Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Pharmacopoea Wirtenbergica

Stutgardia 1760

2 M.med. 75 m
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10213830-5
VD18 14684918-001

2 Mat. med. 75 m



2 M.med. 75 m

<36623523790012

<36623523790012

Bayer. Staatsbibliothek


APOLLO
HIPPO
CRATES

PHARMACOPOEA WIRTENBERGICA

IN

DUAS PARTES

DIVISA

QUARUM PRIOR

MATERIAM MEDICAM

HISTORICO-PHYSICO-MEDICE

DESCRIPTAM

POSTERIOR

COMPOSITA ET PRÆPARATA

MODUM PRÆPARANDI ET ENCHEIRESES

EXHIBET.

JUSSU

SERENISSIMI

DOMINI DUCIS

ADORNATA

ET

PHARMACOPOEIS WIRTENBERGICIS

IN NORMAM PRÆSCRIPTA:

ACCEDUNT

SYLLABUS MEDICAMENTORUM

COMPOSITORUM

IN CLASSES DIVISUS

ET

INDICES NECESSARII.

EDITIO NOVA REVISA AUCTA ET EMENDATA.

Cum Gratia & Privilegiis Sacr. Cæſ. Maj. Reg. Polon. ac Elect. Saxon.
nec non Seren. Dn. Ducis Wirtenberg.

STUTGARDIÆ

SUMTIBUS IOANNIS CHRISTOPHORI ERHARDI BIBLIOPOLÆ.

ANNO MDCCLX.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

AD PRIMAM

PHARMACOPOEÆ WIRTENBERGICÆ

EDITIONEM

PRÆFATIO.

L. B. S.

Recentiſſimam hancce mercem dum in forum extrudimus pharmaceuticum, non diffitemur, BENEVOLE LECTOR, quod circa idem penſum plures alii non modo Germani, ſed omnium quoque nationum celeberrimi gnaviter jamjam deſudaverint viri, materiam medicam exploraverint ſtudioſiſſime: atque Chemiam non minus ac Pharmaciam expoliverint feliciſſime: Alii compoſitionum & formularum inſignes commentarios, imo integra prodige cumulaverint plauſtra: Alii ſelectum prudenter inſtituerint: Alii virgulam cenſoriam acerbe ſtrinxerint ac confuſum chaos ſcite digeſſerint: Alii nævos fraudesque nonnullorum pharmaco-

polarum ingenue detexerint: Alii medicamenta ad justum religiose reduxerint pretium: Alii denique & medici & integri magistratus leges ac ordinationes sanxerint longe saluberrimas.

Nomen omnino laudesque manebunt egregie de pharmacia promeritos insignes viros, qui ante sesquiseculum, & quod excurrit, illam dogmatice cœperunt excolere, novisque semper in hunc usque diem accessionibus atque commentariis augere, emendare ac perficere sedulo perrexerunt. E plurimis nominasse sufficiat Joh. WECKERUM, Casp. BAUHINUM, Guern. ROLFINCIUM, Joseph. QUERCETANUM, Joh. RENODÆUM, Joh. ZWELFERUM, Luc. SCHROECKIUM, Joh. SCHROEDERUM, hujusque commentatorem Frid. HOFFMANNUM, Georg. Wolfg. WEDELIUM, Dan. LUDOVI, Mosen CHARAS, Nicol. LEMERY, Joh. Helfric. JUNCKENIUM, August. Quirin. RIVINUM, Joh. Cunrad. BARCKHAUSEN, Georg. Ernest. STAHLIUM, Herm. BOERHAAVIUM, & qui Halensem Universitatem adhuc ornant, Frid. HOFFMANNUM, & Joh. Henr. SCHULZIUM. &c.

Fraudes, vitia & mangonia candide ac data opera detexerunt Symphor. CAMPEGIUS, Lisettus BENANCIUS, Joh. Anton. LODETTUS, Petr. POMETUS, JUNCKENIUS &c. Taxarum moderationem solide docuit inprimis supra laudatus LUDOVICI. Dispensatoria vero, quibus partim, licet rarius & minus perfecte, simplicia describuntur medicamenta, partim compositionum formulæ atque Taxæ, partim vero annexæ etiam leges sunt publicæ, quæ

medicos

medicos ſpectant atque pharmacopolas, tanto luxuriant numero, ut non integræ modo regiones & provinciæ, ſed & ſingulæ paſſim urbes ſingulis propriisque gaudeant diſpenſatoriis atque taxis.

E recentioribus jure meritoque laudamus *Pharmacopœam Auguſtanam* reformatam, *Bateanam, Diſpenſatorium Brandenburgicum, Viennenſe* ac *Argentinenſe*. Inter taxas quamplurimas Onoldina, quæ 1714. & Windsheimenſis, quæ An. 1708. prodierunt, æquitate non modo ſe commendant præcipue, ſed & multarum compoſitionum novitate. Et, quanta eheu farrago eſt librorum, qui materiam medicam, domeſticam & exoticam per tria naturæ regna tradiderunt ampliſſime & iconibus illuſtraverunt nitidiſſime!

Igitur ne actum videamur agere & noctuas ferre Athenas, dum novum heic molimur Diſpenſatorium, aut arroganter velle ſupra laudatiſſimos illos ſapere viros arguamur, paucis primo cauſas afferre, quæ nos ad hoc impulerunt inſtitutum, tum vero ipſum inſtituti modum atque ſcopum explicare conſultum duximus.

Scilicet uſi hactenus ſunt pharmacopolæ noſtrates Pharmacopœa Auguſtana, tanquam auctore claſſico. Sed, cum non modo plurimæ medicamentorum hodie uſualium formulæ ibi exulent in genere, ſed illæ etiam maxime compoſitiones, quas patria noſtra ſibi quaſi proprias vindicat, a celebribus olim noſtris medicis, GABELKOVERO, HAUGIO, GMELINO, CELLARIO, BRODTBECKIO,

 ZELLERO,

ZELLERO, CAMERARIO &c. officinis cum applausu dudum introductas, ne verbulo tangantur, præter hæc autem a pharmacopœis nostris descriptæ horum medicaminum formulæ passim dissonare, imo subinde vel tituli observati fuerint confundi; Itaque operæ pretium nos facturos confisi sumus, si utrumque non modo supplentes defectum uno codice singulas tam extraneas, quam domesticas colligeremus compositorum formulas, sed uniformem quoque & constantem pharmacopœis nostris præciperemus normam, ad quam omnes quascunque præparationes pharmacevticas atque chemicas exigerent strictissime, neque vel vagas deinceps timide sequerentur, vel, certas quidem, pro ingenio & lubitu temere porro mutarent præscriptiones.

Accedunt & hæ satis, quod putamus, momentosæ rationes, quod, etiamsi hoc Augiæ stabulum plures jam purgare cœperint, nostræ tamen nihilominus etiam officinæ incondita obsoletorum, inutilium atque superfluorum medicaminum mole adhucdum obrutæ in antiquo fere hæserint luto, præparationes vero ipsæ passim vel præter necessitatem operosæ ac sumptuosæ, vel inconcinnæ aut insufficientes, vel arbitrio pharmacopœi nimis expositæ manserint hucusque. Quot vero quantumque hinc non potuerint non propullulare incommoda atque damna, peritus in arte facile intelligit?

Neque minus Taxa nostra Wirtenbergica & ordinationes, quibus A. 1721. renovatis usi sumus

ab eo tempore, aliquam paſſim mutationem & emendationem poſtulare videbantur. Unde juſſu & authoritate SERENISSIMI atque CLEMENTISSIMI DOMINI DUCIS noſtri manus operi admovere cœpimus, nos Georg. Burck. SEEGER, Joh. Wendel. BILFINGER, Joh. Albert. GESNER, atque ego Burck. Dav. MAUCHART, Med. Doctores, Conſiliarii & Archiatri Wirtenbergici ordinarii, habitaque prius ſeria deliberatione totum ita diſpeſcere penſum conſtituimus, ut, duobus voluminibus, altero tota materia medica, altero præparationes ſimplicium & compoſitorum comprehenderentur. Sub finem præter indices neceſſarios, Taxam ſeu pretium medicamentorum adjunximus. Laudabilem præcipuamque operam contulit honoratiſſ. Collega noſter GESNERUS, in ipſa pharmaciæ ac chemiæ praxi dudum verſatiſſimus. Statuendis medicaminum atque laborum pharmaceuticorum pretiis adhibuimus una binos non modo e Stutgardienſibus Pharmacopœos, ſed & Tubingenſes, dexterrimos, & abſolutum denique totum opus cum ampliſſ. Facultate medica Tubingenſi communicavimus, neque minus deſideriis monitisque medicorum atque pharmacopolarum tam indigenorum, quam extraneorum æquas præbuimus aures.

Hanc vero totius operis ichnographiam præmittimus, ut ſtatim in limine appareat, quænam ejus ſit materia, ordo atque ſtructura. Exhibemus itaque primo ſuccinctam ex optimis quibusque auctoribus hiſtoriam phyſico-medicam & diviſio-

visionem in certas classes totius materiæ medicæ per tria, sic dicta, naturæ regna, notas bonitatis & mangonii fideliter aperimus, vires atque usus, nonnunquam etiam doses, aliorum nostraque experientia, vel justo saltem ratiocinio confirmatas subnectimus, ut sic non modo tirones medicinæ ac pharmaciæ, sed & provectiores compendium habeant doctrinæ pariter ac sumptuum, in ampliorem materiei medicæ supellectilem librariam erogandorum. Nomina auctorum, unde plerasque hausimus descriptiones, quod subticuerimus utplurimum, vel solum brevitatis studium satis excusabit. Magnifice & confidenter nimis elatas nonnullorum medicamentorum virtutes, sed certo usu & eventu nondum satis comprobatas nemo, quod speramus, ægre feret, a nobis vel certe inter dubias fuisse relatas. Indicem nativorum pariter ac arte paratorum, ad certas classes relatorum, præfiximus, ut uno obtutu non modo tota materia medica conspici, sed & juxta hunc indicem visitationes officinarum pharmacevticarum solennes institui possint commodius, adjecto insuper discrimine, quibus instrui debeant medicamentis ampliora majorum urbium pharmacopolia, quibus arctiora minorum.

Momenta dispensatorii pharmacevtico-chemica quod attinet, animus primo fuit, vela contrahere, &, quantum fieri possit, arctissimis constringere limitibus luxuriantem planeque stupendum compositorum maxime numerum. Sed, ut ipse selectus omnium ingeniis adcommodari vix potuisset,

tuiſſet, præterea etiam extraneis, quibus amplior variusque remediorum apparatus ad palatum eſt, vel etiam indigenis, ad certas compoſitiones jam adſuetis opera noſtra parum fuiſſet utilis vel jucunda; ita plures, vel invitis nobis, ſe ingeſſerunt formulæ, molemque, omiſſis tametſi quam plurimis ſuperfluis & obſoletis, auxerunt, atque ſic noſtrum Diſpenſatorium ipſa remediorum copia nulli palmam facile cedit alii, ſi quidem laureolam in muſtaceo quærere liceat.

In formularum recenſione ordinem ſervavimus alphabeticum, in ipſa vero diſpenſatione talem, a potiori, qui regulis pharmaciæ magis reſpondeat, atque ſic in arte minus verſatos vel incautos adjuvet dirigatque. Rejecimus vero antiquitus receptas claſſes medicamentorum, ad certas compoſitiones numeroſe adhibitorum, cum per experientiam conſtiterit, multo commodius aptiusque tractari in diſpenſatione, ſi conjuncta ſerventur. Medicamentorum nomina, pondus, doſin expreſſis literis dilucide potius, quam numeris atque chemicis ſignis reddere maluimus, ut omnis, qui facile obrepit, evitetur error. Doſes medicamentorum, atque activorum vel draſticorum ingredientium proportionem, e. g. quantum reſinæ ſcammonii, quantum opii, quantum mercurii dulcis, &c. inſit ſingulæ drachmæ vel ſcrupulo totius compoſiti, nec non dubiam ſecuritatem & noxas certorum medicamentorum ideo adſtruximus, ut junioribus medicis ſtatim diſpaleſcat, qua ſingulum tale medicamentum doſi tuto poſſit

 ex-

exhiberi, quibus abſtinere præſtet, vel circumſpecte ſaltem uti oporteat, &, ſi qua patientes inconſulto medico minus ſecurum expetant medicamentum, aut formulæ in officinas transmiſſæ immodicas & ſuſpectas præcipiant doſes, pharmacopœi regulam habeant conſtantem, damnumque imminens avertere ſciant.

Nec ingenua hac apertaque methodo empiriæ medicæ januam aperuiſſe redarguendi ſumus. Audaculos enim & naſutulos agyrtas quemadmodum alias nihil eſt quod moretur, ita minime reticendum videbatur ideo monitum aliquod ſalutare, ne vertatur ab illis homuncionibus in abuſum. Ceterum qui veræ & dogmaticæ medicinæ præcepta vel primis deguſtavere labris, facile perſpiciunt, quod optimorum quorumlibet remediorum & arcanorum notitia nondum faciat medicum, ſed veriſſimum cedroque dignum ſit CAPIVACII reſponſum, medicinæ Candidato, Ipſius arcana ſciſcitanti ac efflagitanti datum: *Diſce meam methodum, & habebis mea arcana!* Unde per leges patrias dudum apud nos proſpectum ac denuo ſevere cautum eſt, ut ne quicunque alii, niſi in medicina legitime promoti, ultra crepidam ſapere, & in medicinæ ſacra illotis manibus irrumpere tentent.

Antiquis medicamentorum nonnullis formulis, civitate pharmacevtico-medica dudum gaudentibus, licet ſæpe admodum inconcinnæ ſint, limam non adhibuimus, cum vel ex ipſa ferragine incondita tertium quoddam laudabile queat reſultare medicamentum, theriacæ teſtimonio: recentiores etiam compoſitiones, quæ auctorum ſuorum nominibus

nibus clarent, utplurimum ſuo reliquimus pretio. At alibi paſſim a communi tramite diſceſſimus in præparationibus medicamentorum chemicis nec ratione, nec experientia, nec hinc inde etiam authoritate deſtituti. Aloën e. g. atque opium nuper demum evulgata methodo corrigere hic juſſimus. Vagum illud in formulis præceptum: quantum vis, vel quantum ſatis, neque minus præſcribi ſolitos manipulos, pugillos, pro digitorum modulo & phantaſia pharmacopœi valde diſcrepantes, redegimus ad certum pondus atque numerum, hinc quoque effectum daturi, ut in poſterum aquæ, ſpiritus, tincturæ, eſſentiæ, elixiria easdem qualitates & vires ubique & conſtanter obtineant, ſirupi etiam, noſtra methodo parati, reddantur gratiores, atque vires, longa coctione difflari ſolitas, ſervent integriores. Cæteras pariter præparationes, juxta modernæ ac ſanioris Pharmaco-chemiæ regulas ubique inſtruximus ac emendavimus.

Factum hinc eſt, ut, quemadmodum nonnullorum præparatorum vires ſunt exaltatæ, doſes autem imminutæ, & ſuperflua pretioſa omiſſa, e. gr. in præparatione Tartari emetici, ſine cryſtalliſatione parati, & Nitro perlato, ſubſtituta margaritis matre perlarum, ita aliorum compoſitorum pretia evehere, aliorum imminuere oportuerit.

Supereſt, ut pauca adhuc de Taxa medicamentorum moneamus. In ſcopuloſo & procellis tumenti hoc mare ceu cynoſuram ſecuti ſumus æquitatem, regionis populique conditionem, præſentia mercium pharmacevticarum pretia, artis, laboris

 tædii,

tædii, periculi ac expenſarum juſtam æſtimationem: Inſtabile & varians certorum exoticorum pretium ſeorſum ad finem, ut uno conſpectu cerni, & juxta ſyllabos nundinales pretiorum authenticos, die Preiß-*courants* dictos, quoties opus fuerit, ex æquo accommodari queat in ſeparata pagina ſubneximus, atque ſingulis pretium præſens adpoſuimus.

Quamvis ergo haud perfunctorio labore, & citra cujuscunque obtrectationem, ſolo boni publici ſtudio cuncta fideliter exſecuti nobis videamur, tamen & excuſare ſilentium, quod in deſcriptione nonnullorum pharmacopolii noſtratis aulici arcanorum, e. gr. Theriacæ cœleſtis, Emulſionis perlatæ, Maſſæ pilul. de ſuccino GREIPHII, ſervare cogimur, & errores, ſi qui obrepſerunt, deprecari fas exiſtimamus, bene gnari, ne quidem machinari licere opus ab omni parte beatum, imo ex ampliſſima hac meſſe non defuturum ſatis adhuc copioſum ſpicilegium. Unde, ſi quid humani videamur paſſi, humaniter moneri non detrectamus. Ad ultimum vero DEUM TER OPTIMUM MAXIMUM ſupplices rogamus, velit laboribus hiſce noſtris ex alto benedicere, vires infundere medicamentis, cunctaque noſtra conſilia in ſui ipſius honorem & largiſſimos rei publicæ ac literariæ fructus clementer dirigere.

Scripſi Collegarum nomine
Tubingæ Menſ. April. A. MDCCXL.

BURCARDUS DAVID MAUCHART,
Med. & Chir. D. Med. Anat. & Chir. Prof. Ord.
Conſiliarius & Arch. Wirt. Collegii Archiatralis & Facult. Med. Tubingenſis Senior.

AD

SECUNDAM ET TERTIAM

PHARMACOPOEÆ WIRTENBERGICÆ

EDITIONEM

PRÆFATIO.

L. B. S.

Agimus jam tertium luſtrum, BENEVOLE LECTOR, ex quo prima vice in lucem prodiit Pharmacopœa Wirtenbergica. Placuit noſter ille labor publico ita, ut, qui maximo numero typis exſcripta fuerant libri exemplaria, omnia nos inter, atque exteros gentes diſperſa, indiesque plura a Bibliopolis petita fuerint.

Reaſſumſit itaque Clariſſimus Collega noſter D. D. GESNERUS calamum, & uti eſt rerum pharmacevticarum doctiſſimus, editionem hanc ſecundam, priori hinc inde auctiorem paravit, quam jam publico uſui tradimus.

Præfatus eſt multa perſpicue alter Collega Clariſs. D. D. MAUCHARTUS ad primam libri editionem, atque inſtituti Leges, librique ſummam indicavit, ut hac vice pauca ſaltim de diffe-

 rentia,

rentia, & prærogativa hujus editionis, ejusque additionibus præfanda habeamus.

Prima libri pars, Materiam Medicam simplicem complectens, aucta est I. Nomenclatura Gallica, ut scilicet exterorum usibus, qui magnam partem vel Galli sunt, vel Gallica amant, inserviamus. II. Numerus etiam simplicium auctus est, & III. Vires specificas, plantarum inprimis, quæ experientia certa, vel auctoritate virorum clarissimorum, quos inter, *Illustrem* HALLERUM, *Gœttingensium decus*, primo loco nominamus, nituntur, adjunximus.

Exoticorum patriam, & historiam naturalem ex fontibus hausimus, eumque in finem RAJI, KÆMPFERI, VALENTINI, GARCIÆ AB HORTO, PISONIS, LEMERY, POMETI, TOURNEFORTII, BOERHAVII, opera, imo *Germanorum*, atque *Gallorum Ephemerides* in usus nostros adhibuimus, ut ita Lectoribus nostris sumtuum, & laboris compendium faceremus. Sunt quædam, quæ nuper demum erudito orbi innotuere, ab uno alterove magnis laudibus deprædicata, quorum tamen vires medicæ vel non satis cognitæ, vel non satis probatæ sunt: his etiam hac editione, post reliqua locum dedimus, ut ne quid numero simplicium desit.

Alteram

Alteram libri partem, quæ præparata, & compoſita medicamenta complectitur, quod attinet: & hanc, multarum formularum inſperſione auctam damus. Haud quidem ignoramus, pharmacopolia, & libros pharmacevticos laborare copia magis, quam inopia, bonamque ac prudentem methodum medendi non opus habere tot tantisque compoſitionibus, & formulis: inde etiam in nos non recipimus, ut rationem omnium in hoc libro collectorum medicamentorum reddamus, cum non raro compoſitiones & decompoſitiones, quæ inconcinnæ, non neceſſariæ etiam, & inutiles videntur, occurrant, quæ tamen a poſteriori, & ex uſu ſe commendarunt, quorum illuſtriſſimum in Theriaca Andromachi exemplum habemus. Placuit tamen diverſitati guſtus inſervire, & divitias libri augere, atque eadem præciſione, multas novas formulas, clariſſimorum noviſſimorumque Doctorum progenies, deſcribere, qua in prima libri editione uſi ſumus: id enim eſt illud punctum, in quo labor noſter multorum aliorum curas antecellit, ut nihil indeterminatum relictum ſit, ſed omnia ad menſuram & libram dimenſa proſtent.

Quilibet vel pro uſu privato, vel publico eliget ex hac farragine formularum ſelectarum ea,

quæ maxime necessaria, & utilissima judicabit, ita fiet, ut quæ centum pro superfluis habebunt, alii centum tanquam maxime necessaria seligant.

Tandem Indici Latino, Gallicus, & Germanicus adjectus est, ut instar Lexici inservire liber possit.

Hæc sunt, BENEVOLE LECTOR, quæ secundæ libri editioni præmissa, hic repetimus. Superest, ut fidem olim datam & culpa aliorum hactenus non solutam, liberemus, atque *Taxam medicamentorum*, in partes vocatis celeberrimis pharmacopolis, iterata opera expolitam & correctam, superaddamus. Utere nostris BENEVOLE LECTOR, & si placet, meliora redde. Vale!

Stutgardiæ
d. 8. Aprilis 1754.

D. J. W. BILFINGER,
Archiater Wirtenberg.

DE

DE

NONNULLIS,

LECTORIBUS & PHARMACOPOEIS,

SCITU NECESSARIIS.

Quantum intersit, ut in medicamentorum præscriptione omnia ad pondus & mensuram sumantur, etiam hospiti in medicina notum est. Sunt enim pondera & mensuræ quasi regulæ & canones, secundum quas in medicamentorum compositione & medicina facienda, omnia ad æquitatem & pro intentione Medici ponderantur, ne vel excessu noceant, vel defectu peccent.

Necesse igitur esse putavimus, pondera & mensuras, quibus in dispensatorio hoc nostro usi sumus, & quibus Medici in præscribendis formulis uti solent, adponere.

Libræ ubi mentionem fecimus, libram medicam, quæ uncias pendet duodecim, intelligi voluimus. Libra vero civilis nostra uncias habet sedecim.

Uncia una octo habet drachmas.

Drachma una tres habet scrupulos.

Scrupulus unus viginti habet grana.

Mensura nostra ordinaria Wirtenbergica pendet aquæ libras quatuor medicas, vel uncias quadraginta octo.

Mensuræ quadrans (ein Schoppen) libram unam facit medicam, vel uncias duodecim.

Manipulum quando scribimus, quod plerumque in herbis & floribus præscribendis fieri

ſolet, illam intelligi volumus quantitatem, quam manus modica capere poteſt.

Sub Pugillo tertiam partem manipuli, vel quod tribus digitis capitur, intelligimus.

Præſtat tamen herbas & flores etiam pondere determinare, & pro manipulo drachmas tres, pro pugillo drachmam unam ſumere, ut, ſi forſan repetitione opus habeat præſcriptio quædam, illa eo accuratior parari poſſit, & tam quoad ſaporem, quam odorem, in omnibus cum priori conveniat, atque ægrotis omnis ſcrupulus, mancæ ac minus accuratæ præparationis dematur.

Plura etiam nonnunquam ſimplicia uno nomine præſcribi ſolent: exempli gratia cum Medicus præſcribit:

Radices quinque aperientes majores, ſumantur	Apii Aſparagi Fœniculi Petroſelini & Ruſci.
Radices quinque aperientes minores.	Capparis Eryngii Graminis Ononidis Rubiæ tinctorum.

Herbæ quinque emollientes.	Althææ Malvæ Mercurialis Parietariæ Violariæ	vel	Malvæ Brancæ urſinæ Betæ Parietariæ Mercurialis.

Herbæ

Herbæ quinque capillares.	Adianti aurei Capilli Veneris Ceterach Rutæ murariæ Scolopendrii.
Flores quatuor cordiales.	Borraginis Buglossæ Rosarum Violarum.
Semina quatuor calida majora.	Anisi Carvi Cumini Fœniculi.
Semina quatuor calida minora.	Ammeos Amomi Apii Dauci.
Semina quatuor frigida majora.	Citrulli Cucumeris Cucurbitæ Melonum.
Semina quatuor frigida minora.	Cichorii. Endiviæ sive Scariolæ Lactucæ Portulacæ.
Quinque Genera Myrobalanorum.	Belliricæ Chebulæ Citrinæ Emblicæ Indæ.

Fragmenta Lapidum quinque pretioſorum.	Granati Hyacinthi Sapphiri Sardæ ſive Carneoli Smaragdi.
Quatuor Aquæ cordiales.	Bugloſſæ Borraginis Roſarum Violarum.
Quatuor Aquæ pleuriticæ.	Cardui benedicti Cardui Mariæ Scabioſæ Taraxaci.
Aquæ quatuor catarrhales.	Farfaræ Scabioſæ Taraxaci Veronicæ.
Quatuor Unguenta calida.	Agrippæ Altheæ Martiatum Nervinum.
Quatuor Unguenta frigida.	Album camphoratum Infrigidans Galeni Populeum Roſatum Meſues.
Tria Olea Stomachica.	Abſinthii Cydoniorum Maſtiches.

PHAR-

PHARMACOPOEÆ WIRTENBERGICÆ
PARS PRIMA,
MATERIAM MEDICAM
EXHIBENS.

PHARMACOPOEÆ WIRTENBERGICÆ

PARTIS PRIORIS CLASSIS PRIMA.

REGNUM MINERALE.

CAPUT I. DE TERRIS.

Bolus alba, *Bol blanc*, **weisser Bolus.** Terræ argillaceæ species. *Virtutis est adstringentis & siccantis; nunquam interne, sæpius vero externe in usum vocatur.*

Bolus Armena, Armeniaca, *Bol d'Armenie*, **Armenischer Bolus.** Laudatur illa, quæ promte linguæ adhæret; coloris pallido rubri, lubrica & impalpabilis, non arenosa est. Olim ex Oriente advehebatur, nunc etiam in Galliæ & Germaniæ nonnullis provinciis reperitur. *Adscribitur ei vis bezoardica, & notorie adstringit.*

Bolus rubra vulgaris, *Bol rouge vulgaire*, **gemeiner rother Bolus.** Advehitur ex Bohœmia & Episcopatu Salisburgensi. *Raro a Medicis præscribitur; veterinariis vero, & ad Spiritus Nitri & Salis destillationem inservit.*

Creta alba, *Craye blanche*, **weisse Kreide.** Est terra, seu potius marga. Laudatur Coloniensis, quæ alba, levis & non arenosa est. *Acidum absorbet, & ad species diacretæ requiritur.*

Lac Lunæ, Agaricus mineralis, *Lait de lune, Agaric mineral*, **Monmilch.** Est marga friabilissima, levis, vel terra subtilissima, quam aqua poros saxorum transiens solvit, atque intra rimas & cavernas montium deponit. Maximus ejus est proventus in Helvetia, in cavernis montis pileati sive fracti, & montis Wallenstock; reperitur etiam in caverna illa celeberrima Ducatus Wirtenbergici, quæ **Nebelloch** vocatur.

vocatur. *Virtutem habet absorbentem, & ad lactis augmentationem nutricibus praescribitur.*

Lithomarga, Medulla saxorum, *Moëlle de pierre*, **Steinmarck.** Est substantia solida, coloris utplurimum grisei, pinguis, lubrica; *adstringentis saporis & virtutis.*

Ochra, *Ochre, ocre*, **Ochergelb.** Est terra martialis, coloris subflavi. *Pictoribus inservit.*

Rubrica fabrilis, Sinopis veterum, *Craye rouge*, **Röthel=Stein.** Margae martialis species, Bolo durior, valde adstringens. Ex Episcopatu Salisburgensi magna in copia advehitur. *Raro tamen in usum medicum venit; cum melle rosato mixta ad Aphthas commendatur.*

Terra Japonica. Vide Succi condensati.

Terra Lemnia, *Terre Lemnienne*, **Lemnische Erde, Erde aus der Insul Lemnus.** Coloris diversi, vel pallidi, vel flavo fusci, vel rufescentis; nobis ex Turcia advehitur. Eligatur, quae saponis instar, pinguis est, modice adstringit, nec digitos colore inficit. *Virtute gaudet adstrictiva & bezoardica.*

Terra sigillata alba Turcica, *Terre sigillée blanche de Turquie*, **weisse Türckische Siegel=Erde.**

Terra sigillata alba Goldbergensis, *Terre sigillée blanche de Silesie*, **weisse Schlesische Siegel=Erde.**

Terra sigillata Melitensis, sive de Maltha, *Terre sigillée de Malthe*, **Malthesische Siegel=Erde.** Coloris albi, & plerumque effigie S. Pauli signata est. Uti reliquae terrae sigillatae, impalpabilis & pinguis esse debet. *Terrae sigillatae albae omnes viribus conveniunt, absorbentes, sudoriferae & bezoardicae habentur, nec adeo, sicut rubrae, adstringunt.*

Terra sigillata rubra Turcica, *Terre sigillée rouge de Turquie*, **rothe Türckische Siegel=Erde.** *Haec, & aliae hujus coloris, cum Bolo Armena conveniunt.*

Terra sigillata Silesiaca grisea, vel lutea Strigoniensis, *Terre sigillée grise de Silesie*, **graue Schlesische gesiegelte Erde.** A nonnullis *Axungia solis* vocatur. Pinguis, minus friabilis, atque sabuli omnis expers eligenda. *Viribus cum terra Lemnia convenit.*

Terra Tripolitana, Tripolis offic. *Tripoli*, **Trippel=Erde.** Margae est species, & ex particulis pulverulentis constat. Levis atque impalpabilis esse debet. *Siccat, & ad intertrigines commendatur; usus vero est magis mechanicus, quam medicus.*

Terra viridis, viride montanum, Chrysocolla veterum, *Terre verde, Verd de montagne, Chrysocolle*, **grüne Erde, Berggrün.** Est ochra venerea. Ex Hungaria nunc, olim ex Armenia adferebatur; eligenda, quae saturate viret. *Pictoribus inservit potissimum; Chirurgi vero etiam ad purganda & exsiccanda ulcera maligna, bono cum successu ea uti possent.*

CAPUT

CAPUT II.
DE SALIBUS NATIVIS ET ARTE FACTIS.

Alumen crudum vulgare, album, glaciale, *Alum ou Alun blanc, vulgaire*, **gemeiner, weisser Alaun.** Est sal minerale, valde adstringens, quod in Anglia, Suecia & Germania ex propria minera educitur. Acidum Aluminis, cum Vitrioli acido, convenit; terra vero Aluminis, calcareæ, & Vitrioli, metallicæ indolis est.

Alumen Romanum, rupeum, rubrum, *Alum ou Alun Romain, de roche*, **rother Römischer Alaun.** Ex Italia advehitur, & prope *Tulfam*, ex saxo calcinato, certis encheiresibus, extrahitur. Coloris rosei pallidi, & in crystallis esse debet; *cum præcedente convenit.*

Alumen saccharinum, ad præparata pertinet, & in parte posteriori quærendum est.

Borax, Borax Veneta, Chrysocolla, *Borax de Venise*, **Borras, Borax.** Est sal, quod ex peculiari minera, quæ ex Orientalibus Indiis advehitur, Venetiis & in Hollandia paratur. Eligenda est alba, crystallina, levis, in igne facile fluens, atque vitrescens. *Incidit, attenuat, abstergit, stimulat; urinam, menstrua & partum promovet, atque hoc scopo aliis calidis, sanguinem commoventibus medicamentis præferri meretur. Dosis scrupulus unus vel drachma semis. Aurifabri borace ad aurum spissum ac fragile, ductile reddendum, utuntur.*

Cineres clavellati, Sal alkali vulgare, *Potasse, Vedasse, Cendre gravelée*, **Potasche.** Sunt sal fixum lixiviosum, ex cineribus lignorum, præsertim duriorum, e. g. querni & fagini extractum & calcinatum, quod in magna quantitate e Moscovia, Curlandia & Hassia advehitur, atque etiam apud nos in sylva martia paratur. Non purum est alkali, sed sal continet neutrum sive medium, cum Tartaro vitriolato conveniens, quodque facile solutione & crystallisatione separari potest. *Usus Cinerum clavellatorum est varius, & plurimus in arte tinctoria & vitriaria. In Medicina, si a terra & sale neutro depurantur, loco salis tartari inservire possunt.*

Nitrum, Sal petræ, *Nitre, Salpetre*, **Saliter, Salpeter.** Tam regno animali, quam vegetabili & minerali, originem debet. Elicitur apud nos, mediante aqua, ex terra nitrosa, quæ in hypocaustis & stabulis foditur, atque urina, vel aliis excrementis animalium, a longo tempore imprægnata fuit. Solutio sive extractio, ob pinguitudinem nunquam in crystallos abit; hinc per lixivium, ex vegetabilium cineribus & calce viva paratum, depuratur, atque evaporata superflua aquositate, ad crystallisandum reponitur. Eligendum album, purum, quod crystallos exhibet longas, sexangulares, prismaticas; carbonibus ignitis inspersum, absque crepitatione promte deflagrat, atque in aqua facile dissolvitur. *Est medicamentum polychrestum, refrigerans, bilis acrimoniam temperans & diureticum. Datur a granis quinque ad scrupulum unum & ultra.*

Sal Anglicum laxativum, Ebshamense, *Sel d'Epson, Sel purgatif amer*, **Englisches Laxier-Saltz.** Olim ex fonte medicato Ebshamensi in Anglia solum, aquam evaporando, parabatur; nunc etiam ex salis culinaris lixivio certa encheiresi, & additione acidi Vitrioli conficiunt. Advehitur nobis ex Anglia, ubi prope urbem Lemmington, quæ ad comitatum Sauthampton vel Hant-Shiere pertinet, magna ejus quantitas ex residuo lixivio a salis marini depuratione, paratur. Eligitur album, purum, in aqua facillime solubile. *Medicamentum est, alvum ciens incomparabile, & secure etiam in febribus ab uncia ad unam semis in aqua solutum dari potest.*

Sal armoniacum, ammoniacum, *Sel ammoniac ou armoniac*, **Salmiac.** Sal est artificiale, ex urina, fuligine & sale communi in placentas sublimatum. Advehitur ex Ægypto, ubi magna quantitas hujus salis in provincia, quæ Delta vocatur, non procul ab urbe *Mensoura*, in pagis *Damire* paratur. Eligatur candidum & purum, quod addito sale alcalico statim odorem salis volatilis spargit. Datur & nativum, quod inter rariora numerandum. *Usus salis armoniaci est varius, tam medicus, quam mechanicus. A nonnullis pro specifico habetur antifebrili, & a scrupulo uno ad duos exhiberi solet.*

Sal Egranum, *Sel purgatif d'Eger*, **Eger-Sauerbronnen-Saltz.** Paratur ex acidulis evaporatis. Seligitur album in crystallis. *Alvum leniter & absque torminibus laxat. Dosis drachmæ duæ ad sex. Datur aquas minerales bibentibus.*

Sal gemmæ, *Sel gemme*, **Stein-Saltz.** Sal est fossilis seu nativus, qui ex Polonia adfertur. Eligendus pellucidus, albus. *Usus est tam culinaris, quam medicus.*

Sal marinus, *Sel marin*, **Meer-Saltz.** Eligendus purus, crystallisatus, cubicam figuram exhibens. *Sal culinare, gemmæ, & marinum ejusdem sunt indolis, & non nisi puritate differunt; hinc etiam culinare illis substitui potest. Sal est condimentum ciborum universale, & vim habet incidentem, discutientem & diureticam.*

Sal Sedlizense, *Sel purgatif de Sedliz*, **Sedlitzer Saltz.** Ex aquis mineralibus amaris Sedlizensibus in Bohœmia conficitur. Eligendum album, crystallisatum. *Cum Sale anglico convenit; in minori vero dosi exhiberi solet.*

Soda Hispanica, *Soude, Soude en pierre*, **Spanisches Aschen-Saltz.** In glebis diversæ magnitudinis, coloris cinerei, ex Hispania advehitur. Paratur per incinerationem & calcinationem ex planta, quam Kali geniculatum, vel Salicorniam vocant. Planta nimirum exsiccata, in fasciculos collecta, in ferrea crate super foveam posita, comburitur, cineres inde orti, in fovea collecti, cooperiuntur, qui, successu temporis, in massam, duritie lapidem æmulantem, coëunt. Quæ massa diffracta, ubicunque divehitur. Præfertur Soda, quæ *Soude d'Alicante* vocatur, & ex portu Valenciæ Alicanta advehitur, quæ ex cœruleo cinerea, sicca & tinniens, intrinsecus & extrinsecus spongiæ instar porosa & odoris paludosi madefacta expers est. *Usus sodæ in medicina nullus, nisi ad sal Seignette, in arte vitriaria & tinctoria plurimus.*

Vitriolum album, *Vitriol blanc*, **weisser Vitriol, Galitzen-Stein, Augen-Stein.** Apud Goslarienses, ex minera plumbi argen-

argentifera montis Rammelsberg elicitur. Modum parandi, *Schlüterus*, in elegantissimo opere de arte fusoria, Schmeltz- und Hüttenwerck, describit. Sit, sacchari instar, album, & non nimis durum. *In collyriis adhibetur; mundificat, siccat & adstringit. Ob particulas cupreas interne sumtum vomitum ciet, & caute hoc scopo exhibendum.*

Vitriolum cœruleum, de Cypro dictum, *Vitriol de Cypre*, **blauer Vitriol, blauer Galitzen-Stein.** Artificiale, cupreæ vel venereæ indolis est. Eligendum Sapphiri instar cœruleum, crystallisatum. *Virtutem habet septicam & adstringentem; raro vero in usum venit medicum, nisi externe, & ad pulverem sympatheticum.*

Vitriolum viride, Romanum, Hungaricum, Anglicum, *Vitriol verd, Romain, d'Hongrie, d'Angleterre*, **Römischer, Ungrischer, Englischer, grüner Vitriol.** Ferri dives est. Sit herbacei coloris & crystallisatum. Ex Hungaria & Anglia, nec non Episcopatu Salisburgensi, ubi tam e minera propria, quam ex pyrite calcinato conficitur, advehitur. Datur etiam nativum, quod in metallo-thecis curiosorum adservatur. *Usus est mechanicus & medicus. Tartarus vitriolatus Tachenianus optime ex hoc Vitriolo paratur.*

Vitriolum vulgare, *Vitriol d'Allemagne, vulgaire*, **gemeiner Vitriol, Kupfferwasser.** Coloris dilute virescentis, siccum & crystallinum esse debet, pariter cupri & ferri particeps est, & apud Goslarienses magna in copia paratur. *Tinctoribus usus est maximus; cum gallarum infusione mixtum, atramentum præbet scriptorium, & ad decoctum requiritur nigrum.*

CAPUT III.

DE LAPIDIBUS VULGARIBUS ET MINUS PRETIOSIS.

Aëtites, Aquilæ lapis, *Pierre d'Aigle*, **Adler-Stein.** Lapis quasi prægnans alio, in utero sonante. Differt a Geode, qui non sonat, & intus marga plenus est. Præfertur Orientalis, qui plerumque ovalis figuræ est & magnitudinis. *Partum promovere nonnulli tradunt; cum vero martialis indolis est, vis adstringens omnibus innotescit.*

Alabastrum, Alabastrites, *Albâtre*, **Alabaster.** Est marmoris mollioris species, plerumque albi coloris. *Vim habet refrigerantem, & ad unguentum alabastrinum requiritur.*

Alumen plumosum, plumeum, Trichites, *Alum ou Alun de Plume*, **Federweiß.** Asbesti est species, quæ ex Insulis Rhodo & Creta advehitur. *Propter fibras acutas pungentes, & per affrictionem cutem rubefacientes, unguentis ad membra tabida, admisceri a nonnullis solet.*

Alumen scissile, lapis specularis, *Pierre speculaire, Miroir d'Ane*, **Frauen-Glaß, Frauen-Eiß.** Optimum, vitri instar pellucidum, ex Moscovia affertur, & **Moscowitisches Frauen-Glaß** vocatur. *Usus plurimus est mechanicus; ad pulverem Viennensem album etiam requiritur.*

Amiantus, vide Glacies Mariæ vulgaris.

Armenius lapis, *Pierre Armenienne*, *Azur*, **Armenier-Stein**, **Bergblau.** Opacus eſt, cœruleus, maculis nonnunquam argenteis, viridibus & nigris, intermixtus. Minera eſt Veneris; inde etiam eſt virtus ejus purgans. *Melius & ſecurius ad pigmenta, quam in Medicina adhibetur. Probatur ſaturate cœruleus.*

Asbeſtus, *Asbeſte*, *Amiante*, **Stein-Flachs.** Lapis eſt ſciſſilis, & filamentoſus, igni reſiſtens. Veteres, induſia, aliaque, ex hoc lapide præparare ſciebant; quæ, ubi ſordida, igni tradebantur, pura evadebant. Fibras Alumine plumoſo habet molliores, & optima ex Japonia & China advehitur.

Bufonites, Bufonius lapis, Batrachites, Brontias, Chelonites, *Crapaudine*, *Batrachite*, **Kröten-Stein.** Lentem vitream ſimulat, una parte convexam, altera concavam. Coloris eſt ex fuſco pallentis, aliquando fuſci, interdum nigri, viridis, verſicoloris. Sunt, qui diſtinctionem inter Bufonitam & Batrachitam faciunt, atque priorem a bufone, poſteriorem vero foſſilem & mineralem eſſe credunt. De Bufonitæ exiſtentia magnum eſt dubium; de Batrachita vero, qui pro Bufonita venditur, experientia docuit, illum ad petrefacta, vel lapides ſic dictos figuratos pertinere, atque dentes eſſe molares Lupi, piſcis marini. Haud raro in Daniæ regno reperitur. *Alexipharmaca, antepileptica & lithontriptica celebratur virtute.*

Calaminaris lapis, *Pierre Calaminaire*, *Calamine*, *Cadmie*, **Gallmey.** Vocatur etiam *Cadmia foſſilis.* Coloris eſt ſubflavi, ruſeſcentis, nonnunquam griſei; eruitur ex fodinis propriis & metallicis, inprimis circa Aquisgranum magnus ejus eſt proventus. *Metallicæ indolis eſt; cum cupro enim fuſus, non ſolum colorem ejus rufum in aureum mutat, ſed & pondus auget. In Medicina, ad collyria, emplaſtra & unguenta exſiccantia adhibetur.*

Calx, lapis calcarius, *Chaux*, *Pierre a chaux*, **Kalchſtein.** Calcinatus lapis, calx viva dicitur. Marmoris ſpecies eſt, ſiquidem ex quovis marmore forti, igne calcinato, calx viva producitur. *Varius ejus eſt uſus in medicina. Cum ſalibus alcalinis, vel etiam cineribus mixta, dat lixivium forte, ex quo* lapis cauſticus, *vel* Cauterium potentiale, *paratur; item ad ſaponis confectionem, nec non ad aquæ calcis vivæ præparationem, requiritur. Aqua multa lota atque edulcorata*, emplaſtrum defenſivum *ingreditur.*

Cryſtallus montana, *Criſtal*, *Criſtal de roche*, **Cryſtall**, **Berg-Cryſtall.** Vitri inſtar tranſparens, dura, atque ſexangularis, eſſe debet; qua duritie etiam a fluoribus, qui ſæpius in metallifodinis reperiuntur, diſtinguitur. Variis in locis reperitur, inprimis ex Helvetia nobis adfertur. *Abſorbens eſt; vis vero ſpecifica ad diarrhœas bilioſas infantum a lacte coagulato ortas, a nonnullis in dubium vocatur.*

Glacies Mariæ vulgaris, Amianti ſpecies, *Amiante vulgaire*, **Frauen-Eyß**, **gemein Federweiß.** Glacies Mariæ, ſpecularis lapis, Selenites & Amiantus, multum inter ſe conveniunt, ut vix diſcerni poſſint. Lapis, quem glaciem Mariæ modo vocavimus, Amianti eſt ſpecies, & a nonnullis etiam *Alumen plumoſum* vocatur. Fibras habet plumæ inſtar, molliores autem, quam in vero Alumine plumoſo, nec etiam ſapore adſtringente linguam afficit. *Calcinata, a veterinariis pecudibus, ad calorem febrilem temperandum, exhibetur. Argentifabris ad polienda vaſa inſervit.*

Hæma-

Hæmatites, *Hematite, Sanguine*, **Blut-Stein.** Minera eſt Martis, coloris obſcure rubentis, ſaporis terrei adſtringentis. Diverſæ reperitur ſpeciei, *fibris longioribus*, qui in uſum medicum vocatur; *fibris brevioribus*, figura convexa, ſicut cranium humanum, qui germanis metallicolis **Glaßkopff** audit; tertia ſpecies *Schiſtus* eſt, qui loco fibrarum lamellas, ſicut Alumen ſciſſile, habet. *Omnes virtute adſtringente martiali pollent.*

Judaicus lapis, *Pierre judaïque*, **Juden-Stein.** Lapis eſt variæ figuræ, ut plurimum olivaris, cum & ſine petiolo. Colore eſt cinereo; duritie vix ſilici cedit. Reperitur in Judæa, unde forſan nomen accepit: tamen haud raro etiam in aliis obvius eſt provinciis. Ad petrefacta pertinet, & ſecundum modernorum ſententiam, ſunt radioli Echini marini petrefacti. *Adſcribuntur huic & aliis ejusmodi petrefactis vis diuretica & abſorbens.*

Lazuli lapis, *Pierre d'Azur, Azur, Outremer*, **Laſur-Stein.** Coloris debet eſſe cyanei, punctulis aut flammulis, ac venis aureis, ornatus. Durior eſt armenio lapide; ambo autem ſunt mineræ cupreæ proſapiæ. Eligitur pulchre, Sapphiri ac Cyani florum inſtar cœruleus; ex Oriente allatus, & in igne colorem non mutans, in uſum trahitur medicum. Duplo vel triplo, ſalis alcali, igne forti fuſus, in vitrum abit nigerrimi coloris. Quod ſignum præbet, præter cuprum etiam ferrum, & quidem in majori quantitate, reſpectu cupri, continere. Circumferuntur etiam nonnunquam a metallicolis vagabundis, lapides, coloris dilute violacei, ſtriis aureis ornati, quos pro vero lapide Lazuli vendere conantur. Sunt vero arſenicalis & martialis indolis; hinc pharmacopœi caveant, illos vero lapidi Lazuli ſubſtituere. Quamvis non negandum, etiam vero eleganter carere officinas noſtras poſſe. *Ingrediens eſt Confectionis Alkermes, & ad melancholicos humores educendos commendatur. Pictoribus largitur colorem elegantiſſimum cœruleum*, Ultramarinum *dictum.*

Lyncis lapis, Belemnites, Ceraunius, Dactylus Idæus, *Pierre de Lynx, ou Belemnite*, **Katzenſtein, Luchsſtein, Donnerſtein, Druydenfinger.** Figuræ & magnitudinis diverſæ reperitur. Succini inſtar eſt diaphanus, & fere ejusdem coloris flaveſcentis, figuræ teretis, & dum corporibus duris affricatur, urinoſum graveolet. Ille, qui pyramidalis vel coni figura, coloris griſeo-nigricantis eſt, Bellemnites ſtricte dicitur; ambos ex concharum familia, & inter petrefacta eſſe, certum eſt. *Virtute, cum lapide judaico, convenit. A plebe ad incubum & febres intermittentes commendatur.*

Magnes lapis, *Pierre d'Aimant ou Aiman*, **Magnet-Stein.** Ferri colorem habet. Virtutes ad polos directivæ, ferrique ac arenæ martialis attractivæ, omnibus notæ. Quo validius ferrum attrahit, eo melior. *Uſus in Medicina eſt rarus; emplaſtris ſiccantibus nonnunquam additur.*

Nephriticus lapis, *Pierre Nephretique*, **Grieß-Stein.** Jaſpidis eſt ſpecies, coloris obſcuræ viridis, variis coloribus permixtus; ſemper quaſi oleo inunctus videtur. Affertur ex Hiſpania & Bohœmia. *Virtus ex nomine patet; interne datur a drachma dimidia ad integram, externe vel carpo, vel regioni renum, alligare jubent.*

Oſteocolla, *Oſtéocolle*, **Beinbruch, Bruchſtein.** Ob figuram, oſſa æmulantem fiſtuloſam, ita vocatur, oſſiumque fractorum coalitum promovere creditur. Coloris eſt albicantis & Coralli inſtar.

In locis arenosis in Palatinatu, Silesia &c. crescit. *Emplastris additur siccantibus & catagmaticis.*

Pumex, *Pierre ponce*, **Bimsenstein.** Eligendus est levis, albicans, & tritu facilis. Ab ignivomis montibus Ætna & Vesuvio ejicitur; reperitur etiam haud procul a Thermis Embsensibus. *Virtutem habet siccantem, adstringentem, & mundificantem. Usus plurimus est ad dentifricia.*

Selenites, nonnullis etiam Glacies Mariæ, *Pierre speculaire*, **Frauen-Eiß, Frauen-Glas.** Lapis est pellucidus, coloris varii, utplurimum albicantis, figuræ rhomboideæ, scissilis. Multis in locis, etiam in Ducatu Wirtenbergico, reperitur; præfertur clarus & pellucidus. *Virtute cum Glacie Mariæ & Amianto convenit.*

Silex, *Caillou*, **Kieselstein.** Omnibus notissimus. Laudatur e fluviis collectus. *Ad liquorem silicum requiritur.*

Smiris, Smyris, *Emeri, Emeril*, **Schmergel, Schmirgel.** Lapis est ponderosus, ferruginei coloris, ad nigredinem tendentis. Ex Hispania adfertur, & in ferrifodinis reperitur. *Usus est mechanicus, & raro vel nunquam in Medicina adhibetur.*

Spongiarum lapis, *Pierre d'éponge*, **Schwammenstein.** In spongiis marinis reperitur. Est concretum tophaceum salsum, ordinario coloris griseo-albicantis & substantiæ friabilis. *Strumis opponitur, atque virtute gaudet diuretica & absorbente.*

Talcum, Stella terræ, *Talc*, **Talch, Talck.** Lapidi speculari fere simile est; tenuioris & pinguioris tamen substantiæ. Præfertur illud, quod Venetiis nobis advehitur, pingue & coloris viridescentis. *Usus est cosmeticus. Non nisi in mortario probe calefacto in pulverem teri potest.*

CAPUT IV.
DE LAPIDIBUS PRETIOSIS.

Amethystus, *Ametiste*, **Amethist.** Gemma, violacei coloris, pellucida. Est Orientalis & Occidentalis. *Viribus conveniunt, & ebrietatem gestati arcere supponuntur.*

Carneolus, Sarda, Sardius lapis, *Sardoine, Sardienne, Cornaline*, **Carniol, Carneol.** Gemma est semidiaphana, carnis loturæ, sive carni sanguinolentæ similis, unde nomen. Optimus ex Sardinia insula adfertur; in Bohemia, Silesia, aliisque regionibus, etiam reperitur. *Sanguinis profluvia, tam interne sumtum, quam externe gestatum, sistere prætendunt.*

Chrysolithus, Topasius, Chrysopasius, *Chrysolith, Topase ou Topaze*, **Chrysolith.** Diaphana est gemma, luteo-viridescentis coloris, lævigatus aureo fulgore splendens. Advehitur ex Indiis; reperitur etiam in Bohemia. *Ad Epilepsiam & Phrenitidem laudatur.*

Granatus, *Grenat*, **Granat.** Gemma pellucida, punicei coloris. Ex Oriente advehitur pulcherrimus; reperitur etiam in Bohemia, Hispania & Silesia. *Commendatur ad cordis palpitationes, melancholiam & sanguinis sputum.*

Hyacinthus, *Hyacinthe*, **Hyacinth.** Gemma pellucida, ex flavo aut croceo colore rubens. Orientalis & Occidentalis habetur; præ-

ferenda tamen Orientalis. Vitro Saturni adulterata, facile diſtinguitur mollitie & pondere. *Adſcribuntur vires antiſpaſmodicæ & roborantes.*

Rubinus, Carbunculus, *Rubis*, **Rubin.** Gemma diaphana, pulchre rubens, valde dura. Optimus ex inſula Ceylon affertur. *Geſtatus & intus hauſtus, venenis reſiſtere, atque a peſte præſervare traditur.*

Sapphirus, *Saphir*, **Sapphyr.** Gemma pellucida, colore cœruleo, dura. *Cordialis, alexipharmaca & ophthalmica creditur.*

Smaragdus, *Emeraude*, **Smaragd.** Ad pellucidas pertinet gemmas; coloris eſt viridis, omnium gemmarum fragiliſſima. Orientalis eſt & Occidentalis; Occidentalis e Peru advehitur. *Alvi & ſanguinis fluxum ſiſtere, & in febribus peſtilentialibus conferre perhibetur.*

Gemmis quidem eleganter officinas pharmacevticas carere poſſe, ſiquidem vix alium effectum, quam ſilex, in corpore humano præſtent, plurimi contendunt; vitra enim quaſi ſunt indiſſolubilia, quæ vix aquis ſtygiis obediunt, unde facile etiam hoſpes in Medicina perſpicere poteſt, quid ab earum uſu expectari queat. Verum cum a longo tempore in republica medica receptæ ſint, eas quidem exulare noluimus; monemus tamen pharmacopœos, ut ſibi proſpiciant, ne pro genuinarum gemmarum fragmentis, fluores ſive vitra, & gemmas artificiales, Saturno infectas, emant, quod quidem facile ex duritie, quam genuinæ ſibi propriam habent, & qua falſæ diſtinguuntur, cognoſcitur. Operam porro dent, ut gemmæ, non in mortariis æneis, ſed ferreis, in pollinem ſubtiliſſimum terantur, antequam ſuper porphyritem lævigentur. Præſtat etiam, ante ſic dictam præparationem, integras leviter calcinare, atque ignitas in aquam frigidam effundere, quam absque prævia hac calcinatione crudas terere.

CAPUT V.

DE METALLIS, MINERALIBUS ET PIGMENTIS.

Antimonii minera, *Mine d'Antimoine*, **Spieß=Glaß=Ertz.** Eligenda ponderoſa, ſtriata, obſcure cœrulei ac plumbei coloris. Adfertur ex Hungaria, quæ optima cenſetur; reperitur vero etiam multis in locis Germaniæ. *Pro Antimonii diaphoretici præparatione expetitur, quod hinc albidius conficitur, ſi modo ab adhærente ſilice vel ſpato prius purgetur.*

Antimonium crudum, Stibium, *Antimoine*, **Spieß=Glaß.** Probatur quod ſtrias longas ſplendentes habet, & ex Hungaria advehitur. *Olim pro veneno habebatur; a Kunckelio vero ab hac ſuſpicione vindicatum, & in uſum medicum vocatum eſt. Commendatur ab illo in morſulis, ad ſcabiem, & dolores rhevmaticos pertinaces. A veterinariis, in equorum & pecudum morbis, ejus uſus eſt frequens, nec non ad varios labores chemicos expetitur.*

Argentum foliatum, *Argent fin en feuilles*, **geſchlagen Silber, Silber=Blättlein.** Fit laminas argenti, ſæpius calefaciendo, & inter membranas interiores inteſtini recti bubuli, ſingulari methodo præparatas, mallei ope extendendo. *Folia ad pilulas obducendas requiruntur, & admiſcentur pulveribus, ſplendoris gratia.*

 Argen-

Argentum vivum, Mercurius vivus, *Argent-vif, Mercure,* **Queckſilber.** Metallica eſt ſubſtantia liquida, & quaſi baſis metallorum. Eſt vel nativum, quod Mercurius virgineus vocatur, vel arte ex minera deſtillatum. Largiſſimus mineræ & ipſius Mercurii virginei proventus eſt in Iſtria. Reperitur vero etiam in Hungaria, Tranſylvania & Germania. Optimus Mercurius vivus habetur virgineus, a nullo alio metallo, plumbo ſcilicet, inquinatus. Fraus facile detegitur, ſi drachma una aut altera in cochleari ferreo carbonibus ſuperimponitur; ſic Mercurius in auras abit, atque metallum, quo inquinatum fuit, relinquit. *Variis uſibus tam chemicis, quam medicis, & mechanicis inſervit.*

Arſenicum album, *Arſenic blanc,* **weiſſer Arſenic, Mauß- oder Ratten-Gift.** Eſt concretum minerale, ex multa terra metallica & ſale conſtans. Non ſolum ex minera arſenicali, (**Gift-Kieſen**) ſed etiam ex mineris ſtanni, & cobalto pro cœruleo, in uſtulatione harum minerarum, ſub forma fumi albi, allium redolentis, expellitur, atque in camino, peculiari modo in hunc finem conſtructo, **dem Giftfang,** capitur, & ſubſtantia pulverulenta, coloris albi & cinerei, colligitur: qui pulvis a metallicolis, **Hüttenrauch** & **Giftmehl,** appellatur, & addita portione ſalis alcali ſublimatur. Præſentiſſimum eſt venenum; hinc caute cum illo verſandum. Odore allii, carbonibus inſperſum, ſe prodit.

Arſenicum citrinum, ſive flavum, *Arſenic jaune,* **gelber Arſenic.** Artificiale eſt concretum, & ex Arſenico albo, addita decima ſulphuris parte, ſublimatione paratur. *Cauſticum venenum eſt, paulo tamen, ob additum ſulphur, mitius albo.*

Arſenicum rubrum, *Arſenic rouge,* **rother Arſenic, Rauſch-gelb.** Pariter ex Arſenico albo & pyrite ſulphureo ſublimatur. *Pictoribus inſervit.*

Auripigmentum, Sandaracha Græcorum, *Orpin, Orpiment,* **Operment, Auripigment, Goldgelb.** Eſt minerale nativum & foſſile. Optimum cenſetur, quod ex Turcia advehitur, punctulis ſive micis, velut aureis, nitet, & coloris citrini eſt. *Venenatum eſt, & ex arſenicalibus particulis, cum ſulphureis mixtis, conſtat. A pictoribus expetitur, & iis, qui cuticulam depilandam curant. Cum calce viva liquorem conſtituit illum probatorium vini Lithargyrio infecti, & atramentum ſympatheticum.*

Aurum foliatum, *Or fin en feuilles, Or battu,* **geſchlagen Gold, Goldblättlein.** Eodem modo, quo Argentum foliatum, paratur, *iisdemque uſibus inſervit.*

Cadmia nativa, foſſilis, metallica, Cobaltum, *Cadmie, Calamine, Cobalt,* **Kobalt, Mücken- oder Fliegen-Gift,** Minera eſt arſenicalis, & ab illa, quæ ad Smalti præparationem adhibetur, & non raro Argenti dives eſt, differt. Metallicolæ, hanc, vulgo **Giftkieſe;** Cobaltum vero, ex quo, additis ſilicibus, & ſale alkali, ſmaltum conficitur, **Farben-Cobalt** appellant, prius copioſe in Miſnia effoditur; poſterius etiam in diverſis Wirtenbergicis argentifodinis reperitur. *Ambo inter venena reponenda. Septicæ eſt virtutis cobaltum, & ad enecandas muſcas in uſum trahitur.*

Ceruſſa alba Norica, *Ceruſe blanche, Blanc de plomb,* **weiß Bleyweiß.** Factitium eſt, & calcinatione vaporoſa ex plumbo conficitur.

ficitur. Eligenda alba & ponderosa, creta vel bolo non adulterata. *Siccat, adstringit & refrigerat; ad emplastra & unguenta requiritur, & pictoribus inservit.*

Cerussa citrina, *Ceruse jaune*, **Bleygelb.** Est calx plumbi, ad flavedinem calcinata. Citrini coloris esse debet. *A pictoribus expetitur.*

Cerussa veneta, *Ceruse de Venise*, **Venedisches Bleyweiß.** In minoribus conis, quam cerussa alba advehitur, & olim Venetiis parabatur. Alba, & quæ gustu dulcis est, eligi debet. *A pictoribus, quia color ejus albus constantior, quam vulgaris illius Noricæ est, requiritur; præfertur tamen omnibus illa cerussæ species, quæ ex laminis plumbi parata, quam* **Schieferweiß** *appellant. Sicut reliqua producta ex plumbo, adstringit, reprimit & siccat. Usus est in emplastris, unguentis & collyriis.*

Chalybis limatura, *Limaille d'acier de Mars, ou de fer*, **Stahlfeil, gefeilter Stahl.** Eligatur limatura ferri puri, Venere non inquinati. Irritum est tentamen, limati ferri separationem, a Venere, ope magnetis suscipere; nam quamvis limatura Veneris & Martis singula seorsim limata & commixta, tali modo secerni possint; tamen id non succedit cum limatura fabrorum, multis miculis interspersa, quæ ex altera parte vel latere, ferreæ, ex altera autem cupreæ existunt, & sub una eademque portione lima abrasæ fuerunt. Quales propterea ex latere ferreo arripere solet magnes, licet ex altera parte vel latere, particula cupri illiquata adhæreat. Imo duplum Veneris, cum ferro fusum, magnetem sequi, *Henckelius* observavit. *Ad varios usus medicos & chemicos expetitur.*

Chrysocolla, Viride montanum, **Berggrün.** Vide Terra viridis.

Chrysocolla crystallisata, factitia, est Borrax. Vide Salia nativa.

Cinnabaris factitia, *Cinabre ou Vermillon artificiel*, **Zinnober.** Est compositum ex Mercurio & Sulphure. Videatur Pars posterior Pharmacopœæ, ubi & *Cinnabaris Antimonii* fit mentio.

Cinnabaris nativa, *Cinabre ou Vermillon mineral*, **Berg-Zinnober.** Est minera Mercurii, nonnunquam Auri particeps. Optima ex Transylvania, Hungaria & Japonia advehitur. Sit pura ab adhærentibus lapillis, spato & sabulo liberata, nec Risigallo inquinata. *Usus est in Medicina frequens; præstat vero, eam, antequam interne exhibeatur, sublimare.*

Cobaltum. Vide Cadmia fossilis *metallica.*

Fel vitri, Recrementum vitri, Sal vitri, Anatron, *Sel ou Fiel de verre*, **Glasgalle.** Est spuma, aut materia recrementitia, in vitri fusione & præparatione, supernatans. Alcalicæ est prosapiæ, & ad neutrorum salium naturam proxime accedit. Sit album, leve, spongiosum. *Usus est ad dentifricia; vim habet diureticam.*

Indigo, Indicus color, *Inde, Indigo*, **Indig.** Est præparatum artificiale, quod ex planta Anil, in India tam Orientali, quam Occidentali, paratur. Optimæ notæ, coloris cœrulei parum diluti est,

& præfertur obſcuriori. Bonus porro cenſetur, qui aquæ ſupernatat. *Tinctoribus & pictoribus inſervit; in Medicina rarus illius eſt uſus; valde adſtringit, & fluxiones alvi & lochiorum nimias ſiſtit.*

Ferri flores, *Fleurs de Mars*, **Eiſenblüthe.** Sunt concretum album, ex fodinarum & cuniculorum martialium parietibus exſudans, quod ramoſas, Coralliorum inſtar, ſtirias oſtendit, & ad ſtalactitas pertinet. Ex Styria afferuntur, nonnunquam etiam ejusmodi ſubſtantia in ferrifodina Wirtenbergica, prope civitatem *Aalen*, reperitur. *Adſtringunt, parum vero martialis continent.*

Lacca Florentina, *Lacque ou Laque fine de Florence*, **Florentiner-Lacc.** Pigmentum eſt rubrum, ad purpureum colorem accedens, & ex Coccinella, vel etiam non raro ex ligno Braſilienſi, in lixivio cocto & alumine præcipitato, conficitur. *Adſtringens eſt, & pictoribus inſervit; in Medicina pro tingendis trochiſcis Alkermes & ad pulveres dentifricios atque electuaria gingivalia, adhibetur. Eligatur colore pulchre rubens & levis.*

Lacca in globulis, *Lacque colombine*, *Laque en boules*, **Kugellacc.** Uti modo dictum, ex ligno Braſilienſi, lixivio, alumine & creta paratur. Ad colorem dilute purpureum vergit. *Adſtringit, & præter pictorios uſus etiam ad dentifricios pulveres adhibetur.*

Lacca cœrulea, *Tourneſol en pâte, en pain, en pierre, Orſeille*, **Laccmuß, blauer Lacc.** Sunt glebæ cubicæ ſiccæ, ex Heliotropii Tricocci, ſive Ricinoidis ſucco *Tournefortii*, calce & urina paratæ. Adfertur ex Gallia & Batavia; laudatur illa, quæ colore pulchre cœruleo & levitate ſe commendat. *Tinctoribus & condita parantibus inſervit.*

Lithargyrium auri, Lithargyrus, *Litharge d'or*, **Goldglette.** Eſt productum ex plumbo, & in purgatione argenti per plumbum acquiritur. Coloris eſt paulo rubicundioris, quam quod ſequitur Lithargyrium Argenti; nimirum magis coctum ſeu calcinatum eſt, unde color ſaturatior.

Lithargyrium Argenti, Lithargyrus, *Litharge d'argent*, **Silberglette.** Cum præcedente convenit, niſi quod coloris pallidioris. Facile plumbum ex ambobus reſtitui poteſt. Plumbum in cupellatione, **im Abtreiben**, cuprum, quo argentum infectum eſt, abſorbet, & cum illo, in hanc ſemivitream ſubſtantiam abit, unde ſaccharum Saturni ex lithargyrio, a particulis cupreis inquinato, ad uſus medicos, præſertim internos, non probatur. Præſtat, quod ex puro plumbo acquiritur. Solutio lithargyrii, cupro inquinati, virideſcit, quod cum illo, ex puro plumbo, non contingit. *Amborum uſus eſt in Medicina, ad emplaſtra & unguenta conficienda; ſiccant & refrigerant.*

Marcaſita, ſive Bismuthum, *Etain de glace*, *Bismuth*, *Marcaſſite*, **Wismuth.** Eſt ſubſtantia metallica, quæ ex ſua propria minera extrahitur. Invenitur in argenti venis, & prope illas; in Misnia inprimis, nec non Ducatu Wirtenbergico. Eligenda eſt alba, argentei coloris. *Uſus eſt ad coſmetica & varia mechanica; Internus vero ſuſpectus, quia Bismuthum arſenicalis indolis eſt, & plerumque vel ſemper, cum cobalto pro cœruleo mixtum reperitur.*

Minera Martis ſolaris, *Mine martial d'Heſſe*, **Heßiſcher Eiſen-Vitriol-Kieß.** Eſt minera *martialis*, ab omni venereo inquinamento libera, & ad claſſem pyritarum, quos vulgo **Waſſerkieſe** metallico-

licolæ vocant, refertur. Ex obſcuro glauca eſt, nitidis fruſtulis, inſtar mineræ Antimonii reſplendet; ſaporis eſt vitriolacei. Latet plerumque in luto ſeu argilla, in fruſtis figuræ ovalis. In Haſſiæ variis locis, præcipue vero juxta *Almerodam* pagum, invenitur. *Verum Vitriolum Martis exinde parari poteſt, & in ſubſtantia etiam, ubi alia martialia adhiberi ſolent, dari. Doſis grana decem ad viginti.*

Minium rubrum, *Minium*, **Mennig, rother Meng, Mini.** Eſt calx plumbi, ad rubrum hunc colorem reverberata. *Siccat & refrigerat; in Medicina ad emplaſtra & unguenta, in arte pictoria ad pigmenta, Turcicum præſtantius ipſo Norico, noſtratibus uſuali, uſurpatur.*

Nihilum album, Pompholyx, *Calamine blanche, Pompholyx*, **weiſſes Nichts.** Eſt quaſi flos pumbi, qui inter fuſionem minerarum, & in reductione Lithargyri & cineritiorum, ad latera camini ſublimatur. Eligendum, quod album, leve, & impalpabile, atque acrimoniæ expers. *Ad collyria, emplaſtra & unguenta requiritur. Refrigerante & ſiccante gaudet virtute.*

Oleum Petræ album, Petroleum album, *Pétrole blanc, ou Huile de pétrole clair*, **weiß Stein-Oel.**

Oleum Petræ nigrum, Petroleum nigrum, *Pétrole noir, Huile de Gabian, ou de pétrole noir*, **ſchwartz Stein-Oehl.**

Oleum Petræ rubrum, Petroleum rubrum, *Pétrole rouge, ou Huile de pétrole rouge*, **roth Stein-Oehl.** Ad regnum minerale referuntur; Petroleum enim eſt Naphta ſive Bitumen liquidum, quod ex rimis rupium & terræ exſtillat, & in fontibus aquæ innatans colligitur.

I. Album, ex Sumatra inſula, Perſia, & Modenenſi Italiæ Ducatu,

II. Nigrum, ex Languedocia, ubi prope pagum Gabian reperitur, advehitur.

III. Rubrum, quod ex Sicilia & Italia venit, uſitatiſſimum eſt. Deſtillatur etiam ex carbonibus foſſilibus oleum, Petroleo ſimillimum, ubi primo album, poſtea rubrum, & ultimo ignis gradu, nigrum empyrevmaticum fœtidum prodit; quæ olea vix a nativo Petroleo diſtingui poſſunt, viribus etiam cum illo conveniunt. Eligatur Petroleum fluidum, ſpirituoſum, odoris non ingrati. *Album & rubrum Petroleum calefaciunt, digerunt & reſolvunt, atque nervoſo generi conferunt; interne nunquam vel raro, quia ſanguinem valde commovent, adhibentur; a quibusdam tanquam probatiſſimum anthelminticum commendatur petroleum nigrum nativum, ad guttas tres vel ſex interne exhibitum.* Cum Petroleo convenit.

Oleum terræ, *Huile de terre*, **Erd-Oehl**, quod ante paucos annos ex India Orientali advehi cœpit. Colore eſt rubrum, diaphanum, & odoris Petrolei, atque *in nervorum affectibus externe adhiberi ſolet.*

Orleana, Orlean, *Achiote, Orléan, Rocou, Roucou*, **Orlean.** Sunt grana Bixæ, ſive Mitellæ Americanæ maximæ tinctoriæ *Tournefort*, in maſſam coacta. Ex America adfertur. *Refrigerat & adſtringit; raro tamen in Medicina, ſæpius vero a tinctoribus, ad pannos & lintea, colore aurantio inficiendos, expetitur.* Eligenda levis, quæ neque nimium madida, neque tota exſiccata eſt.

D 2 San-

Sandaracha Græcorum, Risigallum, Rauschgelb, Vide Arsenicum rubrum.

Sulphur caballinum, *Soufre grossier*, Roß-Schwefel. Sunt feces, quæ in rectificatione & purificatione sulphuris citrini remanent. *Pulverem equorum ingreditur.*

Sulphur citrinum, *Soufre jaune, commun*, gelber Schwefel. E pyrite, magno igne, expellitur. Largus ejus est proventus in Suecia, Germania, & ejus provinciis. Ducatus etiam Wirtenbergicus non caret eo. Eligitur purum, citrinum. *Usus est varius, tam medicus, quam mechanicus. Interne sumto adscribuntur vires aperientes, balsamicæ & alexipharmacæ; externe adhibitum siccat & repellit.*

Sulphur vivum griseum, *Soufre vif gris*, lebendiger grauer Schwefel. Reperitur in Islandia & Italia, inter Puteolos & Neapolin. Eligitur, quod purum, & arena non permixtum est. *Viribus cum antecedente convenit.*

Tutia, Thutia, Nihil griseum, Cadmia, Botrytis, Tutia Alexandrina, *Tutie*, Tutia. Productum est metallicæ prosapiæ, & in fornacibus, ubi æs caldarium funditur, reperitur. Eligenda est densa, modice gravis, quæ fracta cinerea est. *Siccat, detergit; usus est in collyriis. Ad unguenta ophthalmica & emplastra siccantia adsumitur. Cuprum colore tingit aureo.*

Torna Solis rubra, Bezetta, *Tournesol en drapeau*, Farb- oder Schminck-Flecklein, Spanischer Flor. Sunt lintea, coccinella tincta. Eligenda pulchre rubra, & saturate tincta, quæ ex Turcia advehuntur. *Usus est in culinis, ad gelatinas, condita & liquores tingendos, & abusus ad fucos notissimus.*

Torna Solis cœrulea, Bezetta cœrulea, *Tournesol bleu*, blaue Farb-Flecklein. Sunt lintea, mixtura illa, ex qua Lacca cœrulea paratur, tincta. *Ejusdem sunt usus in culinis, & apud conditores.*

Viride æris, Ærugo, Æs viride, *Verd de gris*, Grünspan, Spangrün. Est factitium ex cupro, mediantibus vinaceis, corroso. Paratur in Gallia & Hispania. Eligendum, quod colore ad cœruleum vergit, & quod creta non adulteratum. *Septicum est, & ad unguentum Ægyptiacum & alia, requiritur. Etiam a pictoribus, & aliis Mechanicis, expetitur.*

Vitrum Venetum, *Verre de Venise*, Venedisches Glaß. Artificiale est, ex arena vel silicibus, cum sale quodam alcalino, ex vegetabili regno, conflatum, omnibus notum. *Creditur anthelminthicum, cum melle umbilico superimpositum.*

CAPUT VI.
DE MARINIS.

Ambra grisea, Ambarum, *Ambre gris*, Ambra, Amber, graue Amber. Bituminis est species, ex venis alveisque terræ, in mare deposita. Frustra nonnunquam monstrosæ, & vix credibilis

dibilis magnitudinis, passim in Indiis reperiuntur; *Kæmpferus* mentionem facit massæ Ambræ, in littore Japonico inventæ, libras Belgicas centum & triginta pendentis. Eligatur Ambra levis, odorata parum, & quæ, si candenti laminæ imponitur, gratum edit odorem, & parum, vel plane nihil, relinquit, quæ facile liquescit, & bene cohæret. Veteribus plane ignota fuit, & demum ab Arabibus in usum vocata est. Adulteratur glumis orizæ, in pollinem redactis, masticheIn & ladano; fraus facile detegitur masticatione, solutione, combustione super lamina ignita. *Calefacit & resolvit, atque analeptica, cephalica & cordialis censetur; nec non ad varia composita in pharmacia adhibetur.*

Ambra liquida, ad Balsama nativa pertinet.

Asphaltum, Bitumen Judaicum, *Bitume de Judée*, **Juden-Pech.** Bitumen est solidum, nigrum, fragile, resplendens; odoris, dum accenditur, ingrati. Reperitur magna ejus copia in mari mortuo. Conficitur ex hoc, cum pice mixto, Pisasphaltum. *Mundificat ulcera sordida; usus est in emplastris & unguentis digestivis, & ad Balsama tingenda adhibetur. Ingreditur etiam Theriacam; veteres eo ad condienda cadavera uti solebant.*

Corallina, Muscus corallinus, marinus, *Coraline*, *Mousse marin*, **Corallen-Mooß, Meer-Mooß.** Est planta, sub aqua rupibus marinis, conchis, & nonnunquam etiam coralliis adnascens, coloris albicantis, viridiusculi, grisei, saporis subsalsi, odoris ingrati pisculenti. Præfertur integra, & quæ, non sabulo & conchis variis, commixta est. Ex mediterraneo mari colligitur. *Anthelminticis adnumeratur, & a dimidia ad integram drachmam præscribitur.*

Corallium sive Corallum album, *Corail blanc*, **weisse Corallen.** Planta est marina, quæ cum corallio rubro per omnia convenit, nisi quod rarior est. *Corallium album officinale.* J. B. quod pro vero plerumque venditur, *Madreporæ* vel *Coralliodis* est species, quæ in mediterraneo mari copiose reperitur, & cum Corallio vero albo viribus convenit. Crudum nunquam, præparatum autem sæpius in usum medicum vocatur.

Corallium seu Corallum rubrum, *Corail rouge*, **rothe Corallen, Corallen-Zincken.** Planta est marina, quæ rupibus, & nonnunquam conchis adnata reperitur. Variis in locis, præprimis vero in mediterraneo mari ad littora provinciæ, Cataloniæ & Siciliæ oras, & non tam in fundo maris, quam in cavernis rupium, provenit, atque, non sicut aliæ plantæ sursum, sed ex superiore parte cavernarum deorsum, crescit. Eligitur pulchre rubens, & a sordibus liberum. *Usus & virtutes inter præparata occurrunt.*

Corallium nigrum, *Corail noir*, **schwartze Corallen.** Rarum est, & ex India, ubi in Oceano Orientali circa Bantam reperitur, advehitur. *Usus in Medicina nullus.*

Pila marina, Sphæra marina, Sphæra Thalasia Galeni, Halcyonium rotundum, *Pelote de mer*, **Meer-Ballen.** Nondum constat, quæ earum origo sit; probabile videtur, concrementum esse, perpetuo fluxu maris & magnorum lacuum, e junco, pilis animalium marinorum, & non raro conchulis, cum spuma maris ita

compactum. Non eandem figuram habent; sunt enim aliæ prorsus rotundæ, aliæ depressæ vel oblongæ. Eligendæ sunt leves & siccæ, quæ odorem marinum spirant, recentes. *Exsiccandi & calefaciendi vis adscribitur; tostæ pulverem strumalem ingrediuntur.*

Spongia marina, *Eponge*, **Badschwamm.** Dicitur etiam *fungus marinus.* Est plantæ genus molle, foraminibus pervium. In mari saxis, conchis, & aliis concretis adnascens. Eligantur Spongiæ albæ, foraminibus exiguis perviæ, leves. Per destillationem ex retorta, magnam quantitatem spiritus urinosi, & salis volatilis elargiuntur, quod illis, qui spongias Zoophyta esse credunt, pro argumento inservit. Magnus earum proventus est in mari mediterraneo. *Spongiarum usus est varius, tam chirurgicus, quam œconomicus; in medicina, tostæ ad pulverem strumalem requiruntur.*

Adnumerantur a quibusdam marinis, quæ tamen ad regnum animale pertinent, ex. gr.

Blatta Byzantina, Unguis odoratus, *Blatte Bizantine*, **Indianische wohlriechende Muschel-Schaalen.** Sunt opercula muricis ramosi. *Ad suffitus, hystericis præsertim adhibetur, alvum laxare & lienis vitiis mederi, interne sumpta censetur.*

Dentalia, Syringites, *Dentales*, **Zahn-Purpur-Schnecken.** Canaliculi sunt striati, parum inflexi, in utraque parte obtusi, pollices duos vel tres longi, coloris pallido-grisei. Veteres credebant, esse dentes piscium, & hanc ob causam dentalii nomen imposuerunt. Hodie inter conchilia numerantur. A Rumphio *Solenes univalves*, ab aliis *Buccina* vocantur.

Entalia, *Entalies*, **Zahn-Schnecken**, cum præcedentibus, non nisi magnitudine, differre, atque minora & acutiora esse, nonnulli perhibent. *Aldrovandus*, concharum marinarum, quas *Tellinas* cum *Entalibus* vocant, esse partes, scribit. Alii conchas Veneris parvas, quæ Porcellanæ appellantur, substituunt. *Tam Dentalia, quam Entalia, non nisi ad Unguentum Basilicum sive citrinum, in usum vocantur, quod unguentum tamen jam diu obsoletum est.*

Margaritæ, Uniones, Perlæ officinis, *Perles*, **Perlen.** Sunt lapilli in conchis, quas Rumphius *Ostrea* vocat, ex eadem materia, qua testæ generantur, producti, qui etiam nonnunquam in ipsis animalculis, quæ conchas inhabitant, inveniuntur. Species Ostrearum, in quibus reperiuntur, enumerat laudatus Rumphius: *Ostreum cratium, Ostreum saxatile, Ostreum placentiforme* sive *Ephippium.* Sunt vel Orientales vel Occidentales; priores sunt splendidiores, & cæteris præferuntur, ac circa insulam Ceylon, & in Sinu Persico, maximæ & optimæ habentur; posteriores sive Occidentales, quæ lactei quasi sunt coloris, & minus splendent, ex America advehuntur, & in multis Europæ locis, in Scotia, Silesia, Bohemia, etiam reperiuntur. *Sæpius in usum medicum vocantur, & fere ad omnes pulveres pretiosos requiruntur. Virtutes cordiales, absorbentes acidum & præcipitantes, censentur.*

Mater perlarum, Nacra perlarum sive margaritarum, *Nacre de Perle*, **Perlen-Mutter.** Sunt conchæ, Ostrei placentiformis sive Ephippii, quæ in mediterraneo mari & alibi inveniuntur. *De præparatione & viribus videatur pars posterior.*

Suc-

Succinum, Electrum, Carabe, Ambarum, Glessum, *Ambre jaune*, *Succin*, **Agtstein**, **Bernstein**. Succino, omnibus cognito, solum fere Borussiæ regnum, dives est. Colligitur enim ibi, non solum in littore maris Baltici, aut & ex ipso mari, piscando quasi hauritur, & vocatur *haustile*, sed effoditur etiam ex terræ visceribus, montibus & cavernis, littori illi propinquis, & dicitur *fossile*. Licet de singulari ejus natura nondum satis clare constet; a vero tamen non multum aberrare videntur, qui putant, in eo componendo concurrere oleum bituminosum, petroleo non dissimile, ceu basin, & salem acidum vitriolicum sive sulphureum, una cum subtilissima terra & aquæ portione, & pro diversa horum ingredientium combinatione, succinum non solum generari solidum, sed & varie coloratum, album, quod reliquis præstare credunt, citrinum, nigrum, rubrum, plus minus opacum, transparens &c. Succinum in prima sua origine liquidum esse, testantur varia animalcula, quæ involuta in eo reperiuntur, uti muscæ, araneæ, culices &c. Characteres, quibus dignoscitur, sunt, quod igni impositum fumet, fluat, ardeat, quod ita tractatum odorem Succino specificum spargat, quod neque ab aqua sola, neque Alkohole solo, neque facile ab alio quocunque menstruo perfecte solvatur, & quod electricitate sive vi attractiva gaudeat & emineat, quibus notis etiam a *factitio* illo & *spurio* Americano, *Gummi de Loock* alias vocato, quod vero etiam in destillatione Sal volatile non exhibet, discerni potest. *Laudatur tanquam resolvens, roborans, balsamicum, nervinum, diureticum medicamentum, & hinc multiplici usu inservit, tam interno in lymphæ vitiis, catarrhis, rhevmaticis fluxionibus, pectoris atque capitis morbis, affectibus soporosis, convulsivis, nephriticis, urinariis, uterinis; quam externo in læsionibus maxime capitis & partium nervosarum atque tendinearum, uti & in suffitibus ad serosas congestiones resolvendas; unde etiam quam plurimas compositiones ingreditur.*

Umbilicus marinus, Belliculus marinus, Faba marina, *Nombril marin*, **Meer-Bohnen**, **Nabel-Stein**. Sunt opercula cochleæ lunaris, *Rumphii*. Reperiuntur ad littora maris Adriatici. Habentur majores & minores, rubri & Cati oculum referentes. *Creduntur, umbilico impositi, colicos dolores sedare. Interne raro in usum venit; absorbet & adstringit. Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.*

Hoc caput de marinis plurimis forsan superfluum atque inconcinnum videbitur: cum omnia, quæ in illo continentur, vel ad regnum minerale, uti Asphaltum, Ambra, Succinum; vel ad vegetabile, uti Corallia, Corallina, Spongiæ; reliqua vero ad animale regnum, scilicet Blatta Byzantina, Dentalia, Entalia, Mater perlarum, Margaritæ, Umbilici marini referri potuissent ac debuissent; Maluimus tamen peculiarem classem illis assignare, & ordinem, in plurimis officinis a longinquo tempore introductum, servare, quam illum, corallia & spongias ad plantas, margaritas & matrem perlarum ad animalia relegando, præter necessitatem turbare.

PARTIS PRIORIS

CLASSIS SECUNDA.

REGNUM VEGETABILE.

CAPUT I.

DE RADICIBUS.

Rad. Acetoſæ, Oxalidis, Rumicis, Acetoſæ pratenſis, C. B. *Racine d'Ozeille, d'Oſeille, d'Aceteuſe*, **Sauerampfer-Wurtzel.** Naſcuntur in pratis, & verno tempore colliguntur. *Linguæ gratum acorem imprimunt, & decoctæ rubrum aquæ colorem conciliant. Datur decoctum ad æſtum febrilem temperandum.*

Acori veri, Calami aromatici officinarum, *Racine de Calamus aromatique, ou d'Acorus veritable*, **Calmus, rechter Ackermann.** Indigenæ ſunt; naſcuntur utplurimum in aquis ſtagnantibus. Colligendæ primo vere vel adulto auctumno. Vocatur etiam *Radix nautica*, ob eximium uſum, quem navigantibus præſtant. Utuntur ea, ut ſibi vel nauſeam arceant, vel præcaveant, ne aquæ putridæ exitio ſint. De Tartaris, extremæ Lithuaniæ incolis, Cluſius refert: quod radices Calami ſive Acori veri plerumque ſecum ferant, nec aquam ex paludibus prius bibant, quam in illa radix hæc infuſa fuerit. Hinc Simon Pauli, viris caſtra ſequentibus, Tartaros imitari, ſuadet. *Vires ſunt alexipharmacæ, ſtomachicæ, carminativæ, balſamicæ, attenuantes & reſolventes.*

Acori vulgaris, Pſeudacori, Gladioli lutei, *Racine de faux Acorus, d'Acore bâtard, de Glayeul*, **Ackermann, gelbe Schwertelwurtz, falſche Acorus-Wurtz.** Ad aquaticas plantas pertinent. *Adſtringunt, & in decoctis pro collutione oris, ſcorbuticis præſcribuntur; recentes ad* Electuarium diacori *expetuntur.*

Alceæ vulgaris, majoris, Malvæ ſilveſtris folio cannabino, *Racine d'Alcée, de Mauve ſauvage*, **Fellriß-Wurtzel, Sigmars-Kraut, Sigmunds-Wurtzel.** *Cum radicibus Malvæ conveniunt; commendantur etiam ad oculorum morbos, & veterinariis inſerviunt.*

Allii ſativi, vulgaris, *Ail*, **Knoblauch.** Coluntur in hortis. *Vires ſunt alexipharmacæ, diureticæ & anthelminticæ.*

Altheæ, Bismalvæ, Ibiſci, Malvaviſci, *Racine de Guimauve, d'Althé*, **Eibiſch-Wurtzel, Althea-Wurtzel.** Planta colitur in hortis, floret Julio. Radices colliguntur auctumno. *Interne & externe adhibentur; vires ſunt anodynæ & emollientes, & præcipue interne, ad pectoris & viarum urinariarum affectus in uſum vocantur. Externe, cataplaſmatibus emollientibus & maturantibus adduntur.*

Amaræ dulcis, Dulc-amaræ, Solani ſcandentis, *Racine de douce-amere, ou de Morelle rampante*, **Hinſchkraut-Wurtzel, Je länger je lieber.** *Tuſſientibus, aſthmaticis, ictericis, & ab alto lapſis, in decocto commendantur.*

Rad.

Rad. Anchusæ, Alkannæ rubræ, Anchusæ floribus puniceis, Buglossi arvensis annui, *Racine d'Alkanna, de Buglose, ou d'Orchanette*, **rothe Ochsenzungen-Wurtzel.** Ex Galliæ provinciis, & etiam ex Oriente afferuntur. Eligendæ sunt radices parvæ fibrosæ, quæ colorem purpureum, in tota substantia magis diffusum, habent; majores intus albicant. *Requiruntur ad unguentum rubrum potabile, & alia colore rubro tingenda. Spiritum salis armoniaci colore inficiunt amethystino.*

Angelicæ sativæ, *Racine d'Angelique, ou du saint Esprit*, **Angelick-Wurtzel, Heilig Geist-Wurtz, Engel-Wurtz, Brust-Wurtz.** Colitur in hortis. Eligantur recentes, non cariosæ, & in loco sicco asserventur. *Vis alexipharmaca, stomachica, carminativa & uterina omnibus nota.*

Angelicæ silvestris, *Racine d'Angelique sauvage*, **wilde Angelick.** Raro in usum veniunt; *virtutes antecedentibus haud inferiores prædicantur.*

Anthoræ, sive Antithoræ flore luteo, Aconiti salutiferi, *Racine d'Anthore*, **Gifftheil-Wurtzel, Hertz-Wurtz.** E bulbis, olivæ magnitudinis, constant, foris fusci, intus albi coloris; gustu sunt amaræ, & sapore acres. Eligendæ recentes, vermibus non exesæ, vel cariosæ. Proveniunt in Alpibus, & aliis Tirolis & Helvetiæ montibus. *Non tantum adversus Napelli, sed & cætera quæcunque venena laudantur. Ob vim alexipharmacam, nonnulli* Contrayervam germanicam *appellant, & in morbis malignis exanthematicis, ad vermes & dolores colicos commendant. Male audiunt ob vim venenosam e contrario apud nonnullos; hinc circumspecte in usum vocandas esse censemus, eo magis, quia securiora in promtu habemus remedia.*

Apii sativi, *Racine de Celeri*, **Garten-Eppich, Selleri.**

Apii palustris, Paludapii, Hydroselini, *Racine d'Ache, d'Api*, **gemeiner Eppich, Wasser-Eppich.** *Inter quinque radices aperientes majores referuntur.* Alia etiam *Apii palustris* species, quæ *Sium alterum* a Dodoneo & *Cicuta aquatica* a Gesnero vocatur, reperitur, quæ vero venenata est, & non nisi foliis angustioribus ab officinali differt; securius igitur radices hortensis Apii, quæ eandem vim habent, substituuntur.

Aquilegiæ, *Racine d'Ancolie*, **Ageley-Wurtzel.** Coluntur in hortis. Verno tempore effodiuntur. *Vim habent diureticam, alexipharmacam & aperitivam.*

Ari, Barbæ Aronis, Serpentariæ minoris, Dracontiæ minoris, Laphæ, *Racine de pied de veau*, **Aron, Aron-Wurtzel, Pfaffen-Pint, Teutscher Jngber, Zehrwurtz.** Promiscue diversæ species Ari in usum vocantur, quia eandem habent virtutem. Sunt vero *Arum vulgare non maculatum, maculatum maculis albis, maculatum nigrum.* Colligenda radix verno tempore. Valde acris est; aceto hanc ob causam vel vino macerata, atque rursus exsiccata, reponitur, & tum *Arum præparatum* vocatur, & ad pulverem stomachicum *Birckmanni* requiritur. *Vires*

Ari sunt aperientes, incidentes, resolventes, attenuantes, abstergentes, diureticæ, & alvum laxantes.

Rad. Aristolochiæ Clematitidis rectæ, C.B. Saracenicæ, *Racine d'Aristoloche clématite des vignes, de Rattelou, d'Ostroloche, de Sarrasine ou Sarazene*, **kleine Osterlucey-Wurtzel.** Tenuis est radix, & multis fibris dotata, saporis amari, acris, subadstringentis, odoris haud ingrati. Ex Hispania & Italia advehitur; nascitur etiam in vineis Alsatiæ, & nonnunquam in nostris. *Præfertur a nonnullis, reliquis Aristolochiæ speciebus, & essentia inde parata, remedium creditur esse antipodagricum. Diuturnum vero ejus usum, tunicam villosam ventriculi destruere, atque nocere, languore appetitus, & totius corporis illato, B. Bœrhave, monente Ill. Hallero, observavit.*

Aristolochiæ fabaceæ, Fumariæ radice bulbosa, rotunda, non cava, C. B. Pseudofumariæ, *Racine d'Aristoloche petite ronde*, **kleine runde Hohlwurtzel, Osterluceywurtz.** *Remissior & debilior est cava, majorem tamen vim habet exsiccantem & absorbentem; a Chirurgis, denudatis ossibus inspergitur; interne vinis medicatis additur; cachecticis, hydropicis & ictericis convenit.*

Aristolochiæ longæ veræ C. B. *Racine d'Aristoloche longue veritable*, **lange Osterluceywurtzel, lange Hohlwurtzel.** Eligantur radices crassiores, non cariosæ, sed ponderosæ. Ex Hispania, ubi in vinetis & dumetis provenit, advehitur. *Odore, virtute & sapore amaro, cum reliquis Aristolochiæ radicibus conveniunt.*

Aristolochiæ rotundæ veræ, Aristolochiæ fœminæ Lugd. *Racine d'Aristoloche ronde veritable*, **rechte runde Osterluceywurtzel.** Laudantur radices ponderosæ non cariosæ; advehuntur ex Gallia & Hispania. *Virtutibus conveniunt cum Aristolochia longa & rotunda vera, ac ob vires alexipharmacas, Theriacæ ingredientia sunt; laudantur etiam uterinæ & vulnerariæ.*

Aristolochiæ rotundæ vulgaris, Fumariæ bulbosæ, radice cava majore, *Racine d'Aristoloche ronde commune*, **Hohlwurtzel, gemeine runde Hohlwurtz, Hertzwurtz.** Indigena est planta, & largus ejus proventus. *Viribus, cum præcedentibus Aristolochiæ speciebus, conveniunt, atque in ciendis mensibus, lochiis, & fœtum mortuum pellentibus, commendantur.*

Arnicæ, Ptarmicæ montanæ, Calthæ vel Calendulæ alpinæ, Nardi Celticæ alterius, Doronici Plantaginis folio, *Racine de Betoine de montagne*, **Arnick, Mutterwurtz, Wolverley, Lucians-Kraut, Engels-Tranck-Wurtzel, Fallkraut-Wurtzel.** In pratis & locis humidioribus alpinis & montanis provenit; in Ducatu Wirtenbergico, non procul ab urbe Calwa, & aliis locis nascitur. *Ob virtutem resolventem sanguinem grumosum merito panacea lapsorum vocatur. Non solum radix, sed plerumque tota planta in decocto exhiberi solet; quod decoctum in largiori dosi propinatum nonnunquam anxietates & vomitus creasse observatum est; hinc delicatioribus cum circumspectione præscribendum.*

Rad.

Rad. Artemisiæ, Parthenii, *Racine d'Armoise*, **Beyfuß, St. Johannis-Gürtel-Wurtz.** *Radix in usum medicum raro vocatur; carbonibus vero Artemisiæ, qui nihil aliud, quam radices annosæ, demortuæ, a multis etiam celeberrimis practicis adscribuntur vires antepilepticæ. Colligendos esse hos carbones circa festum Johannis Baptistæ, perhibent.*

Asari, Nardi rusticæ sive silvestris, Vulgaginis, *Racine de cabaret, d'Asarum, ou oreille d'homme*, **Haselwurtz, wilder Nardus.** Est Planta indigena, ac in silvis & dumetis, plerumque sub corylis invenitur, unde etiam nomen germanicum accepit; nam corylus **Haselstaude** audit. *Vomitus excitare solent in substantia exhibitæ, in infuso rarius. Melancholicis pessima excitasse symptomata compertum est. Menses cient, vehementer purgant, & urinam movent, suspectis igitur non temere dari debent. A nonnullis ad quartanam commendantur, ante paroxismum exhibendæ. Fortiori decoctione, vim emeticam & purgantem deponunt, atque diureticam & uterinam acquirunt. Hydropicis & phlegmaticis præ aliis conducunt; Melancholicis vero pessima symptomata excitasse, Hermannus tradit.*

Asparagi sativi, hortensis, Asparagi altilis, *Racine d'Asperge*, **Spargel-Wurtzel.** Coluntur in hortis, & radicibus quinque aperientibus majoribus, adscribuntur. Eligendæ carnosæ, primo vere collectæ.

Asphodeli, Hastulæ regis, *Racine d'Asphodele*, **Goldwurtzel, Affodillwurtz.** Quæ in officinis occurrunt, radices Asphodeli, non sunt veri Asphodeli, sed *Lilii floribus reflexis*, aliis *Martagon* dicti, radices seu bulbi. Nascuntur in montosis silvis, & indigenæ sunt. *Menstrua & urinam pellunt, interne sumtæ; externe emolliunt & maturant.*

Barbæ caprinæ, Barbulæ caprinæ, Ulmariæ, Reginæ pratorum, *Racine de barbe de chevre, de la Reine des prez*, **Geißbartwurtzel.** *Adstringunt & ad emplastrum contra rupturas requiruntur. Habetur a nonnullis alexipharmaca, vulneraria, & decoctum ad injectiones in ulceribus fistulosis commendatur.*

Bardanæ, Lappæ majoris, Personatiæ, *Racine de Bardane, ou de Glouteron*, **grosse Klettenwurtzel, Butzen-Klettenwurtzel.** Eligantur radices juniores, non lignosæ. Ubique occurrunt. *Habentur alexipharmacæ & sudoriferæ, atque in affectibus serosis commendari solent. S. Pauli, decoctum radicis Bardanæ, lignorum decocto præfert, præsertim in emaciatis, & raræ texturæ ægris.*

Been albi, sive Behen, *Racine de Been blanc*, **weisser Behen, Wiederstoß, Gliedweich-Wurtzel.** Secundum *Rajum*, radices sunt *Jaceæ Orientalis Carthami* facie, flore luteo magno. Optimæ censentur radices majores, non cariosæ, amarore haud ingrato. *Adscribitur vis cordialis & alexipharmaca.*

Been rubri, *Racine de Been rouge*, **rothe Behenwurtzel.** Sunt *Limonii maritimi majoris* C. B. Optimæ censentur, quæ sunt colore saturato rubro, recentes, sapore adstringente, & subaromatico præditæ. *Exoticæ sunt, & easdem cum præcedentibus vires habent.*

Rad. Betæ rubræ, Rapi rubri, *Bêterave*, **rothe Rüben.** Coluntur in hortis, & ſiccatæ raro in uſum vocantur; recentium etiam uſus magis culinaris, quam medicus eſt. *Succus vero præbet errhinum egregium; mucum prolicit absque ſternutatione: hinc illis, qui obſtructione narium vel coryza ſicca laborant, imo ubi metus eſt ozænæ, bonam opem præſtat. Radix ano, ſuppoſitorii loco immiſſa, alvum ſtimulat.*

Biſmalvæ, vide Rad. Altheæ.

Biſtortæ, Serpentariæ vulgaris rubræ, Colubrinæ, *Racine de Biſtorte*, **Schlangen = oder Natter=wurtz, Wurmwurtzel.** Naſcuntur in locis humentibus. Indigenæ ſunt. *Manifeſte adſtringunt; vulnerariis & alexipharmacis adnumerantur.*

Borraginis, Bugloſſi latifolii, veri, urbani, *Racine de Bourrage ou Bourrache*, **Borragen, Borretſch=wurtzel.** Colitur in hortis. *Adſcribuntur vires antimelancholicæ, rarus tamen earum eſt uſus.*

Bruſci, Ruſci myrtifolii aculeati, Myrtacanthæ, *Racine de petit Houx, de Ruſc, ou de frêlon*, **Bruſch=wurtz, Mausdornwurtzel.** Sunt albicantes, ſaporis ab initio ſubdulcis, poſtea amari. Copioſe in Italia proveniunt. *Diureticæ ſunt, & radicibus quinque aperientibus majoribus adnumerantur.*

Bryoniæ, Vitis albæ, Vitis ſilveſtris, Uvæ anginæ, *Racine de Bryone, de Coulevrée, ou de vigne blanche*, **Zaunrüben, Zaunrebenwurtzel, Stickwurtz, Hundkürbſenwurtzel,** a nonnullis etiam **weiſſer Entzian** vocantur. Radix prægrandis, rapæ inſtar, omnibus nota. Saporis eſt acris, amari & nauſeabundi. *Interne ſumta, valide purgat, & ſerum educit; Anthelminticis nec non emmenagogis, adſcribitur. Doſis in infuſo ſcrupuli quatuor vel drachmæ duæ, in ſubſtantia ſcrupulus unus. Externe diſcutit & reſolvit.*

Bugloſſi, Linguæ bovis, Bugloſſi anguſtifolii, *Racine de Bugloſe*, **Ochſenzungenwurtz.** *Cum radicibus Borraginis conveniunt, & raro in uſum vocantur.*

Calami aromatici, **Calmus.** Vide Rad. Acori veri.

Capparis, vel Capparidis ſpinoſæ fructu rotundo minori, *Racine de Caprier*, **Cappernwurtzel.** Naſcuntur copioſe in Apulia. Eligendæ albæ, non carioſæ. *In officinis ad cortices referuntur, & inter radices quinque aperientes minores numerantur. Spleneticis, hypochondriacis & arthriticis commendantur; uſus eſt in infuſis.*

Cardopatii, Cardopatiæ, Carlinæ humilis, Chamæleonis albi, Karlinæ, *Racine de Carline, de Chardouſſe, ou de Chardonnerette*, **Eberwurtz.** Amant montoſa & aprica, copioſe in Ducatu Wirtenbergico reperiuntur. Saporis & odoris aromatici grati; *virtutis alexipharmacæ, carminativæ & ſtomachicæ ſunt.*

Rad.

Rad. Cardui benedicti, Cardui sancti, *Racine de Chardon benit*, **Chardobenedicten-Wurtzel**, **Spinnendistel-Wurtz.** Hortensis est planta. *Usus radicis rarus in officinis; frequentior herbæ.*

Caryophyllatæ vulgaris, Sanamundæ, Lagophthalmi, *Racine de Benoite*, *de Récise*, **Benedict-Wurtzel**, **Weinwurtzel**, **Nägelein Benedictwurtz.** Proveniunt in incultis, ad dumeta & juxta sepes. *Odorem spirant, & saporem aromaticum, caryophyllaceum; colorem intus habent carmesinum, & virtutem roborantem, cerevisiam ab acore præservant. Aphrodisiacæ, vulnerariæ, pectorales & uterinæ habentur.*

Cavæ, vide Rad. Aristolochiæ rotundæ cavæ.

Chelidonii vulgaris majoris, Chelidoniæ majoris, *Racine de grande Chelidoine*, **groß Schellkraut-Wurtzel.** Scatet tota planta succo acri luteo; dicitur Chelidonia, eo, quod hirundines ea oculis mederi credantur. *Ictericis & hydropicis commendantur.*

Chelidonii, sive Chelidoniæ minoris, Ficariæ minoris, Chelidonii rotundifolii, *Racine de petite Chelidoine*, **Feigwarzenwurtzel**, **klein Schellkrautwurtzel**, **Scharbocksrautwurtzel.** Colligendæ primo vere. *Spleneticæ & antiscorbuticæ habentur; recentes contusæ, cum pulpa pomorum & croco mixtæ, ad tumores & dolores hæmorrhoidum laudantur.*

Chinæ, Chinnæ, Cinæ, *Racine d'Esquine, ou de Squine*, **Chinawurtzel**, **Pockenwurtzel.** Planta a plerisque pro *Smilacis* specie habetur. *Kæmpferus* sub nomine *Smilacis minus spinosæ, bacca sive fructu rubicundo*, Japonensibus *Sankira*, officinis China dictæ, describit, atque in incultis locis, inter silices & vepres, luxuriari perhibet. *Bœrhavius*, *Dillenius*, & *van Royen*, *Rajum* secuti, pro radice *Senecionis Asiatici*, *scapo nudo*, *Rapi folio*, *floribus maximis*, quæ Malabaris *Paring-Checka* audit, habent. Quibus etiam *Commelinus* & *Swalbe* accedunt. *Nierembergius* vero, etiam *Chinæ Mexicanæ* mentionem facit, *atque plantam repentem describit.* Cum vero characteres *Smilacis* & *Senecionis* longe inter se differant, conjecturam facimus: radices, quas pro *China* accipimus, diversarum esse plantarum; aliæ enim lignosæ, minores, rubicundiores & ponderosiores sunt, aliæ majores, farinaceæ & leviores deprehenduntur; has *Senecionis*, priores vero *Smilacis* radices esse conjicimus. In utraque India proveniunt. Orientalis in Malabaria, Cuncan, China aliisque regionibus, Occidentalis in Hispania nova & Peru, nascitur. Eligantur recentes, non cariosæ, ponderosæ, foris fusci, intus ex albo rubescentis coloris, & quasi resinosæ. *Commendari solent Chinæ radices in morbis serosis, lue venerea, podagra & cæteris. Usus est in decoctis.*

Cichorei hortensis, sativi, Seris sativæ, *Racine de Chicorée*, **Wegwarten**, **Garten-Wegwarten**, **Hindläuften-Wurtzel.** Coluntur in hortis, atque primo vere, vel adulto auctumno effodiuntur. Eligendæ sunt carnosæ, non lignosæ. *Ad hepatis & bilis vitia commendari solent, atque etiam in usum culinarium cedunt.*

Rad. Cichorei, Cichoreæ agreſtis ſeu ſilveſtris, *Racine de Chicorée ſauvage*, **wilde Wegwarten, Wegweiß, Hindläuff-Wurtzel.** Creſcunt juxta vias in campeſtribus. *Decoctis colorem reddunt, vario gradu coctionis, vel flavum, vel ſmaragdinum, & ſaporem amarum. Vires habent hortenſis.*

Colchici albi, non venenati. Vide Rad. Hermodactyli.

Colubrinæ. Vide Rad. Biſtortæ.

Conſolidæ majoris, Symphyti majoris, *Racine de grande Conſoude, d'Oreille d'Ane*, **Wallwurtzel, Schwartzwurtzel, Schmeerwurtzel.** Sponte proveniunt in locis humidis, creſcunt ac coluntur etiam in hortis. *Sunt admodum mucilaginoſæ & adſtrictivæ. Adduntur decoctis vulnerariis, & emplaſtris catagmaticis. Ad contuſiones & ſuffuſiones, cataplaſma ex radicibus, multum laudatur.*

Contrayervæ, Drackenæ, Cyperi odoris Peruviani, *Racine de Contrayerve*, **Peruvianiſche Gifftwurtzel.** Sunt nodoſæ & fibroſæ, coloris foris rufi, intus pallidi. Lis diu fuit inter autores, cujus plantæ radices ſint? *Hermannus, Clematitidem paſſionalem Peruvianam, folio bifido; Muntingius*, ob foliorum ſimilitudinem, *Ferrum equinum volubile* vocat. *Plumier* in opere, *nova plantarum Americanarum genera*, plantam appellat *Dorſteniam, Sphondilii folio, radice dentata.* Affertur ex Peruviana provincia *Charcas*, & a *Cluſio*, in honorem *F. Dracke*, qui primus hanc radicem in Europam adportaſſe dicitur, *Drackena* appellata fuit. Optimæ cenſentur radices recentes, ponderoſæ, ſapore ſubadſtringente aromatico præditæ. Tam aqua pluviali, quam ſpiritu vini extracta, tincturam exhibet rubram. *Contrayerva*, vocabulum Hiſpanicum, ſignificat *contra venena. Sunt alexipharmacæ, roborantes, ſudorem movent, & ſpecifice ad dyſenteriam malignam commendantur.*

Coſti amari, officinalis, Comagenii, iridem redolentis, *Racine de Coſtus amer*, **bittere Coſtuswurtz.** *Coſtus Indicus, violæ martiæ odore.* Muſ. Zeil. *Tſiana-Kua*, H.M. Part. II. tab. 8. *Chianfou*, Sinenſium. Radices ſunt ſolidæ, craſſæ, oblongæ, interdum per medium diſſectæ, foris cinerei vel pallidi, intus albicantis coloris, ſaporis aromatici, amaricantis, odoris ad Iridem Florentinam accedentis. Coſtus, olim ex Arabia & Syria advectus, Arabicus & Syriacus dicebatur; creſcit vero etiam in nemoribus Malabariæ, Braſiliæ & Surinamæ. Planta eſt graminifolia, quæ florem in caulis folioſi vertice, profert. Terminatur vero hic caulis capitulo piriformi imbricato; ſquamis ovatis, obtuſis, concavis, e quibus exeunt flores candidi ſinguli. Perianthium parvum, tridentatum germini inſidet. Petala ſunt tria lanceolata, concava, erecta, æqualia. Nectarium monophyllum, magnum, oblongum, tubuloſo inflatum, ore ringens, bifidum in duo labia, e medio reflexum. Antheræ duæ parallelæ. Capſula ſeminalis ſubrotunda, trilocularis; ſemina plana triangularia.

Coſti dulcis, *Racine de Coſtus doux*, **ſüſſe Coſtuswurtzel.** Ejusdem plantæ radicem eſſe, cujus deſcriptionem ex *Horto Cliffortiano Linnæi* modo dedimus, plurimi perhibent, & non

niſi

nisi loco natali, & vetustate radicis, differre; per vetustatem enim, non solum obscuriorem colorem, sed amaritudinem quandam contrahere, & tunc sub *Costi amari* nomine venire; recentes vero radices albicantes, *Costum dulcem* exhibere solent. *Tam Costi amari, quam dulcis vires sunt stomachicæ, uterinæ, carminativæ & alexipharmacæ. Ad Theriacæ compositionem requiruntur; violaceo odore urinam inficiunt.*

Rad. Cucumeris silvestris, Cucumeris asinini, Elaterii, *Racine de Concombre sauvage*, **Eselskürbiswurtzel, Springkürbiswurtz.** Sunt radices rapi instar magnæ; coluntur in hortis; planta est annua. Ex fructu paratur Elaterium. *Vehementer alvum movent, & raro interne, nisi hydropicis, præscribi solent; recentes ad unguentum de Arthanita expetuntur.*

Curcumæ, *Racine de Curcuma, Safran d'Indes*, **Gilbwurtz, Gelbsuchtwurtz, gelber Ingwer.** *Mangella-Kua.* H. M. Arabibus *Curcum*, aliis *Terra merita.* Radix Zingiberis facie, intus flava; celeberrimo Bœrhavio sunt *Cannacori radice crocea.* Ex India Orientali advehuntur. Eligantur recentes, ponderosæ, non cariosæ, saporis aromatici. *Incidunt & resolvunt, atque hydropicis & ictericis commendantur. Præter medicos usus etiam tinctoribus inserviunt. Indi, loco croci, ad cibos colore flavo inficiendos, Curcuma utuntur.*

Cyclaminis, Arthanitæ, Panis porcini, Cyclaminis orbiculato folio interne purpurascente, *Racine de pain de pourceau*, **Schweinsbrodt, Erdäpffel, Waldrüben, Erdscheibwurtz.** Radix colligenda autumno. Saporem primo linguæ mucilaginosum, dein acrem fervidum, imprimit. *Potenter resolvit, & ob vim menses & fœtum pellentem, cum circumspectione dari debet; recens ad unguentum de Arthanita adhibetur.*

Cynoglossæ majoris vulgaris, Cynoglossi sive Linguæ caninæ, *Racine de langue de chien*, **Hundszungenwurtzel.** Sponte proveniunt in locis aridis, & circa sæpes. *Refrigerant & adstringunt, vulnerariis adscribuntur, & ad pilulas de Cynoglosso in officinis expetuntur. Sunt anodynæ, humorum acrimoniam mitigantes, & ad alvi fluxus, hæmoptysin &c. commendabiles.*

Cyperi longi odorati, Cyperi odorati, Panicula sparsa speciosa, *Racine de souchet long*, **lange Cyperwurtz.** *Vires sunt sequentis.*

Cyperi rotundi, Orientalis majoris, C. B. Cyperi Syriaci & Cretici, *Racine de souchet rond*, **runde Cyperwurtz.** Longus Cyperus in Gallia, præsertim in Provincia & Italia reperitur; rotundus vero ex Ægypto, & Orientalibus regionibus advehitur. Ab Ægyptiis *Hodweg* vocatur, & in lacubus, aliisque locis palustribus provenit. *Alpin.* Eligendæ sunt radices odoratæ, graves, non cariosæ. *Utplurimum ad odoramenta Cyperi est usus; interne vero adhibitus, vim habet stomachicam, discutientem, & urinam moventem.*

Dentariæ majoris, Squamatæ, Squamariæ, Anblati, *Racine de Dentaire grande*, **Schuppenwurtzel,**

Streubelwurtz, Creutzwurtz. Locos amant umbrosos, & primo vere colliguntur. *Raro in usum vocantur. Aqua, inde destillata, antepileptica habetur.*

Rad. Dentariæ minoris, Dentariæ pentaphyllæ, Violæ dentariæ, Saniculæ albæ, Symphyti dentarii, *Racine de Dentaire petite*, Zahnwurtzel, weisse Steinbrechwurtzel. Ex Helvetia adferuntur. *Adstringunt & siccant; Herniosis & vulneratis commendantur.*

Dentis Leonis, vide Rad. Taraxaci.

Dictamni albi, Diptamni officinalis, Fraxinellæ, Fraxini pumilæ, *Racine de Fraxinelle*, weisser Diptam, gemeiner Diptam, Aschwurtzel. Nascuntur in montosis Galliæ, Italiæ & Germaniæ locis. Eligantur radices albicantes, ab interiore parte lignosa liberæ, non cariosæ. *Alexipharmacæ potissimum & anthelminticæ habentur; ad Epilepsiam, menses & lochia pellenda commendantur.*

Doronici, Doronigi latifolii, scorpii radice, Romani, *Racine de Doronic*, Gemsenwurtzel, Schwindelwurtz. Proveniunt in montibus Helvetiæ, Tirolis, Stiriæ & Austriæ. Eligantur, quæ sunt albicantes, saporis subdulcis, aromatici, acris, non cariosæ. *Specificum contra vertiginem habentur, & ad nonnullas compositiones pharmaceuticas expetuntur.*

Ebuli, Sambuci humilis, Sambuci agrestis, Chameactes, *Racine d'Jeble, d'Hieble*, Attich, Acker-Holunderwurtz. Cortices radicis in usum vocantur, adjecta lignosa parte. *Vehementer purgant, & inter hydragoga numerantur.*

Ellebori albi, Veratri flore subviridi, *Racine d'Ellebore blanc*, weisse Nießwurtzel, Schampanierwurtzel. Nascuntur in montosis & asperis locis Helvetiæ, Silesiæ, Austriæ & aliis Germaniæ provinciis. *Turnefortius* distinctionem facit inter *Elleborum* & *Veratrum:* album potius Veratrum appellari debere censet, quod & *Rajus* monet. Differt enim ab *Helleboro*, quod corniculis careat, & semen habeat marginatum; ideo etiam, diversis nominibus hæc duo genera distinguenda esse, perhibent. *Vehementer per superiora & inferiora purgant, etiam in parva dosi exhibitæ, & nonnunquam convulsiones excitasse, exempla prostant; proinde in substantia, non nisi robustissimis, maniacis vel melancholicis, dari debent, sufficit grana sex vel octo pro una dosi præscribere; securius vino maceratæ, & vehementia orbatæ, ubi ad scrupulum unum ascendere licet, dantur. Usus frequentissimus vero Ellebori est in pulveribus sternutatoriis. Suibus etiam egregia est medicina. Succus Ellebori albi, vulneribus inditus, lethalis. Tela sive sagittæ, succo intincta, vulnera faciunt insanabilia, modo non lethalia.*

Ellebori nigri, Hellebori nigri angustioribus foliis, flore roseo, Melampodii, Veratri, *Racine d'Ellebore noir*, schwartze Nießwurtzel, Christwurtzel. Nascitur optimus Helleborus niger in Stiria. Eligendus radicibus fibrosis, longis, nigris, carnosis. Caveant Pharmacopœi, ne Helleborastrum, qui Hellebori albi est species, pro nigro vero emant. Folia

lia Hellebori nigri veri, ſunt glabra, ſerrata, & ſeparatim ſpectata, foliis lauri fere ſimilia. *Flos roſeus, Bauhin. Raro ſolus, niſi illis, qui absque febre delirant, in ſubſtantia, ſed plerumque in infuſis & vinis medicatis, ad educendos humores melancholicos, præſcribitur. Datur in ſubſtantia robuſtioribus, a granis quindecim ad drachmam dimidiam, in infuſo ad drachmam integram, imo unam ſemis, exhibere licet.*

Rad. Enulæ campanæ, Helenii, Elenii, *Racine d'Aunée, d'Aune, d'Enule campane,* **Alantwurtzel.** Vocatur etiam ab aliis *Panax Chironium. Linnæo, Aſter foliis ovatis, rugoſis, ſubtus tomentoſis amplexicaulibus. Aſter omnium maximus Raji.* Coluntur in hortis; effodiantur primo vere. *Incidunt & reſolvunt; alexipharmacæ, ſtomachicæ & pectorales ſunt: Cum aqua, per veſicam deſtillatæ, oleum præbent butyraceum, & ſpermatis ceti inſtar foliaceum.*

Eryngii, Lyringii, Acus veneris, Capituli Martis, Aſteris inguinalis, Cardui volutantis aculeati, *Racine de Panicaut, ou de Chardon Roland,* **Mannstreu, Radendiſtel, Brackendiſtel.** Vocantur in uſum Eryngii vulgaris, campeſtris radices. Eligantur carnoſæ. *Radicibus quinque aperientibus minoribus adnumerantur; urinam cient, & venerem languidam ſtimulare creduntur.*

Eſulæ minoris, Tithymali Cypariſſiæ, cupresſini officinalis Linariæ admodum ſimilis, *Racine de Tithymale, d'Eſule,* **Wolffsmilchwurtzel.** Proveniunt copioſe in locis ſterilibus, incultis, aridis, circa vias. Succo ſcatent lacteſcente, acri, cauſtico. Eligantur cortices radicum. *Hydragogis adnumerantur; vehementer purgant, hinc per acida corriguntur atque mitigantur. Doſis a ſcrupulo uno ad duos, raro ad drachmam, in ſubſtantia; in infuſo vero, ad drachmam unam aſcendere licet, hac tamen præcautione, ut acido antea corrigantur, aceto vel ſucco citri.*

Farfaræ, Tuſſilaginis, Bechii, Ungulæ caballinæ, *Racine de Pas d'Ane, de Tuſſilage,* **Brand-Lattich, Huff-Lattichwurtzel.** Creſcunt in locis humidis, circa rivos. Primo vere, dum floreſcere incipiunt, colligi debent. *Pectorales ſunt, & phthiſicis conveniunt; ex recentibus paratur Looch de Farfara.*

Filicis, *Racine de Fougère femelle,* **Farnkrautwurtzel.** In uſum vocari ſolet illa ſpecies, quam *Filicem majorem ramoſam*, ſive *fœminam radice repente* vocant. Colligi debent autumnali tempore. Ubique proveniunt, præcipue vero apud nos in ſilva martia largisſimus earum eſt proventus. *Latis tæniis & lumbricis expellendis vel ſolæ, vel cum Æthiope minerali, & quovis laxante mixtæ, ad ſcrupulum unum vel drachmam dimidiam exhibitæ, inſerviunt; commendantur in decocto etiam lienoſis, calculoſis & podagricis.*

Filipendulæ, Oenanthes, Saxifragiæ rubræ, *Racine de Filipendule, de Saxifrage rouge, de Fougère aquatique,* **rothe Steinbrechwurtz.** Proveniunt in pratis & paſcuis montoſis. Vocatur etiam planta, *Filix florida, Osmunda,* **Waſſerfarn.** Præter vires aliarum filicis ſpecierum, huic præprimis virtus vulneraria attribuitur, atque ex alto lapſis, læſis & ruptis commendatur; ſanguinem enim coagulatum diſſolvere creditur.

Bœcler. Sic etiam ad fluorem album, & *a Sylvatico* ad epilepſiam laudatur. *Rajus* pro ſpecifico ad rachitidem vel in decocto, vel in forma pulveris exhibitam, habet. *Hiſt. Plant.*

Rad. Fœniculi, Fœniculi vulgaris, *Racine de Fenouil*, **Fenchel-Wurtzel.** Seruntur in hortis, & altero poſt ſationem anno effodiuntur. Pars radicis corticoſa in uſum vocatur. *Radicibus quinque aperientibus majoribus adſcribuntur.*

Fragariæ, Fragulæ, Fragariæ vulgaris, *Racine de Fraiſier*, **Erdbeer-Kraut-Wurtzel.** Sponte in ſilvis proveniunt. Auctumnali tempore colligendæ ſunt. *Vim habent ſubadſtringentem; adduntur decoctis vulnerariis.*

Fraxinellæ vide Rad. Dictamni albi.

Galangæ, ad Aromata referuntur.

Gentianæ cruciatæ, Gentianæ minoris, *Racine de Gentiane Croiſette*, **Madelgeer, Creutzwurtz.** Indigenæ ſunt. *Incidunt, abſtergunt, aperiunt, menſes provocant, febribus medentur, lumbricos enecant, atque vulnerariæ ſunt.*

Gentianæ majoris, luteæ, Gentianæ veterum, *Racine de Gentiane*, **Entzian, Gentzian, Bitterwurtzel.** Copioſe in Helvetia proveniunt, etiam in Ducatu Wirtenbergico, in ſilva nigra, & alpibus noſtris, largus earum eſt proventus. Eligendæ ſunt ponderoſæ, carnoſæ, non carioſæ. *Alexipharmacæ, roborantes & ſtomachicæ ſunt.*

Graminis, Graminis arvenſis, loliacei, radice repente, Graminis canini, *Racine de Chien-dent*, **Graßwurtzel, Queckenwurtzel, Hundsgraß.** *Adnumerantur radicibus quinque aperientibus minoribus; cenſentur etiam diureticæ & anthelminticæ.*

Hellebori albi & nigri. Videantur Rad. Ellebori.

Hermodactyli, Colchici alba radice, C. B. J. B. *Racine d'Hermodattes, d'Hermès*, **Hermodattel, oder fremde Zeitloſen-Wurtzel.** Sunt radices oblongæ rotundæ, latæ, & quaſi compreſſæ, cordis figuram referentes, foris albicantes, intus prorſus albæ, ſaporis dulceſcentis & acris, odoris nullius. Ex Syria, Smirna & Aleppo advehuntur. Eligantur albæ & ſolidæ. *Leniter laxant; decoctis adduntur antarthriticis, antivenereis, ac a Wedelio inter leniora & mitiora purgantia recenſentur; ſpecifice laudantur ad guttam ſerenam in collyriis.*

Hirundinariæ, Aſclepiadis, multis floribus albicantibus, Vincetoxici, *Racine de Dompte venin, ou d'Aſclepias*, **Schwalbenwurtzel.** Amant montoſa. *Vires habentur alexipharmacæ, incidentes, reſolventes & urinam pellentes; Hydropicis præcipue commendantur. Sunt tamen, qui, propter affinitatem & ſimilitudinem, quam planta cum Apocynis habet, non ſine ſuſpicione admittere volunt. Certum eſt, recentes radices vomitum provocare.*

Rad.

Rad. Hydrolapathi, Lapathi aquatici, magni, J.B. longifolii, nigri, paluſtris, ſive Britannicæ antiquorum, Munt. *Racine de Patience de Marais, de Hydrolapathum,* **Waſſer-Mengel-Wurtz, groſſe Mengel-Wurtzel.** *Laudantur antiſcorbuticæ, reſolventes & leniter adſtringentes; ſuccus vel decoctum ſpecifice ad ſtomacacem, aliaque ulcera putreſcentia commendatur.*

Hypecacuanhæ, Ipecacuanhæ, Hyppoacannæ, dyſentericæ radices, *Racine d'Ipecacuanha,* **Indianiſche Ruhr-Spey-Wurtz.** Tres apud autores recenſentur ſpecies, nigra, alba, & flava. Ex his prima, ſcilicet nigra, apud nos in uſum vocatur; alba, a Portugallis blanca vocata, rarior eſt, & flava, quæ tamen optima cenſetur, rariſſima. Ex America, & præſertim ex Braſilia advehitur. Planta a *Linnæo* vocatur *Ouragoga,* a *Pluckenetio, Periclimenum parvum Braſilianum, alexipharmacum,* a *Rajo, Herba Paris Braſiliana polycoccos.* Creſcit in ſilvis humidis Braſiliæ. Radix eſt longiſſima, caulis rariſſime ramoſus, decumbens, interne nudus; folia verſus apicem oppoſita, obverſe ovata, utrinque acuta, ſcabra, ſubtus pallidiora, duorum pollicum latitudine, trium longitudine, internodiis caulis vix pollicis longitudine, ſunt; Perianthium quinquepartitum, laciniis lanceolato linearibus æqualibus; Corolla quinquefida; Bacca ſubrotunda, unilocularis, calyci inſidens; Semina ſunt tria oſſea, hinc gibba, inde angulata. Prolixiorem ex *Linnæi Hort. Cliff.* dedimus plantæ deſcriptionem, quia nullibi accuratam invenimus. Eligantur a fibris mundatæ, aſperæ, multis annulis notatæ, tenaces, compactæ, pulpoſæ & reſinoſæ, quæ craſſiori cortice ſunt cinctæ. *Ipecacuanha lene & ſecurum præbet emeticum, quod etiam infantibus dari poteſt, non raro per inferiora quoque purgat. Præſcribitur utplurimum in ſubſtantia, adultis, a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis, infantibus, pro ratione ætatis, a granis duobus vel tribus ad decem, addito ſtimulo ſalino. Celebratur etiam alexipharmaca & antidyſenterica, in quo morbo tamen cum circumſpectione adhibendam eſſe cenſemus. Non magna ejus quantitas inſimul in pulverem teri debet, ſed tempore uſus tantum recenter teratur; aër enim, qui minimas particulas ſubit, vim emeticam aufert.*

Hyoſcyami, Jusquiami, Fabæ ſuillæ vel porcinæ, Hyoſciami albi majoris, *Racine de Jusquiame blanche, d'Hannebane,* **Bilſenkraut-Wurtzel, Toll- oder Schlaff-kraut-Wurtzel.** Diſtinguuntur albus & niger, ratione florum & ſeminis; albus præfertur nigro, qui virulentior creditur. *Raro in uſum veniunt; interdum ad ſomnum conciliandum in pediluviis adhibentur.*

Jalappæ, Gialappæ, Chelapæ, Mechoacannæ nigræ, Gelapii, Rhabarbari nigri, Jalappa officinarum fructu rugoſo Tournefortii, & Convolvulus Americanus, Jalapium dictus, *Racine de Jalap,* **Jalappen-Wurtzel, Gallen-Pulver.** *B. Bœrhave, Mirabilem Peruvianam,* pro Jalappa habet, ea tamen diſtinctione, quod ſub Nr. 5. Jalappam fructu rugoſo officinarum ponit. *Ind. pl. T.* I. Radices ſunt craſſæ, oblongæ, raparum inſtar, & orbiculatim inciſæ nobis adferuntur. Patriam agnoſcunt *Americam,* ubi in inſula *Madera* largus & ſpontaneus earum eſt proventus. Eligendæ ſunt

nigricantes, resinosæ, ponderosæ, quæ candelæ admotæ mox accenduntur. *Usus & virtutes radicis hujus sunt purgantes, omnibus notæ, anodynæ vero & somniferæ incertæ. Dosis resinosæ in substantia scrupulus unus ad drachmam dimidiam.*

Rad. Imperatoriæ vide Rad. Ostrutii.

Ipecacuanhæ vide Rad. Hypecacuanhæ.

Iridis Florentinæ, Iridis albæ Florentinæ C. B. *Racine d'Iris de Florence*, **Florentinische Veil- oder Violen-Wurtzel.** Ex Italia, Rhodo insula, Cypro & Dalmatia advehuntur. Eligantur radices albæ, longiores, crassæ, odore Violas martias æmulantes. *Tam ad odoramenta, quam in Medicina, multus earum est usus. Resolvunt, alvum & urinam movent, & præsertim hoc scopo infantibus, bono cum effectu, præscribuntur. Dosis grana tria ad scrupulum unum. Adspergitur ossibus denudatis, & ad cariem præservandam, vel præsentem auferendam, laudatur.*

Iridis nostratis, Iridis vulgaris Germanicæ, sive silvestris C. B. *Racine d'Iris bleue, ou de Glayeul*, **gemeine Veilwurtz, blaue Schwertel, blaue Lilienwurtzel.** Nonnunquam sponte proveniunt, coluntur etiam in hortis. Radix colligenda auctumnali tempore. *Commendatur hydropicis & œdematosis; alvum laxat & serum educit. Datur uncia dimidia in sero lactis decocta.*

Lapathi acuti, folio acuto, C. B. Oxylapathi J. B. Ramicis silvestris, *Racine de Patience sauvage, de Parelle*, **Grindwurtzel, wilder Ampfer, Mangel-Wurtz, Lenden-Wurtz.** Ubique occurrunt. *Adstringunt & vulneraria censentur; ad scabiem & cutaneos morbos externe commendantur.*

Levistici, Lybistici, Ligustici, Laserpitii Germanici, *Racine de Leveche ou Liveche*, **Liebstöckel, Badkraut, Saukraut-Wurtzel.** Coluntur in hortis. Verno tempore effodiendæ sunt. *Vires habent alexipharmacas, carminativas, uterinas & diureticas.*

Liliorum alborum, Liliorum candidorum, *Racine des Lis blancs*, **weisse Lilienwurtzel.** Sunt radices bulbosæ, ex pluribus squamis carnosis constantes. Coluntur in hortis; auctumnali tempore colligendæ. *Usus internus est rarus; in clysteribus & cataplasmatibus emollientibus frequens.*

Liquiritiæ, Glycyrrhizæ, *Racine de Régliſſe*, **Süßholtz, Süßholtzwurtzel.** Præfertur Liquiritia, quæ in Germania colitur, & in agris circa Bambergam luxuriat, Hispanicæ & Italicæ, quæ raro satis recens, & situ non corrupta, advehitur. Diu in aqua cocta amarescit; hinc decoctis in fine addi debet, remoto cortice exteriore. *Acrimoniam humorum demulcet, dolores nephriticos mitigat, atque expectorationem promovet. Datur in pulvere & in decoctis.*

Malvæ, Malvæ vulgaris, flore minore, folio rotundo, *Racine de Mauve*, **Papelwurtzel.** *Cum radicibus Altheæ conveniunt; raro tamen in usum vocantur, nisi ad dentes affrictione extergendos.*

Rad.

Rad. Mandragoræ, Mandragoræ fructu rotundo, vel Maris, *Racine de Mandragore*, **Alraunwurtzel.** Nascuntur in calidis regionibus, Italia & Hispania; coluntur apud nos nonnunquam in hortis. *Usus in Medicina est rarus, quia ob vim stupefacientem inter infida medicamenta locari merentur. In pediluviis, contra dolorem capitis & ad somnum conciliandum, nonnunquam adhibentur.*

Mechoacannæ albæ, Bryoniæ Mechoacannæ albæ C.B. *Racine de Mechoacan*, **weiſſe Jalappa, weiſſe Rhabarbara.** Pertinet ad convolvulorum classem, & *Rajo*, *Convolvulus Americanus*, *Mechoacanna* dictus, audit. Ex America advehitur, & in regione Mexicana, quæ vocatur *Mechoacanna*, a qua nomen habet, provenit. Saporis & odoris fere omnis expers est. Eligenda ponderosa, alba, insipida, quæ non radicibus *Mandragoræ* adulterata vel permixta, nec cariosa sit. *Ad infantes laxandos commode adhibetur, quia insipida est. Dosis grana quinque, ad drachmam semis.*

Sunt, qui varia funesta symptomata usum Mechoacannæ secuta, observasse, scribunt, quæ vero symptomata nunquam a Mechoacanna vera, sed a Mandragoræ radicibus, quæ faciem externam Mechoacannæ habent, & a falsariis his substitui solent, excitantur.

Mechoacannæ nigræ. Vide Rad. Jalappæ.

Metalistæ, Matalistæ, *Racine de Metaliste*, Mechoacannæ species esse videtur. Sunt, qui pro radice *Mirabilis Peruvianæ* habent, cum qua etiam convenit. *Leniter alvum ciet, & serum educit. Dosis drachma una.*

Mei, Mei Athamantici, Anethi ursini, Fœniculi ursini, Athamantæ, *Racine de Meum*, **Bärwurtz, Mutterwurtz, Bärenfenchel, Hertzwurtzel.** Sunt radices oblongæ, digiti vel pollicis crassitie, foris fuscæ, intus albicantes. Nascuntur in montosis Galliæ, Italiæ & Germaniæ, inprimis in silva Hercynia proveniunt. Eligantur recentes, non cariosæ. *Vires sunt alexipharmacæ, carminativæ & Theriacam ingrediuntur.*

Morsus diaboli, Succisæ hirsutæ C.B. Præmorsæ, Jaceæ nigræ, *Racine de Succise*, **Teuffels-Abbis-Wurtzel.** Indigena planta, provenit in pratis. Radix colligenda primo vere. *Alexipharmaca & vulneraria habetur.*

Mungos, *Racine Mungos*, **bittere Jndianische Gifftwurtz.** Radix est plantæ, Malaice *Hampaddu Tanah*, i. e. *fel terræ* dicta, a sapore amarissimo omnium fere partium, præsertim radicis, quæ intensam bilis amaritiem exhibet. Lusitanis *Mungo*, Batavis *Muncus* appellata, a Mustela quadam seu Viverra, quæ radicem monstrasse, & usum ejus pro alexipharmaco prima mortalibus prodidisse creditur. Est mustelæ huic is genius, ut serpentem naturali odio prosequatur; tradunt igitur, si contingat, morderi Muncum, pro alexipharmaco hanc radicem quærere, & ejus esu illico restitutum, certamen redintegrare. Indi, præcipue, qui *Sumatram* & *Javam* incolunt, radicem pro explorato habent antidoto, sive venenum extrinsecus vulneri illatum, sive intrinsecus assumtum fuerit. Maximam autem celebritatem radicis hujus enatam esse ab eximia illa virtute, quam adversus toxicum macassariense præstat, exitiale illud & vix alio remedio vincibile, *Kæmpferus*, qui nobis descriptio-

nem dedit, perhibet. Patriam agnoſcit *Javam*, *Ceylanam* & *Sumatram* inſulas. Creſcit, altitudine pedali & longiori, faciem eminus conſpecta exhibet Centaurii minoris. Radix illi una eſt & ſimplex, ſpithamam longa, digiti craſſitie, crebro vagoque deflexu intorta; cortice firmiter adnata fungoſa, rufa, rugoſa, ſubſtantia lignoſa, dura, fibrarum exorte & fragili, coloris albidi, ſaporis amariſſimi, inſtar Gentianæ, ſed ſubtilioris & haud æque ingrati. Caule aſſurgit recto, tenui, æquali, ramulis raris, alterne adverſis, quos folia ornant pari ordine diſpoſita, rariora, anguſta, longitudinis uncialis, figuræ lanceatæ; ſtylis ſingulis, ex ſurculorum axillis in duorum vel trium digitorum transverſorum longitudinem exſurgentibus, tenuibus, deciduis, inſiſtunt floſculi circiter quinquaginta, parvi, in plures faſciculos digeſti, & in umbellam tantillam, quam ungue obumbres, conglobati, pulchre rubentes; qui per microſcopium cognoſcuntur nudi, tubulati, extremitate in quinas & ſenas lacinias diviſi. Areſcente floſculo, ex umbilico ejus ſemen minutiſſimo pediculo protruditur, in aliis geminum, vel ex duobus ſeminibus ad baſes concretum, faſtigiis divaricatis, in aliis ſimplex & unum, inæqualis rotunditatis, & ex quadantenus compreſſo utrinque turbinatum, oſſeum, ſeminis Coriandri magnitudine, cute veſtitum carnoſa adnata, per ſiccitatem rugoſa, coloris promiſcue vel nigricantis, vel ex viridi pallentis.

Doſis eſt drachma integra, vel etiam dimidia, cum hauſtu aquæ. Externe radicem ſputo vel aqua in pultis formam tritam vulneribus venenatis imponere ſolent. Non ſolum autem contra venena, ſed & in febribus putridis & malignis, & adverſus morſum canis rabidi infallibilem habere virtutem, perhibet, quem laudavimus, Kæmpferus.

Rad. Ninzin, Niſii, Nindſin, Dſin, Gin-ſem, Genſing, *Racine de Ninzin, ou Gin-ſeng*, **Indianiſch, Japaniſche Krafftwurtz.** Vocatur planta a *Kæmpfero*, *Siſarum montanum Corvenſe*, radice non tuberoſa. Habetur pro *Araliaſtri* ſpecie. *Eph. Nat. Cur. Cent. VIII.* Sunt radices oblongæ, vix digiti minimi craſſitie, utplurimum bifidæ, albicantes, nonnunquam flaveſcentes, ſaporis ſubdulcis & amaricantis ſimul, ſuavis, aromatici. Naſcuntur in Japonia, China & regno Siam. Sunt etiam, qui in America creſcere perhibent. *R. J. Lafiteau*, *Aurelianam Canadenſem* vocat, apud Iroquæos *Garentogen* audit. Colliguntur ineunte hyeme, &, ad uſum ut fiant idoneæ, ita præparantur: recens effoſſæ triduum macerantur in aqua dulci frigida, vel Oryzæ, maceratæ in aheno operculato ſuſpenduntur in vapore ſuper igne; tum exſiccatæ ab ima parte, usque ad mediam, duram, rufam, reſinoſam ac quaſi pellucidam acquirunt faciem. Eligendæ bifidæ, flaveſcentes, & quæ quaſi diaphanæ apparent. *Virtutes harum radicum a Japonenſibus & Sinenſibus prædicantur variæ, ex quibus præcipue ſunt, quod roborent, pinguefaciant, renibus conducant, analepticæ & aphrodiſiacæ ſint. Utuntur veluti Thea in India. Dantur ex infuſo aquæ ferventis, vel etiam in pulvere, a ſcrupulo uno ad duos. Magno in pretio etiam in India ſunt, & unica uncia olim quinquaginta florenis Hollandicis & ultra vendita eſt, quæ nunc decem modo conſtat.*

Nymphææ albæ majoris, C. B. Nenupharis, Nenufaris, *Racine de Nenufar*, **weiſſe Seeblumen,**

Waſſer

Waſſer-Lilienwurtzel. Naſcuntur in ſtagnantibus aquis & fluminibus pigro curſu labentibus. *Adſtringentis ſunt virtutis, a nonnullis ad fluorem album commendantur.*

Rad. Olsnitii, Apii lacteo ſucco turgentis, Apii ſilveſtris, Thyſſelini Plinii, Mei paluſtris Sileſiaci, *Racine d'Olsnitium*, **Elſenich, Oelnitz.** Radices ſunt digiti minimi craſſitie candidæ, ſaporis amari, acris. *Calefaciunt, incidunt & reſolvunt; aſthmaticis & ictericis conveniunt; alexipharmacæ ſunt virtutis, urinam & menſes movent.*

Ononidis, Reſtæ bovis, Remoræ aratri, *Racine d'Arrête Bœuf, la Bougrande*, **Hauhechel, Stallkraut, Ochſenbrech-Wurtzel.** Vocatur etiam *Urinaria*, ob effectum. Adnumerantur radicibus quinque aperientibus minoribus. Ubique ad vias occurrunt. Primo vere colligendæ ſunt. *Vim habent diureticam, abſtergentem & attenuantem. Specifice ad ſarcocelen a Tournefortio, ad drachmæ unius pondus pro doſi exhibitæ, commendantur.*

Oſtrutii, Imperatoriæ, Magiſtrantiæ, Aſtrantiæ, *Racine d'Imperatoire, ou d'Otruche*, **Meiſterwurtz, Kayſerswurtz.** Intelligitur *Imperatoria major* C. B. Proveniunt in locis montoſis, noſtris Alpibus, etiam in Styria. *Sunt nervinæ, alexipharmacæ, carminativæ & diureticæ. Recentes diſſectæ & pollicibus manuum & pedum alligatæ, ad infantum epilepſiam commendantur. Præferuntur a C. Hoffmanno, Angelicæ & Zedoriæ, præſertim in colicis doloribus; ad quartanam, hydropem & febres diuturnas, non habere ſibi parem, & divinum eſſe remedium, perhibet. Ad urinam pellendam, infuſum theiforme, & in clyſtere, ad partum facilitandum, laudantur.*

Oxylapathi. Vide Rad. Lapathi acuti.

Palmæ Chriſti, Orchidis palmatæ, Satyrii Baſilici, *Racine de Palme de Chriſt*, **Creutzblumen-Wurtzel.** Naſcitur in humidis pratis. *Cum Satyrio vel Orchide rotunda conveniunt; alii ad febrem quartanam & maniam commendant.*

Pareiræ bravæ, Ambutua, Butua, *Racine de Pareira brava*, **Americaniſche Grieſzwurtzel.** Nihil certi adhuc de charactere hujus plantæ conſtat, quæ a Braſilianis *Caapeba*, a Luſitanis *Pareira brava*, quod vitem ſylveſtrem notat, vocatur. Planta in America, & præſertim in Braſilia naſcens, juvencula exiſtit ſarmentoſa & tortuoſa, arbores vicinas ſcandit, vel ſuper terram repit, annoſa vero craſſitie rudentes navium adæquat. Radices juniores & minores foris coloris e cinereo ſunt nigricantis; annoſiores & majores, quæ ſæpius ad craſſitiem brachii perveniunt, extrinſecus plane nigricant, intrinſecus vero colorem habent ex fuſco luteum, & ſaporem dulcamarum. Eligendæ ſunt radices craſſiores, non carioſæ. *Vim habent demulcentem & diureticam, hinc in doloribus ſpaſticis, renum, pulmonum & articulorum affectibus, nec non Hydrope & Ictero bonam præſtant opem. Exhibentur tam in forma pulveris, quam in decoctis; ſunt etiam, qui ſpiritu vini eſſentiam extrahunt. Incolæ Braſiliæ unciam unam hujus radicis, cum ſalis armoniaci drachma, in menſura aquæ coquunt, & de hoc decocto ſingulis quatuor horis ægrotis hauſtum præbent. Doſis in ſubſtantia a ſcrupulo ad drachmam ſemis, in infuſo drachmæ duæ.*

Rad. Pentaphylli, Quinquefolii majoris repentis C. B. *Racine de Quinte feuille, de Pempedula,* **Fünffingerkraut-wurtz.** Proveniunt in locis arenosis. Colligantur verno tempore. *Alexipharmacæ, vulnerariæ & adstringentis sunt virtutis. A* Tabernæmontano *radicibus Chinæ æquiparantur; Theriacam ingrediuntur.*

Petasitidis majoris, vulgaris rubentis, rotundiori folio, *Racine de Pétasite, de grand Pas d'Ane,* **Pestilentz-Wurtzel, Schweiß-Wurtz, neue Krafft-Wurtz.** Crescunt in locis humidis, pratis uliginosis & irriguis. Colligantur primo vere. Flores Petasitidis & Farfaræ ante folia proveniunt, hinc Farfara filius ante patrem apud nonnullos audit. *Vis attribuitur alexipharmaca, cardiaca & anthelmintica; externe ad Bubones & maligna ulcera laudantur.*

Petroselini vulgaris, *Racine de Persil,* **Petersilien-Wurtzel.** Seruntur in hortis. *Sunt diureticæ, & radicibus quinque aperientibus majoribus adnumerantur.* Tabernæmontanus *Petroselini usum, gravidis, puerperis & lactantibus prohibet, ne infantes epilepsia, vel motibus convulsivis corripiantur.*

Peucedani, Fœniculi porcini, Pinastellæ, *Racine de Queue de Pourceau,* **Haarstrang, Sau-Fenchel, Schwefel-Wurtz.** Sponte proveniunt in nostris Alpibus. *Resolvunt & attenuant; carminativæ, alexipharmacæ & diureticæ celebrantur. Etiam externe decoctum, ad ulcera inveterata sordida curanda commendatur.*

Phu Pontici, Valerianæ hortensis, Phu folio Olusatri Dioscorid. C. B. Phu magni, veri, *Racine de grand Valeriane,* **grosser Baldrian, Garten-Baldrian.** Sunt radices oblongæ, rugosæ, superficie geniculatæ, digitum crassæ, multis fibris dotatæ, foris cinerei, intus albicantis coloris, saporis acris, odoris aromatici. Effodiendæ verno tempore. Coluntur in hortis, nonnunquam in silvis occurrunt. *Habentur alexiteriæ, & ad Theriacæ confectionem requiruntur.*

Pimpinellæ sanguisorbæ, *Racine de Pimprenelle,* **Pimpernell-Wurtzel, Blutkraut, Kölbleinkraut-Wurtzel.** Inveniuntur in incultis, & circa limites agrorum aridiorum, amant aprica & petrosa. *Virtutem habent adstringentem & vulnerariam; a Palmario contra Hydrophobiam laudantur: Equis, teste Tabernæmontano, anthelminticum præbent.*

Pimpinellæ albæ, umbelliferæ, hircinæ, Saxifragæ, Tragoselini, *Racine de Pimprenelle blanche, de Boucage,* **Bibernell, Steinpeterlein, Pfefferwurtz.** Nascuntur in locis arenosis & incultis. Effodiendæ vel verno vel auctumnali tempore. Saporis sunt acris, & odorem quasi hircinum spirant. *Virtute gaudent alexipharmaca, lithontriptica, uterina, vulneraria & anticatarrhali.*

Plantaginis latifoliæ, Plantaginis majoris, *Racine de Plantain,* **breit Wegerich-Wurtzel.** Ubique occurrunt. Colligendæ auctumnali tempore. *Decoctum commendatur in febribus intermittentibus; vulnerariis potionibus & gargarismis adduntur.*

Rad. Pœoniae, Roſae benedictae, regiae, *Racine de Pivoine*, **Päonien-Wurtzel, Pfingſtroſen, Gichtroſen-Wurtzel.** Præfertur illa ſpecies, quæ mas dicitur, folio ſplendido, nigricante. Coluntur in hortis, & primo vere, creſcente Luna, effodi debent. *Sunt anodynæ, antiſpaſmodicæ, & inprimis antepilepticæ cenſentur, atque plerisque pulveribus antepilepticis adduntur.*

Polygonati majoris, latifolii, vulgaris, Sigilli Salomonis, Geniculatae, Genicellae, *Racine de ſceau de Salomon*, **Weiß-Wurtz, Schminckwurtzel.** In ſilvis & umbroſis locis proveniunt. Verno tempore effodiendæ ſunt. *Ad ſugillationes in forma cataplaſmatis applicatæ pro ſpecifico habentur, atque coſmetico uſui inſerviunt.*

Polypodii vulgaris, Filiculae dulcis, *Racine de Polypode*, **Engelſüß, Baumfarn, Eichfarn, Kropffwurtz, Corallenwurtz.** In ſilvis ad radices caudicesque arborum Fagi, Quercus & Coryli naſci ſolent. Eligendæ ſunt quercinæ, vel quæ ad caudices Quercuum reperiuntur. Coloris intus virideſcentis, ſaporis dulcis. *Aperiunt, incidunt, ad pectoris & renum vitia, febre quartana laborantibus, & melancholicis, ex decocto, commendantur; veteres etiam melanagogis adſcribebant. Uſus eſt in infuſis; longa coctione amara reddunt decocta.*

Pſeudacori. Vide Rad. Acori vulgaris.

Pulſatillae cœruleae, Herbae venti, *Racine de Coquelourde*, **Küchen-Schell, Oſterblumen-Wurtzel.** Sunt craſſæ, longæ, Cardopatii modo exeſæ, ſaporis ſubdulcis, acris. *Vi pollent alexipharmaca, & contra peſtilentiæ contagia, virulentorum animalium ictus cum vino potæ commendantur. Aliis ejus uſus internus eſt ſuſpectus.*

Pyrethri officinalis, Salivalis, Dentariae, *Racine Salivaire, ou de Pyrethre*, **Bertram, Zahnwurtz, Speichelwurtz, St. Johanniswurtz.** Sunt Pyrethri, flore Bellidis, radices, ex calidioribus regionibus allatæ. *Incidunt & attenuant; raro interne adhibentur. Piperis inſtar acres ſunt; ad linguæ Paralyſin, & ad dentium dolores maſticatæ præcipue commendantur.* Ettmullerus *ſingularem virtutem, externe cum pinguedine coturnicis, membro, generationi dicato, adhibitæ adſcribit ſtimulantem.*

Quinquefolii. Vide Rad. Pentaphylli.

Raphani ruſticani, Raphani marini, Armoraciae, Raphani ruſtici, Cochleariae folio cubitali, Tournefort. *Racine de grand Raifort*, **Meer-Rettich.** *Coluntur in hortis, & plantis antiſcorbuticis adnumerantur. Calculoſis, hydropicis, verminoſis & menſium vitiis laborantibus, commendari ſolent.*

Rhabarbari Monachorum, Lapathi latifolii hortenſis, Rumicis ſativi, *Racine de Rhubarbe des Moines*, **Münchs-Rhabarbara.** Coluntur in hortis. *Multum cum Rhabarbaro vero conveniunt, magis vero adſtringunt.*

Rad. Rhabarbari veri, Rhabarbari lanuginosi, sive Lapathi Chinensis longifolii, *Racine de Rhubarbe*, **edle Rhabarbara, wahre Rhabarbara.** Lapathum præstantissimum, Rhabarbarum officinale Munting. Ob florem monopetalum, campaniformem, multifidum, proprium genus constituit Bœrhave Ind. pl. part. II. p. 84. A *Tournefortio* ad plantas flore monopetalo, campaniformi, multifido, refertur. Patriam agnoscit Chinam, unde per reliquas Asiæ regiones ad nos pervenit. Eligendum est Rhabarbarum, quod rarum existit, & minorem stipticitatem habet, quod inter mandendum glutinosum est, cum levi adstrictione, & croceæ tincturæ; varii coloris, dilute ex carneo colore rubens. Frusta nodosa minora præferuntur majoribus, quæ sæpius intus putrescunt & nigrescunt. Hodie etiam radices in taleolos dissectæ advehuntur, quæ reliquis præferri merentur. Sit mediocriter ponderosum & non cariosum. *Vires vere habet polychrestas, quas recensere nimis longum esset.* Tilingius *integrum scripsit tractatum, sub titulo* Rhabarbarologiæ. *Unicum monemus, Rhabarbarum assumtum urinam tingere flavo colore, quod juvenes practici, ne in urinarum examine hallucinentur, notent.*

Rhapontici officinalis, Lapathi Alpini folio subrotundo J. C. Lapathi hortensis rotundifolii B. C. *Racine de Patience grande.* Sunt unius vel duorum pollicum crassitie, extus flavæ, intus sicut Rhabarbarum verum variegatæ, saporis amaricantis adstringentis. Reperiuntur nonnunquam crassæ proxime ad formam & magnitudinem Rhabarbari veri accedentes; distinguuntur vero odore, qui non ita gravis, sapore magis adstringente & glutinoso, atque, quod masticatæ, salivam colore non ita intense flavo, sicut Rhabarbarum, inficiant. Coluntur in hortis, & sponte in Styriæ & Austriæ alpibus proveniunt. *Alvum, ad drachmam unam usque vel duas exhibitæ, solvunt. Commendantur vulneratis, ictericis & ab alto lapsis.*

Rhapontici veri, *Racine de Rapontic*, **wahrhafte Rhapontic.** Sunt oblongæ, pollicis crassitie, coloris foris fusci, intus crocei, substantiæ raræ & laxæ, saporis amaricantis subadstringentis, parum glutinosi, odoris haud ingrati. Planta inter *Lapatha* a nonnullis ponitur; *Tournefortius* vero, ob florem monopetalum, campaniformem, multifidum, proprium inde genus constituit: hinc inde, eandem cum Rhabarbaro vero plantam esse, multi autumant, & non nisi loco natali & radicibus minoribus distinctam. Raro in officinis reperiuntur, & loco Rhapontici veri, plerumque radices *Centaurii majoris*, quod *Rha capitatum*, sive *Rhaponticum Helenii folio* appellant, prostant. *Optime igitur, si Rhaponticum verum præscribitur, Rhabarbarum verum orientale substituitur, cum quo etiam ratione virium convenit.*

Rhodiae, Rosariae, *Racine de Rhodus, ou sentant les Roses*, **Rosenwurtz.** Planta sub nomine *Anacampseros, radice rosam spirante, majoris, a Tournefort.* describitur. A *Bœrhavio, Thelephium, radice rosam spirante majus, foliis cæsis, minus serratis*, vocatur. Nascuntur in alpibus. *Vim habent subadstringentem, & tam interne sumtæ, quam externe, fronti cum aceto applicatæ, ad Cephalalgiam laudantur.*

Rad. Rubiae tinctorum, ſativae majoris, Erythrodani Raji, *Racine de Garance*, **Färber-Röthe-Wurtzel.** Coluntur copioſe circa Vratislaviam in Sileſia. *Vulneraria ſunt & radicibus quinque aperientibus minoribus adſociantur. Propter travmaticas vires a Turcis per excellentiam Baya*, i. e. Balſamum, *vocantur. Uſus maximus in arte tinctoria.*

Ruſci, vide Rad. Bruſci.

Saniculae, Saniculae officinarum, vulgaris Diapenſiae, *Racine de Sanicle*, **Sanickelwurtzel, Bruch-krautwurtz.** Indigena eſt planta, & in ſilvis naſcitur. *Folia & radices leniter adſtringunt, & decoctis adduntur vulnerariis, commendantur etiam hernioſis.*

Saponariae majoris laevis, C. B. Lychnidis Saponariae dictae, *Racine de Saponaire, ou de Savoniere*, **Seiffenkrautwurtzel.** Juxta rivulos & foſſarum margines creſcunt. Radices primo vere effodiendæ. *Vires ſunt ſudoriferæ, attenuantes, aperientes & diureticæ, ac in morbis ſeroſis, pectoris, lue venerea & menſibus ciendis commendari merentur.* Stahlius *radices Saponariæ, Sarſaparillæ radicibus longe præferendas eſſe, autumat.*

Sarſaparillae, Salſaparillae, Zarzaparillae, *Racine de Sarcepareille, ou de Salſepareille*, **Sarſaparill.** Sunt *Smilacis viticulis aſperis Peruvianæ, folio hederaceo lævi. Smilax caule angulato aculeato, foliis ovatis, acutis, inermibus*; vel *Smilax viticulis aſperis Virginiana, folio hederaceo lævi. Zarza nobiliſſima. Hort. Lugd. Royen.* Ex multis Americæ provinciis, Peru, Mexico, Virginia & Braſilia advehuntur. Eligendæ ſunt radices recentes, coloris foris obſcurioris, intus albicantis, quæ non facile franguntur, nec carioſæ ſunt; præferuntur, quæ calami ſcriptorii craſſitiem habent. *Temparatiſſima eſt radix, & in morbis lymphæ bonam præſtat opem, longam vero expoſcit coctionem, vel macerationem.*

Satyrii, Cynoſorchidis latifoliae C. B. *Racine de Satyrion*, **Stendelwurtz, Knabenkrautwurtz.** Radices *Orchidis* & *Satyrii* hodie confunduntur, atque ſæpius una pro altera ſumitur. A veteribus vero diſtinguebantur, ita ut ſpecies, quæ radicem bulboſam, eamque geminam obtinerent, *Orchides*, quæ vero tantum unicam, *Satyria*, appellarentur. Differunt etiam ab illa ſpecie, quæ *Palma Chriſti* vocatur, & radices multifidas habet. Naſcuntur in pratis humidis, colliguntur ineunte vere. *Radices Satyrii, virtute multum cum illa Perſica radice*, Salab *dicta, convenire*, Degnerus *in Diſſertatione* de Dyſenteria contagioſa bilioſa, *perhibet; quæ & celeberr. & illuſtr.* Hallerus *confirmat.* Muntingius *ad ſpaſmos & convulſiones nervorum, fluorem album, & hæmorrhagias uteri commendat. Vulgo pro aphrodiſiacis habentur, & ad* Electuarium Diaſatyrium *expetuntur.*

Saxifragiae albae, Saxifragiae rotundifoliae C.B. radice tuberoſa, *Racine de Saxifrage*, **weiſſe Steinbrechwurtz.** Proveniunt in pratis & collibus humidis. Ordinario in officinis ſub nomine ſeminum Saxifragiæ veniunt, magnitudine ſemen Coriandri æquantes. *Reſolvunt, & humores viſcidos attenuant; hinc ad pectoris, renum & veſicæ vitia commendantur.*

Rad. Scillae, Squillae, Scillae rubrae, five Pancratii veri, *Racine de Scille, Oignon marin*, **Meerzwiebel, Mauszwiebel.** Sunt ſpecies *Ornithogali maritimi*, radice rubra *Tournef.* magnitudinis variæ, aliquando duorum pugnorum, e plurimis ſquamis, lamellatim, Ceparum inſtar, ſibi incumbentibus compactæ, inferius multis fibris donatæ, extus rufæ, quæ ordinarii ſunt uſus, albæ rarioris. Utræque ſaporis amari & acris, odoris nullius. Naſcuntur in locis maritimis arenoſis Luſitaniæ, Hiſpaniæ, Siciliæ. Flores, hyacyntho ſtellari ſimiles, in ſpica creſcentes, antequam folia apparent, emergunt. Crudæ raro, præparatæ vero ſæpius in uſum vocantur. Vide *Scilla præparata*, *Parte II. Diſpenſatorii. Scilla alba mitior habetur rubra.*

Scorzonerae, Latifoliae, Sinuatae, Serpentariae, *Racine de Scorzonnere*, **Scorzonerawurtzel, Schlangenwurtzel.** Scorzonera a voce Catalonica *Eſcorzo*, *Vipera*, cujus morſui & aſſumta, & externe applicata, mederi creditur. Coluntur in hortis. *Tam alimentum, quam medicamentum, blandum, diaphoreticum & alexipharmacum præbent.*

Scrophulariae, nodoſae fœtidae, vulgaris & majoris, Ficariae, Ferrariae, Caſtrangulae, *Racine de Scrophulaire*, **Braunwurtz, Saukrautwurtz, Feigwartzwurtz.** Naſcuntur in locis humidis, circa rivulos & foſſas. Verno tempore colligi debent. *Vulneraria ſunt & inciſivæ, ſed odoris & ſaporis ingrati, amari. Folia corrigunt ſennæ ſaporem nauſeoſum. Vide Yquetaya.*

Serpentariae Virginianae, Viperinae, Colubrinae, Contrayervae Virginianae, *Racine Serpentaire ou Viperine de Virginée*, **Virginianiſche Schlangen-Wurtzel.** Planta ad ariſtolochiarum claſſem refertur, atque *Serpentaria* ſive *Piſtolochia flore atro purpureo, in terræ ſuperficiem procumbente, foliis cordiformibus* a *Clayton in flora Virginica*, vocatur. Apud *Gronovium*, *Ariſtolochia, caulibus infirmis, anguloſis, flexuoſis, foliis cordato oblongis, planis, floribus recurvis, ſolitariis*, audit. Plerumque tota planta, in faſciculos ligata, ad nos pervenit. Radices ſunt tenues, fibroſæ, ſaporis aromatici, odoris camphorati, vel ad *Valerianæ* accedentis, gratioris tamen. *Vires alexipharmacæ, balſamicæ, anticatarrhales, carminativæ, diureticæ, & uterinæ, celebrantur.*

Sigilli Salomonis, vide Rad. Polygonati.

Spicae Celticae, Nardi Celticae, Alpinae, Valerianae Celticae, Tournefort. *Racine de Nard Celtique*, **Celtiſcher Nardus, Magdalenen-Kraut, Magdalenen-Blumen.** In officinis quidem ad flores referuntur, accuratius vero examinatæ, ſunt radices cum foliis, quæ in Alpibus Tyrolenſibus, Styriacis & Liguſticis creſcunt. Eligendæ ſunt odoris aromatici, jucundi, radiculis numeroſis cohærentes, haud fragiles & plenæ. *Alexipharmacæ, uterinæ & diureticæ ſunt. Ad Theriacæ confectionem adhibentur.*

Spicae Indicae, Nardi Indicae, Graminis Cyperoidis aromatici Indici, *Racine de Spica Nard*, **Indianiſche**

nische Spicanard. Radices sunt longæ, fungosæ, digiti crassitie & longitudine, ex nervosis quasi filamentis convolutæ, & congestæ, coloro ex fusco rufescente, saporis amari aromatici. Ex India orientali ad nos advehuntur. Eligendæ recentes, leves, coma longa præditæ Cyperum redolentes. *Usus præcipuus est ad Theriacæ confectionem, ad menses ciendos, vermes necandos; carminativæ, stomachicæ & nephriticæ etiam habentur.*

Rad. Squamariæ, vide Rad. Dentariæ.

Succisæ, vide Rad. Morsus Diaboli.

Taraxaci, Dentis Leonis, *Racine de Pisse en Lit, Pissenlit, ou Dent de Lion,* **Pfaffenröhrlein, Löwenzahn, Löwenkrautwurtz.** Ubique occurrunt. Colligendæ primo vere. *Cum Cichorii radicibus conveniunt, sanguinem purificant, vulnerariæ, aperitivæ & diureticæ sunt.*

Tormentillæ, Heptaphylli, Tormentillæ silvestris, *Racine de Tormentille,* **Tormentill, Rothwurtz, Blut- und Ruhrwurtz.** Proveniunt in arenosis locis. *Adstringunt, vulnerariæ & alexiteriæ sunt. Decoctum, roseum quasi odorem spirat, & ad tonum ventriculi & intestinorum deprædicatur. Quia vero fortius adstringit, non saturatum, sed dilutum exhiberi debet. Etiam in gargarismatibus & collutionibus, ad dolores & dentium vacillationem, usus est.*

Trifolii fibrini, aquatici, antiscorbutici, *Racine de Trefle de Castor,* **Bieberklee, Wasser- und Scharbocks-klee-Wurtzel.** Rarioris sunt usus. In locis paludosis proveniunt. *Easdem vires, quas foliis, adscribunt, efficaciora vero folia habentur. Lapponiæ incolis, exsiccatæ, tam pro pabulo pecorum, quam, urgente annonæ sævitia, cum farina mixtæ, pro panificio inserviunt; panis vero inde paratus, admodum amarus & detestabilis est, monente Linn. Flor. Lappon.*

Turbith, Turpethi, *Racine de Turbit,* **Turbith-wurtzel.** Sunt radices *Convolvuli Indici alati maximi, Ibisci foliis non nihil similibus angulosis.* Advehuntur ex Insula Ceylon & Malabaria, ubi in locis opacis, humidis, ad fossarum margines, aliisque locis silvestribus proveniunt. Eligendæ sunt resinosæ, albicantes, non cariosæ. *Tormina excitare solent, nec temere gravidis exhibendæ sunt, hydropicis optime & mirifice conveniunt. Dosis scrupulus unus, ad duos, vel drachmam unam.*

Tussilaginis, vide Rad. Farfaræ.

Valerianæ palustris, silvestris, Valerianæ pratensis, *Racine de Valeriane,* **kleine Baldrian, Katzenwurtzel, Augenwurtzel.** Indigenæ sunt. Colliguntur verno tempore. *Viribus sunt alexipharmacæ, emmenagogæ, uterinæ, antarthriticæ & diureticæ, ac specifice ad ophthalmiam & epilepsiam commendantur.*

Victorialis longæ, Victorialis maris, Allii Alpini, Allii montani latifolii maculati, *Racine de Victoria-*

lis longue, **lange Siegwurtzel, Allermanns-Harnisch-Wurtzel, Schlangen, Knoblauchwurtzel.** Proveniunt in alpibus Tyrolensibus. *Raro in medicina inserviunt; mulierculæ contra veneficia & magicas incantationes in usum vocare solent.*

Rad. Victorialis rotundæ fœminæ, Gladioli foliis ensiformibus, floribus uno versu dispositis, purpureo-rubentibus C. B. *Racine de Victorialis ronde*, **runde Siegwurtz, Siegwurtzweiblein, Acker-Schwertel.** Apud nos coluntur in hortis; in regionibus calidis sponte inter segetes occurrunt. Utriusque Victorialis radices corticem fibrosum, lamellatum & quasi reticulatum habent, odorem alliaceum & nonnihil quoque saporem. *Rarissimi in medicina sunt usus; externe ad emolliendos tumores adhibentur.*

Vincetoxici, vide Rad. Hirundinariæ.

Ulmariæ, vide Rad. Barbæ caprinæ.

Urticæ, Urticæ majoris urentis, vulgaris, *Racine d'Ortie*, **Nesselwurtz, Brennesselwurtz.** *Vim habent diureticam & sanguinem depurantem; specifice ad mictum cruentum commendantur.*

Zedoariæ, vide Aromata.

Zinziberis, vide Aromata.

CAPUT II.

DE HERBIS ET FOLIIS.

Herba Abrotani maris angustifolii, *Auronne ou Garderobbe le mâle*, **Stabwurtz, Gartheyl.** Colitur in hortis. Colligenda Augusto. *Cum Absinthio Pontico, cujus est succedaneum, convenit, & habetur balsamica, uterina, anticterica, quæ & morsibus animalium venenatorum medetur.*

Absinthii Pontici, Romani, nobilis, tenuifolii, incani, hortensis, *Absinthe Romain, Absince Pontic*, **Welscher, Römischer Wermuth.** Colitur in hortis; sponte provenit in Ponto, mitius est Absinthio vulgari. *Vis stomachica, anticachectica, anthelmintica notoria est, & specifica diuretica ab Hermanno adscribitur.*

Absinthii vulgaris, Artemisia foliis compositis, multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo papposo, Linn. *Absinthe, Absince, Aluyne*, **gemeiner Wermuth.** Colitur in hortis, & nonnunquam sponte provenit. *Viribus cum antecedente convenit; adscribiüur etiam vis anodyna. Externe succus vel decoctum ad ulcera inveterata, putrida & scabiem, suffitus vero auribus exceptus ad otalgiam commendatur.*

Herba

Herba Acetosæ, Oxalidis, Acetosæ pratensis vulgaris, *Ozeille, ou Oseille, Aceteuse,* **Sauerampffer.** *In decoctis & jusculis medicatis adhibetur, bilem temperat & antiscorbutica est.*

Acetosellæ, Allelujæ, Trifolii acetosi, *Oxytriphylli, Oseille sauvage, Alleluja,* **Sauerklee, Buchampfer, Hertzklee.** Provenit in silvis, circa radices fagorum. Colligitur Majo. *Saporem acidum gratum præbet. E succo plantæ paratur Syrupus & Sal essentiale.*

Acmellæ, Attmellæ, Admellæ, Acemellæ, Achmellæ, *Acmelle,* **Indianisch Harnkraut.** Sunt folia *Bidentis, urticæ folio, Ceylanicæ,* vel *Chrysanthemi Zeylanici flore luteo, Lamii folio.* Nascuntur in Ceylon Insula. *Virtus adscribitur huic plantæ lithontriptica, diaphoretica, anodyna & humores viscidos attenuans; specifice etiam ad fluorem album commendatur. Bibitur ceu apozema; datur etiam in substantia. Infusum nunquam absque Liquiritia, syrupo de Althæa, vel simili quopiam, quod acrimoniam foliorum temperat, propinari debet. Pretiosa est medicina, cum unciam unam pro quatuor imperialibus divendant Batavi; propterea commode nostram Bidentem, Lamii vel Urticæ folio, quæ fere easdem vires habet, huic pretiosæ substitui posse, cum clarissimo Nebelio censemus.*

Adianti, Adianti albi, Rutæ murariæ, Paronychiæ, Matth. *Adiante blanche,* **Mauer-Rauten, Stein-Rauten.** E scissuris & juncturis vetustorum murorum, in locis umbrosis provenit. *Vim habet diureticam, ad rachitidem & enterocelas puerorum, specifice commendatur.*

Adianti aurei, Polytrichi aurei, Musci capillacei majoris, Tournefort. *Perce mousse,* **Golden Wiederthon.** In silvis provenit, & ad muscos pertinet. *Raro in medicina in usum vocatur. Refertur inter antimagicas herbas.*

Adianti nigri, foliis Coriandri, Capilli Veneris, *Capillaire, Cheveux de Venus,* **Frauen-Haar, Venus-Haar.** In Languedocia, circa montem Pessulanum, multus ejus est proventus. *Incidit & attenuat, pulmonica & diuretica est. Paratur ex hac plantula syrupus ille celebris, Syrop capillaire.*

Agrimoniæ, Lappulæ hepaticæ, Eupatorii veterum, Hepatorii, *Aigremoine,* **Odermenig, Leberkletten, Steinwurtz.** Circa agrorum & viarum margines provenit. Majo & Junio colligenda. *Vulneraria est, atque hepaticis & lienosis dicata, ad urinæ incontinentiam & renum ulcera commendatur.*

Alceæ, *Alcée, ou Mauve sauvage,* **Sigmars-Simeons-Kraut.** Differt a Malva foliis divisis & profundius incisis; provenit in incultis. *Viribus cum Malva convenit; laudatur inprimis ad nodos & tumores scirrhosos mammarum, de cancro ipso suspectos, in cataplasmate.*

Herba Alchimillæ majoris, Pedis Leonis, Leontopodii, *Pied de Lion*, **Sinnau, Löwenfuß, Frauenmantel, grosser Sanicul.** Crescit in pascuis & pratis humidis. *Vulneraria est & adstringit.*

Alliariæ, Alliastri, *Alliaire, Herbe des Aux*, **Knoblauchkraut, Läuchelkraut.** In dumetis & juxta sepes provenit. Mense Majo colligenda. *Folia recentia contrita Allium redolent & viribus cum Scordio conveniunt. Ad gangrænam, & ulcera cancrosa, a Bœrhavio commendatur.*

Alsines mediæ, Morsus gallinæ, Alsines foliis Trissaginis, *Morgeline*, **Hünerscherben, Vogelkraut.** Ubique provenit, & etiam hyeme viret. *Externe ad ulcera & scabiem adhibetur; interne sumta refrigerat & atrophia laborantibus commendatur.*

Althææ, Bismalvæ, Ibisci, *Guimauve*, **Eybischkraut, Heylkraut,** Colitur in hortis. *Adnumeratur herbis quinque emollientibus.*

Anagallidis maris, flore phœniceo, *Morgeline, Mourron, Anagallis le mâle*, **Gauchheil, Collmarkraut, Vogelkraut, Hünerdarm.** Crescit in vinetis & hortis. *Adscribitur vis singularis antimelancholica, antepileptica, & antimaniaca.*

Anethi hortensis, *Anet*, **Dillkraut, Dill, Garten-Dill.** Seritur in hortis. *Raro herba sicca, nisi forsan in clysteribus & pediluviis, in usum vocatur.*

Anserinæ, Argentinæ, Argentariæ, Potentillæ, *Argentine*, **Genserich, Gänßkraut, Silberkraut.** Juxta sepes & vias occurrit. Colligitur mense Junio. *Refrigerat, adstringit & vulneraria est.*

Antirrhini, majoris folio longiori, C. B. *Muffle de Veau*, **Löwenmaul, Sterckkraut, Dorant.** Colitur in hortis. *Virtute gaudet diuretica, & herbis antimagicis adnumeratur.*

Arnicæ, Ptarmicæ montanæ, Doronici, Plantaginis folio, *Plantain des Montagnes*, **Fallkraut, Lucianskraut.** Vide *Radices* Arnicæ.

Aristolochiæ, Pistolochiæ dictæ C.B. Aristolochiæ polyrhizos J. B. *Aristoloche menue, Sarrasine, Ratelou*, **Oster-Luceykraut.** Nonnunquam in vinetis occurrit, colitur etiam in hortis. *Vulneraria habetur, & plerumque a veterinariis, præsertim ad equorum ulcera, adhibetur.*

Artemisiæ vulgaris, caule & flore purpurascentibus, Artemisia rubra, *Armoise ou Arsemise rouge*, **rother Beyfuß, rother Buck.**

Herba

Herba Artemiſiae albae vulgaris, caule ex viridi albicante, *Armoiſe blanche*, **weiſſer Beyfuß**, **weiſſer Buck.** Sponte proveniunt. *Alba & rubra virtutibus conveniunt, & inter plantas ſeu herbas vulnerarias & uterinas numerantur. Ex Artemiſia Chinenſi paratur illa lanugo, quæ* Moxa *dicitur, & in curatione podagræ per uſtionem, apud orientales gentes, celebre eſt remedium.*

Aſari, Nardi ſilveſtris, ruſticae, *Cabaret, Oreille d'homme*, **Haſelwurtzkraut.** Naſcitur in dumetis & circa caudices Corylorum, perpetuo viret. Colligenda Majo & Junio. *Vim habent folia radicis, mitiora tamen ſunt, & in parva doſi diureticum & emmenagogum præbent inſigne, raro tamen, ob nauſeam & vomitus, quos excitare ſolent, in uſum vocantur, niſi in pulveribus errhinis & pediluviis.*

Aſplenii, vide Herba Ceterach.

Auriculae muris, vide Herba Piloſellae.

Baſilici, Ocymi vulgatioris, medii, magni, *Baſilic*, **Baſilgen**, **Baſilienkraut.** Colitur in hortis. *Cephalica & uterina eſt.*

Beccabungae, Anagallidis aquaticae, folio ſubrotundo C. B. Veronicae aquaticae, *Becabunge*, **Bachbungen**, **Waſſerbungen.** In foſſis, paluſtribus & rivulis provenit. Colligenda primo vere. *Siccata raro in uſum venit, recens antiſcorbuticis adnumeranda eſt. Scirrhis viſcerum reſolvendis, ipſisque podagræ, longum hujus plantæ uſum, oppoſuit Boerhavius. Succus ad integros ſcyphos, vel ſolus, vel cum ſero lactis mixtus, exhiberi poteſt.*

Bellidis minoris, pratenſis, *Pâquerette*, **Maßliebenkraut**, **Margarethenkraut**, **Gänsblumenkraut.** Ubique luxuriat. *Vulneraria & pectoralis eſt, refrigerat, abſtergit & roborat.*

Betae albae, Betae communis viridis, *Poirée blanche*, **Mangold.** Colitur in hortis. *Uſus maxime eſt culinaris; in officinis a nonnullis adſcribitur herbis quinque emollientibus.*

Betonicae, Veronicae vulgaris purpureae, *Betoine*, **Betonien**, **braune Betonien**, **Zehr-Kraut.** Creſcit in pratis & montibus herbidis. Colligenda menſe Junio. *Polychreſta eſt herba, atque ad multos morbos commendabilis. Folia integra, naribus intruſa, & per aliquot horæ quadrantes detenta, ſingulare quidpiam præſtare in Epiphora, ſeu Ophthalmia ſeroſa. Act. Phyſ. Med. Vol. IV. teſtantur.*

Boni Henrici, Lapathi unctuoſi, Tota-bonae, Chenopodii folio triangulari, Tournefort, *Toute bonne, Bon Henri*, **guter Heinrich**, **ſtolzer Heinrich**, **Smerbel.** Ubique in locis incultis, ad ſepes & parietes hortorum reperitur. *Pollet inſigni virtute in vulneribus recentibus ſanandis, & ulceribus antiquis expurgandis, ad hæmorrhoidum dolores, cum butyro frixa, ſpecificum habetur.*

Herba Borraginis, *Borrage, Bourrache*, **Borragenkraut, Borretsch.** Colitur in hortis. *Antimelancholica, cordialis & alexipharmaca habetur; herba ſicca vero raro in uſum venit.*

Botryos, Botryos Mexicanae, Ambroſioidis, Chenopodii, Atriplicis odoratae Americanae, Ambroſioidis Mexicanae, Tournefort. *Piment, Patte d'oye*, **Traubenkraut, Mottenkraut, Lungenkraut.** Colitur hæc planta in hortis; & ante paucos annos, ſub titulo *Theæ Romanæ* ſive *Sileſiacæ*, celebris fuit. *Ad pectoris affectus, præſertim ad tuſſim ferinam, ad menſes ciendos, & fœtum mortuum ejiciendum commendatur; uſus eſt in infuſis & decoctis. Recens ſiccata & in uſum vocata vim habet inebriantem. Intra veſtes repoſita ad tineas abigendas laudat Rajus.*

Brancae urſinae, Acanthi mollis, Spondylii, *Acanthe, Branque urſine*, **Bärenklauen, Bärentatzen.** Provenit in pratis humidioribus. *Spiritum vini colore eleganti viridi inficit, qui color durabilior eſt, quam ullius herbæ. A quibusdam, loco Betæ, herbis quinque emollientibus adſcribitur.*

Bugloſſae, Bugloſſi anguſtifolii, Linguae bovis, *Bugloſſe*, **Ochſenzungen.** Colitur in hortis, etiam paſſim ſponte provenit. *Cordialis & antimelancholica celebratur; ſicca tamen raro in uſum vocatur.*

Burſae paſtoris, Herba cancri, Sanguinaria, Burſae paſtoris majoris, folio ſinuato, *Tabouret, Bourſe à Berger*, **Täſchelkraut, Hirtentäſchlein, Seckelkraut.** Occurrit in locis incultis. *Refrigerat, adſtringit & in fluxionibus ſanguinis pro ſpecifico habetur, tam interne, quam externe adhibita.*

Calaminthae montanae, flore magno, C.B. *Calamente*, **wohlriechende Bergmüntz.** Ex regionibus calidioribus advehitur, colitur etiam in hortis. *Alexiteria, nervina, uterina & diuretica habetur, & ad Theriacam requiritur.*

Calaminthae vulgaris, Calaminthae agreſtis, Calaminthae Pulegii odore, ſeu Nepetae, *Herbe aux Chats*, **Kornmüntz, Feldmüntz, wilder Poley.** In arenoſis & locis apricis provenit. Colligitur Auguſto menſe. *Diuretica & uterina eſt.*

Capilli Veneris, vide Herba Adianti nigri.

Cardiacae, Marrubii Cardiaca dicti, Brancae ſeu Patae lupinae, Lycopis, *Agripaume*, **wild Mutterkraut, Hertzgeſpankraut, Hertzgeſperrkraut.** Provenit in locis aſperis & incultis, juxta ſepes & vinetorum muros. Colligenda menſe Junio. *Urinam & menſtrua movet, vermes enecat, in pectoris pituitoſis morbis convenit, atque ad infarctum & inflationem hypochondriorum infantibus commendatur.*

Cardui benedicti, Cardui ſancti, Cnici ſylveſtris, *Chardon benit*, **Cardobenedictenkraut, geſegneter**

ter Distel, Spinnen-Distel. Colitur in hortis. *Polychresta est & vere benedicta, atque præsertim morbis ex ventriculo oriundis medetur. Succus ad ulcera cancrosa, putrida, imo gallica, commendatur.*

Herba Cardui Mariae, Lactei, Spinae albae, *Chardon de nôtre Dame*, Vehedistel, Mariendistel. Colitur in hortis. *Pleuritidi & Hepatis morbis opponi solet.*

Centaurii minoris, Febrifugae, Fellis terrae, *Petit Centaurée*, klein Tausendguldenkraut, Fieberkraut, Erdgallen. In silvis & pascuis nascitur. Ab Illustr. Hallero, ad Gentianas refertur, & Gentianæ quadrifoliis trinerviis, ovatis, floribus umbellatis, tubo strictissimo vocatur. *Omnibus morbis a bile ortis dicata est, ut vix præscribatur vinum medicatum, cui non addatur Centaurium. Contra furfures & crustosam capitis scabiem, vix præstantius ullum decoctum reperiri, quam Centaurii ex pisorum brodio*, Rajus *perhibet. Illo enim decocto, caput si lavetur, non solum insigniter furfures & scabies detergitur, sed & simul myriades pediculorum enecantur.* Rajus. *Etiam ad reliquas cutis affectiones varos, alphos &c. conducit secundum* Matthiolum. *Decoctum per clysterem infusum, mirificum auxilium ad ischiaticum malum esse, humores educere, & dolores sedare*, Fernelius *auctor est.*

Centumnodiae, Centinodii minoris, Polygoni, Sanguinariae, *Renouée*, *Centinode*, Wegtritt, Weggraß, Tausendknoten, Blutkraut. Ubique ad vias occurrit. *Refrigerat & adstringit; hinc in sanguinis & alvi fluxionibus commendatur.*

Cerefolii, Chaerefolii, Chaerophylli sativi, *Cerfeuil*, Körffelkraut. Colitur in hortis. Colligenda vere. *Diuretica, pectoralis, emmenagoga & lithontriptica censetur.*

Ceterach, Scolopendrii veri, Asplenii, *Ceterac*, Miltzkraut, Miltzfarn. Exotica est planta, & ex Helvetia, ubi in montibus asperrimis atque rupibus ad umbram sitis provenit, adfertur. *Spleneticis, calculosis & ictericis commendatur, atque herbis quinque capillaribus adnumeratur.*

Chamaedryos, Chamaedryos repentis minoris, Quaerculae minoris, *Germandrée*, *petit Chene*, Gamanderlen, klein Bathengel, edel Gamanderlein. Provenit in montosis, & colligitur per æstatem. *Arthriticis, hydropicis & scorbuticis præprimis commendatur. Bibitur infusum ejus loco Theæ.*

Chamaepytyos, luteae vulgaris, folio trifido, Ivae artheticae, Ajugae, *Ivette*, Erdkieffer, Feld-Cypreß, Schlagkräutlein, je länger je lieber. Odorem spirat terebinthinaceum, *balsamica est planta, nervina & anodyna; Apoplecticis & epilepticis, vertiginosis atque pareticis commendabilis.*

Chelidonii majoris, Chelidonii vulgaris, *Chelidoine grande eclairé*, groß Schöllkraut, Schwalbenkraut. Provenit in locis incultis circa sepes & muros.

Succum in ſe habet acrem crocei coloris. *Ictericis commendatur, & in obſtructionibus hepatis laudatur; externe egregium eſt vulnerarium, detergit & mundificat ulcera. Tota planta hydropicorum plantis pedum ſubditur.*

Herba Cichorii hortenſis, *Chicorée*, **Wegwartenkraut, Sonnenwendkraut.** Colitur in hortis. *Vires ſunt eædem ac radicum; rari tamen uſus.*

Cicutae majoris, *Ciguë*, **Schierling, Wüterich.** Circa ſepes & in dumetis occurrit. *Planta, hominibus & nonnullis brutis, venenoſa, nunquam, niſi ad emplaſtra, alioque uſu externo, reſolvendi ſcopo, adhibetur.*

Cochleariae folio ſubrotundo, *Herbe aux Cuillers*, **Löffelkraut.** Colitur in hortis, & colligitur verno tempore. A forma foliorum nomen accepit. *Aperitiva, diuretica & antiſcorbutica eſt. Præfertur recens ſiccæ.*

Conſolidae majoris, Symphyti majoris, *Grande Conſoude*, **Wallwurzkraut.** Sponte provenit in locis humidis & circa foſſas pratorum. *Decoctis additur vulnerariis.*

Conſolidae mediae, Bugulae, *Bugle, Conſoude moyenne*, **gulden Günſel, gulden Wundkraut.** Naſcitur in pratis & paſcuis humidis. *Vulneraria cenſetur, ſubadſtringit & refrigerat.*

Conſolidae Saracenicae, Solidaginis, Virgae aureae anguſtifoliae minus ſerratae, *Verge d'or*, **heydniſch Wundkraut.** Sponte provenit in ſilvis. *Vulneraria eſt celeberrima & lithontriptica. Gargariſma ex decocto, faucium & columellæ morbis medetur, putredinem gingivarum, & vacillationem dentium curat.*

Conyzae cœruleae, Aſteris conyzoidis, Senecionis cœrulei, Erigeri vulgaris, *Coniſe*, **blau Dürrwurz, Beruff- oder Beſchreykraut.** Provenit in locis ſiccis apricis. *Siccat, digerit, diſcutit, & antimagica habetur.*

Conyzae pulicariae, mediae, Aſteris conyzoidis luteo flore, antidyſentericae Hoffmanni, *Coniſe jaune*, **gelbe Münze, Ruhrkraut.** In humidis locis naſcitur. *Ad dyſenteriam & icterum commendari ſolet. Suffitu venenatas beſtias fugare, & culices abigere, atque pulices necare, Dioſcorides auctor eſt.*

Craſſulae, Craſſulae majoris, Fabariae, Telephii vulgaris, Illecebrae majoris, *Orpin*, **fette Henne, Knabenkraut, Bruchkraut, Wundkraut.** Provenit in arenoſis. *Refrigerat, adſtringit & vulneraria creditur.*

Cupreſſi, Chamaecypariſſi, Santolinae, Abrotani fœminae, *Garderobbe*, **Garten-Cypreſſen, Stabwurz-Weiblein.** Colitur in hortis. *Anthelmintica & diuretica eſt, atque cum Abſinthio pontico convenit. Garderobbe a Gallis vocatur, quia veſtes contra tineas defendit.*

Herba

Herba Cuſcutae majoris, Caſſuthae, *Cuſcute, Goutte de Lin*, Flachsſeyden, Filtzkraut, Flachsdotter. Inter linum & urticas naſcitur. *Splenetica & hepatica eſt, aperit & abſtergit.*

Dictamni Cretici veri, Origanum foliis tomentoſis, ſpicis nutantibus, Linn. *Dictam, Dictame ou Dictamne de Crete*, Cretiſcher Diptam. Ex Creta advehitur. Folia ſunt eligenda tomentoſa, recentia, odorata. *Alexipharmaca & uterina eſt; Theriacam & Diaſcordium ingreditur. Vulnerarium etiam celebratur, & ad partum difficilem, fœtum mortuum & ſecundinas expellendas, ad grana decem, in forma pulveris exhibitus, multum laudatur. Etiam in infuſo, Theæ inſtar, apud incolas Candiæ, ad febres tertianas, cachexiam, & ſudorem proliciendum, celebris eſt.*

Digitalis purpureae, folio aſpero C. B. *Digitale*, Fingerhut. Raro quidem in officinis reperitur, commendatur vero a *Parkinſonio*, in decocto cum radicibus *Polypodii*, tanquam *remedium ad epilepſiam ſive morbum caducum, efficax. Vomitus excitat, & alvum purgat magna cum vehementia.*

Ebuli, Sambuci humilis, arvenſis, *Yeble, ou Hieble*, Attichkraut. Provenit in agris & campis. *Serum educit, & eo fine hydropicis confert.*

Endiviae majoris, latifoliae, Intybi hortenſis, *Endive*, Andivien, Endivien. Colitur in hortis. *Refrigerat & hepati dicata eſt.*

Epaticae, vide Herba Hepaticae.

Epithymi, Epithymi Cretici, Caſſuthae minoris, Cuſcutae Thymi, *Epithyme*, Cretiſche Thym-Seydt. Ex Creta inſula advehitur, naſcitur etiam in Italia. Epithymum, ſpecies eſt *Cuſcutæ*, & planta paraſitica. Epithymum vocatur, quia *Thymo*, ſicut Cuſcuta, urticis & lino, adhæret. *Purgat melancholicos ſic dictos humores, urinam & menſes ciet.*

Equiſeti, arvenſis longioribus ſetis, *Prêle, Queue de Cheval*, Katzenwedel, Schafftheu. *Laudatur decoctum, vel infuſum ejus in exulceratione renum & veſicæ, atque hæmorrhagiis ſiſtendis.*

Ericae, Ericae vulgaris humilis J. B. *Bruyere*, Heyde, Heydekraut. Planta omnibus notiſſima, copioſe circa martiam ſilvam occurrens. Colligitur planta floreſcens. *Specifice ad nephritidem & calculum veſicæ, infuſum vel decoctum a Matthiolo laudatur: aqua deſtillata ad Ophthalmiam, inſeſſus & balnea ex decocto arthriticis & paralyticis commendantur.*

Eryſimi, Verbenae fœminae, Irionis, *Velar*, wilder Weg-Senff. Juxta vias occurrit. *Attenuat & reſolvit, atque in morbis a viſciditate humorum ortis convenit, & ad Syrupum de Eryſimo Lobelii requiritur.*

Herba Eupatorii cannabini, Avicennae, Trifolii cervini, Origani aquatici, *Eupatoire bastard*, **Waſſerdoſten, Kunigunden-Kraut, Hirſch-Klee.** Provenit circa rivulos & fluviorum ripas. *Vulneraria & antiſcorbutica habetur, & præſertim externus ejus uſus eſt. Turfi foſſores ſibi mederi, putrida ulcera pedesque tumentes, hoc & nullo alio remedio ſanare, Beat.* Bœrhavius *auctor eſt. Radices hydropicis & ictericis, in infuſo commendantur, vehementer purgant, & ſerum educunt.*

Euphraſiae flore albo, Euphragiae, Herba ophthalmica, *Eufraiſe, Euphraiſe*, **Augentroſt.** Provenit in pratis, & ſub initium auctumni colligenda eſt. *Ictericis commendatur, & ad memoriam confortandam, nec non Ophthalmiam laudatur.*

Farfarae, Tuſſilaginis, Ungulae caballinae, *Pas d'Ane*, **Hufflattich, Roßhub, Brandlattich.** Provenit in locis humidis. *Tota planta pectus juvare fertur; folia etiam externe ulceribus imponuntur.*

Fœniculi, Marathri, *Herbe de Fenouil*, **Fenchel-Kraut.** Colitur in hortis. *Herba vires habet ſemine debiliores, atque raro, frequentius radix & ſemen in uſum vocantur.*

Folia Indi Malabathri, Tamalapatri, Canellae ſilveſtris Malabaricae, *Feuille Indienne*, **Indianiſch Blatt.** Folia ſunt oblonga, acuminata, denſa & glabra, a pediculo ad apicem tribus nervis excurrentibus, odore grato, ſapore aromatico. Veterum Malabathrum plane incognitum eſt; noſtrum folia ſunt arboris Canellæ Malabaricæ in H. M. *Katou-Karva* nominatæ. Eligenda ſunt recentia, viridiuſcula, odorata. *Ad Mithridatii & Theriacæ confectionem requiruntur; alexitericæ, balſamicæ & uterinæ ſunt virtutis, & urinam potenter movent.*

Fragariae, Trifolii fragiferi, *Herbe de fraiſier*, **Erdbeer-Kraut.** In ſilvis largus ejus eſt proventus. *Vulneraria eſt, leniter adſtringit, & hepar imprimis juvare fertur.*

Fumariae, Fumi terrae, *Fumeterre*, **Tauben-kropf, Erdrauch, Krätzheyl.** Sponte provenit inter olera & in vinetis. Colligenda planta floreſcens, menſe Junio & Julio. Multum ſalis habet eſſentialis, & B. *Bœrhave*, cryſtallos, nitri ſimiles, in ſucco inſpiſſato obſervavit. *Inſigniter amara, ſplenetica & hepatica eſt, ſerum purificat. In morbis chronicis atque cutaneis commendatur.*

Galegae, Rutae caprariae, *Galega*, **Geißrauten.** Colitur in hortis. *Alexipharmaca & ſudorifera eſt.*

Gallii, Gallii lutei, *Caillelait*, **Megerkraut, Waldſtroh, Bettſtroh.** Provenit copioſe circa vias, margines agrorum, & in collibus apricis. *Acidum in ſe continet, unde lac coagulat; ceterum vulneraria & detergens eſt.*

Gallitrichi, Hormini Sclarea dicti, ſativi ſive hortenſis, *Ormin*, **Scharlachkraut.** Colitur in hortis. *Raro in uſum venit. Siccat & abſtergit, atque vulnerariis adſcribitur.*

Sunt,

Sunt, qui vina hormino & floribus sambuci mangonizant, ut illis saporem & odorem moschatellinum concilient, quæ vero vina citius inebriant, atque enormes capitis dolores excitare solent.

Herba Geranii Robertiani, Gratiae Dei, Herba Ruperti, *Bec de Grue, Herbe Robert*, **Storchenschnabel, Ruprechtskraut, Gottesgnad, Rothlauffenkraut.** Obvia est Geranii hæc species in ruderibus & muris vinetorum. Colligenda mense Majo. *Vulnerarium præstantissimum est; externe applicatum lac in mammis discutit, & inflammationi medetur.*

Gnaphalii montani, Elichrysi montani, flore rotundiore, Tournef. Hispidulae, Rivini, *Pied de chat*, **Feldkatzen, Kuhrkraut, Haasenpfötlein.** Nascitur in montosis apricis locis. *Usus est in decoctis & gargarismis; vulneraria est & subadstringit. Commendatur ad tussim ferinam puerorum.*

Gratiolae Limnesii, Digitalis minimae, Centauroidis C. B. *Gratiole, Herbe à pauvre homme*, **Gottesgnadenkraut, Wild-Aurin.** Provenit in locis uliginosis & pratis humidis. *Commendari solet hydropicis & cachecticis, febre quartana, & mensium obstructione laborantibus. Potenter per superiora pariter atque inferiora purgat, emmenagoga & anthelmintica est. Datur in substantia scrupulus unus ad tres, in infuso aut decocto a drachma una ad duas exhibere licet: sed cum grano salis propinanda, quia facile hypercatharsin excitat. Præstat infusum, lacte vel sero ejus dulci, quam vino paratum.* A Tournefortio *Speciebus pro clysteribus emollientibus additur.*

Hederae arboreae, Hederae communis majoris, *Lierre*, **Epheu, Baumwinde, Mauer-Epheu-Blätter.** In silvis reperitur, & passim muros antiquos scandens occurrit. *Sunt, qui internum usum foliorum hederæ arboreæ dissuadent, & mentis turbationem inde secutam observatum esse tradunt;* in Act. Physic. Medic. Vol. V. *vero pro specifico ad Atrophiam infantum laudantur. Externe decoctum præbet mundificans, vulnerarium, & folia fonticulis superimposita affluxum concitant majorem.*

Hederae terrestris, Chamaeclema, Bœrhav. Glechoma, Linnaei. Calaminthae humilioris, rotundiori folio, Tournef. *Lierre terrestre, Terrette*, **Gundelreben, Gundermann.** Ubique circa sepes & parietes hortorum occurrit. Colligenda Majo & Junio. *Pectori dicata est, & quasi polychrestum & balsamicum est remedium, in sputo & mictu cruento. Succus naribus attractus, cephalalgiam etiam vehementissimam & inveteratam, non lenire tantum, sed penitus auferre*, Rajus *refert.*

Hepaticae fontanae, Lichenis petræi latifolii, *Hepatique d'eau*, **Stein-Leberkraut, Brunnen-Leberkraut.** In puteis & circa fontes, ubi radii solares raro vel nunquam perveniunt, crescit. *Siccat, adstringit & abstergit.*

Hepaticae nobilis, Epaticae, Trifolii aurei, Trifolii hepatici C. B. *Hepatique noble*, **Leberkraut, Gulden-**

Guldenklee. In silvis & dumetis occurrit. *Vulneraria est & subadstringit. Laudatur ad Gonorrhœam inveteratam, mictum & sputum cruentum.*

Herba Hepaticae stellatae. Vide Herba Matrisylvae.

Herniariae, Millegranae, Empetri, *Turquette, Herniale,* Harnkraut, Bruchkraut. Crescit in locis aridis arenosis. Subsalsa acris & styptica est. *Commendatur in renum & vesicæ affectibus, ad urinam ciendam; prodest herniosis in pulvere exhibita, & quia ab* Hollerio *ad hunc morbum experta, laudatur, etiam* Holleriana *dicitur, tradente Illustri* Hallero.

Hispidulae. Vide Herba Gnaphalii montani.

Hormini. Vide Herba Gallitrichi.

Hyoscyami, Jusquiami, Fabae suillae, *Jusquiame, Hanebane,* Bilsenkraut, Schlafkraut. Circa sepes & muros hortorum occurrit. *Raro in usum vocatur. Vires sunt anodynæ & emollientes. Cataplasma cum lacte & croco, ad urinæ suppressionem, lac abigendum, & perniones laudant. Internus usus merito suspectus.*

Hyperici, Perforatae caule rotundo, *Mille pertuis,* St. Johanneskraut. Provenit circa vias, in dumetis. Colligenda cum floribus mense Junio. *Vulnerarium, diureticum & anthelminticum est egregium; adnumeratur antimagicis.*

Hyssopi, Hysopi officinarum, spicatae flore cœruleo, *Hisope,* Isop, Ispen, Hyssop. Colitur in hortis. *Est balsamica, incisiva, & multis morbis medetur. In specie ictericis, hydropicis & calculosis prodest; externe ad oculorum sugillationes commendatur.*

Jaceae tricoloris, Trinitatis, Violae tricoloris hortensis, *Pensée,* Dreyfaltigkeitkraut, Freysamkraut. Nonnunquam sponte occurrit, nascitur etiam in hortis. *Demulcet & refrigerat, inflammationibus internis opem fert; epilepticis, infantibus præcipue, succus vel syrupus inde paratus conferre creditur.*

Ivae Artheticae vide Herba Chamaepytis.

Junci odorati vide Herba Schœnanthi.

Juniperi, Summitates Juniperi, *Sommitées de Genevrier,* Wachholder Lympff, Wachholdersprossen. *Juniperus tota est balsamica, antiscorbutica, alexipharmaca & diuretica.*

Lamii, alba linea notati, Lamii C. B. Lamii Plinii, mortui Columnae, Galeopsidis maculatae J. B. Milzadellae vulgo. Etiam apud nos provenit, præprimis circa Uracum. *Prædicatur a* C. Hoffmanno *ad scirrhum lienis.*

Lappae majoris, Bardanae, Personatae, *Bardane grande,* grosse Klettenblätter. *Raro in usum veniunt, & externe ad cutis vitia in decoctis adhibentur.*

Lavendulae angustifoliae, fœminae, *Lavande,* Lavendel.

Herba

Herba Lavendulae latifoliae, maris vulgaris, Pſeudonardi, quae vulgo Spica, *Aſpic*, **Spick**. Coluntur in hortis. *Viribus conveniunt, raro herbæ, frequentius flores in uſum vocantur. Nervinæ & uterinæ ſunt.*

Lauri, ſive folia Lauri, *Feuilles de Laurier*, **Lorbeerblätter**. *Magis in uſum vocantur culinarium, quam pharmaceuticum. Poſſunt in infuſis ſcopo diuretico & carminativo dari.*

Lauro-ceraſi ſive folia Lauro-Ceraſi J. B. Ceraſi folio laurino, *Feuilles de Laurier Ceriſier*, **Kirſch-Loorbeerblätter**, vulgo **Mandelblätter**. Arbor colitur in hortis. *Folia, in lacte cocta, ſaporem ei conciliant Amygdalarum, & ſpiritum vini ſuper illis abſtractum, ſuavi ſapore, Perſicorum nucleorum inſtar, impraegnant; quia vero exempla, ubi funeſta ſymptomata, imo mors repentina, eorum abuſum inſecuta ſunt, proſtant, illorum hoc loco mentionem facere, & ab eorum uſu dehortari omnes voluimus.* Conf. Selecta Phys. Oecon. Ps. IV. pag. 349.

Lichenis arborei videatur Herb. Pulmonaria arborea.

Lichenis terreſtris cinerei, Raj. Muſco-fungus terreſtris, latifolius cinereus hepaticae facie. Oxon. Lichen foliis planis, ſubrotundis, lobatis, obtuſis, calice plano ovali, lacinula propria adnato. Niveus. Linnaei Fl. Lapp. Celeberrimus *Hallerus* in opere ſplendidiſs. *Enum. Plant. Helvet.* in agris & paſcuis macilentis provenire, terræque valide adhærere, ſcribit. *Pulvis cum pipere mixtus, ad morſus canis rabioſi laudatur, vid. Pulv. Antilyſſus.*

Linariae vulgaris flore luteo, Oſyridis, *Linaire*, **Leinkraut, Harnkraut, Stallkraut.** *Diuretica eſt, & unguentum ex illa paratum hæmorrhoidum dolores ſedat.*

Lini catharctici, Lini caule dichotomo, foliis ovatis lanceolatis, Lini pratenſis foliis exiguis C. B. *Lin cathartique*, **Purgier-Flachs, klein Leinkraut.** Floret in paſcuis montoſis menſe Julio & Auguſto. *Ob vim, quam habet catharcticam, ita vocatur; humores ſeroſos ſatis valide, absque moleſtia, educit. Sumuntur caulis, folia & capitula exſiccata, atque in pulverem redacta, cum cremore Tartari, vel in vino infuſa. Doſis in ſubſtantia drachma dimidia, ad ſcrupulos duos, in infuſo uncia dimidia ſiccæ plantæ.*

Lunariae racemoſae minoris, Rutae lunariae, *Lunaire*, **Mondrauten, Mondskraut.** Eſt *Oſmundæ* ſpecies & *Oſmunda foliis lunatis a Tournefortio vocatur.* In montibus ac collibus herbidis, circa ſilviam martiam, provenit. *Adſtringentis ſaporis eſt, refrigerat & ſiccat, atque inter vulnerarias plantas, & quæ ad ſuperſtitionem adhibentur, locum habet.*

Lupuli ſalictarii. Vide Flores Lupuli.

Lyſimachiae luteae, Lyſimachiae luteae majoris vulgaris, *Lyſimachie ou Corneille*, **Weiderich,**

gelber Weiderich. In silvis, locis humidis, & ad rivos occurrit. *Vulneraria est, raro autem in usum venit medicum.*

Herba Majoranae, Majoranae aestivae, Amaraci, Sampsuchi, *Marjolaine*, Majoran, Maseran. Colitur in hortis. *Balsamica, cephalica, uterina & errhina est planta, nec non aromatica, & in usum venit culinarium.*

Malvae vulgaris, pumilae, silvestris folio rotundo, flore minori, *Mauve*, Pappeln, Käßpappeln, Hasenpappeln. Crescit circa sepes & inculta. *Adscribitur herbis emollientibus. Veteres illam in usum culinarium vocabant.*

Marrubii albi, Prassii, *Marrube blanc*, weisser Andorn. Colitur in hortis, nonnunquam etiam circa rudera sponte nascitur. Colligenda mense Junio. *Calefacit & siccat, uteri & pectori affectibus dicata est, atque nephriticis & hydropicis commendatur.*

Marrubii nigri, Ballotte dicti, nigri fœtidi, *Marrube noir*, schwartzer Andorn. Sponte circa sepes hortorum nascitur. *Commendatur ad hypochondriacos & hystoricos affectus.*

Mari veri Syriaci, Masticinae, *Marum*, Amberkraut, Mastichkraut. *Thymbræ* est species, & a *Tournefort. Thymbra Hispanica, Majoranæ folio*, vocatur. Colitur in hortis. *Balsamica est, & inter medicamenta cephalica, ptarmica, diuretica & carminativa excellit. In vitris probe obturatis servari debet.*

Matricariae, Artemisiae tenuifoliae, Parthenii minoris, *Matricaire, Espargoutte*, Mutterkraut, Mettrich. Colitur in hortis. Folia & flores simul colliguntur. *Ad uteri morbos frigidos, flatulentiam & renum calculum commendatur: tam interne, scilicet in infusis, quam clysteribus adhibetur. Imponitur mammis ad lac discutiendum.*

Matrisilvae, Hepaticae stellatae, Aparine latifolia humilior montana Raj. *Mouget de bois*, Waldmeister, Sternleberkraut, Hertzfreud. Est *Aparine latifolia humilior montana Tournefort.* Nascitur in silvis. Colligenda mense Majo. *Vulneraria est & hepati dicata.*

Meliloti, Meliloti vulgaris, Trifolii odorati, *Melilot*, Steinklee, Honigklee. Ad agrorum margines & inter segetes crescit. Colligenda cum floribus, qui vel albi vel lutei. *Emollit & dolores mitigat. Ad emplastrum ejus nominis requiritur.*

Meliloti cœruleae, odoratae, Loti hortensis odorae, *Melilot bleu*, Siebengezeit, zahmer blauer Steinklee. Colitur in hortis. *Alexipharmaca, anodyna, diuretica & vulneraria est. Ab Helvetis caseis viridibus, quos* Schaabzieger *vocant, admiscetur. Flores cœrulei cum herba Rutæ hortensis in butyro cocti, unguentum exhibent ophthalmicum laude dignum.*

Herba

Herba Melissae hortensis, Citratae, Citronellae, *Melisse*, **Melissen, Mutterkraut, Citronen-Melissen, Bienenkraut.** Colitur in hortis. *Vires habet stomachicas, carminativas, nervinas atque uterinas.*

Melissae Turcicae, Peregrinae folio oblongo, Citraginis Turcicae, *Melisse Turque*, **Türckische fremde Melissen.** Colitur in hortis. *Viribus cum antecedente convenit.*

Melissophylli Fuchsii, Lamii montani Melissae folio, Melissae humilis latifoliae, maximo flore, Tournefort. *Melisse sauvage*, **Wald-Melissen.** Provenit in silvis montosis. Colligenda mense Junio & Julio. *Laudatur tanquam incomparabile remedium ad renum & vesicæ affectus. & in retentione urinæ, quæ non a calculo oritur, feliciter adhibetur.*

Menthae crispae, sativae, rotundifoliae crispae, spicatae, cruciatae, *Menthe crêpue, Beaume*, **Krause-Müntz, Kreutz-Müntz.** Colitur in hortis. Colligenda mense Junio & Julio. *Balsamica, stomachica, uterina & carminativa est. Lac in mammis coagulatum superimpositam resolvere perhibent.*

Mercurialis, annuae, glabrae, vulgaris, *Mercuriale*, **Bengelkraut, Hundskohl.** Provenit coliturque in hortis & vineis. *Emollit, alvum movet, & herbis quinque emollientibus adscribitur.*

Millefolii, Achilleae vulgaris, albi, *Millefeuille*, **Garbenkraut, Schafgarben, Tausendblatt.** Ad viarum & agrorum margines occurrit, floret per æstatem, & colligenda est florescens. *In fluxibus sanguinis compescendis, præcipue affectibus hæmorrhoidalibus convenit, & summo jure ad tonica referri potest. Adscribitur etiam vis alexipharmaca, vulneraria & lithontriptica. Infusum theiforme haud ingratum, etiam phthisicis commendabile.* Millefolium *in destillatione exhibet oleum cœruleum, sicut Chamomilla.*

Millegranae, vide Herba Herniariae.

Morsus Diaboli, Succisae, *Succise*, **Abbiß, Teuffels-Abbiß.** Crescit in pratis. *Cum scabiosa convenit, & vulneraria est, raro autem in usum venit, frequentius radix.*

Morsus gallinae, vide Herba Alsine.

Myrti, folia Myrti, Bœticae silvestris & sativae, communis Italicae, *Myrte*, **Myrthenblätter**, Myrtus colitur in hortis apud nos; sponte provenit in regionibus calidioribus. *Folia adstringunt, & præprimis masticata vel decoctum inde paratum gingivis relaxatis scorbuticorum medentur.*

Nasturtii aquatici, supini, Sisymbrii aquatici, Sisymbrii, Cardamines, *Cresson d'eau*, **Brunnen-Kresse, weisser Kresse.** Provenit in aquosis, colligitur verno tempore. *Incidit, aperit & resolvit, recens in jusculis medicatis, succusque expressus specifice in scorbuto commendantur.*

Herba Nepetae, Menthae cattariae, *Herbe aux Chats*, **Katzen-Müntz.** Sponte circa margines agrorum, & in incultis provenit. Commendatur ictericis, asthmaticis, nephriticis tussientibus in infuso.

Nicotianae majoris, Peti, Tabaci, Hyosciami Peruviani, *Tabac*, **Taback.** Nomen ab *Johanne Nicotio*, Regis Galliæ ad Lusitaniæ Regem oratore, qui semen Nicotianæ vulgaris, a Belga quodam, ex Florida allatum, primus in Galliam misit. Colitur in agris & hortis. *Vires habet abstergentes, incidentes, resolventes, anodynas, vulnerarias, vomitorias & sternutatorias, clysteribus additur in affectionibus soporosis. In usum medicum vocari debent folia probe siccata, lutei coloris, non Tabacum jam præparatum & contortum.*

Nummulariae, Centummorbiae, Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo, *Nummulaire*, **Pfenningkraut, Egelkraut, Schlangenkraut.** Provenit in locis humidis & herbosis, mense Majo colligenda. *Antiscorbutica, vulneraria & antiphthisica est.*

Ocymi, vide Herba Basilici.

Ophioglossi, Echioglossi, Linguae serpentariae, *Langue de serpent*, **Natterzünglein.** Provenit in pratis & pascuis humidis, montosis. *Egregium est vulnerarium tam interne exhibitum, quam externe applicitum. A Rajo ad ramices vel in forma pulveris, vel in decocto exhibitum, laudatur. Oleum, per infusionem paratum, ad vulnera recentia, & ulcera inveterata, nec non ad ramices, valdopere commendatur, præsertim, si Terebinthina addatur.* Parckinson.

Origani Cretici, *Origan de Crete*, **Cretische Dosten, Cretischer Wohlgemuth.** Ex Creta insula advehitur. Eligi debent spicæ recentes odoratæ. *Aperit, resolvit, urinam & menstrua movet.*

Origani vulgaris, silvestris, Cunilae bubulae Plinii, *Origan*, **gemeiner Wohlgemuth, Dosten, Frauendosten.** Nascitur in dumetis, & amat locos apricos. *Abstergit & aperit, ad pulmonum, hepatis & uteri affectus commendatur; lac augere etiam perhibent. Sacculus, origano repletus, atque cerevisiæ probe lupulatæ calefactæ immersus, ad urinam movendam pectini bono cum effectu imponitur.*

Parietariae majoris, vulgaris, Helxines, *Parietaire*, **Tag und Nachtkraut, St. Peterskraut, Nachtkraut.** Colitur apud nos in hortis. *Abstergit, refrigerat, & ad herbas quinque emollientes refertur. Succus expressus, vel infusum saturatum, nephriticis & hæmoptoicis commendari meretur.*

Parthenii, vide Herba Matricariae.

Pentaphylli lutei, Quinquefolii, *Quinte-feuille*, **Fünffingerkraut.** Provenit in locis arenosis campestribus. *Vulnerariis & adstringentibus herbis adnumeratur.*

Herba

Herba Perfoliatae, Perfoliatae vulgaris, annuae arvensis, *Perce-Feuille*, **Durchwachs.** Colitur in hortis, & nonnunquam ſponte inter ſegetes provenit. *Adſtringit & roborat; decoctis vulnerariis additur, & herniosis commendatur.*

Perforatae, vide Herba Hyperici.

Petroſelini vulgaris hortenſis, *Perſil*, **Peterlein, Peterſilien-Kraut.** Seritur in hortis. *Aperit & urinam movet; raro in medicum, frequentius in culinarium uſum vocatur.*

Piloſellae montanae hiſpidae, vide Herba Gnaphalii montani, ſive Hiſpidulae Rivini.

Piloſellae majoris, repentis hirſutae, Auriculae muris, Piloſellae luteae, *Piloſelle, Oreille de ſouris*, **Mausöhrlein, gelbe Mausöhrlein.** Creſcit in montoſis, aridis & arenoſis. *Pectoralibus & vulnerariis plantis adſcribitur. Decoctum ulceribus ſinuoſis inveteratis injicitur, atque ad collutiones, in oris, faucium & columellæ vitiis, laudabilem præſtat opem.*

Pimpinellae ſanguiſorbae, *Pimprenelle ſanguiſorbe*, **welſcher Biebernell, Kölbleinskraut, Blutkraut.** Naſcitur in pratis humidis. *Virtute pollet adſtringente, diuretica & vulneraria.*

Pimpinellae, Saxifragae majoris, Bimpinellae, *Pimprenelle ſaxifrage*, **Biebernell, Bockspeterlein, Steinpeterlein.** Provenit in locis incultis, campeſtribus. *Aperit, abſtergit, urinam movet & vulneraria cenſetur.*

Plantaginis anguſtifoliae, Quinquenerviae minoris, *Plantain long*, **ſpitziger Wegerich.** *Cum ſequente convenit. Succus laudatur ad febres intermittentes.*

Plantaginis majoris, latifoliae, Arnogloſſi, Septinerviae, *Plantain majeur*, **breiter Wegerich.** Ubique juxta vias creſcit. *Refrigerat, ſiccat & adſtringit; adhibetur in decoctis vulnerariis & gargariſmis.*

Polii Cretici, montani, anguſtifolii, *Polium de Créte*, **Cretiſcher Berg-Poley.** Naſcitur in Creta inſula. Eligenda recens & odorata. *Ad Theriacæ compoſitionem requiritur; urinam & menſes movet.*

Polii montani lutei, maritimi erecti Monſpeliaci, *Polium de montagne*, **Berg-Poley, mit gelber Blüthe.** Ex Gallia advehitur, ubi in Provincia, Delphinatu & Languedocia frequenter naſcitur. *Cum præcedenti ratione virium convenit, & ejus eſt ſuccedaneum. Sylvius adſcribit vim antepilepticam, alii maniacis & noctambulis commendant.*

Polygalae C. B. Ambarvalis, Dod. *Polygale*, **Creutz-Blumen.** Plantæ hujus, quæ in pratis ſiccioribus, &

ad margines eorum occurrit, qua huc usque in officinis noſtris nondum uſi ſumus, hic mentionem facimus propter characterem & eximias virtutes reſolventes, quas cum Polygala Virginiana communes habet. Deſcribitur hæc a *Gronovio* in *Flora Virginiana*, caule ſimplici erecto, foliis ovato-lanceolatis, alternis integerrimis, racemo terminatrice erecto. *Ab incolis ſilveſtribus Virginiæ, non ſolum ad morſus ſerpentis caudiſonæ, ſed etiam ad pleuritidem, peripnevmoniam, aliasque febres phlogiſticas, bono cum effectu adhibetur. Pariſienſes medici noſtra indigena experimenta fecerunt, atque easdem vires, modo debiliores, experti ſunt. Uſus eſt in infuſo, ad modum herbæ Theæ. Tota planta floreſcens, cum radicibus inciſa, aqua ferventi infuſa in uſum vocatur, & ſpecificam, ſerum coagulatum reſolvendi, virtutem habere autumant.*

Herba Potentillae. Vide Herba Anſerinae.

Polygoni. Vide Herba Centumnodiae.

Polytrichi aurei. Vide Herba Adianti aurei.

Praſii. Vide Herba Marrubii albi.

Prunellae, Conſolidae minoris, Brunellae vulgaris, *Prunelle ou Brunelle*, **Prunellenkraut, Gottheyl, St. Anthonikraut.** Creſcit in montoſis & herboſis locis. *Refrigerat & leniter adſtringit, celebratur vulneraria & antiſcorbutica, adhibetur recens in juſculis, & ſicca in decoctis in gargariſmis ad faucium inflammationem.*

Ptarmicae vulgaris, folio ſerrato, flore albo, Dracunculi ſerrato folio pratenſis, Pyrethri germanici, *Ptarmica*, **wilder Bertram, Beruffkraut, weiſſer ſpitziger Rheinfarn.** Indigena eſt, in pratis humidis & foſſis creſcit. *Naribus indita ſternutationem movet; ſunt, qui acetariis addunt recentem herbam, ad eorum frigiditatem corrigendam.*

Pulegii hortenſis, Pulegii cervini, anguſtifolii, *Puliot*, **Poley.** Colitur in hortis. Colligenda menſe Junio & Julio. *Aperit, attenuat & ad plantas nervinas refertur, ad tuſſim ferinam & raucedinem pertinacem, aliosque pectoris & uteri morbos ſpecifice commendatur.*

Pulmonariae arboreae, Muſci arborei pulmonarii, vocatur etiam Lichen arboreus, *Pulmonaire de chêne*, **Lungenkraut, gemein Lungenkraut.** In ſilvis occurrit, & plerumque quercubus aliisve arboribus adnaſcitur. *Siccat & adſtringit; vulgo ad pulmonum affectiones adhibetur. In Ephem. Nat. Cur. Ann. III. Obſerv.* 290. *ad icterum, omnium Medicorum ſolertiam eludentem efficax remedium, celebratur.*

Pulmonariae maculoſae latifoliae, Symphyti maculoſi, Echii folio, *Pulmonaire*, **Flecken-Lungenkraut.** Colitur in hortis, occurrit etiam in ſilvis, foliis anguſtioribus. Colligenda Aprili menſe. *Uſus eſt in affectibus pulmonum, ulceribus, phthiſi & exſpuitione ſanguinis.*

Herba

Herba Pyrolae rotundifoliae, Limonii Cordi, *Pyrole*, **Wintergrün**, **Holtz- oder Wald-Mangold.** Provenit in montosis silvis. *Refrigerans, adstringens, consolidans & vulneraria est.*

Quercus, Folia Quercus, *Feuilles de chêne*, **Eichenlaub.** Quercus ubique occurrit. Colligantur folia tenella. *Adstringunt, & in gargarismis atque decoctis externe adhibentur.*

Rorellae, Roris solis, folio subrotundo, *Ros solis, ou herbe de la goutte*, **Sonnenthau.** In humidis & palustribus inter muscos provenit. Colligenda Junio mense. *Abstergit & incidit. Acrimonia quadam dotata est hæc planta, ob quam nonnulli ejus usum dissuadent. Maxime ovibus noxia a* Rajo *censetur, quia pulmones eorum adurit, & tussim lethalem excitat.*

Rorismarini, Libanotidis, Rosmarini lati & angustifolii, *Romarin*, **Roßmarin.** Colitur in hortis. *Tota planta est balsamica, nervina, cephalica & uterina, interne & externe in usum vocatur. Herba recens, axungia anguillæ infusa, & ad solem digesta, pro remedio habetur ad gravem auditum.*

Rubi vulgaris, Rubi fructu nigro, *Feuilles de Ronce*, **Brombeer-Laub.** Crescit in silvis & dumetis. *Adstringit & in gargarismis adhibetur.*

Rutae hortensis, vulgaris, latifoliae, sativae, *Ruë*, **Gartenrauten, Weinrauten.** Colitur in hortis, & colligitur, dum floret. *Alexipharmaca, cephalica, nervina, uterina & diuretica est. Succus anthelminticum & antepilepticum celebratur. Herba, mammis imposita, lac discutit.*

Rutae caprariae, vide Herba Galegae.

Rutae murariae, vide Herba Adianti albi.

Sabinae, Savinae vulgaris, Tamarisci folio, *Sabine*, **Sevenbaum, Sadebaum, Mägdebaum.** Colitur in hortis. *Calefacit, incidit, discutit, urinam movet; ob vim menses ciendi, suspectis mulierculis nunquam dari debet; externe decoctum ad gangrænam & ulcera mali moris commendabile est.*

Salicis, folia Salicis vulgaris albae, *Feuilles de saule*, **Weidenblätter, Felbenblätter.** Ubique occurrunt. *Refrigerant, siccant, & adstringunt; usus est externus & in gargarismis.*

Salviae hortensis, majoris & minoris, *Sauge*, **Salbey.** Colitur in hortis, & florescente planta colligi debet. Vocatur a Paulino *Herba sacra. Est nervina, balsamica, uterina & tam externe, quam interne in usum vocatur. Vinum salviatum a* Sebizio *commendatur mulieribus, quæ ob frigiditatem uteri infœcundæ sunt.*

Salviae silvestris, Scorodoniae, Salviae agrestis C. B. *Sauge sauvage*, **wilde Salbey.** In pratis & dumetis provenit. *Inter vulnerarias plantas eminet, menses & urinam ciet.*

Herba Sampsuchi, vide Herba Majoranae.

Saniculae, Saniculae quinquefoliae, Diapensiae, *Sanicle*, **Sanickel, Bruchkraut.** Nascitur in silvis & montosis. *Refrigerat & adstringit, vulneraria est, & fere omnia decocta vulneraria ingreditur.*

Santolinae, vide Herba Cupressi seu Abrotani fœminae.

Saponariae, majoris, lævis, Lychnidis Saponariae dictae, *Saponaire*, **Seiffenkraut.** In arenosis juxta rivulos & torrentes nascitur, colligenda mense Junio, dum floret. *Attenuat, aperit & sudorem movet; externus usus in scabie & cutis vitiis commendatur.*

Saturejae sativae, hortensis, Cunilae sativae, *Sariette*, **Saturey, Garten-Jsop, Bohnen-Kraut.** Nascitur in hortis & mense Augusto colligenda. *Stomachica, carminativa, diuretica & uterina est. Etiam in usum cedit culinarium.*

Saxifragiae albae, vulgaris, rotundifoliae, radice granulosa, *Saxifrage*, **weisser Steinbrech, Steinbrech-Kraut.** Provenit in pratis & pascuis arenosis humidioribus. Colligenda cum floribus sub finem Aprilis, vel initium Maji. *Usus est in sabulo & calculo renum pellendo.*

Scabiosae, vulgaris majoris, pratensis, foliis laciniatis, *Scabieuse*, **Scabiosen, Apostemkraut.** Crescit in pascuis & ad margines agrorum. Colligitur mense Junio & Julio. *Alexipharmaca, travmatica & pulmonica est, atque a Bœrhavio summopere ad pectoris morbos commendatur.*

Scariolae, vide Herba Endiviae.

Sclareae, vide Herba Gallitrichi sive Hormini.

Schœnanti, Junci odorati aromatici, Gramen Orientale aromaticum panicula ampla, *Schœnanth, Jonc Oriental odorant*, **Cameelheu, Cameelstroh.** Est gramen dactylon aromaticum, multiplici panicula, spicis brevioribus tomento candicantibus, ex eodem pediculo binis, *Pluckenetii.* Affertur ex *Arabia.* Eligendum spica non orbatum, &, quod est saporis acris, amaricantis & suavis, odoris fragrantis. *Calefacit, subadstringit & discutit, urinam & menses ciet, capiti & ventriculo gratum est; purgantibus tanquam corrigens addi solet, & ad Theriacæ compositionem requiritur.*

Scolopendrii veri, vide Herba Ceterach.

Scolopendrii vulgaris, majoris, Lonchitidis, Linguae cervinae, Phyllitidis, *Langue de cerf*, **Hirschzungen.** Colitur apud nos in hortis, sponte provenit in rupibus Tirolis & Helvetiæ. *Pertinet ad herbas V. capillares, & easdem habet virtutes. Pulvis herbæ exsiccatæ ad palpitationem cordis,*

dis, suffocationem uteri, & motus convulsivos specifice a Rajo *commendatur. Vulneraria & antiscorbutica est planta.*

Herba Scordii Cretici, *Scordium de Crete*, **Cretischer Lachen-Knoblauch.** Ex *Creta* insula advehitur. Eligenda recens, foliacea, odorata, redolens Allium, saporis amaricantis.

Scordii nostratis, Chamaedryos aquaticae, allium redolentis, palustris, *Germandrée d'eau, Scordium*, **Lachen-Wasser-Knoblauch/Wasser-Bathenig.** Nascitur in palustribus. Colligenda mense Junio & Julio. *Alexipharmacum, sudoriferum, pectorale & anthelminticum medicamentum est, & praecedenti Cretico substitui solet in Theriacae compositione.*

Scrophulariae aquaticae, vulgaris, nodosae foetidae C. B. *Scrophulaire, Scordium*, **Braun-Wurtz/Feigwartzen-Kraut.** Floret Junio, & in palustribus, & fluviorum ripis provenit. Colliguntur folia, florescente planta, atque in umbra per decem vel duodecim dies siccantur, & tandem per aliquot horas soli exponuntur. *Virtute gaudent vulneraria, tam externe, quam interne in usum vocata. Ad odorem & nauseosum saporem* Sennae *corrigendum commendantur, &* Yquetaya Brasiliensi *substituuntur. Vide Folia Sennae.*

Scrophulariae minoris, Chelidonii minoris, Ranunculus vernus, rotundifolius minor, Raj. *Petite Chelidoine*, **Scharbocks-Kraut/ klein Schöll-kraut.** Nascitur in humidis. Colligenda Majo. *Ad plantas antiscorbuticas refertur, & cum reliquis antiscorbuticis plantis recens, siccata vero, utpote virtute fere orbata, raro in usum venit.*

Sedi, Vermicularis flore flavo, *Sedum ou Cedon*, **Mauer-Pfeffer/ Katzen-Träublein/ klein Hauß-wurtz.** Ex parietibus & muris vinearum & ruderum nascitur. *Saporem acrem fervidum praebet, & pro specifico antiscorbutico habetur.*

Sennae, Folia Sennae Alexandrinae, *Sené, Feuilles de Sené*, **Sennetblätter.** In Syria, Persia, Arabia & Ægypto colitur Senna. Optima censentur folia acuta, quae ex Alexandria advehuntur, coloris sunt pallido-vel flavo-viridescentis, saporis subacris, amaricantis, nauseosi, recentia & a stipitibus liberata. Italicae Sennae folia sunt latiora & obtusiora, saporis magis subdulcis & glutinosi, atque vilioris pretii & virtutis. *In classem purgantium usitatissimorum pertinent, flatulentiam excitare solent; hanc ob causam Zinziberis, Galangae & Cinnamomi additione corrigi debent. Nauseoso vero sapore, per additionem portionis aequalis, foliorum* Scrophulariae aquaticae *orbantur, sicut experimentum fecit Dom.* Marchantius. Eph. Acad. Reg. Paris. 1701. *Dosis in substantia drachma una, in infuso ad quatuor, usque sex, ascendere licet; per longam coctionem virtute privantur laxativa, praestat igitur, aqua infundere bulliente, & infusum post digestionem exhibere.* Huc etiam pertinent

Folliculi Sennae, *Ecosse de Sené*, **Sennetbälglein.** Sunt capsulae sive siliquae seminales Sennae sulcatae, recurvae, semi-

ſemilunares, compreſſæ, continentes ſemina nigricantia. *Nonnulli eos foliis præferre volunt, ſed experientia docet, magis flatulentos eſſe, quam folia.*

Herba Senecionis, Erigeri vulgaris, *Seneçon*, **Creutzwurtz, Grindwurtz-Kraut**, noſtris **Goldkraut**. In hortis, arvis & inter olera occurrit, atque omni anni tempore floret. *Maxime efficax eſt, atque ſcorbuticis, arthriticis, ictericis, vulgo etiam ad convulſiones infantum ſuccus expreſſus commendatur.*

Serpilli vulgaris, minoris, Serpilli ſilveſtris repentis, *Serpolet*, **Quendel, Feld-Poley, Künlein.** Creſcit in ſiccioribus, montoſis & ſabuloſis. Colligenda, dum floret, Junio vel Julio. *Cephalica, ſtomachica, diuretica & uterina eſt planta, atque tam externe, quam interne, in uſum vocari poteſt. Urinam & ſudorem movet; uſus in infuſo, Theæ inſtar, eſt. Externe ad cucuphas, pediluvia, gargariſmata & fomentationem adhibetur.*

Sideritidis, hirſutae, procumbentis, *Crapaudine*, **Gliedkraut, Wundkraut, Feld-Andorn, Beruff- oder Beſchreykraut.** In agris ſiccioribus, ſabuloſis apricis provenit. *Vulneraria & arthritica eſt, ſubadſtringit & urinam movet. Balnea ex aqua, in qua Sideritis cocta, mulieres ad infantum atrophiam, ab incantatione putatitia ortam commendare ſolent, unde nomen* **Beruff- oder Beſchreykraut.**

Solani, Solatri nigri, *Morelle*, **Nachtſchatten oder Saukraut.** Circa ſepes & inter olera naſcitur. Colligitur, dum floret. *Refrigerat & anodyna eſt. Nunquam interne, raro externe in uſum vocatur.*

Soldanellae, Braſſicae marinae, Convolvuli marini rotundifolii, *Choumarin*, **Meer-Kohl, Meer-Winde, Meer-Glöcklein.** Per terram ſuas ſpargit viticulas, quibus folia prodeunt ſubrotunda, retuſis alis prædita, latiora, quam longa, *Chelidonii minoris* ſimilia, craſſiuſcula, liquore lacteo manantia, pediculis longis enixa; flos magnus, purpureus, quadrantalis fere, campanulatus. Creſcit in maritimis Galliæ, Angliæ & Italiæ. *Planta eſt in totum ventriculo inimica, acris; vehementiſſime alvum ciet. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carnis juſculo; Valide ſerum educit, hinc* Altomarus, *Medicus ille celebris, uſum Soldanellæ diſſuadet, atque potius noxam inferre, quam auxilium hydropicis præſtare perhibet* Raj. in Hiſt. Plantar. *Dari ſolet in pulvere drachma una, in infuſo vel decocto uncia ſemis.*

Squinanti, vide Herba Schœnanti.

Tamariſci, germanicae, ſilveſtris, fruticoſae, *Tamaris*, **Tamarisken-Kraut, Porſt.** Juxta Rhenum & Danubium fluvios provenit copioſe, naſcitur etiam in Gallia Narbonenſi. *Adſtringit & refrigerat, raro tamen in uſum venit, frequentius vero cortices.*

Tanaceti vulgaris, lutei, Athanaſiae, *Taneſie*, **Rheinfarn, Wurmfarn.** Creſcit circa foſſas, ad agrorum margines, aliaque ſabuloſa loca. Colligenda menſe Junio & Julio.

lio. *Anthelmintica, nephritica, vulneraria & uterina est. Externe ad scabiem & lentigines decoctum commendatur.*

Herba Taraxaci, Dentis Leonis, *Dent de Lion, ou Pissenlit*, **Löwenzahn, Pfaffenröhrlein.** In hortis & pascuis crescit. *Censetur alexipharmaca, pectoralis & hepatica. Aqua destillata inter antipleuriticas numeratur.*

Theae, The Sinensium, Tsiae Japonensium, Thee Indorum, *Thée*, **Thee.** Colitur in regno Japonico & China. Planta est Evonymo adfinis, nucifera, flore roseo. Frutex ultra orgyæ altitudinem raro exsurgens, vestitur foliis carnosis brevissimis, surculos perenni, nisi decerpantur, vigore inordinate singulatim occupantibus, foliis cerasi, fructu acido, similibus. Flores sunt Rosæ silvestris facie, remisse fragrantes, albi, hexapetali, cum numerosis staminibus. Fructus monococcus, bicoccus & utplurimum tricoccus, concretus ex globulosis capitulis, Pruni silvestris magnitudine, nucula fere globosa fœtis. Florum & fructuum nullus est usus. Omnes vero Theæ species ex una eademque planta seu frutice colliguntur. Decerpuntur prima collectione folia nobilissima, tenella & nondum explicata, quæ rara & etiam in patria valde cara sunt, atque *Thea cæsarea*, nec non *flos Theæ* appellari solent. Secunda collectione folia integra explicata, cum semiexplicatis decerpuntur; atque secundum bonitatem ac magnitudinem in classes seliguntur. Messem claudit tertia collectio, folia rigidiora perfecta largiens. Post collectionem folia Thee præparantur, atque recens decerpta super laminam ferream torrentur, tosta & adhuc ferventia volis manuum volvuntur, donec crispa evadant. Duæ species Theæ maxime familiares nobis notæ sunt, quæ tamen bonitate multum inter se differunt; prior *Thee Bohe, Thee Bou, Thee rubrum*, **rother Thee**, posterior *Thee viridis*, ad quam etiam *Thee imperialis* refertur, appellatur. *Omnes Theæ species magis vel minus adstringunt, viridis tamen sapore adstringente rubrum plerumque antecellit. Grata fere omnibus est medicina infusum Theæ & vere polychresta; multum tamen aquæ calenti adscribendum esse persuasi sumus. Optima Thea censetur, cujus folia parva tenella, atque in apicibus alba, incana vel lanuginosa sunt, quæ leviter adstringunt, & odoris atque saporis grati deprehenduntur. Thea viridis aquam, in qua infusa est, viridiusculo colore, & odore violaceo vel fœni recentis instar imprægnare debet.*

Thymi Cretici, Thymi albi capitati veri, *Thym de Crete*, **Cretischer Thymian.** Provenit in Creta insula, & aliis regionibus calidioribus. *Eligenda odorata aromatica, capitulis integris.*

Thymi vulgaris, folio tenuiore cineritio, rigidi, *Thym vulgaire, a feuille menue*, **Thymian.** Colitur in hortis. Colligenda mense Junio. *Carminativas, anticatarrhales & nervinas habet vires. Non solum in usum cedit medicum, sed & culinarium. Est succedaneum prioris sive Cretici, utpote qui vulgari præstantior est, si modo debitas bonitatis notas habet.*

Tormentillae, Septifolii, *Tormentille*, **Tormentill, Blutwurtz-Kraut, Siebenfinger-Kraut.** *Raro in usum, nisi in decoctis vulnerariis, venit.*

Herba Trichomanis, vide Herba Adianti aurei.

Trifolii fibrini, aquatici, paluſtris, Menoanthes foliis ternatis, Linn. Limonium Cord. Acopa Dioſcorid. Bœrh. H. L. Menianthes paluſtre triphyllum Raj. *Treffle de Caſtor, Menyanthe*, **Bieberklee, Bitterklee, Waſſerklee, Scharbocksklee.** Naſcitur in aquis ſtagnantibus & paludoſis. Colligenda menſe Majo vel Junio. *Aperit, incidit & roborat. Excellens eſt antiſcorbuticum, antaſthmaticum, anthypochondriacum & antifebrile. Externe etiam, ſcopo mundificandi, ad ulcera tibiæ ſuccus, vel decoctum herbæ conducit. Rajus ad ovium tabem commendat.*

Trifolii pratenſis, purpureae, vulgaris, majoris, *Treffle des prées*, **Wieſenklee.** Ubique provenit in pratis herbidis. Colligenda, dum floret. *Vulneraria cenſetur, & albo fluori conferre, ob vim balſamicam & ſubadſtringentem, creditur.*

Tuſſilaginis, vide Herba Farfarae.

Verbaſci, Thapſi barbati, Verbaſci foliis incanis, ovato - acutis, utrinque tomentoſis, floribus in ſpica denſiſſima ſeſſilibus, Haller. flore luteo magno, *Bouillon blanc, Molene, Bonhomme*, **Wullkraut, Himmelbrand, Königskertzen.** Juxta agrorum margines, aggeres & ſcrobes naſcitur. Folia colligenda ſunt Junio menſe. *Prodeſt interne ſumtum, in morbis pectoris, tuſſi, ſputo cruento, & torminibus ventris. A veterinariis anglis, in affectibus pulmonum vaccarum & jumentorum, adhibetur, atque.* Pulmonaria vaccarum *appellatur.* Raj. Hiſt. plant. *Externe adhibitum emollit, diſcutit & dolores mitigat, atque ad hæmorrhoidum dolores, teneſmum & ani procidentiam commendatur.*

Verbenae vulgaris, maris, flore cœruleo, *Verveine*, **Eiſenkraut, Taubenkraut, Eiſenhart.** Naſcitur juxta ſepes & muros, alioſve locos incultos. Colligenda menſibus æſtivis. *Adſtringit, refrigerat, vulneraria & anodyna eſt.*

Veronicae majoris, vulgaris ſerpentis, *Veronique*, **Ehrenpreiß, Heyl aller Schäden, Wundkraut.** Naſcitur in paſcuis ac ſilvis recens cæſis, ſiccioribus. Colligenda menſe Majo & Junio. *Inter vulnerarias plantas eminet, diuretica, ſudorifera, pectoralis & roborans eſt.*

Vincae per vincae, Clematitidis Daphnoidis, *Pervenche*, **Wintergrün, Singrün, Ingrün.** Provenit in ſilvis. Colligenda Majo & Junio. *Ob vim, quam habet, leniter adſtringentem, vulnerariis adſcribitur, atque in fluxionibus ſanguinis commendatur.*

Violariae, *Violette*, **Violenkraut, Veylkraut, Mertzen-Violenkraut.** Juxta ſepes, in dumetis & hortis provenit. *Ad herbas quinque emollientes refertur.*

Vitis, folia Vitis, *Feuilles de Vignes*, **Wein-Laub, Wein-**

Weintrauben-Blätter. Colligenda sunt mense Augusto. *Adstringunt & refrigerant, atque in gargarismis adhiberi solent.*

Herba Virgae aureae. Vide Herba Consolidae Saracenicae.

Urticae urentis, vulgaris, racemiferae, *Orte commune*, **Brennesseln.** Ad sepes & rudera crescit. *Diuretica est, ad mictum cruentum specifice & hæmorrhagias omnis generis commendatur. Cicutæ & Hyoscyamo adversatur.*

Urticae mortuae, inertis, Galeopsidis, Lamii flore albo, *Ortie blanche ou morte*, **weisse, todte Nessel.** Ad sepes hortorum occurrit. Colligitur, dum floret, mense Aprili & Majo. *Commendatur specifice ad fluorem album & scrophulas.*

Uvulariae, Hippoglossi, Bislinguae, Bonifaciae, Lauri Alexandrinae, Rusci latifolii fructu folio innascente, Tournefort. *Uvulaire*, **Zäpfleinkraut, Zungenkraut, Kehlblatt.** Colitur in hortis, sponte provenit in Gallia & Italia in montosis. *Travmatica est, adstringit, & decoctum in affectibus uvulæ, ex nimia humiditate & laxitate ortis, pro gargarismatibus adhibetur.*

CAPUT III.

DE FLORIBUS.

Flores Acaciae Germanicae, Pruni silvestris, *Fleurs des pruniers sauvages*, **Schlehenblüth.** In sepibus occurrit Acacia. Floret mense Aprili. Flores colligendi sereno cœlo. *Laxant alvum, serum & sabulum renum educunt, inter anthelmintica & antepileptica numerantur.*

Anethi hortensis, *Fleurs d'Anet*, **Dillenblumen, Dillenblüth.** Sunt in umbellam congesti. Colligantur Julio. *Anodyni & carminativi sunt, usus est in enematibus.*

Anthos, Rorismarini, Libanotidis, *Fleurs de Romarin*, **Rosmarinblüthe.** Colliguntur Majo & Junio. Vix apud nos sufficienti habentur quantitate, hinc afferuntur ex calidioribus regionibus. Eligendi odorati, recentes. *Cephalici, nervini & uterini sunt.*

Aquilegiae, *Fleurs d'Ancolie*, **Ackeley, Ageley, Glockenblumen.** Nascitur Aquilegia in hortis, nonnunquam sponte occurrit in silvis. Flores reperiuntur diversi coloris, eligendi cœrulei. *Antiscorbutici sunt, urinam & menses cient, vulnerariis adnumerantur; in gargarismis etiam adhibentur.*

Arnicae. Vid. Herba & Radices. Cum quibus conveniunt, mitius tamen agunt.

Flor. Aurantiorum, Naphae, *Fleurs d'Orange*, **Pomerantzenblüth.** Coluntur in hortis. Sicci raro, recentes ad aquam destillandam expetuntur. *Sunt alexipharmaci & cordiales.*

Balaustiorum, Balaustiae, Mali punicae silvestris, flore pleno majori, *Fleurs Balaustes*, **Granatenblüthe.** Coluntur in hortis, & ex regionibus calidioribus advehuntur. *Valde adstringunt & refrigerant; ad uvulæ laxitatem in gargarismis conducunt. Ex petalis rubris, abjectis calycibus, pulverem rubrum sternutatorium parare solent.*

Basilici, Ocymi, *Fleurs de Basilic*, **Basilgenblumen.** In officinis prostant summitates herbæ cum floribus. *Virtutibus balsamicis, nervinis & uterinis conveniunt cum herba.*

Bellidis minoris, silvestris, *Fleurs de petites Marguerites, Pasquette*, **Gänseblumen, Angerblumen.** Florent primo vere in pratis & aggeribus. *Cum herba conveniunt. Refrigerant, & pectori, renibus, hepatique sunt amici.*

Bellidis hortensis, Bellidis rubrae, *Fleurs de Marguerites rouges*, **rothe Maslieben, Margarethen-Blumen.** *Virtutes eædem ac prioris, & præcipue ad Tincturam requiruntur.*

Betonicae, Bethonicae purpureae, *Fleurs de Betoine*, **Bethonienblüth.** Junio & Julio colliguntur; plerumque spicæ florescentes tantum, & non flores excerpti in usum trahuntur. *Cæterum cum herba conveniunt, & ad conservam expetuntur.*

Borraginis, Buglossi veri latifolii, *Fleurs de Borrache*, **Borragenblumen.** Mense Julio & Augusto colliguntur. *Adscribitur illis vis cordialis & antimelancholica, atque floribus quatuor cordialibus adnumerantur.*

Buglossi angustifolii, *Fleurs de Buglosse*, **Ochsenzungenblüthe.** Junio & Julio florent. *Cum Borraginis floribus conveniunt, & pariter ad flores quatuor cordiales pertinent.*

Calcatrippae, Consolidae regalis, Delphinii, *Fleurs de pied d'alouette*, **Rittersporublumen, Lerchenklauenblumen.** Sponte inter segetes proveniunt, coluntur etiam in hortis. Silvestres cœrulei in usum vocantur. *Ophthalmici, diuretici, & vulnerarii sunt. Nonnullis tamen usus internus, ob vicinitatem, quam cum* Aconito *Calcatrippa habet, suspectus est. In Ophthalmia flores in sacculis, vel decoctum eorum externe applicantur.*

Calendulae, Calthae sativae, Verrucariae, *Fleurs de Soucy*, **Ringelblumen, Goldblumen.** Coluntur in hortis. Per totam æstatem florent. *Censentur cardiaci, uterini & alexipharmaci; suffitum a parturientibus, vagina exceptum, partum promovere ajunt.*

Carthami, Cnici sativi, *Fleurs de Carthame, ou Safran bâtard*, **wilder Saffran, Safflohr.** Coluntur in hortis & agris. Florent Julio & Augusto. *Alvum emolliunt & ictericis*

ictericis commendantur. Usus præcipuus est ad tingendum. Notatu dignum, lintea roseo colore floribus hisce luteis tingi posse.

Flor. Centaurii minoris. Vide Herbæ.

Chamomillae seu Chamæmeli Romani, Leucanthemi odorati, multiplici flore, *Fleurs de Camomille Romaine*, Römische Chamillen, Edle Chamillen. Coluntur apud nos in hortis. *Sunt carminativi, stomachici, anodini & diuretici. Infusum theiforme ad dolores post partum commendabile est.*

Chamomillae, seu Chamæmeli vulgaris, silvestris, *Fleurs de Camomille de Champs*, Chamillen, gemeine Chamillen. In segetibus mense Junio & Julio luxuriant, singulis annis colligendi. *Gaudent virtute tonica, carminativa, anodina & antifebrili.*

Cheiri, Keyri, Levcoji lutei, Cheiranthos Linn. *Fleurs de Giroflée jaune*, gelbe Violen. Primo vere florent, coluntur in hortis. *Ad icterum & uteri vitia commendantur.*

Cichorii, *Fleurs de Chicorée*, Wegwartenblumen. In campestribus & circa vias publicas proveniunt. *Hepati dicati sunt, & conserva ex floribus, non ex herba parari debet.*

Consolidae regalis. Vide Flor. Calcatrippae.

Cyani cœrulei, Baptisecularae, *Fleurs de Bluet*, blaue Kornblumen. Florent inter segetes Junio. Colligendi sicca & serena tempestate, & celeriter inter chartam, fornacis calore, ne pallescant, siccandi. *Diuretici sunt; externe aqua destillata & flores ipsi in sacculis ad ophthalmiam commendantur.*

Farfarae, Tussilaginis, *Fleurs de Tussilage*, Hufflattich, Roßhubblumen. Primo vere ante herbam proveniunt, & hanc ob causam planta Filius ante patrem vocatur. *Pectorales sunt, in decoctis exhibentur, & eorundem syrupus atque conserva in officinis prostant.*

Galeopsidis. Vide Urticae.

Genistae, Cytiso-genistae, flore luteo, Genistae scopariae angulosae, *Fleurs de Genet*, Ginster-Pfriemenkraut-Blumen, Künschroten. Copiose proveniunt in arenosis, montosis, incultis. Mensibus Majo & Junio colliguntur. *Vires splenetica, nephriticæ, antiscorbuticæ & diureticæ illis tribuuntur. In substantia vomitus excitant, in decoctis alvum laxant.*

Granatorum. Vide Flor. Balaustiorum.

Hepaticae nobilis, *Fleurs d'Hepatique*, Edel-Leberkraut-Blüthe. In silvis proveniunt & primo vere colliguntur. Sicut flores Cyani colligi & siccari debent. *Conveniunt cum herba, & ad conservam requiruntur.*

Flor. Hyperici, Perforatae, *Fleurs de Millepertuis*, **Johannes-Blumen, Hartheu-Blumen.** Junio & Julio colliguntur. *Vulnerarii & anthelmintici ſunt. Odorem contriti ſpirant terebinthinaceum, ſpiritum vini & oleum colore carmeſino-rubro inficiunt.*

Lavendulae fœminae, anguſtifoliae, *Fleurs de Lavande*, **Lavendel-Blumen.** Coluntur in hortis. Vigent menſe Junio & Julio. *Cephalicæ & nervinæ ſunt, atque pro odoramentis & cucuphis expetuntur.*

Liliorum alborum, *Fleurs des Lis blancs*, **weiſſe Lilienblätter.** Coluntur in hortis. Flores colligi poſſunt Julio & Auguſto. *Anodini ſunt, digerunt, humectant & maturant, cuticulam curant, ſicci vero raro in uſum veniunt. Antheras ſive apices luteos liliorum, menſtrua & fœtum pellere, nonnulli perhibent.*

Liliorum convallium, Convallariae, Linn. *Fleurs de Muguet*, **Mayenblumen.** Florent Majo in ſilvis. *Cephalici ſunt, & contra morbos frigidos capitis adhibentur. In ſubſtantia aſſumti alvum movent; præſtat igitur ſcopo confortandi aquam adhibere ex illis deſtillatam. Errhinam etiam habent virtutem, & pulveribus ſternutatoriis adduntur.*

Linariae. Vide Herba.

Lupuli ſalictarii, Humili, Linn. *Fleurs de Houblon*, **Hopfen.** Sunt folliculi ſquamoſi, vel capſulæ foliaceæ, ſtrobilorum inſtar, molles, quæ ſemina continent parva, & potius fructus, quam flores appellari deberent. Lupulus ſponte provenit, copioſe vero etiam colitur. Planta eſt ſcandens. *Præcipuus uſus Lupuli eſt ad cereviſias condiendas; in medicina vero medicamentum anodinum, diſcutiens, reſolvens, calculum, urinam & menſtrua pellens præbet; externe contuſionibus & tumoribus auxiliatur.*

Malvae arboreae, hortenſis, hyemalis, *Fleurs de Mauve de jardin*, **groſſe Pappeln, Herbſt-Roſen, Winter-Roſen.** Coluntur in hortis. Flores colliguntur menſibus Auguſto, Septembri & Octobri. Eligendi, qui colore ſunt fuſco-purpurei. *Emolliunt, & ob viſciditatem præbent anodinum in faucium inflammatione. Uſus eſt in gargariſmis.*

Meliloti, *Fleurs de Melilote*, **Steinklee-Blumen.** *Infuſum florum Meliloti, ad partum facilitandum, dolores poſt partum, & nephritidem commendatur. Uſus eorum etiam in clyſteribus eſt.*

Nymphææ albae, *Fleurs de Nymphée blanche*, **weiſſe Seeblumen.** Naſcuntur in ſtagnis, florent menſe Julio. *Refrigerant, humectant, & ad maniam & ſatyriaſin commendantur.*

Origani, ſunt ſummitates. Vide Herba.

Papaveris erratici, Rhœadis, ſilveſtris, *Fleurs de Coquelicot, ou Pavot rouge*, **Kornroſen, Klapperroſen, Schnallenblumen.** Proveniunt inter ſegetes. Colliguntur menſe Junio & Julio. *Anodini ſunt, & præcipue in catarrhis acribus, ſalſis & pleuritide conducunt, atque ob mucilaginem leniunt & mulcent.*

Flor.

Flor. Perſicorum, Mali Perſicae, *Fleurs de pêcher*, **Pferſich=Blüth.** Florent menſe Aprili, coluntur in hortis & vineis. *Alvum laxant, ſerum educunt, & vermes necant. Parantur inde ſyrupus & conſerva.*

Pœoniae, *Fleurs de Pivoine*, **Gichtroſen.** Coluntur in hortis. Colliguntur menſe Majo. *Conveniunt virtutibus cum radicibus, & antepileptici creduntur. Raro flores, ſæpius ſyrupus ex illis paratus adhibentur.*

Primulae veris, flore odorato, Paralyſeos, Verbaſculi pratenſis odorati, C. B. *Fleurs de Primevere*, **Schlüſſelblumen, Himmelsſchlüſſel, St. Peters=Schlüſſel.** Ubique in pratis verno tempore proveniunt. *Cenſentur nervini, antepileptici, anodini & pectorales.*

Roſarum albarum, Roſae albae vulgaris majoris, *Fleurs de Roſes blanches*, **weiſſe Roſen.** Coluntur in hortis, & menſe Junio florent. *Ad oculorum inflammationes & fluorem album mulierum commendari ſolent.*

Roſarum pallidarum, *Fleurs des Roſes pâles*, **bleiche Roſen, Ulmer=Roſen.** Etiam in hortis coluntur, & eodem tempore florent. *Alvum laxant, bilioſis & hydropicis proſunt.*

Roſarum rubrarum, vulgarium, *Fleurs des Roſes rouges*, **Zucker=Roſen, rothe Roſen.** Colliguntur eodem tempore, quo præcedentes. *Omnes Roſarum ſpecies vim quandam habent ſubadſtringentem, hæ vero paulo magis, quam præcedentes; ſunt ſimul roborantes, analepticæ & cordiales. Floribus adnumerantur quatuor cordialibus. Uſus eſt varius, tam internus, quam externus.*

Roſarum finarum, intenſe rubrarum, flore ſimplici ſericeo, *Fleurs des Roſes de Provins*, **Knopff=Roſen, feine Roſen, Eßig=Roſen.** Coluntur in hortis. Colliguntur, dum nondum ſunt apertæ, atque abſciſſis ungulis albis celeriter ſiccantur. *Vi adſtringente omnibus reliquis Roſarum ſpeciebus præcellunt, in reliquis conveniunt. Requiruntur præcipue ad Tincturam & Acetum.*

Salviae hortenſis, *Fleurs de Sauge*, **Salbey=Blüthe.** Colliguntur per æſtatem, & inprimis menſe Julio. *Virtutibus balſamicis & nervinis cum herba conveniunt.*

Sambuci, *Fleurs de Sureau*, **Hollunderblüthe.** Ubique occurrit Sambucus arbor, & circa rudera, muros & ſepes naſcitur. Floret menſe Junio. *Flores diſcutiunt, emolliunt, reſolvunt, lac augent, dolores mitigant, ſudorem movent; infuſum Theæ loco, ſenibus præſertim, ad cruentum ſputum & tuſſem pertinacem commendatur.*

Saxifragiae, vide Herbae.

Scabioſae, *Fleurs de Scabieuſe*, **Scabioſen=Blumen, Apoſtemkraut=Blüthe.** *Cum herba conveniunt, & inprimis ad conſervam expetuntur.*

Flor. Spicae Celticae &

Spicae Indicae, vide Radices.

Spicae hortensis, Lavendulae latifoliae, Psevdonardi, *Fleurs de Spica*, Spick. Coluntur in hortis; in Hispania & Gallia Narbonensi sponte proveniunt. Colliguntur mense Junio & Julio. *Adscribitur vis cephalica, nervina atque uterina, & tam externe, quam interne in usum vocantur.*

Stœchadis Arabicae, Stœchadis purpureae, C. B. *Fleurs de Stœchas Arabique*, Stöchas-Blumen, Welscher Lavendel. Advehitur ex Gallia, Italia & aliis calidioribus regionibus. *Eligendæ Spicæ integræ, odoratæ, recentes. Nervina, pulmonica, diuretica, uterina & carminativa gaudent virtute.*

Stœchadis citrinae, Germanicae, Amaranthi lutei, *Fleurs de Stœchas citrin*, *Passevelours*, Rheinblumen, Winterblumen, Schaben-Motten-Kraut. Sunt species Elichrysi, proveniunt in locis sabulosis siccis, frequenter occurrunt circa Rhenum. Florent Junio & Julio. *In affectibus pectoris, lienis & renum conducunt, vermes enecant. Fumus a floribus carbonibus injectis excitatus, ad arthriticos dolores commendatur.*

Tanaceti, *Fleurs de Tanasie*, Rheinfarn, Wurmkraut-Blumen. Colligendi mense Junio & Julio. *Anthelmintici sunt, & cum herba conveniunt.*

Tiliae, *Fleurs de Tillau, Tilleul, ou Tillot*, Linden-blüth. Passim sponte & plantata provenit Tilia. Floret mense Julio. *Flores roborant, discutiunt, anodini & cephalici sunt, ad epilepsiam, apoplexiam & vertiginem commendantur. Speciebus pro potu ordinario additi gratum conciliant colorem rubellum.*

Tunicae hortensis, rubri, *Fleurs d'Oeuillets rouges*, Nägelblumen, Garten-Nägelein, Grasblumen. Coluntur in hortis. Florent mense Julio & Augusto. *Cephalici & cordiales censentur.*

Tussilaginis, vide Flor. Farfarae.

Verbasci, Thapsi barbati, *Fleurs des Bouillons blancs*, Wullenblumen. Proveniunt in locis arenosis, juxta agrorum margines. Colliguntur mensibus Julio & Augusto. *Sunt anodini & emollientes, atque ad hæmorrhoidum dolores & tenesmum ab hypercatharsi ortos, in lacte dulci cocti & sacculis applicati, conveniunt. Infusum florum Verbasci ad phthisin laudatur, & Italis familiare esse, Ill.* Hallerus perhibet.

Violarum, purpurearum odoratarum, *Fleurs des Violettes de Mars*, blaue Violen, wohlriechende Veilgen, Mertzen-Violen. Juxta muros, sepes & in hortis proveniunt. Florent mense Martio & Aprili. *Refrigerant, humectant, emolliunt & laxant; vis etiam adscribitur cordialis, & hanc ob causam floribus quatuor cordialibus adnumerantur. Siccati in vitris loco calido asservandi, ne accessu aëris pallescant.*

Flor. Urticae mortuae, Galeopsidis, Lamii albi, *Fleurs d'Ortie morte, ou de Lamium,* **taube Nesselblumen.** Ad hortorum sepes occurrunt, Martio, Aprili & Majo florent. *Specifice ad album fluorem commendantur.*

CAPUT IV.

DE SEMINIBUS.

Sem. Abelmosch, Ketmiae Ægyptiacae, semine moschato, Tournefort. Alceae Ægyptiacae villosae, Bamiae moschatae, Ketmiae Americanae hirsutae, flore flavo Raj. *Graines de Musc,* **Bisamsaamen.** Grana sunt reniformia, pusilla, albicantia, odorem moschi & ambræ spirantia. Ex Ægypto advehuntur, in hortis etiam nonnunquam coluntur. Eligenda probe odorata & recentia. *Aphrodisiaca censentur, & ad odoramenta & alia odore moschato imbuenda inserviunt.*

Acetosae, Oxalidis pratensis, *Semence d'Ozeille,* **Sauerampffer-Saamen.** Est nigrum, parvum, triangulare, punicei coloris, splendentis, saporis adstringentis. *Pro alexipharmaco habetur, & hoc fine nonnullis compositionibus additur.*

Agni casti, Viticis officinalis, *Semence d'Agnus castus,* **Keuschbaum, Keuschlamm-Saamen, Schaaff-müllen-Saamen.** Arbuscula sponte in Italia & Sicilia nascitur. Semina sunt grana rotunda, pipere minora, colore cinereo, saporis subadstringentis, acris. *In calidioribus subjectis habere vim antaphrodisiacam, in frigidioribus vero venerem excitare compertum est.*

Alkekengi, Halicacabi, *Bajes de Coqueret,* **Juden-kirschen-Saamen.** Proveniunt Alkekengi in vineis & silvis. Semina & fructus maturescunt mensibus Octobri & Novembri. *Adnumerantur antinephriticis.* Vid. Fructus.

Altheae, Ibisci, *Semence de Guimauve,* **Eybisch-kraut-Saamen.** Sunt semina parva, semicircularia vel reniformia. Mucilaginem, in aqua macerata, exhibent. *Emolliunt, leniunt, & nephriticis commendantur.*

Ammeos, Ammi veri Cretici, odore Origani, *Semence d'Ammi,* **Cretischer Ammy-Saamen.** Ad umbelliferas & annuas refertur plantas. Semen parvum, striatum, e rufo spadiceum, saporis aromatici, acris est. Ex Alexandria Ægypti advehitur. Eligendum recens, maturum, saporis acris. *Alexipharmacum, diureticum & carminativum est; Theriacam ingreditur, & seminibus quatuor calidis minoribus adnumeratur. Commendatur a Matthiolo ad fluorem album, & sterilitatem mulierum.*

Amomi, *Semence d'Amome,* **wohlriechender Saamen, oder Frucht aus Indien, Amomlein.** Inter Auctores lis est, quid verum sit Amomum; hodie plerumque pro Amomo baccæ rotundæ ex fusco nigricantes, pipere paulo majores, Myrti arboreæ aromaticæ, foliis laurinis, acuminatis, venduntur, quæ

etiam *Cariophylli rotundi*, vel *Piper odoratum Jamaicense & Pimenta* vocantur. Colliguntur immaturæ, & ſaporis ſunt aromatici, ex Cariophyllorum, Nucis moſchatæ & Cinnamomi ſapore & odore quaſi compoſiti. Angli iis ad condiendos cibos utuntur, & ex *Jamaica* inſula, ubi arbor in montoſis ſilvis creſcit, ſub nomine *All-Spice*, quia odorem & ſaporem omnium aromatum, ſcilicet *Cinnamomi*, *Cariophyllorum* & *Nuciſtæ* referunt, advehunt. *Rajus* ex *Sloan Hiſtoria Jamaica* arborem ſub nomine *Cariophylli aromaticæ Americanæ, lauri acuminatis foliis* ſequenti modo deſcribit: "Arboris „hujus truncus, femoris humani craſſitudinem æquat, ad triginta „pedum altitudinem recta aſſurgit, cortice glaberrimo incano tectus, „quaqua verſus ramos emittit. Virgularum extrema folia diverſæ „ſunt magnitudinis, ampliſſima, quatuor vel quinque uncias longa, „duas vel tres lata, glabra, tenuia, nitentia, ſaturato virore imbu„ta, pediculis uncialibus inſidentia, attritu odorata, & laurinis per „omnia ſimilia.„ Surculorum extrema, ſeu ſummitates in multos, unciam longos, pediculos faceſſunt, totidem flores ſuſtinentes, quorum unusquisque e plurimis ex albicante viridibus ſtaminibus, quatuor petalis perexiguis, deorſum reflexis, concoloribus conſtat. Floribus delapſis, ſuccedunt baccæ multæ coronatæ, ſeu umbilicatæ, per maturitatem baccis juniperinis majores, nigræ, glabræ & ſplendentes, in quibus continetur pulpa humida, ſubviridis, acris & aromatica. Baccæ hæ per veſicam deſtillatæ, oleum largiuntur ſuave, odoriferum, quod, velut *Oleum cariophyllorum & cinnamomi* fundum petit. Alii pro Amomo vero venditant ſemen quoddam anguloſum, rugoſum, aromaticum, nigrum, quod in capſulis ſeu ſiliquis ſubovatis, trigonis, in tria loculamenta diviſis, apportatur, & a nonnullis *Cardamomum majus*, ab aliis *Amomum racemoſum* vocatur, atque a *Linnæo* in *Horto Cliffortiano*, ſub nomine *Amomi*, *ſcapo nudo*, *ſpica ovata & ſpica oblonga obtuſa*, deſcribitur. *Amomi vires ſunt cephalicæ*, *ſtomachicæ*, *incidentes & roborantes*; *ob virtutes alexipharmacas ad Theriacæ confectionem requiritur*. *Alii* Amomum *hoc*, ſcapo nudo Linnæi, *pro* Cajeput, Cardamomi ſpecie ſumunt.

Sem. Anethi hortenſis, *Semence d'Anet*, **Dill-Saamen.** Compreſſum, membranaceum quaſi & tenue eſt, tribus ſtriis notatum, coloris dilute fuſci, ſaporis aromatici, odoris grati. *Digerit & diſcutit*, *auget lac*, *& ſomnum conciliat*, *flatus & urinam pellit*.

Angelicae ſativae, *Semence d'Angelique*, **Angelick-Saamen.** Albicans, latum & compreſſum eſt, ſaporem acrem & odorem Angelicæ radicis habet. *Carminativum eſt*, *diureticum & alexipharmacum*.

Aniſi, *Semence d'Anis*, **Anis-Saamen.** Oblonge rotundum, parvum & ſtriatum eſt, coloris viridiuſculi, ſaporis dulcis, aromatici. Ex annua planta, quæ copioſe in agro Bambergenſi ſeritur, colligitur. Eligantur ſemina magna, matura, & a ſtipitibus & quisquiliis libera. *Carminativum*, *pnevmonicum & ſtomachicum eſt*. *Ad quatuor ſemina calida majora refertur*.

Aniſi Indici, ſtellati, Philippinarum inſularum, Badiani, *Semence d'Anis de la Chine*, *ou Anis êtoilé*, **Indianiſcher Anis, Stern-Anis.** Externa forma, capſula ſeminali ſtellam repræſentat, dum ex ſex vel ſeptem radiis conſtat,

ſtat, ex eodem centro ortis, qui hiantes grana tot proferunt, quot ſunt radii. Coloris eſt ex fulvo fuſci, ſaporis ex Fœniculi & Aniſi mixti dulcis. Non raro integræ ſtellæ ad nos veniunt. Cujus plantæ fructus ſit, nondum conſtat; creditur eſſe planta, quæ *Evonymo affinis Philippinarum inſularum, Aniſum ſpirans, nuculas in capſulis ſtellatim congeſtis proferens vocatur.* Ex India orientali advehitur, & in Moſcoviam ex Tartaria transportatur, unde forſan *Fœniculum* & *Aniſum Sibirienſe* nominatur. Eligendæ capſulæ vel radii majores, multo oleo dotati, ſaporis ſubdulcis. *Convenit virtute cum ſemine Aniſi vulgaris, penetrantius, gratius & præſtantius tamen eſt.*

Sem. Apii ſativi, *Semence d'Ache*, **Garten-Eppich, Selery-Saamen.** Parvum, ſtriatum, Petroſelini ſemine minus eſt. *Ad calculum & uteri vitia commendatur. Adnumeratur ſeminibus quatuor calidis minoribus.*

Aquilegiae, *Semence d'Ancolie ou d'Ancholie*, **Ackeley-Glockenblumen-Saamen.** Nigrum, parvum, ſplendens eſt. *Tribuitur illi vis alexipharmaca & antiſcorbutica. Commendatur ictericis, vel in ſubſtantia, vel in emulſione, quæ emulſio etiam in peripnevmonia, variolis, morbillis, aliisque febribus exanthematicis, nec non eryſipelate, bono cum effectu datur.*

Aſparagi ſativi, *Semence d'Aſperge*, **Spargel-Saamen.** Plerumque baccæ rubræ, in quibus ſemina, ſeu acini nigri duri includuntur, loco ſeminum proſtant. *Vis adſcribitur diuretica, raro vero in uſum venit.*

Atriplicis hortenſis, albae ſativae, *Semence d'Arroche*, **Melten-Saamen.** Albicans, orbiculatum, compreſſum eſt. *Vim habet emeticam & purgantem, atque ad drachmas duas cum aqua calida propinari ſolet; ictericis inprimis commendatur.*

Aurantiorum, *Semence d'Orange*, **Pommerantzen-Kern, Pommerantzen-Saamen.** *Virtute gaudet alexipharmaca, diaphoretica & anthelmintica. In emulſionibus datur.*

Bardanae, ſeu Lappae majoris, *Semence de Bardane*, **Kletten-Saamen.** Oblongum, fuſcum, nigris ſtriis interſtinctum eſt, ſaporis amaricantis. *Habetur inſigne diaphoreticum & diureticum. Datur in ſubſtantia, vel in emulſione ad drachmam unam & ultra.*

Baſilici, Ocymi vulgatioris, *Semence de Baſilic*, **Baſilgen-Baſilien-Saamen.** Parvum, nigricans, & ſaporis mucilaginoſi eſt. *Ad Uteri affectus commendatur. In aqua maceratum dat mucilaginem, quæ ad aphthas & fiſſuras labiorum & mammillarum utiliter adhibetur.*

Berberum, Acini fructus berberum, *Semence d'Epine vinette*, **Erbſelen-Saamen, Saurachbeer-Saamen.** Sunt acini, ſive arilli oblongi ex fructu, coloris pallidi, ſaporis adſtringentis. Frutex, in qua fructus Berberis naſcitur, ſponte provenit in dumetis ſilvoſis, & incultis locis, alitur etiam quandoque in hortis. Floret Aprili & Majo, & circa finem Septembris fructus perficit. *Semen adſtringit, ſed raro in uſum vocatur.*

Bombacis, Goſſypii fruteſcentis ſemine albo, annui, *Semence de Coton*, **Baumwollen-Saamen.** Eſt coloris

coloris ex nigro cinerei, Pisorum majorum magnitudinis; nucleum condit album, oleosum, dulcem. Gossypium sive Bombax colitur in Cypro, Maltha, Sicilia, & aliis insulis Archipelagi. *Semen vim habet demulcentem, & recens, non rancidum, nephriticis & hecticis prodest.*

Sem. Brassicae rubrae, *Semence de Chou rouge*, **rother Kohl-Saamen.** Rotundum, Sinapi magnitudinis, coloris ex rufo fusci, saporis oleosi, subacris est. Colitur brassica in hortis & agris, & demum altero post sationem anno semina perficit. *Commendantur ad gonorrhœam, vermes necandos & colicam.*

Buniadis. Vide Sem. Napi.

Cannabis sativae, *Semence de Chanvre*, **Hanff-Saamen.** Parvum, rotundum, cineracei coloris, saporis dulcis, oleosi est. *Intus sumtum ventriculum & caput gravat; commendatur a nonnullis in tussi, & ad icterum. Dosis est in substantia, scrupulus unus, ad drachmam unam; præstat in emulsionibus exhibere; externe ad capitis dolores quoque utilibus; nec non ad maculas a variolarum suppuratione contractas delendas.*

Cardui benedicti, *Semence de Chardon benit*, **Cardo-benedicten-Saamen.** Oblongum, teres, striatum est, & scopulam quasi refert, saporis amari. *Vires sunt alexipharmacæ, antipleuriticæ; in variolis & morbillis etiam adhiberi solet. Additur emulsionibus.*

Cardui Mariae, albis maculis notati, vulgaris, *Semence de Chardon Marie*, **Mariendistel, Vehdistel-Saamen.** Oblongum, aliquantum compressum, fuscum est, saporis amaricantis. *Non solum ob signaturam, sed revera antipleuriticum est, atque emulsio exinde parata ad internas inflammationes quascunque conducit.*

Carthami, flore croceo, Cnici, *Semence de Saffran bâtard*, **wilder Saffran-Saamen.** Album, oblongum, angulare est, & sub cortice duriore album, dulcem nucleum condit. Copiose in Alsatia & in agro Argentoratensi colitur Carthamus. Semina sunt eligenda matura, magna, nucleum oblongum, album, pulposum, ponderosum includentia. *Egregium & leve est catharcticum, hydragogum, atque tussientibus, hydropicis, & febre quartana laborantibus convenit. Optime in emulsionibus exhibetur, & a drachmis duabus ad sex dari potest.*

Carvi, Cari, Cumini pratensis, *Semence de Carvi*, **Kümmich, Wiesen-Kümmel.** Planta sponte provenit in pratis, floret Majo, & sequente mense semina maturantur. *Semina carminativa, stomachica & diuretica sunt, atque ad quatuor calida majora referuntur.*

Cataputiae majoris, Ricini vulgaris, *Semence de Ricin, de Chassetaupe*, **Purgier-Körner, Treib-Körner.** Ovalis figuræ atque quodammodo compressæ est, Fabæ minoris magnitudinis, coloris albicantis & cineracei, ex nigro variegati; sub putamine tenui nucleum condit album, saporis acris. Ricinus pertinet ad plantas apetalas. Colitur in hortis, ubi eodem,

dem, quo ſeritur, anno floret; in Ægypto vero ſponte naſcitur & perennat. *Hydragogum & purgans ſatis vehemens eſt; Emulſio ex granis decem vel duodecim,* i. e. *ſeminibus duobus vel tribus, parata vehementer ſerum educit, & hydropicis, non vero emaciatis & bilioſis convenit. Oleum ex ſemine expreſſum externe ad membra paralytica commendatur, atque ad drachmas duas & ultra interne poteſt dari ad ſerum educendum.*

Sem. Cataputiae minoris, Tithymali latifolii, Lathyridis majoris, *Semence d'Epurge*, **Spring-Körner, Treib-Körner.** Seritur in hortis, & quotannis ſe ſponte propagat. Semina ſunt grana rotunda, Piſi magnitudine, nucleus albus a corticoſa ſubſtantia includitur. *Vehementer ſurſum & deorſum purgat, ſed vix aliis, niſi hydropicis exhiberi debet, cum ob nimiam acrimoniam facile inflammationem inteſtinorum excitare poſſit. Caveant etiam pharmacopolæ hæc grana indiſcriminatim divendere, præſertim vero ſuſpectis mulierculis nunquam dari debent. Doſis hydropicis grana quinque ad ſeptem.*

Chærefolii, *Semence de Cerfeuil*, **Körbelkraut-Saamen.** Longum, nigrum, acuminatum, ſaporis acris, aromatici eſt. Seritur in hortis, planta eſt annua. *Seminum vires cum herbæ conveniunt.*

Cichorii hortenſis, ſativi, *Semence de Chicorée*, **Wegwarten-Saamen.** *In emulſionibus, ad hepatis inflammationem commendatur.*

Cicerum rubrorum, ſativorum, flore ex purpureo rubeſcente, *Semence des pois chiches rouges*, **Küchern, Kücher-Erbſen, Zieſern.** Seruntur Cicera verno tempore. *Decoctum commendatur puerperis ad lochiorum fluxum promovendum, nonnulli venerem excitare credunt.*

Cinae, Cynae, Zinae, Zedoariae, Sanctum, Santonicum, contra vermes, *Semence contre les vers*, **Wurm-Saamen, Zittwer-Saamen.** Ex Perſia & Ægypto advehitur. De planta, ex qua hoc ſemen colligitur, nihil certi conſtat, volunt eſſe Abſinthii ſpeciem, quæ *Abſinthium Santonicum Alexandrinum* C. B. vocatur. Alii ex ſeminibus, terræ mandatis, plantam Tanaceti ſimilem proveniſſe, perhibent. Eligantur ſemina ex viridi flaveſcentia, non pulvere & quisquiliis mixta, odoris Zedoariæ, ſaporis acris, amari. *Vermibus adverſatur, & ſtomachicum ac emmenagogum præbet.*

Citri, Mali Citrei, *Semence de Citron*, **Citronen-Saamen.** Ex fructu maturo colligendum. *Calefacit, attenuat, & lumbricos necat; ob magnam amaritiem ingratum eſt, additur tamen nonnunquam emulſionibus in febribus malignis.*

Citrulli, Anguriae, folio Colocynthidis ſecto, ſemine nigro, *Semence de Citrouille*, **Augurien-Waſſer-Melonen-Saamen.** Eligatur recens, non rancidum. *Vim habet refrigerantem & demulcentem. Seminibus quatuor frigidis majoribus adnumeratur.*

Sem. Coccognidii, Laureolae folio deciduo, flore purpureo, Chamæleae, Mezerei, *Semence de Laureole*, **Kellerhals, Seidenbast, Purgier-Körner-Saamen.** Rotundum, Pipere paulo majus, fuscum & urentis saporis est. Frutex est Laureola, quæ Martio in silvis & editioribus locis floret; semina circa auctumnum perficit. *Vehementer, ob vim causticam, purgat, ut non nisi robustissimis concedi debeat; hydropicis tria integra grana ab empiricis dantur. Religiosi medici illius usum merito interdicunt.*

Cochleariae, rotundifoliae hortensis, *Semence de Cochlearia*, **Löffelkraut-Saamen.** Parvum, seminis Papaveris instar est, ex rufo fuscum, rotundum, saporis acris, amaricantis. Seritur in hortis. *Antiscorbuticum est, & cum herba convenit.*

Colocynthidis, *Semence de Coloquinte*, **Coloquinten-Saamen.** Albicans, oblongum & compressum est. Medulla alba, quam sub cortice duriusculo continet, non adeo amara deprehenditur, sicut fructus. *Raro, vel nunquam in usum venit.* Videatur Fructus.

Coriandri vulgaris, sativi, majoris, *Semence de Coriandre*, **Coriander-Saamen.** Seritur in hortis & arvis. Planta est umbellifera & annua. Semen rotundum, saporis aromatici. *Stomachicum, carminativum & antifebrile est. Veteres Coriandrum pro venenato habuerunt, ideo aceto præpararunt, quæ vero sollicitudo & præparatio est inanis.*

Cucumeris sativi, *Semence de Concombre*, **Gurcken-Cucumern-Saamen.** Albicans, oblongum, planum, & saporis oleosi dulcis est. Seritur in hortis. Fructus in usum culinarium cedit. *Semen inter quatuor majora frigida numeratur, refrigerat & demulcet, modo sit recens, non rancidum.*

Cucurbitae, *Semence des Courges*, **Kürbsen-Kern.** Variæ est formæ & magnitudinis, semper tamen planum & album, atque margine cinctum. Colitur in hortis, agris & vinetis, Autumno semen maturescit. *Ob vim refrigerantem seminibus quatuor majoribus frigidis adscribitur. Usus horum seminum est in emulsionibus, quæ nunquam sine sacchαro, ne lentore & mucilagine ventriculum molestent, propinari debent, addito vero saccharo hoc incommodum præveniri potest.*

Cydoniorum, *Semence des coins*, **Quitten-Kern, Quitten-Saamen.** Fulvo colore, & magnitudine Pomorum semina imitatur. Arbores in hortis & vinetis coluntur. *Mucilago e seminibus extracta refrigerat, & tam acrimoniam, quam æstum temperat; in alvi fluxu, ardore & excoriatione linguæ ac faucium cæteris mucilaginosis ob gratiorem saporem præfertur.*

Cymini, Cumini semine longiore, hortensis, Romani, Fœniculi Orientalis, Cuminum dicti, Tournefortii, *Semence de Cumin*, **Römischer Kümmel, langer Kümmel.** Oblongum & striatum, ex flavo spadiceum est. E regionibus calidis, præcipue ex Melita insula, ubi copiose seritur, advehitur. *Ingrati est odoris & saporis; carminati-*

vum

vum tamen, dissolvens & diureticum insigne. Seminibus quatuor majoribus calidis accensetur.

Sem. Cynosbati, Rosarum silvestrium, *Semence d'Eglantier,* **Hägen-Hüfften-Hagenbutten-Saamen.** A lanugine, quæ pruritum & molestiam in ano parit, probe liberari debent. *Laudantur ob lithontripticam virtutem ad calculum præcavendum.*

Dauci Cretici, Candiani, Myrrhidis annuae, semine striato, villoso incanae, *Semence de Daucus de Crete,* **Mohren-Kümmel, Cretischer Vogelnest-Saamen.** Daucus habet folia Fœniculi tenuissima, semina oblonga, incana, superiore parte acutiora; saporis est acris, aromatici, grati. In Creta sponte provenit, colitur etiam in hortis. *Alexipharmacam, diureticam, carminativam & uterinam virtutem habet. Ad Theriacæ & Mithridatii confectionem requiritur.*

Dauci vulgaris Germanici, Pastinacae silvestris, *Semence de Panais, ou Carotte sauvage,* **Vogelnest-wilder Möhren-Saamen.** Floret mense Junio, in segetibus, pascuis & pratis. In medio umbellæ floris purpureus plerumque reperitur flosculus, qui instar Coccionellæ purpureo colore inficit, & ad Epilepsiam commendatur. Dicitur a vulgo **das Vögelein im Nest,** avicula in nido. *Semen cum præcedente, tam forma, quam sapore, convenit, paulo tamen minus est, & saporis non adeo aromatici. Carminativa & diuretica gaudet virtute, & ad semina minora calida refertur.*

Ebuli, Sambuci agrestis arilli vel acilli, *Semence d'Yevle,* **Attich-Saamen.** *Hydragogis adscribuntur, & urinam simul movent. Dantur ex vino, vel in substantia, vel infuso. Oleum ex semine expressum per superiora & inferiora, a drachma una ad unam semis assumtum, purgat, & contra Philtra laudatur.*

Endiviae albae, sativae, Scariolae, Intybi sativae, Cichorii latifolii, Tournefort. *Semence d'Endive,* **Endivien, Winter-Endivien-Saamen.** Parvum, oblongum, albo & etiam alia species nigro cortice tectum reperitur. Colitur planta in hortis, & in usum culinarium cedit. *Seminibus quatuor minoribus frigidis adscribitur. Refrigerat, ictericis & hepaticis prodest, usus est in emulsionibus.*

Erucae, Sinapi hortensis, Sinapi albi, *Semence de Roquette,* **weisser Senff.** Rotundum, parvum, flavescens, & saporis acris est. Colitur in agris & hortis, floret Majo & Junio, Augusto & Septembri semina perficit. *Antiscorbutica & diuretica vi pollet; externe ad sinapismos etiam expetitur. Condimentum illud, quod Mustardam vocant, ex Erucæ & Sinapios semine cum musto parari solet.*

Fabarum, vulgarium, albarum, *Haricots,* **Bohnen.** Sunt semina plantæ annuæ, papilionaceo flore; seruntur in hortis & agris. *Magis in culinarium, quam medicum usum veniunt.*

Farina est cosmeticum & abstersorium, atque ad cataplasmata emollientia & discutientia inservit.

Sem. Fagopyri, Tritici fagini, *Blé noir, Sarrasin,* **Buchweitzen, Heydenkorn, Heidelkorn.** Grana sunt triquetra, oblonga, nigra, quæ sub cortice nigro farinaceam continent substantiam albissimam. Seritur in agris. *Panis, pulmenta & juscula ex Fagopyro cocta, cibum præbent haud ingratum, & inprimis commendari solent in vulneribus & erosione ventriculi atque intestinorum; cataplasma ad inflammationem testium & mammarum laudatur.*

Fœniculi Cretici, dulcis, Romani, majore semine, *Semence de Fenouil doux,* **Römischer, süsser Fenchel-Saamen.** Colitur in hortis, & ex Italia advehitur. Ex cinereo spadiceum, oblongum, striatum, saporis dulcis, grati est. Eligatur recens, multo oleo dotatum, & a stipitibus liberum. *Commendatur ad lac augendum, Calculum & flatus pellendos. Datur in trageis & infusis.*

Fœniculi vulgaris, Germanici, *Semence de Fenouil commun,* **Fenchel-Saamen.** Colitur in hortis, & altero post sationem anno floret & semina perficit. *Semen gaudet virtute carminativa, diuretica, lac auget, & pectori amicum est. Egregium etiam præbet ophthalmicum, & inter semina quatuor majora calida numeratur.*

Fœni græci, Fœnugræci, *Semence de Fenugrec,* **Bocksborn-Saamen.** Granula sunt dura, parva, flava, angulosa, quæ in longis, acuminatis siliquis, corniformibus, crescunt. Saporis & odoris ingrati mucilaginosi. Seritur in agris, floret Junio; annua est planta, & ad papilionaceas refertur. *Usus seminis est externus in cataplasmatibus. Virtute pollet anodyna, emolliente & discutiente. Equis etiam est medicamentum confortans.*

Fraxini, Linguae avis, *Semence de Fresne,* **Eschbaum-Saamen, Vogelzungen.** Fraxinus arbor in silvis provenit. Semen ex longis, planis & ad modum linguæ acuminatis laminis, seu foliolis constat, in quibus ex flavo fuscum semen latet, subacri & amaro sapore præditum, quod excorticatum in usum vocatur. *Adscribitur illi vis diuretica, lithontriptica, antipleuritica, antihydropica & aphrodisiaca.*

Genistae angulosae, Scopariae, *Semence de Genêt,* **Genisten-Pfriemen-Künschroten-Saamen.** Est seminis Lini magnitudine, lutei coloris, aliquantum planum, cordiforme, saporis amaricantis. Provenit in incultis, floret mense Majo & Junio. *Seminis drachma una in pulvere ex aqua exhibita alvum & urinam movet, & hydropicis confert; in majori dosi vomitus excitare solet.*

Hordei, *Semence d'Orge,* **Gerste.** Seritur in agris; est vel hybernum vel vernum, prius ante hyemem, posterius verno tempore seritur. *Virtute demulcente, anodyna, nutriente & refrigerante conveniunt; plerumque in usum vocatur excorticatum. Usus est in decoctis, ptisanis, & externe in cataplasmatibus.*

Hyosciami albi, *Semence de Jusquiame,* **weisser Bilsen-Saamen.** Pallidi coloris, parvum, planum, reniforme, &

& oleosi saporis est; mense Septembri ad maturitatem pervenit. *Stupefacientem vim habet, & merito inter infida medicamenta ponitur, a nonnullis tamen specifice in hæmoptysi commendatur. Ingreditur pilulas de Cynoglossa & Philonium Persicum. Nonnunquam etiam in parva dosi exhibitum funestos edidit effectus, deliria, maniam, sopores, convulsiones lethales; imo etiam externe fumo suscepto, & fomentationibus, deliria movisse, exempla prostant. Dosis in substantia grana octo ad scrupulum semis usque. Hyosciami antidota sunt sinapi, allium, cepæ, & vomitoria.*

Sem. Hyperici, *Semence de Millepertuis*, **Johanneskraut-Saamen.** Parvum, oblongum, cylindriforme, coloris ex rufo fusci, saporis amari, resinosi est. *Vulnerarium, diureticum, antinephriticum & anthelminticum egregium habetur. Datur a drachma dimidia ad integram.*

Lactucae sativae, non capitatae, *Semence de Laitue*, **Lattich-Saamen.** Colitur in hortis. *Semina cum tota planta refrigerant, & biliosis conveniunt, & adnumerantur seminibus quatuor minoribus frigidis.*

Lapathi acuti, *Semence de Patience*, **Mengel- oder Grindwurtz-Saamen.** Fuscum & triangulare, Acetosæ simile est. *Virtute pollet adstringente & alexipharmaca.*

Lappae majoris. Vide Bardanae.

Levistici, Ligustici, *Semence de Levesche*, **Liebstöckel-Saamen.** Oblongum, planum & striatum ac membranaceum est, coloris pallidi, odoris fragrantis, saporis aromatici. Colitur in hortis. *Alexipharmacum, diureticum, carminativum & hystericum censetur.*

Lini sativi, *Semence de Lin*, **Leinsaamen, Flachssaamen.** Seritur in agris. Oblongum, planum, læve, splendens, fuscum & saporis oleosi est. *Vires habet anodynas, emollientes & maturantes. Decoctum vel mucilago tussientibus, phthisicis & pleuriticis commendatur; imo mucilagine hujus seminis, per aliquot septimanas loco jentaculi assumta, colica spasmodica, ex plumbi fumo contracta, quam metallifusores* **Hütten-Katze** *vocant, laborantem, me sola restituisse, memini; externe in cataplasmate dolores mitigat, emollit, discutit, & fœtum mortuum pellere creditur.*

Lupinorum sativorum, flore albo, *Semence de Lupins*, **Feigbohnen, Wolffsbohnen.** Fabæ adæquat magnitudinem, colore est album, figura rotunda, compressum & in medio quasi concavum. Colitur in hortis, semina seruntur vere, planta floret Junio, Julio & Augusto; semina maturitatem Septembri consequuntur. *Interne raro vel nunquam in usum vocantur; externe ad conficienda cataplasmata discutientia inserviunt. Cosmeticum etiam præbent, ob vim abstergentem.*

Lycopodii, Plicariae, Musci clavati, squamosi, vulgaris, repentis, *Semence de Lycopodium*, **Beerlappen-Gürtelkraut-Truttenfußsaamen.** Provenit in ericetis silvæ Martiæ. Pulvis flavescens, qui in clavis reperitur, ab aliis pro semine, aliis pro polline antherarum habetur. *Commendatur tanquam panacea fere ad omnes infantum morbos. Est diureticum, roborans, anodynum,*

num, antihecticum, antepilepticum & travmaticum. Dosis grana sex, scrupulus semis, ad scrupulos duos in adultioribus. Externe valet ad intertrigines, cum Tutia, vel pauxillo Cerussæ mixtum. Flammis injectum tanquam pyrius pulvis fulgurat; hinc inde a nonnullis Sulphur vegetabile *appellatur.*

Sem. Malvae, folio sinuato rotundo, *Semence de Mauve*, **Pappeln-Saamen, Käß-Pappeln.** Est fuscum, semilunare, in parvas placentulas caseoli instar congestum, mucilaginosi saporis. Malva provenit in sepibus, floret Majo, & semina perficit Junio & Julio. *In aqua decoctum, vel in pulvere exhibitum, vim habet demulcentem, antinephriticam.*

Melonum, *Semence de Melon*, **Melonen-Saamen, Melonen-Kern.** Vix a semine Cucumeris distinguitur, crassius tamen & pulposius est. Colitur in hortis, Julio & Augusto maturatur. *Refrigerat, demulcet, nephriticis commendatur, & inter semina quatuor majora frigida numeratur. Sit recens, ponderosum, non rancidum.*

Milii solis, Lithospermi majoris cretici, *Semence de Gremil*, **Meerhirse, Steinsaamen, Perlenhirse.** Rotundum, glabrum, splendidum, album, semine Cannabis paulo minus est. Provenit in segetibus. *Diureticum & lithontripticum est, partum promovet, & ad febrem quotidianam, ante paroxismum ad drachmam integram assumtum, laudatur.*

Napi sativi, Buniadis, *Semence de Navet*, **Stech-rüben-Saamen.** Parvum, rotundum, ex rubro nigrum, saporis acris, amaricantis est. Seritur in agris, & altero post sationem anno floret, & semina perficit. *Alexipharmacæ, abstergentis & attenuantis virtutis est. Datur in emulsionibus.*

Nasturtii hortensis, *Semence de Cresson*, **Kreßig, Garten-Kressen-Saamen.** Parvum, oblongum, ex flavo fuscum, saporis acris est. Seritur in hortis primo vere, & Junio vel Julio semina maturantur. *Commendantur herniosis & scorbuticis, urinam cient.*

Nigellae, Melanthii, Cumini nigri, *Semence de Nielle*, **schwartzer Kümmich, schwartzer Coriander.** Extus nigrum, angulosum & rugosum, intus album est, saporis acris. Colitur in hortis, floret Julio & Augusto. Semina odorem quendam gratum aromaticum spirant. *Incidunt, aperiunt, & urinam movent; ad hydrophobiam & animalium rabidorum morsus, lac augendum, & febres quartanas commendantur, & inter errhina decantata sunt. Multis vero internus usus suspectus est, ob characterem, quem planta habet.*

Orobi, Ervi veri, *Semence d'Orobe*, **Ervensaamen.** Grana sunt spadicea, & aliquantum rotunda, saporis farinacei, amaricantis. Seruntur in hortis, ad plantas flore papilionaceo referuntur. *Semina in decocto ad nephritidem, & in cataplasmatibus ad emolliendos & maturandos abscessus laudantur.*

Papaveris albi, hortensis, sativi, *Semence de Pavot blanc*, **weisser Mag-Mohnsaamen, Oelmagen-saamen.** Album, valde minutum, saporis subdulcis, oleosi est. Colitur in hortis, floret Junio, Julio & Augusto; eligatur recens, ma-

maturum, ponderosum. *Virtutis est anodynæ, lenitivæ & demulcentis. Datur in emulsionibus.*

Sem. Papaveris nigri, hortensis, semine nigro, *Semence de Pavot noir*, schwartzer Mag-Saamen. *Cum præcedente convenit magnitudine & virtute.*

Perfoliatae, *Semence de Percefeuille*, Durchwachs-Saamen. Ex nigro fuscum, oblongum, in uno latere convexum, in altero aliquanto planum, & quasi crenatum, saporis subamari, acriusculi. *Adstringit, & herniosis tam interne, quam externe commendatur.*

Petroselini Macedonici, Apii saxatilis, petræi, *Semence de Persil Macedoine*, Stein-Eppich, Stein-Peterlein, Macedonisch Petersil. Petroselini vulgaris semine paulo longius & tenuius, striatum & villosum, obscure viride, acris, aromatici saporis, odoris fragrantis est. Colitur in hortis. *Cum semine Apii convenit; alexipharmacam, diureticam & carminativam habet virtutem, & ad Theriacæ compositionem requiritur.*

Petroselini vulgaris, *Semence de Persil*, Petersilien-Saamen. Est oblongum, striatum, parvum, saporis aromatici, subacris. Seritur in hortis. *Alexipharmacum & diureticum est.*

Plantaginis, *Semence de Plantain*, Wegerich-Saamen. Minutissimum est, longiusculum, fulvum, saporis mucilaginosi. *Adstringit & refrigerat; ad calculum, hernias, sanguinis & alvi fluxiones commendatur. Refertur a nonnullis ad semina quatuor minora frigida.*

Pœoniae, folio nigricante maris, *Semence de Pivoine*, Gicht-Rosen-Saamen. In cortice nigro, splendente rotundum, Pisi magnitudinis, nucleum album, ingrati saporis continet. *Habetur antepilepticum & anodynum. Nonnunquam vomitus excitasse, & alvum movisse, B.* Bœrhave *auctor est.*

Portulacae hortensis, latifoliae, sativae, *Semence de Pourpier*, Burtzel, Burtzelkraut-Saamen. Valde exiguum, nigrum, & saporis oleosi est. Seritur in hortis, & autumno semina perficit. *Semen refrigerat, & seminibus quatuor minoribus frigidis adscribitur.*

Psyllii, Pulicariae, *Semence de l'herbe aux pouces*, Psillienkraut, Flöhkraut-Saamen. Puliciforme, fusci coloris, saporis mucilaginosi, & parum acris est. Colitur in hortis, in calidioribus regionibus sponte luxuriat. *Virtute gaudet refrigerante, demulcente & laxante; biliosis convenit; mucilago extracta ad faucium & linguæ siccitatem, nec non anginam confert.*

Raphani, *Semence de Raifort*, Rettig-Saamen. Rotundum, rufi coloris, saporis acris est. Colitur in hortis; radices cedunt in victum. *Semina incidunt, & urinam movent.*

Raparum sativarum, *Semence de Rave*, Rüben-Saamen, weisser Rüben-Saamen. Est Raphani minus, fuscum,

fuſcum, rotundum, ſaporis oleoſi, acris. *Cum ſemine Napi convenit, & in emulſionibus ad variolas & morbillos expellendos datur.*

Sem. Ruſci, *Semence de Houx-frelon*, **Mausdorn-Saamen.** Bacca eſt rotunda, ex fuſco rubra, quæ ſemen continet nigrum, ſaporis ſubdulcis. *Diuretica & abſtergente gaudet virtute, & cum radice convenit; raro, vel nunquam, niſi ad Electuarium benedictum laxativum in uſum vocatur.*

Rutae hortenſis, *Semence de Rüe*, **Rauten-Saamen.** Nigrum eſt, parvum, figuræ ſemilunaris, ſaporis acris, amari. Perennat, & colitur Ruta in hortis, floret per æſtatem, & ſemina matura profert autumno. *Commendatur ad ſingultum a flatibus ortum, lumbricos enecandos, gonorrhœam, urinam & menſtrua pellenda.*

Sabadilli, *Semence de Sabadillum*, **Mexicaniſcher Laus-Saamen.** Figura & colore nigreſcente Muſcerdam refert, & in capſulis oblongis, gibboſis, quaſi corniculatis, trilocularibus adfertur. Saporis eſt fervidi, amari, ingrati ſicut ſtaphidis agriæ, odoris nullius. Maſticatum ſalivam ciet, atque acrimonia cauſtica fauces afficit, & nauſeam excitat. E Mexico, Americæ regno advehitur, &, quantum ex capſula ſeminali & effectu conjicere licet, veratri vel aconiti eſt ſpecies. *Miræ contra pediculos eſt efficaciæ, quos vix adplicitum, magis præſentaneo effectu, quam mercurius vel ſtaphidis agriæ, perimit. Semen cum capſula ſeminali in pulverem teritur, & vel ſolus pulvis, vel axungia ſuilla exceptus adplicatur. Milites, religioſi & nautæ, ſuturas veſtium hoc ſemine fricare ſolent, atque ſe contra hos alias infenſiſſimos hoſtes reddunt ſecuros.*

Sambuci, *Semence de Sureau*, **Hollunder-Saamen.** Sunt arilli, ſive acini ex baccis Sambuci. *Oleum inde expreſſum alvum laxat, & ſerum educit, ad drachmas duas ſumptum, ſpecifice contra philtra commendatur.*

Santonicum, vide Sem. Cinae.

Saxifragiae albae, vide Radices ejusdem.

Scariolae, vide Sem. Endiviae.

Seſami, Digitalis Orientalis, Seſamum dictum, Tournefort. *Semence de Seſame, ou Jugeoline*, **Leindotter, Flachsdotter-Saamen.** Ex Ægypto, Sicilia & Italia advehitur. Eligenda ſemina albicantia, oleoſa, dulcia. *Emolliunt, reſolvunt & digerunt. Ægyptiis in cibum cedunt.*

Seſeli Cretici, Tordylii minoris, *Seſeli de Candie*, **Seſel-Saamen, Cretiſcher Berg-Kümmel.** Oblongum, ſtriatum & depreſſum, coloris obſolete viridis, ad fuſcum inclinantis, ſaporis acris, aromatici eſt. Sponte provenit in Candia, in incultis Apuliæ, & aliis calidis regionibus. *Diuretica, carminativa, & uterina pollet virtute.*

Seſeli Maſſilienſis, Sileris montani, *Seſeli de Montagne*, **Seſel-Saamen, Berg-Kümmel.** In Gallia Narbonenſi & Provincia, in viis & locis incultis provenit, floret

Auguſto

Augusto & Septembri. Semina colliguntur Novembri. Depressum & oblongum est semen. Eligendum viridiuscule pallidum, saporis acris, aromatici, succi plenum. *Carminativum est, alexipharmacum, diureticum & emmenagogum. Ad Theriacam assumitur.*

Sem. Sinapi, Rapi folio, semine rufo, *Semence de Moutarde*, **rother Senff=Saamen.** Perfecte rotundum & saporis acris est. Seritur in agris, floret Majo & Junio; semina mense Augusto & Septembri perficit. *Frequens ejus est usus ad mustardam parandam. Incidit, attenuat, diuresin promovet; externe ad sinapismos adhibetur.*

Sophiae Chirurgorum, Nasturtii silvestris tenuissime divisi, Sisymbrii annui, Absinthii minoris folio, Tournefort. *Semence de Sisymbrium*, **Sophienkraut=Well=Saamen, Habicht=Saamen.** Minutissimum, oblongum, rufum, & saporis acris est. Provenit in locis incultis, circa vias & in arenosis. Floret per æstatem, & semina simul matura perficit. *Vulneraria & mundificante, anthelmintica & diuretica pollet virtute.*

Staphidis agriae, Herbae pedicularis, Delphinii Platani folio, Tournefort. *Semence de Staphis aigre*, **Staphis=Körner, Lause=Körner.** Est triangulare, asperum, nigro gryseum, saporis acris, nauseosi, & ingrati odoris. Nascitur in calidis regionibus, Hispania, Italia, Gallia, nonnunquam in hortis colitur. *Ad purgantia acria, drastica pertinet, tam per superiora, quam inferiora evacuat; raro igitur interne adhibetur. Usus est decocti, in ore detenti, ad dolores dentium; frequentius autem, ad pediculos necandos, in pulvere & unguento adhibetur.*

Sumach, Rhois Ulmi folio, Rhus coriarii, culinariae, obsoniorum, *Semence de Sumach*, **Gerberbaum, Färberbaum=Saamen.** Colitur in hortis, sponte etiam provenit in calidioribus regionibus, præcipue in Hispania. Sunt baccæ orbiculatæ, villosæ, parvæ, rubentes, quæ nucleum seu semen orbiculatum includunt. *Adstringunt, & in fluxionibus alvi & sanguinis conferunt.*

Tanaceti, *Semence de Tanesie*, **Rheinfarn=Saamen.** Saporis aromatici, amari est, & cum semine Cinæ convenit. *Egregium præbet carminativum & anthelminticum; laudatur etiam uterinum & emmenagogum.*

Thlaspios arvensis, *Semence de Thlaspi*, **Bauren=Senff, Besenkraut=Saamen.** Oblonge rotundum, parvum, fuscum, saporis viscosi, acris est. Provenit in locis incultis, apricis & saxosis, floret Majo & Junio. *Urinam potenter movet, & ad aperiendos abscessus internos commendatur.*

Violarum, purpurearum, martiarum, *Semence de Violette*, **blauer Violen=Saamen.** Albicans, rotundum, splendidum, & saporis oleosi, subacris est. Violæ florent Martio & Aprili, & semina mense Junio ad maturitatem perveniunt. *Virtute pollent diuretica, leniter laxativa. In emulsionibus dantur.*

X 2 Sem.

Sem. Viticis, vide Sem. Agni caſti.

Urticae Romanae, piluliferae, Hiſpanicae, ſemine lini, *Semence d'Ortie Romaine*, **Römiſcher Neſſel-Saamen.** Fuſcum, ſplendens, Lini ſemine minus, ſaporis parum acris eſt. Colitur in hortis apud nos, in regionibus calidis ſponte provenit. *Commendatur ad affectus pulmonum, aſthma, tuſſim ferinam & pleuritidem, nephriticis prodeſt, & in pulvere, vel, quod præſtat, in emulſionibus propinatur.*

Urticae, urentis, vulgaris, racemiferae, *Semence d'Ortie*, **Brenn-Neſſel-Saamen.** *Diureticum eſt, & ſubadſtringit.*

Zedoariae, vide Sem. Cinae.

CAPUT V.

DE FRUCTIBUS, BACCIS ET NUCLEIS.

Acaciæ germanicæ, noſtratis, Pruna agreſtia, *Prunelles ſauvages*, **gedörrte Schlehen.** Autumno maturæ colliguntur & exſiccantur. *Refrigerant & adſtringunt, in gargariſmis ad uvulæ relaxationem, & gingivas relaxatas proſunt. Præcipuus recentium uſus eſt ad ſuccum inde exprimendum, qui ſucco Acaciæ Ægyptiacæ ſubſtitui poteſt.*

Alkekengi, ſeu Halicacabi baccæ, Solani veſicarii, *Coquerets*, **Juden-Kirſchen.** In vineis & ſilvis umbroſis proveniunt, florent Junio & Julio, & autumno fructus in veſica incluſi maturitatem adipiſcuntur. *Refrigerant, urinam movent, & calculoſis proſunt.*

Amygdalæ amaræ, *Amandes ameres*, **bittere Mandeln.** Arbor primo vere floret, & ab Amygdalo, dulces fructus proferente, non differt. Colitur in hortis, ſed raro occurrit, inter alias amygdalos dulces in tractu Rheni & regionibus calidioribus frequentior. *Utplurimum ad oleum exprimendum in uſum vocantur. Vulpibus, Pſittacis & aliis animalibus carnivoris lethales ſunt.*

Amygdalæ dulces, *Amandes douces*, **ſüſſe Mandeln.** Amygdalus ſativa colitur in hortis & vineis, copioſe provenit in Provincia, Languedocia & aliis calidis regionibus. Eligantur majores, quas *Ambroſinas* vocant, non rancidæ, nec verminoſæ. *Ad emulſiones & oleum conficiendum præcipuus earum eſt uſus.*

Anacardium, eſt arboris Malabaricæ, Oepatæ dictæ, fructus, *Anacardes*, **Elephanten-Lauß.** Orientale figuræ cordis compreſſi, occidentale vero reniforme eſt, & *Acajou* vocatur, nigricat utrumque, ſub involucro duplici nucleum ſolidum albicantem, ſaporis ſubdulcis, condit; inter hoc involucrum ſuccus oleoſus, ſaporis acris & exurentis reperitur. *Nucleos ventriculum roborare*

&

& venerem ſtimulare perhibent; ſuccus oleoſus ad ſcirrhos reſolvendos, & clavos pedum extirpandos commendatur. Raro in uſum venit medicum, ipſa etiam Confectio Anacardina obſoleta eſt.

Been, Balanus myrepſica, Glans unguentaria, *Ben*, **Ben.** Fructus eſt arboris cujusdam in Syria & Arabia naſcentis, & ab incolis ad montem Sinai *Pharagon* dictæ, avellanæ magnitudinis, triangularis, in putamine corticoſo, cinereo nucleum pinguem condentis. *Olei acris amari plenæ ſunt Balani, quod, cum non facile ranceſcat, & odoris plane expers ſit, variorum florum ſuavi odore facile inficitur, & fraudulenti mercatores olea deſtillata hoc oleo inquinare ſolent. Fructus raro apud pharmacopolas reperitur, & rarioris eſt uſus.*

Berberes exſiccatæ, Oxyacanthæ fructus, *Berberis seché*, **gedörrte Saurach-Beerlein, Erbſelen, Weinnägelein.** Baccæ ſunt oblongæ, in racemis congeſtæ, per maturitatem rubræ, acido grato ſapore præditæ. Frutex ſponte in dumetis & ſilveſtribus locis provenit, floret Aprili, & maturos fructus menſe Septembri offert. *Baccæ refrigerant, bilem refrænant, & æſtum ſanguinis temperant; ſiccatæ in decoctis adhibentur.*

Cacao, Cacavahe, Avellanæ Mexicanæ, *Cacao*, **Cacau, oder Chocolade-Frucht.** Arbor a Barbaris *Cacahuſe*, aliis *Cacao Cacavifera*, Botanicis vero recentioribus *Theobroma* vocatur. Flos ſurgit ex calice pentaphyllo roſaceus, piſtillum tubi cujusdam multiſciſſi laciniis cinctum mutatur in fructum cucumeriformem, quinquangularem, ſtriatum, ſeminibus ſeu nucleis, in quinque utplurimum acervulos oblongos collectis, fœtum, qui amygdalarum formam habent, & fiſſiles ſunt. Naſcitur in locis uliginoſis, pinguibus, riguis Americæ calidioribus. Theobroma dicta eſt arbor, cum fructus baſin ſternat potionis ſaluberrimæ, maxime nutrientis, *Chocolate* Mexicanis, Europæis quondam ſolis Magnatibus propriæ, (βρωμα των θεων, vos Deos feci, dixit Deus de imperantibus,) licet nunc vilioris factæ. *Non ſolum vero ad Chocolatæ confectionem requiruntur fructus, ſed & oleum ex illis exprimitur dulce, grati ſaporis, copioſum, quod ſevi inſtar frigeſcens coagulatur, & ſub nomine Butyri Cacao venit, de quo inter olea expreſſa.*

Capita Papaveris, Codia, *Têtes de Pavot*, **Mohnhäupter, Mohnköpff.** Capſulæ ſunt ſeminales Papaveris ſativi, globoſæ, utplurimum nucis juglandis, non raro Mali mediocris magnitudine, coronatæ quaſi, & operculis ſtellatis tectæ, ſemen nunc nigricans, nunc album continentes. Aſſervantur cum & ſine ſeminibus. *Vires ſunt eædem, quæ ſeminum, magis tamen narcoticæ. Ad Diacodii confectionem & pediluvia eorum eſt uſus.*

Caricæ, Ficus paſſæ, *Figues ſeches*, **dürre Feigen.** Sunt fructus Ficus arboris ſativæ. Variæ & multæ earum numerantur ſpecies; optima cenſetur *Ficus ſativa, fructu parvo, ſerotino, albido, intus roſeo, mellifluo, cute lacera Tournefortii.* Hæ, in minutis e ſpartio paratis corbibus, ex Marſilia afferuntur, & **Marſilianiſche Korb-Feigen** vocantur. Eligantur pingues, non verminoſæ. Vocabulum *Ficus* in officina denotat recentes fructus, *Carica* vero Ficum exſiccatam vel paſſam ſignificat. *Demulcent humores acres, & in raucedine, nephritide, ardore urinæ, & tuſſi ſicca commendantur. Decoctum in variolis laudatur; externe emolliunt, maturant & leniunt.*

Carpobalſamum, *Carpobalſam*, **Balſam-Körner, die Frucht vom Balſam-Baum.** Sunt grana, ſeu baccæ oblongæ, pediculo donatæ, brevi, cortice rugoſo, fuſco, quatuor coſtis diſtincto, odoris & ſaporis aromatici, grati. Planta, in qua naſcuntur, eſt Balſami Syriaci Arbuſcula; Creſcit hæc ad Liguſtri vel Cytiſi altitudinem, cortice eſt veſtita ſubrubro, ramuli longi, recti, graciles, paucis foliis inordinatim referti, ſunt ejusdem coloris. Folia Rutæ ſimilia, perpetùo virentia, alata, impari numero vel terna, quina aut ſeptèna, deprehenduntur. Flores parvi, albi, Acaciæ proximi, terni ſingulis alis vel extremitatibus ramulorum, quaſi in umbellæ forma inſident, ſumme odorati. Patriam agnoſcit Arabiam felicem, & in pluribus locis etiam arenoſis & ſterilibus, prope *Meccham* & *Medinam*, nec non citra villam quandam *Bedruniam* ab Arabibus vocatam, ubi mons prægrandis arenoſus, innumeris Balſami arbuſculis refertus, ſponte naſcitur; parum vero vel nihil ex his ſilveſtribus fruticibus Balſami producitur, ſemina tamen vel fructus ferunt copioſos. Incolæ igitur, ut Balſamo fœcundas reddant arbuſculas, in Balſameta & pingue ſolum transferunt, atque diligenter colunt. Non ſolum autem in Arabia felici, ſed etiam in Ægypto Balſami arbuſculæ in hortis ad hunc finem conſtructis aluntur. Carpobalſamum eſt eligendum grave, oleo vel balſamo fœtum, ſaporis cum Opobalſamo convenientis. *Raro in uſum venit medicum, ad Theriacæ vero compoſitionem requiritur. Stomachicum, nervinum, vulnerarium atque diureticum eſt.*

Caſſia fiſtula, Siliqua purgatrix, *Caſſe en bâton.* Siliqua eſt longa, rotunda, nigricans, includens ſub putamine corticoſo, in loculamentis, ſemina depreſſa, fulva, & pulpam ducem nigricantem. Optima cenſetur Alexandrina, ſive Orientalis. Advehitur etiam ex America, quæ longe craſſiores & breviores ſiliquas, pulpam vero ſaporis amariuſculi, & virtute purgativa præſtantiorem habet. Siliquæ eligi debent recentes, graviores & medulla plenæ. *De virtute hujus medullæ videatur Pulpa Caſſiæ.*

Ceraſa acida, exſiccata, *Ceriſes aigres ſeches*, **ſaure Kirſchen, Wein-Kirſchen, Weichſeln.** Sunt fructus Ceraſi ſativæ, fructu acido, ſerotino, ſucco ſanguineo. Colitur arbor in hortis, fructus perficitur Junio & Julio. *Ex recentibus ſuccus exprimitur pro confectione Syrupi; e ſiccatis parantur decocta pulchre rubentia, bilioſis ad æſtum ſanguinis & ſitim ſedandam utilia.*

Ceraſorum Nuclei, *Noyaux des Ceriſes*, **Kirſchen-Kern.** Ex omnibus Ceraſorum ſpeciebus colliguntur. *In emulſionibus adhibentur. Sunt anodyni & diuretici.*

Coccognidium. Vide Semina.

Cocculi Indi, Cocculæ Orientales, vel de Levante, *Coques de Levant*, **Köckel-Körner, Fiſch-Körner.** Ex Oriente afferuntur. *Arbor a Rajo, Solanum Indicum arboreſcens; cocculos Indos* ferens, & in *Horto Malabarico*, *Natſiatam* vocatur, & *foliis cordiformibus, floribus monopetalis quinque partitis, candidis, fructibus racematim congeſtis*, deſcribitur. Fructus eſt baccarum Lauri magnitudine, rotundior tamen, fuſco & rugoſo cortice tectus. *Pernicioſi ſunt, atque nunquam in medicina adhiberi intus ſolent. Pediculos enecant, & ad capiendos piſces inſerviunt.*

Coffée, Caffée, Caffea, *Caffé*, **Coffe, Caffe-Bohnen.** Eſt fructus, ſive nucleus arboris *Bon* vel *Ban*, quæ a nonnullis *Jaſminum*

Ara-

Arabicum, *Lauri folio*, vocatur. Folia habet Lauri, majora, ſemper virentia, pinnata; calix floris eſt quinquefidus, flos infundibuliformis, bacca ſubrotunda, ceraſi magnitudinis, ex carne molli, dulci, viſcoſa, & nucleo bifido conſtat. Sponte provenit arbor in Oriente, præſertim in Arabia & Perſia; in Americam translata, magna in quantitate colitur, neque infrequenter in hortis botanicis reperitur. Baccæ vel ceraſa nunquam in uſum veniunt medicum, quamvis viſcoſa ſua ſubſtantia acrimoniam demulcere valeant; ſemina vero bina, ſibi invicem parte plana cohærentia, & folliculo membranaceo tecta eo frequentius. Variæ nobis afferuntur Coffée ſpecies, quæ ratione bonitatis differunt; ex omnibus optima habetur, quæ ex Oriente affertur, atque *Caffée de Levante* appellatur, quæ cæteris eſt minor, & coloris pallidi; hanc ſequitur alia viridiuſculi coloris; infimæ notæ eſt, cujus ſemina ſunt majora, ex albo flaveſcentia. *Uſtulata, & in pulverem redacta, cum aqua coquuntur, & decoctum, addito Saccharo, fervens ſorbillatur. Ad roborandum ventriculum, juvandam coctionem, & ſpiritus excitandos, laudatur, virtute antihypnotica etiam celebratur. Convenit igitur magis phlegmaticis, & illis, qui frigidioris ſunt temperamenti, quam biliosis & macilentis, quorum ſpiritus inquietos & agiles reddit.*

Colocynthis, fructu rotundo minor, *Coloquinte*, **Coloquinten.** Adſcribitur plantis pomiferis, & a cæteris cucurbitaceis folio, in profundas lacinias diſſecto & fructu amaro, differt. Fructus, Pomi mediocris magnitudinis, cortice cingitur duro, flavo, quo vero, antequam ad nos venit, orbatur; in ſubſtantia alba, levi, fungoſa, ſemina albicantia, plana includit. In Syria & cæteris orientalibus regionibus provenit. Eligatur a cortice exteriori mundata, alba, levis. *Vehementiſſimam vim habet purgantem, ut ſuſpectis mulierculis nunquam dari debeat. In ſubſtantia nunquam, ſed in vino infuſa & in petia ligata, atque in compoſitione Trochiſcorum Alhandal, qui inde parantur, medico inſervit uſui. Optimum, vires draſticas Colocynthidis corrigens, habetur* Nux Moſchata *vel* Macis.

Corna, arboris, Corni hortenſis, fructus exſiccati, *Cornouilles*, **Cornel=Kirſchen, Ruhr=Kirſchen, Dürlützen.** Floret arbor, quæ in hortis colitur, menſe Martio, fructus vero maturos menſe Julio perficit. *Refrigerant & ſiccant, & in fluxionibus alvi, atque ad ſitim reſtinguendam commendantur. In decoctis adhibetur fructus exſiccatus; ex recentibus Roob Cornorum paratur.*

Cubebæ, vide Aromata.

Cupreſſi Nuces, *Noix de Cyprés*, **Cupreſſen=Nüſſe.** Sunt coni *arboris Cupreſſi*, quæ in Creta inſula copioſe provenit, atque apud nos frequenter in hortis colitur. Ad coniferas pertinet, & perpetua fronde viret. *Nuces ſive coni adſtringunt; in diarrhœa, mictione involuntaria, & ubi adſtrictione opus eſt, vel in pulvere, vel infuſo ac decocto tam interne, quam externe adhibentur.*

Cydonia exſiccata, *Coins*, **gedörrte Quitten.** Sunt fructus *arboris Cydoniæ*. Colitur in hortis & vineis, floret Aprili & Majo, fructus Octobri maturat. *Adſtringunt & roborant, ſitim & æſtum temperant. Vulneribus, telis vel aliis inſtrumentis bellicis intoxicatis, inflictis, bono cum effectu imponitur cataplaſma, ex carne cydoniorum cocta, quod & de Succo Cydoniorum* Foreſtus *affirmat.*

Cynosbata, *Cynorrhodons, ou Gratte-cu*, **Hüfften, Hagenbutten.** Sunt fructus *Roſarum ſilveſtrium*, exemptis ſeminibus & lanugine abſterſi, ſiccati. *Adſcribitur eis vis diuretica, aperitiva; laudantur*

 ad

ad sodam sive ardorem ventriculi in pulvere exhibiti, & a nonnullis in decoctis pro potu adhibentur.

Dactyli, *Dactes, Dattes*, **Datteln.** Sunt fructus *Palmæ* majoris, vulgaris, dactyliferæ. Vocantur etiam *Palmulæ* & *Caristæ*. Figura sunt oblongi, rotundi, Glandium majorum magnitudine & forma; includunt sub dulci carne nucleum durum, oblongum, per longitudinem sulcatum. Nascuntur in Syria, & Ægypto, aliisve calidis orientalibus provinciis. Eligendi sunt magni, fulvi, parum rugosi, molles, carnosi, saporis mellei, vinosi. *Vires habent demulcentes; hinc in catarrhis, tussi & faucium asperitate, calculo, nephritide & dysuria utiles sunt.*

Ebuli Baccæ exsiccatæ, **Attich-Beer.** Vide Semen Ebuli.

Faba S. Ignatii, Faba febrifuga, Nux Vomica legitima Serapionis Camelli, *Feve de S. Ignace*, **St. Ignatius Bohnen.** Sunt semina oblonga, Avellanæ nuci cum putamine paria, nonnunquam paulo majora, nodosa, durissima, corneæ quasi substantiæ, saporis intense amari, coloris glauci. Nascitur in planta cucurbitifera, Malabathri folio scandente, *Catolongay* & *Contara* Philippinis Orientalibus dicta; in uno fructu viginti & plures hujusmodi fabæ reconduntur, molli flaventeque pulpa ab invicem distinctæ. Facile fiunt cariosæ, quæ rejiciendæ. *Venenis resistere, febres quartanas curare, urinam & menses provocare creditur. Nimis largam dosin vertiginem & vomitus, sudores frigidos, & animi deliquia excitasse*, Rajus *in* H. Pl. *auctor est. Dosis in substantia grana sex, adultiori etiam grana decem dari possunt. Vino infusa amaritie illud, Centaurii minoris instar, inficit.*

Gallæ, *Noix de Galle*, **Galläpffel.** Plerumque inter fructus ponuntur; sunt vero excrescentiæ morbosæ a puncturis insecti cujusdam, ovula deponentis, ortæ. In Robore, Quercus specie, nascuntur. Præferuntur cæteris illæ, quæ ex Aleppo & Smirna advehuntur, atque nigræ, nodosæ, aculeatæ, ponderosæ & minores sunt; flavescentes vero magnæ & leves improbantur. *Virtutis sunt adstringentis, & pro Febrifugo habentur. Decoctum ad examinandas Aquas minerales inservit, & cum Vitriolo Martis exhibet atramentum.*

Glandes quercinæ, *Glands*, **Eicheln.** Fructus arboris notissimæ, Quercus vulgaris. Diversæ sunt Quercus species, quæ tamen omnes virtute conveniunt, glandes vero vel magnitudine, vel sapore distinguuntur. *Esculus* dulces habet glandes; *Ilex* & ceteræ amaras. *Virtute pollent adstringente, & in alvi fluxionibus atque urinæ incontinentia commendari solent.*

Grana Kermes, Grana Tinctorum, *Kermes, ou Graines d'Ecarlate*, **Scharlach-Beer, Carmesin-Beer.** Eandem originem, quam Gallæ, habent, & in foliis *Ilicis coccigeræ aculeatæ*, e puncturis & depositione ovulorum insecti cujusdam nascuntur. Ex Monspeliensi agro ad nos veniunt. Eligenda sunt grana rubicundo-fusca integra. *Ex his granis Succus vel potius Syrupus Chermes & Confectio Alkermes parantur. Modice adstringunt, & Cardiaca creduntur.*

Grana Paradisi, vide inter Aromata.

Grana Tiglia, *Pignons d'Inde, ou Graines de Tilli*, **Purgier-Körner.** Sunt *Ricini Indici* arborescentis, *Pavana* incolis dicti, fructus oblongi, ovales, Ricini vulgaris magnitudine, coloris cinerei, putamine tecti, quod condit nucleum saporis acris. Seritur & colitur

litur in Malabaria hæc arbor, & magni ab incolis æſtimatur. Truncus ſuppeditat *Lignum Moluccenſe. Vehementer purgant, hinc perſonis ſuſpectis nunquam, & aliis ſumma cum circumſpectione dari debent, ſerum potenter educunt, & in hydrope nonnunquam laudabilem præſtiterunt effectum. Ob excedentem acredinem, fauces, palatum, & nonnunquam anum inflammant. Corriguntur Succo liquiritiæ, aromatibus, vel viſcoſis. Doſis granum unicum fructus, vel grana ſex ponderis medicinalis.*

Granatorum poma, vide Cortices.

Hederæ Baccæ, *Bayes de Lierre*, **Eppheu-Beer.** Sunt fructus Hederæ arboreæ corymboſæ, ſeu fructibus in corymbos digeſtis. *Purgant per ſuperiora & inferiora, laudantur ad febres intermittentes, & philtra. Doſis drachma dimidia ad integram, ex aceto vel vino.*

Hippocaſtanum vulgare, Caſtaneæ, equinæ, folio multifido, *Marons d'Inde*, **Roß-Câſten, wilde bittere Caſtanien.** Arbor olim in Germania rara, nunc frequenter occurrit. *Nucleus in pulverem redactus præbet errhinum, & ſerum copioſum e naribus educit, atque hemicranicos dolores nonnunquam mitigaſſe compertum eſt. Cæterum equis anheloſis & tuſſientibus cum pabulo exhibitus opem fert.*

Jujubæ, *Jujubes*, **rothe Bruſtbeer.** Sunt fructus arboris *Ziziphi*, ſive *Jujubæ majoris*, magnitudine olivari, coloris rubri, ſaporis dulcis, mucilaginoſi, continentes oſſiculum unicum. In Italia, Hiſpania & Botanophilorum hortis colitur. A Linnæo *Rhamnus, floribus digynis, aculeis geminatis rectis, foliis ovato-oblongis*, vocatur. Eligantur recentes, ſucculentæ, non putridæ ac carioſæ. *Demulcent & humectant, exhibentur in decoctis, maxime pectoralibus.*

Juniperi Baccæ, *Bayes de Genevre*, **Wachholder-Beer.** Sunt fructus Juniperi vulgaris, ubique in ſilvoſis, montoſis, & ericetis obviæ, flores a fructu ſunt remoti. Colligantur baccæ maturæ, magnæ, nigræ, reſinoſæ. *Incidunt, reſolvunt, urinam cient, carminativæ & alexipharmacæ ſunt.*

Lauri Baccæ, *Bayes de Laurier*, **Lorbeeren.** Arboris *Lauri latifoliæ* fructus rotundus, nigricans, ſub putamine tenui nucleum geminum includens, ſaporis amari, aromatici. Arbor habet flores pentapetalos, fructum per maturitatem ſiccum, monococcum. Sponte gignitur in Italiæ ſepibus & ſilvis, colitur apud nos in hortis. *Menſes & urinam cient, in affectionibus colicis, & ventriculi frigidis conducunt.*

Meſpili Fructus exſiccati, *Nefles ſeches*, **gedörrte Meſpeln.** Fructus arboris ejuſdem nominis, folio laurino non ſerrato. Colitur in hortis, floret Majo, & autumno fructus abſolvit. *Refrigerant & adſtringunt, arilli laudantur ad calculum.*

Myrobalani Belliricæ, rotundæ, *Myrobolans Bellerics*, **Belliriſche Myrobalanen.** Gallarum majorum magnitudinem, figuram rotundam, nonnunquam anguloſam obtinent.

Myrobalani Chebulæ, *Myrobolans Chebules*, **groſſe ſchwarzbraune Myrobalanen.** Omnium ſunt maximæ, oblongæ, rugoſæ. Ex arbore Myrobalanifera, Perſici folio, colliguntur.

Myrobalani citrinæ, *Myrobolans citrins*, **gelbe Myrobalanen.**

balanen. Sunt arboris, Sorbi folio, Myrobalaniferæ fructus oblongi, rotundi, pentagoni, rugosi, Chebulis Myrobalanis minores.

Myrobalani Emblicæ, *Myrobolans emblics*, **Aschfarbe Myrobalanen.** Fructus arboris foliis minutim incisis, rotundi, nigri, sessiles, sexangulares.

Myrobalani Indæ, *Myrobolans Indiens noirs*, **Indianische schwarze Myrobalanen.** Arboris Myrobalaniferæ, Salicis folio, fructus oblongi, superficie octangulari, rugosi, solidi & duri, intus & extus coloris nigri. Myrobalaniferæ arbores ad Pruniferas referuntur, & in multis Indiæ Orientalis regionibus reperiuntur. Eligendæ sunt carnosiores & ponderosiores. *Adscribebant veteres Myrobalanis citrinis bilem flavam, Indis bilem atram, Chebulis, Belliricis & Emblicis pituitam & bilem educendi facultatem.*

Myrti Baccæ, *Bayes de Myrte*, **Myrten-Beer.** Sunt fructus *Myrti communis Italicæ*, oblongi, nigri, umbilicati, triloculares, multis seminibus reniformibus fœti, saporis acerbi, adstringentis. Advehuntur ex Italia & Gallia. *Refrigerant & adstringunt, tam interne, quam externe adhibentur; raro tamen in usum veniunt, & plerumque Baccæ Myrtilli, seu Vitis Idææ illis substituuntur.*

Myrtilli exsiccati, *Bayes de Myrtille*, **Heidelbeer.** Planta in ericetis nascitur, floret Majo, flos urceolum refert, & mense Julio & Augusto fructus maturantur. *Frigidi sunt & subadstringunt, febrium calorem mitigant, & in decoctis, quæ pulchro colore inficiunt, adhibentur.*

Nuces Vomicæ, *Noix vomiques*, **Krähen-Augen.** Semina sunt *Solani arborei indici maximi* foliis Oenopliæ majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, seminibus orbicularibus, compressis, maximis, in Horto Malabarico *Caniram* appellatæ. Ex Malabaria advehuntur, sunt orbiculatæ, cornea duritie, colore cinereo. *Veteres pro alexipharmaco Nuces Vomicas habuerunt, merito vero inter infida a recentioribus ponuntur medicamenta; narcoticæ & virulentæ, canibus, felibus, corvis, aliisve brutis carnivoris præsentissimum sunt venenum.*

Nuclei Pineæ, Pigneoli, *Pignons*, **Pinien-Nüßlein, Zirbel-Nüßlein.** Arbor Pinus sativa, quæ hos fructus fert, copiose in Italia crescit. Nuclei sunt oblongi, candidi, inclusi ossiculis crassis & duris, in squamato cono dispositis. Eligantur recentes, non rancidæ. *Demulcent, resolvunt & pinguefaciunt; phthisicis, tussi sicca & stranguria laborantibus prosunt.*

Paridis Baccæ, *Bayes des raisins de Renard*, **Wolffs-Beer, Einbeer.** Solani quadrifolii, bacciferi, sive Paridis herbæ sunt fructus. Flos in singula planta est unicus, perfectus, tetrapetalus, quem sequitur fructus solitarius. Floret mense Majo & Julio, & Augusto maturescit; provenit in silvis & umbrosis. *Alexipharmacæ creduntur, & maniacis convenire.*

Passulæ majores, Uvæ passæ majores, *Raisins de Damas, ou gros raisins*, **grosse Rosinen, Zibeben.** Sunt Vitis viniferæ fructus, & ex Italia & Hispania ad nos veniunt; præferuntur tamen, quæ ex Syria advehuntur. Eligantur majores, pingues & recentes. *Temperatæ sunt, alvum laxant, acrimoniam temperant, ventriculo, pectori & hepati gratæ.*

Passulæ

Paſſulæ minores, Paſſulæ Corinthiacæ, *Raiſins de Corinthe*, kleine Roſinen, Weinbeerlein, Corinthen. Vitis Corinthiacæ, ſive Apyrenæ, fructus. Ex inſulis Ægei maris advehuntur. *Ad æſtum ſitimque febrilem temperandam, & alvum laxandam in uſum vocantur; plurimus uſus eſt in decoctis.*

Perſicorum Nuclei, *Noyaux des peches*, Pferſich-Kern. Colliguntur ex fructibus maturis arboris Mali Perſicæ. *Commendantur ad præcavendum & pellendum calculum & ſabulum. Anacollemata & emulſiones frontales ex his nucleis parata ad cephalalgiam & agrypniam laudantur.*

Piſtaciæ, Nuces piſtaciæ, *Piſtaches*, Piſtacien, Syriſche Pimpernüßlein. Fructus arboris Piſtaciæ peregrinæ, fructu racemoſo, vel Terebinthi Indicæ. In Perſia, Syria copioſe hæ arbores proveniunt, nonnunquam etiam in Hiſpania & Italia coluntur. Fructus ſeu nuces anguloſæ, oblongæ, Avellanæ magnitudinis, includunt ſub putamine tenui, rufo, nucleum vireſcentem, oleoſum, pellicula obductum rufeſcente, ſaporis ſubdulcis, grati. Eligantur recentes, ponderoſæ, non rancidæ. *Roborant, pinguefaciunt, ſemen augent, & ſtomacho gratæ ſunt.*

Pruna Damaſcena, Pruna magna atro-cœrulea, dulcia, *Pruneaux doux*, Zwetſchgen, Quetſchen. Fructus Pruni omnibus notus. *In officinis ad Pulpam conficiendam, & pro Decocto Florum & Fructuum requiruntur. Refrigerant, humectant & alvum laxant.*

Sambuci Baccæ exſiccatæ, grana Actes, *Bayes de Sureau*, Hollunderbeeren. Fructus arboris notiſſimæ. *Sunt alexipharmacæ, ſudoriferæ, diureticæ, atque ad diarrhœam commendantur.*

Sebeſtenæ, Sebeſten, Myxæ, *Sebeſtes*, ſchwartze Bruſt-Beerlein, Sebeſten. Fructus eſt arboris in Syria & Ægypto naſcentis, quæ hodie *Cordia*, foliis ſubovatis, ſerrato-dentatis, tam ob formam fructus, quam in honorem *Valerii Cordi*, a Botanicis vocatur. Fructus calici inſident, acetabuli inſtar, concavo, Prunis fere ſimiles, minores tamen, nigricantes, & ſub pulpa carnoſa, dulci, mucilaginoſa, nucleum includentes. Eligantur recentes & carnoſæ, ſitu non infectæ, quales tamen raro ad nos perveniunt; hinc eleganter officinæ his carere queunt, atque Jujubæ, quæ recentes haberi poſſunt, illis ſubſtitui, cum quibus etiam viribus conveniunt. *Demulcent, & in catarrhis acribus, urinæ ardore, & bilioſis febribus, in decoctis, in uſum veniunt.*

Siliqua dulcis, Ceratia, Xylocaracta, Caroba, *Carouge*, Johannis-Sood-Brod, Bocksbörnlein. Fructus eſt arboris in regionibus calidioribus, Sicilia, Neapoli & Syria frequentis, flore apetalo, plurimis ſtaminibus conſtante, ex diviſuris calicis naſcentibus; meditullium occupat piſtillum, quod abit in fructum, ſeu ſiliquam planam, compreſſam, carnoſam; folia ſunt pinnata, lata, decidua. Eligendæ ſunt Siliquæ carnoſæ, recentes. *Demulcendi & acrimoniam mitigandi habent virtutem, in decoctis pectoralibus & ordinariis, pro infantum potu, adhibentur.*

Sorbi Torminalis Baccæ, *Sorbes ſechées*, Speyerling, Arlas-Beer, Elſter-Beer. Sunt fructus *Sorbi Torminalis*, ſive *Cratægi* folio laciniato, ſubtus incano, floribus & fructibus in umbellam congeſtis.

geſtis. Floret Majo, & fructum auctumno perficit. Naſcitur in montoſis, & ad ſilvam Martiam in dumetis nonnunquam occurrit. *Refrigerant & adſtringunt fructus, atque ad calculum laudantur.*

Spinæ Cervinæ Baccæ, Rhamni cathartici ſeu ſolutivi, Spinæ infectoriæ, *Bayes de Nerprun*, **Creutz-Beer, Wegdorn-Beer.** Fructus ſunt fruticis, flore monopetalo, infundibuliformi, foliis Mali minoribus, in margine denticulatis. Succus baccarum recentium, addito alumine, vireſcit; amaricantis & nauſeoſi eſt ſaporis. Occurrit in ſepibus & ſilvis; floret Majo, & fructus Octobri matureſcit. *E ſucco Baccarum maturarum recentium paratur Syrupus domeſticus, & color viridis, qui* **Saftgrün** *appellatur. Baccæ exſiccatæ in pulverem tritæ, a drachma una, vel ad drachmas duas, in decocto exhibitæ, alvum movent, & inprimis Cachecticis & Arthriticis commendantur.*

Tamarindi, *Tamarinds*, **Tamarinden, ſaure Datteln.** Sunt pulpa fructuum e fuſco nigricans, acidi ſaporis, filamentis lignoſis pertexta, in qua latent oſſicula dura quadrata, rubicunda, ſplendentia. Arbor *Siliquæ Arabicæ*, *Tamarindus* dictæ, florem habet roſaceum, ex plurimis petalis, in orbem diſpoſitis, conſtantem, e cujus calice multifido ſurgit piſtillum, quod deinde in ſiliquam compreſſam, aliam condentem, ſemine fœtam plano, utplurimum anguloſo, abit; intervallum autem, quod inter duas ſiliquas occurrit, pulpa turget nigra & acida, quæ Tamarindos conſtituit. Provenit in Arabia felici arbor. Fructus ad nos non integri, ſed pulpa ſaltem, adferuntur. Eligatur recens, nigra, rufeſcens, tenera, multis villis intertexta, pinguis & acida. *Refrigerant Tamarindi, humorum & inprimis bilis fervorem temperant, & blande educunt, ſitimque ſedant. Uſus eſt in decoctis.*

Tribuli aquatici, Caſtaneæ aquaticæ paluſtres, cornutæ, *Tribules aquatiques*, **Waſſer-Nüſſe, Stech-Nüſſe.** Eſt fructus *Tribuloidis vulgaris*, aquæ innaſcentis *Tournefort.* Planta eſt flore roſaceo, ex cujus calice piſtillum ſurgit, quod deinde cum calice abit in fructum ſubrotundum, aculeatum, unicapſularem, ſemine, Caſtaneæ ſimili, fœtum; folia ſunt anguloſa. Naſcitur in aquoſis. Floret menſe Majo, & circa auctumnum fructus perficit. *Utuntur plebeji hac nuce in pleuritide.*

Vainiglia, Vaniliæ, Vanillæ, Bainillæ, *Vanilles*, **Vanilien.** Siliquæ ſunt compreſſæ, ſemipedem fere longæ, calami ſcriptorii majoris craſſitie, coloris atro-fuſci, ſaporis aromatici, odoris grati, quæ pulpam, ſeu medullam, cum minutiſſimis acinis, pinguem continent. Vaynilla ab Hiſpanis, a vaginarum ſimilitudine, vocantur. Fructus ſunt *Volubilis ſiliquoſæ Mexicanæ*, foliis Plantaginis, & floribus nigricantibus, quæ *Epidendrum Linn. Angurek Kæmpf.* & *Tlilxochitl* Americanis dicitur. Ex America & inprimis nova Hiſpania advehuntur. Eligendæ ſunt ſiliquæ pingues, recentes, aromatici ſaporis & odoris, dum recentes, gratiſſimi. *Creduntur virtutis roborantis & diureticæ; calefaciunt, flatus diſcutiunt, & concoctionem adjuvant. Vainillarum tinctura, ſpiritu vini extracta, ad melancholiam & phreneſin, remedium ſingulare & ſpecificum habetur, quo multos, poſt methodos uſitatas, incaſſum tentatas, ſanatos eſſe,* Raj. H. Pl. *perhibet. Præparatur ex ſeminibus, cum ſacchari albiſſimi tripla vel ſextupla portione tritis; apud Hiſpanos celebris ille pulvis* Vacaka *dictus, quo ad Chocolatæ fragrantiam, in ipſo hauſtu ex tempore exaltandam, utuntur.*

Uva Quercina, **Eichtraube.** Eſt excreſcentia quædam, ad radices

dices Quercuum, ab insecti cujusdam puncturis, quod ovula deponit, orta, & quasi Galla subterranea, in forma Uvæ, conglomerata. *Vehementer adstringit, & in omnibus cum Galla convenit. Laudatur a nonnullis in dysenteria, sed, ob vim vehementer adstringentem, caute adhiberi debet.*

CAPUT VI.
DE AROMATIBUS.

Anthophylli, *Meres des Girofles*, **Mutter-Nägelein.** Sunt arboris Caryophylliferæ fructus maturi, Caryophyllis crassiores & tumidiores, odoris & saporis pene ejusdem. Arbor colitur præcipue in insula *Moluccensium Ternata*, solo omnium aridissimo & siticuloso, ut vix siccior terra ulla inveniatur, atque a *Rumphio* in *Herbario Amboinensi* sequenti modo describitur: "Arbor Anthophyllos & Caryophyllos gerens Lauro quodammodo similis est. Trunco simplici anguloso, versus inferiora utplurimum diviso, gaudet; Cortex est glaber, tenuis, coloris ex cinereo lutei; Folia laurinis longiora & angustiora, bina semper opposito situ conspicua, ita, ut cum sequenti pari cruciatim ponantur, in ambitu integerrima, superius obscure viridia, splendentia, inferius flava. Mense Majo tenera folia propullulant, & simul floris & fructus rudimenta evolvuntur. Quarto deinde subsequente mense completam Caryophyllorum dant speciem. Fructus rudimentum sensim læte viridem deponit colorem, atque pallide flavum induit, qui demum in sanguineum transit. Flore evoluto fructus nondum maturi aromaticam, quam exoptamus, vim habent, tamen ad propagationem apti non sunt. Ad maturitatem accedentes, amplum acquirunt ventrem, quatuor anguli antea in capitulo immaturi fructus conspicui, sese contrahunt, & color iterum in viridem mutatur. Tum demum nucleum durum continent, & Caryophylli matres, sive Anthophylli dicuntur. Caryophylli fructus tres dantur species: Prima parum rubet; altera, minor præcedente, sanguinei est coloris: tertia, quæ fœmina dicitur, alba est, parum rubens, omnes vero aromaticæ indolis. Caryophylli olim in Moluccis insulis tantum inveniebantur; nunc vero in Amboina majori cura, quam in naturali ipsorum patria, coluntur. Arbusculæ juniores, arborum silvestrium umbra obteguntur, adultiores vero factæ requirunt, ut arbores assitæ extirpentur. Minime vero credendum est, ac si arbores propinquæ calida Caryophyllorum natura destruerentur. Ex fructibus maturis sive Anthophyllis arbor sponte se propagat, & arbusculæ inde natæ transplantantur. Anthophylli ipsi ne quidem per octo dies in ædibus vegeti possunt conservari, statim enim exsiccantur, & nunquam germinant." Cæterum, quoad characterem, arbor Caryophyllus pertinet ad plantas flore rosaceo, quatuor petalis, in orbem positis, calici insidentibus. Filamenta sunt plurima, perianthium ovale, & semen unicum. *Anthophylli viribus cum caryophyllis aromaticis conveniunt, & inprimis ad hystericos affectus laudantur.*

Cardamomum maximum, vide Grana Paradisi.

Cardamomum minus, officinale, C. B. *Petit Cardamome*, **kleine Cardamomen, Cardamemelen.** Variæ species sunt Cardamomi, & vel in capsulis, sive siliquis seminalibus, brevibus, triangularibus, vel digitum fere longis, triquetris, pallidis, vel granis angulosis, fuscis

fuſcis advehuntur, & nobis, ſub nomine Cardamomi minoris, venduntur. Planta, in qua naſcuntur hæc grana, a *Rajo* ad graminifolias floriferas, flores & racemos fructuum in caule peculiari, non folioſo, ex radice orto, ferentes, refertur. Flores habet tetrapetalos, difformes, albos, luteo colore diſtinctos, odoris aromatici, ſuaviſſimi, ovario inſidentes, fructus eſt trilocularis, polyſpermus. Præfertur Cardamomum minus, thecis minoribus incluſum, recens, oleoſum, ſaporis ſuavis, aromatici, odoris grati. Tam in orientalis, quam occidentalis Indiæ regionibus, præcipue in Malabar provenit; Cardamomum majus vero in ſiliquis longioribus utplurimum ex Java advehitur. *Utrumque calefacit, attenuat, flatus diſcutit, coctionem juvat, & urinam ciet.*

Caryophylli Aromatici, *Clous des Girofles, Girofles;* **Nelcken, Gewürtz-Nägelein.** Sunt fructus immaturi, vel potius calices florum arboris Caryophylliferæ, *Ts-hinka* dictæ. Capitellum ſeu ſphærula, quæ Caryophyllo inſidet, eſt rudimentum floris ex quatuor petalis conſtantis, quæ complicata firmiſſime Caryophyllis adhærent, quando manu decerpuntur, vel arundinibus decutiuntur, colliguntur & cratibus impoſiti atque latis foliis Ari tecti, per aliquot dies fumo macerantur, & deinde in ſole exſiccantur. Si vero Caryophylli diutius ſuis ſurculis adhærent, petala expanduntur, coloris cœrulei, lineolis albis notata, ſtamina autem purpurei ſunt coloris, & paucas poſt ſeptimanas in Anthophyllos abeunt. Eligendi ſunt oleoſi, ſaporis fervidi, & odoris ſuavis. Plura reperiuntur ſub titulo *Anthophyllorum. Uſus Caryophyllorum tam in medicina, quam in culinis, frequentiſſimus eſt: Cardiaci, cephalici & ſtomachici ſunt, calefaciunt & diſcutiunt. Ad febres intermittentes, cortici Peruviano additi, laudantur.*

Caryophylli rotundi, vide Semen Amomi.

Caſſia Caryophyllata, Canella Cubana Jonſt. *Ecorce de Girofle,* **Nelcken-Rinden, Nelcken-Zimmet.** Eſt cortex tenuis, ex rufo ferrugineus, in modum tubuli convolutus, ſapore & odore caryophyllaceo. Arbor eſt Myrti ſpecies, & a Botanicis *Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis,* ſive *Caryophyllus Aromatica Americana, Lauri acuminatis foliis,* vocatur; Americanis vero *Caninga* dicitur. In Cuba inſula, montoſis Jamaicæ ſilvis, & aliis Indiæ occidentalis regionibus provenit. Eligatur cortex recens, odoratus, & ſaporis acris, caryophyllacei. *Virtute cum Caryophyllis convenit, inferioris autem efficaciæ & pretii.*

Caſſia lignea, Xylo-caſſia, *Caſſe,* **Mutter-Zimmet, Caßien-Rinden.** Eſt cortex *arboris Canelliferæ, Malabaricæ,* cujus folium *Malabathrum* officinarum. Character arboris cum Cinnamomi Zeilanica arbore idem eſt, & ſaltem loco natali videtur ab illa differre. Cortex lignoſior, odore & ſapore plerumque debiliore, & magis mucilaginoſo, a vero Cinnamomo differt. Hinc a *Breyn. Prodr. II. Arbor canelliforma Indica, cortice acerrimo, viſcido, ſeu mucilaginoſo, quæ caſſia lignea officinarum* vocatur. *Virtutes ſunt Cinnamomi, ſed longe debiliores, & ob mucilaginem, quam condit, non adeo diu durantes. Quo magis ad Cinnamomum accedit, eo melior habetur.*

Cinnamomum, Canella Zeylanica, *Canelle fine,* **Zimmet, Canell.** Eſt cortex tenuis, ab exteriore pellicula alba purgatus, cannulatus, coloris ex flavo rubeſcentis, ſaporis acris, ſubdulcis, grati, odoris fragrantiſſimi. Arbor, ex qua colligitur, ab Illuſtr. *Linnæo, Lau-*

rus

rus foliis oblongo-ovatis, trinerviis, planis, nitidis, in *Hort. Cliffort.* vocatur. Naſcitur in *Ceylon*, vel *Zeylan*, inſula Indiæ orientalis, & ad arbores fructu caliculato refertur, foliis oblongis, trinerviis, nitidis, planis, ex adverſo binis, floſculis monopetalis, in ſex lacinias diviſis. Fructus glandi quernæ ſimilis, a calice excipitur. Eligendum eſt Cinnamomum longum, ſaporis acris, & odoris fragrantis. *Calefacit, ſiccat, roborat, menſtrua movet, & partum accelerat, & in omnibus affectionibus frigidis locum invenit; præſtantiſſimum eſt Cordiale.*

Coſtus corticoſus, Canella alba, *Canelle blanche*, **weiſſer Zimmet.** In oblongos tubulos convolutus, ab exteriore cortice purgatus, tam foris, quam intus, albicans, Caſſia lignea craſſior, ad nos venit. Saporis eſt aromatici, acris, odoris grati. Eſt arboris bacciferæ, laurifoliæ, aromaticæ, fructu viridi caliculato, ramoſo, cortex. Flos eſt pentapetalus, coloris coccinei, baccæ tetrapyrenæ caliculis inſident. Naſcitur in inſula Jamaica & aliis Americæ regionibus. *Calefacit & ſiccat, incidit, ſcorbuto medetur, & vomitus ſiſtit, ventriculum roborando.*

Crocus, *Safran*, **Saffran.** Sunt ſtamina florum. Planta eſt radice bulboſa, foliis anguſtis, gramineis, linea in medio alba, ſecundum longitudinem decurrente; Flores nudi, erecti, ab ipſa ſtatim radice orti, abſque pediculis herbaceis, monopetali, in ſex partes ampliati, ſtamina tria: Capſula ſeminalis ſubrotunda, trilocularis: ſemina plura, rotunda. Floret autumnali tempore, & colitur in regionibus temperatis, in Gallia, Anglia, Germania, & præcipue in agro Viennenſi. Optimus eſt *Auſtriacus* & *Anglicus*, & præſertim ille, quem provinciæ *Eſſex* & *Cambridge* producunt. Notæ bonitatis ſunt ſtamina, neque nimis pinguia, neque nimis marcida, coloris purpurei, ad aureum inclinantis, ſapor amariuſculus, acris, odor fragrans & parum acris, &, ſi exigua quantitate magnam aquæ quantitatem tingat. *Vires ſunt anodynæ, cordiales, pnevmonicæ, uterinæ. Doſis grana tria, ad duodecim.*

Cubebæ, *Cubebes*, **Cubeben, Schwindel-Körner.** Sunt grana rugoſa, exiguo petiolo prædita, piperis magnitudine, coloris cinerei, intus quodammodo cava, & parvum nucleum continentia, odoris fragrantis, ſaporis acris, aromatici, ſubamari. Cujus plantæ ſint fructus, nondum certe conſtat? Creduntur eſſe fruticis convolvulacei Javanenſis, *Carane* dicti. Ex Java inſula advehuntur. Eligantur majores, recentes, ponderoſæ & oleoſæ. *Calefaciunt, incidunt, diſcutiunt, nervos roborant, flatus pellunt, & ſpecificam vim contra vertiginem habere creduntur, ad apophlegmatiſmos utiliter adhibentur, atque Aphrodiſiacis adnumerantur.*

Galanga major, *Grand Galanga*, **groſſer Galgant.** Eſt radix tuberoſa, pollicis craſſitie, nodoſa, geniculata quaſi, fuſca, intus rufeſcens, ſaporis acris, amaricantis, odoris aromatici. Venditatur pro radice plantæ Indicæ, *Barehabe* dictæ, quæ cum Cannacoro, vel Canna Indica convenire a Celeb. *Bœrhavio* in *Hort. Lugd.* traditur. Advehitur ex Malabaria & Java. Eligantur radices recentes, non carioſæ, & non adeo lignoſæ.

Galanga minor, *Petit Galanga*, **kleiner Galgant.** In omnibus cum præcedente convenit, niſi quod minor & paulo acrior ſit. Sponte in China, ubi *Lagondi* vocatur, naſcitur. De charactere plantæ nihil certi conſtat, plurimi ad graminifolias referunt. Eligendæ ſunt radices minores, ponderoſæ, non fibroſæ, odoratæ, non carioſæ. *Præ-*

fertur Galanga minor majori, ac in cruditate ventriculi & vertigine valde laudatur. Specificum etiam est Emmenagogum. Vim habet incidentem, roborantem & attenuantem, atque virginibus, ob retentionem Menstruorum pallescentibus, utiliter exhibetur.

Grana Paradisi, Cardamomum maximum, Melaguette, *Graines de Paradis, Grand Cardamome*, **Paradieß-Körner.** Sunt grana triquetra, parva, foris spadicei coloris, intus albi, saporis acris, fervidi, sicut Piper. Planta, ex qua colliguntur hæc grana, nondum satis cognita est. *Rajus* tamen in *Hist. Plant.* mentionem facit *Cardamomi Sirinamensis*, cujus descriptio cum Granis Paradisi convenit. Radix est crassa, oblonga, tuberosa, saporis aromatici expers, caulis & folia Zingiberis silvestris. Flores non in summitate caulis, sed scapo peculiari, e radice seorsim prodeunte, in parva spica dispositi. Fructus pruni majoris magnitudine & forma, in tres partes dehiscunt, quorum cortex cœruleus, carnosus, plane aromaticus includit semina, grana Paradisi tam facie, quam sapore ad amussim referentia, sextupli serie, secundum fructus longitudinem, eleganter disposita. Singulis seminum interstitiis interjacens substantia alba fungosa, qualis in fructu Cardamomi cernitur. Ex Oriente magna ejus quantitas advehitur. *Calefaciunt & incidunt, atque cum Pipere magis conveniunt, quam Cardamomis, hinc abusive Cardamomo majori substituuntur.*

Macis, *Macis ou fleurs de Muscade*, **Muscaten-Blüthe.** Non est flos, sed involucrum, quod secundo putamini, duro, Nucis moschatæ, instar reticuli, circumducitur, coloris ex aureo rufescentis. Eligenda recens, integra, magna, colore saturato, rubescente, odore suavi, sapore subacri; pinguis & oleosa. *Stomachica, uterina & carminativa est.*

Nuces moschatæ, Myristicæ, Nucistæ, *Muscades*, **Muscaten-Nüsse.** Arbor, in qua crescit, vocatur ab Indis *Pala*, & *Pongopala*, provenit in insula Banda. Tradunt, Piri habere magnitudinem, corticem griseum, lignum porosum, folia nervosa; florem pentapetalum, qui cum basi fructus cohæret. Ipse fructus est solitarius, pediculo brevissimo, & a reliquis hujus generis, triplici integumento, & nucleo inprimis, exterius rugoso, pulpa interiore, venis flavorubentibus variegata, aromatico differt. Nuces moschatæ sunt vel majores, vel minores, rotundæ vel oblongæ; præferuntur rotundæ: oblongas silvestres esse putant, rotundas domesticas. Eligendæ ponderosæ & pingues, quæ acu punctæ oleum emittant. *Calefaciunt, subadstringunt, stomachicæ, cephalicæ, uterinæ & anodinæ sunt.*

Piper album, rotundum, *Poivre blanc*, **weisser Pfeffer.** Sunt grana albida, rotunda, non rugosa; a nonnullis pro fructu ejusdem plantæ, in qua Piper nigrum crescit, habetur, & artificio quodam decorticari traditur, eliguntur scilicet grana Piperis nigri majora, & aqua marina maceratis cortex exterior niger detrahitur. *Jonstonius* & alii, peculiarem, quæ Piper album profert, esse plantam, perhibent, eamque non nisi in Malabaria & Malacca, provenire. *Viribus cum Pipere nigro convenit, attamen non adeo est acre.*

Piper Jamaicum vel Jamacense, vid. Semen Amomi.

Piper nigrum, rotundum, Malabaris Molagocodi, *Poivre*

Poivre noir, **schwartzer Pfeffer, Pfeffer-Körner.** Est fructus plantæ scandentis, foliis nervosis, subrotundis, acuminatis, flosculis monopetalis, tripartitis, racematim digestis, fructu rotundo, monopyreno, racemoso. Colitur in Malabaria, Java & multis Indiæ orientalis regionibus. Eligenda grana majora, non pulvere & aliis quisquiliis mixta. *Piperis usus multus & frequens est in culinis, rarior in Medicina; sunt, qui grana integra Piperis deglutita pulveri præferunt, & ad febrem quartanam maxime suadent. Vires habet calefacientes, incidentes & resolventes. Suibus est noxium & quasi venenum.*

Piper Hispanicum, *Poivre d'Espagne*, **Spanischer Pfeffer.** Est fructus, seu siliqua *Capsici*, sive *Piperis Indici.* Planta florem habet monopetalum, stellatum, multifidum, pistillum ex calice surgens abit in fructum mollem, membranaceum, in duo loculamenta divisum, seminibus compressis fœtum. Variæ sunt species Capsici, ex his tamen plerumque in usum veniunt siliquis propendentibus, & erectis longioribus. Frequenter in hortis colitur, floret Augusto, & fructus siliquosos, coloris rubri vel lutei, auctumno perficit. *Ferventissimi est saporis, & vix unquam in Medicina adhibetur. Vires habet Piperis incidentes & attenuantes. Apud Indos & etiam nonnullos Europæos familiare est, siliquas nondum perfecte maturas in aceto & sacchara coquere, atque iis condimenti loco uti. Acetum his siliquis conditum citius acescit, diutius durat, & a vappa præservatur, quod etiam tinctoribus, qui colorem nigrum, pro tingendis linteis, Capsio condiunt & conservant, notum est.*

Piper longum, Macro-Piper, *Poivre long*, **langer Pfeffer.** Est fructus oblongus, teres, cinerei coloris, figuræ julorum Corylli, e numerosis, vermiculato plexu dispositis granis minutim compactus. Planta est sarmentosa, foliis latis, subrotundis, nervosis, acuminatis, flosculis monopetalis, quinquepartitis, fructus, uti diximus, longus, teres, aggregatus, saporis fervidi & amaricantis est. Colitur in Malabaria, Java, & aliis regionibus Indiæ, indeque nobis advehitur. *Potentius est Pipere Nigro, sumendum igitur, ubi in Compositionibus Piperis mentio fit. Incidit, attenuat, resolvit, digestionem promovet. Ad Theriacæ & Mithridatii & Diascordii compositiones requiritur.*

Zedoaria, *Zedoire*, **Zittwerwurtz.** Radix est tuberosa, nodosa, cinerea, saporis acris, amaricantis, odoris ad Camphoram accedentis, fragrantis. Apud Auctores Zedoariæ longæ & rotundæ fit mentio, quas tamen non inter se differre, nisi quod ejusdem radicis partes sint diversæ, aliis videtur. Notæ plantæ sunt folia longa, nervosa, flores pentapetali, in singulari scapo. Ex India orientali, China & Zeylon ad nos transfertur. Eligenda ponderosa, non cariosa, & quæ odoris est fragrantis. *Alexipharmaca est, calefacit, siccat, in colicis doloribus prodest, menses movet, & vermes enecat.*

Zingiber Album, Inschi, vel Inschikua Hort. Malab. *Gingembre blanc*, **Ingwer, weisser Ingwer.** Radices sunt ramosæ, nodosæ, compressæ, pallidæ, saporis fervidi, odoris aromatici, a cortice exteriore aliquantum liberatæ.

Zingiber, Gingiber, Zinziber vulgare, *Gingembre*, **gemeiner Ingwer.** Ejusdem plantæ radices sunt, infusione cum aqua fervida ita paratæ. Facile enim vel vermibus arroditur Zinziber, vel, dum adhuc recens est, inter siccandum germinat; hoc, ut impediant cultores, recentes & a fibris mundatas radices aqua ferventi in-

fundunt, & postea solis vel fornacis calore exsiccant. Quo fit, ut faciem quasi corneam interior earum substantia induat. Zinziber vero album, detracto cortice ex parte, sine immersione, siccatur, atque majori indiget cura & labore. A plerisque ad Iridum classem refertur Zinziber, & Iris latifolia tuberosa, flore albo, quæ Zinziber est, vocatur. Notæ Zinziberis sunt, radix tuberosa, folia Cannacori, flos in scapo singulari, pentapetalus, difformis, quasi bilabiatus, insidens ovario trigono triloculari. Copiose provenit & colitur Zinziber tam in orientalis, quam occidentalis Indiæ regionibus. Eligatur minus fibrosum, ponderosum, non cariosum. *Incidendi, attenuandi & roborandi vim habet; commendatur Hydropicis, Serosis, Cachecticis; additur quoque purgantibus, & inprimis foliis sennæ, ad corrigendam eorum flatulentiam & vehementiam.*

CAPUT VII.

DE CORTICIBUS.

Cortex Acaciæ Germanicæ radicum, *Ecorce de prunier sauvage*, **Schlehendornwurtzel-Rinde.** Colliguntur auctumnali tempore. Adstringunt & refrigerant, in gargarismatibus, ad uvulæ, & in balneis, ad uteri, & ani laxitatem adhibentur. In A. Ph. M. vol. V. etiam ad febres intermittentes decoctum eorum laudatur.

Aurantiorum, Arantiorum, Pomorum Aurantiorum, *Ecorce d'Orange*, **Pomerantzen-Schalen.** Sunt cortices fructuum Mali Aurantiæ, quæ adnumeratur arboribus pomiferis, fructu corticoso molliori. Notæ speciales sunt, arbor fruticosa, foliis semper virentibus, glabris, acuminatis, odoratis, floribus pentapetalis, albis, odoratis, semina utrimque acuminata, in carne succulenta. Provenit in regionibus calidioribus, Lusitania, Hispania & Italia; colitur & in hortis apud nos. Cortices eligendi sunt amari, recentes, non situ corrupti. *Vires habent tonicas, carminativas, & antiscorbuticas. Liberati ab interna fungosa albida substantia, ingrati saporis, suppeditant, quod in officinis vocant* Flavedinem Corticum Aurantiorum.

Capparis vide Radix.

Cascarillæ, Chacarillæ, Eleutheriæ, Linn. Hort. Cliffort. *Chacarille*, **Chagrillen-Rinde.** Sunt grysei extus, ferruginei intus coloris, saporis acris & amari, fragrantis, maxime si accendantur, odoris quasi moschati. Magna huc usque inter Materiæ Medicæ Scriptores lis fuit, qualis Planta sit, quæ Chacarillam profert: tandem *Marcus Catesby* Anglus, in Historia Naturali Carolinæ Floridæ & insularum Bahamæ, tradit, esse illam *Ricinoidem, Elæagni folio,* copiose in plurimis Bahamæ insulis crescentem; raro altitudine decem pedes attingere, vixque crassitie pedem superare; folia esse oblonga, angusta, acuminata, pallide viridia. In extremis ramificationibus, e calicibus, surgere flosculos exiguos, hexapetalos, albicantes, flavis apicibus; hoc excipere baccas ex albo viri-

viridescentes, distinctas in tres loculos, magnitudine Pisi, quæ tria semina nigra continent, in singulis loculis unum. Collectio corticis fit, resecto circa radicem cortice, ut nutritionis defectu, reliqua pars a trunco & ramis soluta, decidat. Crescit non solum in Florida & Bahamæ insulis, sed & in Peru, & magna quantitate ad nos vehitur. Eligendi cortices odorati & resinosi quasi. *Vires sunt blande sedativæ, balsamicæ, tonicæ, diapnoicæ & discutientes.*

Cortex Chinæ Chinæ, Kinkinæ, Peruviani, Antifebrilis, Antiquartii, Febrifugi, *Quinquina, Chine Chine*, **China China, Fieber-Rinde.** Cortex est crassitiei mediocris, scaber, parum canescens, aliquando musco obductus, intus lævis, coloris e fusco rufescentis, saporis adstringentis, parum aromatici, amari. Arbor corticem hunc nobilem elargiens, Americæ civis est, atque maxime in Peruanis montibus, Cajanuma dictis, duo milliaria ab urbe Loxa distantibus provenit. Ramum cum floribus, fructibus & seminibus delineatum *Histor. Academ. Parisiens. Anni* MDCCXXXIIX. cum ulteriori descriptione & historia arboris exhibet. Quina apud veteres Peruanos corticem significare, atque more illorum, propter eximias virtutes per excellentiam *Quina Quina, Cortex corticum* vocari, *de la Condamine*, qui historiam suppeditavit, autumat. *Chinæ Chinæ* nomen a *Comitissa de Chin Chon, Pro-Pegis Peruani conjuge*, quæ ejus usu a febre pertinaci liberata fuit, accepisse fertur. Ipsa Comitissa remedium, in se expertum, omnibus, quibus opus fuit, gratis distribuit, atque tum demum, scil. circa annum MDCXXXXIIX. sub nomine *Pulveris Comitissæ* innotescere cœpit. Et cum paulo post, R. P. S. J. copiam corticis a laudata Comitissa illis traditam, etiam gratis distribuerent, nomen *Pulveris Jesuitarum* accepisse, perhibent. Eligendus cortex non nimis crassus, ex junioribus arboribus detractus, qui etiam odoris est suavis, aromatici, sapore amarus, & sine molestia adstringens. *Vis antifebrilis, tonica, roborans* &c. *omnibus nota, non solum in febribus intermittentibus celebratur specificum, sed & contra gangrænam a causa interna ab Anglis commendatur. Dosis, intuitu ætatis & circumstantiarum, varia. Raro tamen ultra drachmam in substantia, & drachmas duas in decocto Coffée tosti, vel vino infusum exhibetur.*

Citri, *Ecorce des Citrons*, **Citronen-Schalen.** Sunt cortices fructus Citreæ, sive Medicæ Mali. Arbores ab Aurantiis non nisi foliis, quæ in Citrea absque appendice, distinguuntur. Copiose crescunt in Italia, Hispania & Lusitania. Fructus magna in copia ex comitatu Niciensi & ditione Genuensi nobis advehuntur. Ex diversis Citri speciebus in usum veniunt fructus & cortices Citrei vulgaris. Eligantur recens siccati citrini, non virides, fusci ac situ corrupti. *Calefaciunt, atque alexipharmaca, cardiaca & carminativa gaudent virtute.* Flavedo Corticum Citri *eandem habet rationem, quam Corticum Aurantiorum.*

Coccognidii, Mezerei, Laureolæ deciduo folio, Thymelæa lauri folio deciduo Tournef. *Ecorce de Garou, ou Bois gentil*, **Seidelbast, Keller-hals-Rinde.** *Vehementer purgant, igneum, acrem & causticum*

habent ſuccum, & hanc ob cauſam ad draſtica & periculoſa pertinent Purgantia. Vehementer corrigitur maceratione in aceto. Setaceum e Mezerei cortice radicis, auriculæ perforatæ trajectum, ad inflammationes pertinaces oculorum compertum eſt remedium.

Cortex Culilavvan, Culilavan, Caryophilloides, *Culilavan*, **bittere Zimmet-Rinde.** Eſt cortex arboris Amboinenſis, quæ Caſſiæ ligneæ, ſive Canellæ ſilveſtris arbori valde ſimilis, extus albicans & ſubcinereus, ubique minutis verrucis obſitus, intus ex rufo flaveſcens, qui in parte infima, vel trunco, detractus eſt, digiti craſſitiem habet, verſus ſuperiora tenuior eſt, ille, qui calami ſcriptorii craſſitiem non habet, abjicitur; ſuperior & tenuior pro optimo habetur, ſaporis debet eſſe acris, aromatici, ad Caryophyllorum aromaticorum proxime accedentis. *Apud Indos externus ejus eſt uſus in torminibus, colica & cephalalgia, ex cauſa frigida; nimirum corpora ſua hoc cortice, antea cum Maſſoy cortice in maſſam coacto, inungunt. Ob oleum copioſum carminativus, roborans & ſtomachicus eſt.*

Ebuli. Vide Radix.

Eſulæ. Vide Radix.

Frangulæ, Alni nigræ bacciferæ, *Ecorce de Frangula*, **Faulbaum- Hundsbaum- Zapffenholtz-Rinde.** Naſcitur in ſilvis, locisque humidis, floret Majo, folia ſunt decidua. Cortices eliguntur arboris mediani, vel, qui præſtant, radicum, vel flaveſcentes, amaricantes. *Vehementer purgant, tam per ſuperiora, quam inferiora. Propinantur a drachma una ad drachmas tres in Infuſo. Externe Unguentis ad Scabiem dicatur.*

Fraxini, *Ecorce de Frêne*, **Eſchbaum-Eſchen-Aſchbaum-Rinde.** In uſum vocantur *Fraxini excelſioris, vulgatioris*, Cortices, qui ſunt ex cinereo palleſcentes, ad viriditatem inclinantes, ſaporis acris, amari, adſtringentis. Arbor creſcit in ſilvis montoſis, floret Aprili & Majo, ſemen auctumno matureſcit. *Cortex adſtringentis eſt virtutis, &, ob acrimoniam & amaritiem, ſimul attenuat. Laudatur in cachexia, hydrope & febribus intermittentibus.*

Granatorum, Cortices Mali Punici, Malicorium, *Ecorce de Grenades*, **Granaten-Schalen.** Arbor pertinet ad illas, quibus flos ſummo fructui inſidet, & ob id umbilicatus appellatur. Folia ſunt decidua, flos roſaceus perfectus, pentapetalus, fructui inſidet, qui in plura loculamenta diviſus, acinis ſucci plenis, membranis tenuiſſimis diſtinctis, impletus eſt. In Italia, Gallia, Hiſpania provenit, & apud nos in hortis colitur. Cortices, qui etiam *Malicorium* vocantur, ſunt coriacei, duri, rugoſi, ſaporis amaricantis, adſtringentis. *Raro interne in uſum vocantur, ad gargariſmata, balnea & fotus adſtringentes eorum frequentior eſt uſus.*

Guajaci, *Ecorce de Gayac, ou de Bois ſaint*, **Frantzoſenholtz-Rinde.** Sunt ligni Guajaci cortices tenues, duriuſculi, lignoſi, e cinereo ruſeſcentes, maculati, intus pallidi, lamellatim congeſti, ſaporis acris, amaricantis. *Nobiliores & potentiores Ligno habentur. Præcipuus uſus eſt in Decoctis lignorum, ad veneream luem, & ſanguinem mundificandum.*

Cortex

Cortex Hippocaſtani, Caſtaneæ equinæ, folio multifido, J. B. *Ecorce de Maronier d'Inde*, **wild Caſtanienbaum-Rinde.** Arbor, alias in Germania hoſpes, nunc frequenter occurrit, & ad ambulationes copioſe plantatur. *Cortices ante aliquot annos in uſum venire cœperunt medicum, & pro ſuccedaneo Chinæ Chinæ habentur, eodemque modo & doſi exhiberi ſolent.*

Mandragoræ. Vide Radix.

Mori radicis, *Ecorce de Meurier*, **Maulbeerbaum-Rinde.** Colitur in vinetis & hortis; cortex e radice detrahitur. *Abſtergit & calefacit, alvum laxat, & pro ſpecifico habetur ad lumbricos latos enecandos.*

Quercus, *Ecorce de Chêne*, **Eichbaum-Rinde.** Provenit in ſilvis & fere ubique. Cortex eligitur a junioribus, non ab annoſis detractus. *Virtutis eſt adſtringentis; non tam interne, quam externe, in gargariſmis, balneis & fotibus adſtringentibus in uſum venit.*

Sambuci medianus, *Ecorce mediane de Sureau*, **Hollunder-Rinde.** Florem & fructum in umbella diſpoſitum habet, & ubique occurrit; floret Majo, & fructum circa auctumnum perficit. Cortex, de quo hîc ſermo, tempore verno detrahitur; debet eſſe medius, qui ſcilicet externum cineritii coloris ſequitur, viridis. *Remedium eſt inſigne antihydropicum, ſerum educit, ictericis convenit, & menſtrua movet. Infunditur uncia dimidia, vel habita ratione ſubjecti, uncia integra recentis in vino, & exhibetur pro una doſi. Imponitur etiam eriſypelati.*

Saſſafras, *Ecorce de Saſſafras*, **Saſſafras-Fenchelholtz-Rinde.** Sunt leves, ferruginei coloris, odoris & ſaporis intenſioris Ligno. *Easdem vires, quas lignum, habent, ob oleum vero, quod copioſius in cortice reſidet, minori doſi præſcribi ſolent. Ligni vires non, niſi coctione aliqua, corticum vero infuſione aqua fervida facile extrahuntur; hinc infuſionibus theæformibus anticatarrhalibus, aliisve, commode addi poſſunt. Plura vid. ſub Lignis.*

Tamariſci fruticoſæ, foliis craſſioribus, Germanicæ, *Ecorce de Tamaris*, **Tamarisken-Rinde.** Juxta ripas Rheni & Danubii creſcit frutex. Præfertur cortex radici detractus. *Ad icterum, fluorem album, ſcabiem, melancholiam, & ſpecifice ad affectus lienis laudatur. Uſus eſt in decoctis & vinis medicatis.*

Thuris, Thymiamatis, Thuris Judæorum dicti, *Styrax Thymiama*, **Weyrauch-Rinde, Juden-Weyrauch.** Fragmenta ſunt corticis, coloris ferruginei, ſaporis acris, aromatici & amari, odoris ſuavis, ad Styracis & Balſami Peruviani accedentis. Præferuntur cortices pingues, odorati, craſſiores. Ex India Orientali ad nos advehuntur, cujus vero arboris vel plantæ pars ſint, adhuc incognitum eſt. Putant, eſſe cortices arboris Storacis, ex qua liquida Storax exprimitur, atque incola eſt Aſiæ minoris. *B. Fridericus Hofmannus, mediante Spiritu vini, eſſentiam & reſinam extraxit, quarum priorem, propter vim anodinam, ad tuſſes ferinas & convulſivas, poſteriorem ad ſuffimenta, commendat. Suffimentis, odoris gratia, adduntur, & ad prolapſum uteri ex ſuffitu proſunt.*

Cortex Winteranus, nonnullis Canella alba, *Ecorce de Winter*, **Winters Americanische Gewürtz-Rinde.** Sunt crassi, cannulati, foris cinereo integumento fungoso, inæquali, fisso, & multis rimis hiante, obducti, intus solidi, densi, pallidi, saporis acris, aromatici, odoris fragrantissimi. Ex arbore laurifolia Magellanica, seu potius Periclymeno odorato Magellanico colligitur, cujus notæ sunt folia laurina, flores pentapetali, albi, odorati, racematim congesti; baccæ subvirides, multis seminibus angulosis, acinis uvarum similibus refertæ. In Jamaica, Barbados & Magellanica abunde in campestribus, & ad viarum margines nascitur, atque ita vocatur a Præfecto classico, Wintero, qui ipsum corticem primus ex Magellanica attulit. *Cum Canella alba convenit, potentior tamen creditur. Calefacit, siccat, vomitum sistit, flatus discutit, & specificum in scorbuto frigido habetur.*

CAPUT VIII.

DE LIGNIS ET VISCIS.

Lignum Aloës, Agallochum, Xyloaloës, *Bois d'Aloës*, **Paradieß-Holtz.** Fragmenta sunt lignosa & resinosa arboris cujusdam, nondum satis cognitæ, in Siamensi, Cambodiæ & Sinensi regnis, crescentis, atque Siamensibus *Kissinà*, Latinis *arbor Aquilæ* & *Aloës*, dictæ. Lignum non, nisi per vetustatem arboris, odorem acquirit fragrantem, qui odor in succo resinoso residet, & marcente & putrescente arbore, interiores quasdam ligni partes occupat, & circa nodos copiosius condensatur. Hæc resinosa fragmenta singulari nomine, *Calambà*, vel *Calambac*, reliquæ vero ipsius arboris nomine appellantur *Kissinà*. Raro vel nunquam ad nos venit Agallochum verum, magno enim in pretio apud Indos habetur, & duplo Argenti pondere venditur; quod ad nos transvehitur, spurium est, &, tradente *Rumphio*, ex Arbore Excæcante, ita ab incolis & nautis vocata, colligitur. Est vero Arbor Excæcans Lathyridis arborescentis species, fructus fert triquetros, baccis Lathyridis, quæ vulgo Cataputia audiunt, valde similes; succus arboris lactescit. Deformis arbor non, nisi in littoribus desertis ac solitariis crescit. Nomen Excæcantis accepit, quia lacteus, quo turget, succus, casu Oculis immissus, magnos excitat dolores, &, nisi citissime succurratur, summa cum inflammatione & mordacitate excæcat. In hujus periculosæ arboris caudice & radicum cavernis odoratum hoc lignum reperitur. Nascitur circa Amboinam, in Insulis, & ad nos advehitur in frustis, magnitudine varia, ex quibus solida, densa, resinosa, nigro-purpurea, ponderosa, amara, odoris, dum accenduntur aut durius perfricantur, fragrantis, eligi debent. *Cum sufficiente quantitate aquæ, per vesicam destillatum, exhibet oleum, coloris albicantis, camphoræ instar, quandoquidem parva quantitate, tamen fragrantissimum, quod promte in spiritu vini solvitur. Lignum Aloës calefacit, & confortativum cerebri, cordis, ac uteri creditur; vim tamen inebriantem, delicatioribus largius exhibitum habet.*

Lignum

Lignum Aſpalathum officinale, Aſpalathus, C. B. *Bois d'Aſpalat*, **Rhodiſer Dorn-Holtz.** Fragmenta ſunt Ligni exotici, reſinoſi, cujus arbor nondum ſatis deſcripta eſt, Ligno Aloës ſeu Agallocho leviora, laxiora & pallidiora. Ex India Orientali nobis advehuntur, & ſæpius Aſpalathum pro Agallocho, & Agallochum pro Aſpalatho venditur. *Easdem etiam habet vires, modo debiliores.*

Buxi arboreſcentis, *Bois de Buis*, **Buxbaum-Holtz.** Arbor ſponte naſcitur in Italia & Galliæ Provincia, colitur apud nos in hortis. Pertinet ad arbores bacciferas, fructu per maturitatem ſicco. Flores ſunt pentapetali, baſin fructuum excipientes; Fructus tricuſpidales, interne in tres capſulas diviſi, in quarum ſingulis bina ſemina lucida, deprehenduntur; Folia parva, perpetuo virentia. *Lignum eſt ponderoſum, flaveſcens, durum, & easdem virtutes cum Ligno ſancto vel Guajaco habet, atque Antimagicum cenſetur.*

Colubrinum, ſive Serpentarium officin. *Bois Couleuvré*, **Schlangen-Holtz.** Eſt radix lignoſa, arboris Timorenſis, Solani arboreſcentis Indici, foliis Napecæ ſeu Oenopliæ minoribus, floribus parvis in umbellam diſpoſitis, fructu rotundo, duro, ſeminibus orbicularibus, compresſis, quæ Nuces Vomicæ minores, *Scheru Katuvalli-camram* Horti Malabarici, cortice ex fuſco ferrugineo, ſubinde maculis cinereis aut albicantibus notato, includens materiam ſolidam, ponderoſam, acrem, amariſſimam, odoris nullius. Eligendum eſt amarum, grave, non carioſum. *Adſcribitur huic ligno ſpecifica vis adverſus ſerpentum & venenatorum animalium morſus, vermes & febres intermittentes. Alii vi virulenta, ſoporoſa hoc lignum præditum eſſe volunt. Ex fructu vero, quem profert planta, facile cognoſcitur, caute hoc lignum eſſe exhibendum.*

Cupreſſum, Cupreſſi officin. *Bois de Cyprés*, **Cupreſſen-Holtz.** Eſt arboris coniferæ, foliolis brevibus, acutis, in ſquamas degenerantibus, floribus amentaceis, fructu ſeu cono, e clavatis, lignoſis tuberibus, in formam globoſam coaptatis, compoſito, nucleis angulatis, acuminatis, parvis. Colitur apud nos in hortis, in calidis regionibus ſponte provenit. *Refrigerat, ſiccat & adſtringit, ſudoriferum eſt & diureticum, atque in decoctis præſcribitur.*

Ebenum offic. *Ebene*, **Eben-Holtz.** Lignum omnium ponderoſiſſimum. Meditullium eſt arboris *Ebeni* C. B. quæ in India orientali provenit, & prunifera eſt. Folia ſunt juglandinis paulo minora, pinnata, praſſinum colorem referentia; fructus oblongus, viridis, edulis, Perſicæ fructus æmulus. Nomen habere dicunt a vocabulo hebraico *Eben*, quod lapidem ſignificat; durum enim eſt lignum, lapidis inſtar. *Virtutibus cum Ligno Guajaco convenit. Uſus tamen magis eſt mechanicus, quam medicus.*

Guajacum officinale, Lignum Sanctum, *Bois de Gayac*, *Bois ſaint*, **Frantzoſen-Holtz.** Eſt lignum ſolidum, denſum, ponderoſum, & reſinoſum, nigricantis coloris, ſaporis acris, amaricantis, odoris haud ingrati. Inter plures

arborum Guajaci ſpecies lignum officinis dat illa, quæ folia habet ſubrotunda, pinnata, pari numero, ſicut Lentiſcus, læte virentia, cujus flos eſt roſeus, pentapetalus, colore albus, piſtillum ſtiliforme, rectum & longum; Fructus parum compreſſus, cordiformis, bilocularis, loculo uno plerumque vacuo, in altero continet ſemen, quod eſt nux ovata, duriſſima. *Plumier Nov. Gen. plant.* arborem *Guajacum, flore cœruleo fimbriato, fructu tetragono* deſcribit. Ex Hiſpaniola, Jamaica & aliis provinciis Americæ advehitur. Eligenda eſt matrix, ſive pars interior, non pars corticoſa, quæ prior eſt, coloris ex fuſco cinerei, reſinoſa. *Siccat, ſudorem & urinam promovet, ſanguinem mundificat, & ſpecifice ad luem veneream adhibetur.*

Lignum Juniperinum, *Bois de Genevre*, **Wachholder-Holtz.** Eſt radix reſinoſa, odorata Juniperi officinalis, vulgaris, fruticoſæ. *Sudoriferum atque diureticum eſt, & in morbis lymphæ & catarrhalibus, in decoctis, propinari poteſt; ad ſuffitus etiam adhibetur.*

Lentiſcinum, *Bois Lentisque*, **Maſtich-Holtz.** Eſt nodoſum, non admodum craſſum, interne album, cortice cinereo tectum, ſaporis & odoris reſinoſi. *Lentiſcus* officin. *Lentiſcus vulgaris* C. B. Arbor Maſtichen fundens. Gaudet foliis pinnatis, in extremitate coſtæ, absque impari. Flos ex foliorum alis egrediens, eſt amentaceus in mare, in fœmina calix trifidus, minimus. Fructus unicus, nucleus glaber. In Chio inſula copioſe naſcitur, floret Martio & Aprili. Optimum cenſetur ponderoſum & reſinoſum. *Siccat & adſtringit, ad ſanguinis & alvi fluxiones, uteri & ani procidentiam laudatur, urinam ciet, & dentes vacillantes firmat. Uſus eſt in decoctis.*

Moluccenſe, Pavana, *Bois des Moluques*, **Moluckiſches Purgier-Holtz.** Eſt ſpongioſum, leve, pallidum, cortice tenui tectum, ſaporis acris nauſeoſi, odoris fere nullius. Colligitur ex *arbore Ricino*, fructu glabro, *Grana Tiglia* officinis dicta, foliis Malvæ, cortice molliore & nigricante. Pavana ab incolis appellatur. *Cadel Avenacu H. Malabar.* In Malabar colitur, unde ad nos advehitur. *Recens vehementer purgat, atque ſerum educit, nonnunquam vomitus facit, & ob acrimoniam pruritum, imo inflammationem in ano excitat. Siccum & inveteratum mitius ſe gerit, & ſudorem movet, præcipuus uſus eſt in morbis chronicis, febre quartana & hydrope. Hypercatharſis & ani pruritus ab hoc pharmaco excitati, cremore oryzæ vel avenæ, facile ſiſtuntur. Ad avium capturam etiam adhiberi ſolet; illico enim concidunt, ſi de tritico vel alio frumento, cui pulvis hujus ligni immiſtus eſt, aſſumſerint. Ex quibus patet, cautius cum hoc ligno mercandum eſſe. Doſis a granis quatuor ad decem pro robuſtiſſimo, ex carnis juſculo.*

Nephriticum, *Bois nephretique*, **Grieß-Holtz.** A colore, quo aquam inficit, etiam a nonnullis vocatur *Sandalum cœruleum.* Fuſcum, ſolidum, durum & grave eſt, ſaporis acris, amaricantis. Arbor, ex qua colligitur, ſecundum *Sloan. Hiſt. N. Jamaic.* eſt *Acacia arborea, major, ſpinoſa, pinnis quatuor majoribus, ſubrotundis, ſiliquis varie intortis,* habetque Pruni vel Piri magnitudinem, folia pinnata, flores papilionaceos, ſiliquas bivalves, craſſas, in extremo latas, ſemina reniformia. Advehitur e Mexico, regno Americano. In uſum venit pars interior, ſive meditullium

tullium fuscum, corticosa alba abjicitur. *Ad renum vitia, calculum & urinam pellendam laudatur. Exhibetur in infuso & decocto. Curiosum est experimentum, quod cum infusione hujus ligni in aqua fontana instituitur; versicolor enim illa cernitur, prout in hoc vel illo situ spectatur.*

Lignum Rhodium, *Bois de Rhode, de Cypre, des Roses*, **Rosen-Holtz.** Radix est lignosa, dura, contorta, nodosa, resinosa, odoris rosei, saporis subamari. Dicitur etiam *Aspalathum* colore buxi C. B. Sunt, qui volunt, esse *Cytisi incanæ, siliquis falcatis*, C. B. radicem, quæ est planta, flore papilionaceo, fructu siliquoso. Ex insulis Canariensibus & aliunde ad nos advehitur. Eligatur resinosum, ponderosum, odoris fragrantis, rosei. *Usus ejus frequentior est ad odoramenta, quam internus. In decoctis tamen nonnunquam lignorum, ad sanguinem mundificandum, præscribitur; urinam & sudorem ciet.*

Sanctum officinale, quasi Guajacum propemodum sine matrice C. B. *Bois saint*, **Pocken-Holtz.** Pro eodem cum Guajaco habetur, vires etiam, odor & sapor vix differunt, colore vero paullo albidius, & pondere levius est Guajaco. Arbor Jasminum vulgo Americanum, at rectius *Evonymo* affinis occidentalis, alatis Rusci foliis, nucifera, Indis *Hvaxacon* dicta, vocatur. Ex America advehitur. *Easdem cum Guajaco habet vires, Guajacum tamen potentius est.*

Sandalinum album, Santalum s. Sandalum album officinale, *Bois de Santal blanc*, **weisses Sandel-Holtz.** Est durum, solidum, pallidum, odoris & saporis grati, subamari, aromatici. Arbor est baccifera, folia sunt pinnata, flores ex cœruleo nigricantes, fructus cerasi magnitudine per maturitatem nigri. Ex India advehitur orientali, & quidem insula Timor; arbor ab Indis *Sercanda* vocatur.

Sandalinum citrinum, Santalum citrinum officinale, *Bois de Santal citrin*, **gelber Sandel.** Colore est flavius præcedenti, superat illud etiam pondere, densitate & odore fragrantiore, sapore, virtutibus & pretio. Ejusdem arboris Timorensis bacciferæ, Sercandæ dictæ, est pars interior; Santalum album vero, quod haud raro etiam in segmentis cylindraceis, in quibus nulla medullosa ac resinosa substantia cernitur, ad nos venit, pars corticosa, sive exterior. *Cardiaca & hepatica censentur, & in decoctis ad lymphæ vitia præscribuntur.*

Sandalinum rubrum, Santalum rubrum officinale, *Bois de Santal rouge*, **rothes Sandel-Holtz.** Est arboris pars interior, ab externo cortice liberata, colore rubrum, ponderosum, fibrosum, densum, saporis adstringentis. Species est Ligni Brasiliensis tinctorii, & arboris, folio pinnato, flore papilionaceo, siliqua bivalvi, seminibus reniformibus. Adfertur tam ex Orientalis, quam Occidentalis Indiæ provinciis. *Tinctores æque ac Medici hoc Santalo utuntur, siccat & adstringit.*

Sassafras, Lignum Pavanum Indorum, Winanck Virginiensium, J. B. *Bois de Sassafras*, **Sassafras, Fenchel-Holtz.** Radix arboris est lignosa, levis, rara, coloris pallidi, nonnunquam cinerei, saporis acris, subdulcis, odoris

odoris aromatici, Fœniculi inſtar. Cortice veſtitur tenui, foris cinereo, intus ferrugineo. Arbor, ex qua deſumitur, *Laurus, foliis integris & trilobis*, in Hort. Cliffort. *Saſſafras & Cornus mas odorata, folio trifido, margine plano*, ab Indis vero *Pavane* vocatur. Mediocris eſt magnitudinis, fructu calicibus inſidente, acetabulorum inſtar concavis; foliis trilobis ſeu anguloſis, ſemper virentibus, ſubtus cinerei coloris, floſculis luteis racematim congeſtis, e ſex petalis ovatis acuminatis conſtantibus, ſtaminibus novem. Fructus baccæ parvæ ſunt, per maturitatem nigricantes, ſicut floſculi, racematim congeſti, & continent ſemen unicum, nucem nimirum ovatam, acuminatam, quæ includit nucleum ejusdem formæ. In Virginia & Florida largus hujus arboris eſt proventus, unde etiam ad nos advehitur. Eligatur odoratum, in parvis ſegmentis, cortice veſtitis. *Laudatur ad Lymphæ vitia, catarrhos, arthritidem, fluorem album, & alios hujus generis morbos. Uſus eſt in decoctis & infuſis.*

Lignum Suberis, *Liege*, **Pantoffel-Holtz, Korck.** Eſt cortex arboris, quæ Quercus ſpecies, atque foliis perpetuis, non aculeatis, & cortice craſſo a reliquis differt. Provenit in Hiſpania & Italia. *Virtute gaudet adſtrictiva, ſæpius tamen in uſus venit mechanicos, quam medicos; præcipue ad obturanda vitra inſervit. Carbo ex ſubere, conſtituit colorem illum nigrum*, Hiſpanicum *dictum.*

Viſcus vel Viſcum, *Gui*, **Miſtel.** Baccis albis, planta eſt paraſitica, fruticoſa, aliis arboribus innaſcens, folia ejus conjugata ſunt, anguſta, oblonga, ſemper virentia; flores in perianthio tetraphyllo, monopetali, patentes, ſemiquadrifidi, fœminini cum maſculinis in eadem planta. Bacca eſt ovalis, alba, unilocularis, ſemen unicum cordatum. Deſcriptio hæc omnibus Viſci ſpeciebus convenit, quæ in Medicina adhibentur: Sunt vero

Betulæ, *Gui de Bouleau*, **Bircken-Miſtel.**

Coryli vel Corylinus, *Gui de Coudrier*, **Haſel-Miſtel.**

Quercinus, *Gui de Chene*, **Eichel-Miſtel.**

Salicis, *Gui de Saule*, **Weiden-Miſtel.**

Tiliæ, *Gui de Tillau*, **Linden-Miſtel.**

Vix ulla proſtat pulveris Epileptici deſcriptio, quæ non pro ingrediente Viſcum agnoſcat. Quernus plerumque in uſum vocatur; alii Corylinum, vel Tiliaceum præferunt. *Veteribus polychreſtum fuit remedium quernus, qui & in morbis lymphæ locum habet; antepilepticum & diureticum eſt, atque in arthritide, catarrhis, alvi & menſium nimio fluxu feliciter, in pulvere vel in decoctis, exhibetur.*

CAPUT IX.

DE GUMMI ET RESINIS.

Ammoniacum Gummi, *Gomme Ammoniac*, **Ammoniac.** Eſt concretum gummoſum & reſinoſum, e magna ferulacea planta exſtillans, collectum. Ex India Orientali advehitur, in Lybia etiam, juxta Jovis Ammonis templum proveniſſe, & inde allatum, atque nomen acce-

accepisse, ferunt. Eligendum est in granis, instar Olibani, condensatum, & ab arena & aliis quisquiliis liberum, odoris gravis, ex Castoreo & Allio mixti, saporis amari, parum acris, digitis tractatum mollescens, exterius flavum, intus candidum. *Emollit, resolvit, digerit, maturat, alvum movet, & tam interne, quam externe feliciter adhibetur.*

Animi & Animæ, *Gomme Animé.* Est resina arida, quæ in frustis variæ magnitudinis advehitur, foris albida, intus pallescens, aliquatenus transparens, friabilis, saporis terebinthinacei. Dum accenditur, tota consumitur, & hanc ob causam, gummi animæ dicitur. Odorem spargit fragrantem. Arbor in nova Hispania & Brasilia provenit, & ab incolis *Jetaiba*, a botanicis *Lebus peregrinus cartilaginosus, phaseolo nigro puniceo annulo cincto*, vel *arbor siliquosa animifera Brasiliana*, & a *Plumier, Courbaril bifolia, flore pyramidali*, vocatur. *Attenuat* & *resolvit, nervos roborat. Usus est externus in Emplastris, ad capitis & nervorum affectus.*

Arabicum officinale, Gummi, Senegal, Senica, *Gomme Arabique*, **Arabisch Gummi, Dinten-Gummi.** Est substantia gummosa, pallida, pellucida, saporis viscosi, fatui, odoris nullius. In globis, ovis columbinis majoribus, exterius scabris, intus claris & transparentibus, nobis ex Guinea Africana advehitur. Secundum *Rajum H. Pl.* fluit ex arbore, quæ est *Acacia Indica Farnesiana Ald.* Verum gummi Arabicum, post incisionem fruticis, exstillat ex Acacia Ægyptiaca, foliis Scorpioidis, leguminosa, siliquis albis compressis, isthmo interceptis, flore luteo; vermiculatum est, & vix unquam ad nos fertur. Cum eo vero virtutibus convenit gummi *Senegal*, quod minori pretio & copiosius & purius habetur; facile igitur vero ex Acacia carere possumus; eligatur modo vitri instar pellucidum, purum & candidum. *Temperat lymphæ acrimoniam, & leniter adstringit.*

Asa dulcis, Benzoin, Belzoinum, Benzoë, *Benjoin*, **Benzoe, wohlriechender Asand.** Resina est arida & indurata, ex variis frustulis, diversorum colorum, in massam coacta, saporis acris, resinosi, odoris suavis. Arbor, quæ Benzoin largitur, non solum in Sumatra & Java, pariter in Siamensi & Martabano regnis crescit, sed etiam in America & a *Bœrhavio*, sub nomine arboris *Virginianæ Benzoiniferæ*, Citri vel Limonii folio, notatur. Ex uno caliculo quadrifolio oriuntur flosculi tres, ad eundem ortum, qui singuli constant uno tubo longo, superius expanso in tumidum caput, quod in octo segmenta profunde finditur, intra hæc segmenta stamina sunt brevia, testiculata, in medio tubo floris ovarium, tuba longa instructum, cuncta vero quam minima sunt. A *Linnæo* in *Hort. Cliffort. Laurus, foliis enervibus, obverse ovatis*, utrinque acutis, integris, annuis, vocatur. Exstillat Benzoin ex arbore vulnerata; optimum censetur, quod *Amygdaloides* vocatur, & maculas candidas, Amygdalarum instar, refert, nec aliis heterogeneis inquinatum est, atque suavissimum spirat odorem. *Calefacit, incidit, attenuat, pnevmonicum est, in tussi, asthmate & catarrhis utile, atque ad suffimenta adhibetur.*

Asa fœtida, Laser fœtidum, Syriacum, *Asa fœtida*, **stinckender Asand, Teuffelsdreck.** Est gummosum, & parum resinosum concretum, e grumis albescentibus, flavescentibus, nonnunquam rosei coloris. Planta, ex qua colligitur, *Hingisch* vocata, est umbellifera, Levistico affinis, foliis, instar Pæoniæ, ramosis, caule pleno, maximo, semine foliaceo, nudo, solitario, Brancæ Ursinæ vel Pastinacæ simili. Patria ejus sola est Persia, non Media, nec Lybia &c. &c.

& illa potissimum, quæ circa *Heraatum*, campestre desertum occupat, & quæ in montibus vicinis crescit, succi ferax est. Nulla ex caulibus vel sponte fluit, vel arte exprimitur, sed ex radice manat sauciata. Miræ longævitatis est hæc radix, magna, ponderosa, nuda, exterius nigra. Quadriennio minor parum lactescit, & nunquam secatur, quo autem annosior & major, eo copiosiorem fundit lachrymam. Succus ex utriculis illius recens emanans candidissimus, liquidus & pinguis, Flori Lactis simillimus est, ad aëris vero solisve contactum lentescit, & colorem subfuscum induit. Fœtor, virtutis index, ad Allii odorem accedit. Sapor acris est & valde ingratus. *Raro interne adhibetur; in colicis torminibus tamen & hydrope, præsertim tympanite, Indis laudatum est remedium; alias etiam non modo contra veneficia, sed ad affectus quoque uterinos communiter adhibetur. Externe in emplastris ad nervorum, uteri & lienis affectus commendatur.*

Asphaltum, vide Marina.

Bdellium, *Bdellium*, **Gummi Bdellium.** Est lachryma arboris cujusdam non satis huc usque cognitæ & descriptæ, quæ in Guinea, Arabia, Media & India nascitur. Tradunt etiam in America arborem Bdelliferam, foliis quernis, spinis geminis, ad ortum singulorum foliorum, exasperatam provenire. Cl. *Royen* ex *Plucken. arborem Bdelliferam, lactescentem aculeatam, foliis quernis* describit. Coloris est ferruginei, nigricantis, in guttas seu grana concretum, sapore & odore myrrham æmulatur. Præfertur, quod gustu est amarum, translucidum, dum frangitur, pingue & odoratum. *Cum Myrrha convenit, & ad Mithridatii compositionem & nonnulla emplastra adhibetur.*

Camphora, Caphura, *Camphre*, **Campher, Kampfer, Kapher.** Est resinosa substantia, vel potius oleum destillatum solidum, nivis instar candidissimum, in panes coactum, saporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis, gravis. Camphora, quæ in nostris officinis prostat, ex Japonia advehitur, atque ex *Lauro, foliis ovatis, utrinque acuminatis, trinerviis, nitidis, petiolis laxis, Linnæi*, sive *arbore camphorifera, foliis laurinis, fructu parvo, globoso, calice brevissimo*, colligitur. Arboris folia alternatim sunt posita, semper virentia, flores, ex foliorum sede provenientes, hexapetali, albi, fructus seu bacca atro-purpurea, pericarpio molli, saporis ex Camphora caryophyllacei, nucleo bifido, calloso, duro ac pingui, cortice integro fragili, calici concavo insidet. Extractio Camphoræ per rusticos peragitur, in provincia *Sazuma* & in insulis *Gotho*; radices & ligna arboris in festucas comminuta, cum effusa aqua, in vesica ferrea, superimposito & stramine impleto alembico magno, coquunt, & tandem Camphoram sublimatam, straminibus adhærentem, colligunt, quæ deinde ulterius purificatur, atque, tradente *Künstio* in *Act. Phys. Med.* Vol. V., in vitro probe clauso, leni igne colliquata, figuram orbicularem nanciscitur. *Camphora Borneensis*, quæ optima censetur, nunquam ad nos pervenit, sed magno pretio etiam apud incolas habetur. Nativa est & absque destillatione, ex trunco arboris eruitur & colligitur. Multæ etiam dantur aliæ plantæ, quæ Camphoram largiuntur: Radices arboris Cinnamomi magnam exhibent quantitatem destillatione; Zedoaria vero parum prodit. *Eligenda Camphora candicans, sine maculis, pellucida, instar glaciei, quæ deflagrando tota consumitur, & in ipsa aqua ardet. Alexipharmaca, calida & anodina est. Adhibetur tam interne, quam externe. Dosis interne granum unum, ad tria usque. Miscetur, utplurimum cum nitro, & absorbentibus, vel sic dictis bezoardicis. Beat.* Fr. Hofmannus, *cum* Balsamo de Copaiva *mixtam, ad gonorrhœam, & cum* Tincturis croci, succini & Cort. Aurantiorum, *ad menstrua suppressa, commendat.*

Can-

Cancamum quid ſit, hodie plane ignoratur. Alii *Laccam* eſſe, alii *Benzöen;* nonnulli *Animæ Gummi*, pro Cancamo habent. Plurimi, ubi in veterum deſcriptionibus ſive compoſitionibus occurrit, *Gummi Animæ* ſumere ſuadent.

Caranna, *Caragne.* Reſina tenax duraque eſt, quæ, dum recens, picis inſtar ductilis, inveterata vero fragilis & dura eſt; coloris ex viridi nigricantis, ſaporis amari, ingrati, odoris fragrantis eſt, præſertim, dum accenditur. Ex nova Hiſpania, in fruſtis cylindraceis, quæ foliis junceis involuta ſunt, advehitur. Arbori, ex qua exſudat, folia adſcribuntur oleaginea, in crucis formam compoſita, fructus ſeu baccæ oblongæ, quaternæ. *Calefacit & reſolvit. Uſus eſt externus in emplaſtris.*

Ceraſorum Gummi, *Gomme des Ceriſes*, **Kirſchen-Hartz, Kirſchen-Gummi.** *In aqua totum diſſolvitur, & cum Gummi Arabico vel Senica convenit, atque defectu ejus in uſum vocari poteſt.*

Colophonia, *Colophone*, **Spiegel-Hartz, Geigen-Hartz, Colophonium.** Ex urbe Colophone olim habebatur; Pix, ſive abiegna reſina eſt, lento igne ad hanc conſiſtentiam friabilem & colorem brunneum cocta. Fit etiam ex reſiduo olei Terebinthinæ, vocatur quoque *Pix græca. Fumus ejus ad teneſmum & prolapſum ani ac uteri procidentiam commendatur, additur Emplaſtris, roborat & ſiccat.*

Copal, Pancopal, *Gomme Copal*, **Gummi Copal.** Reſina eſt duriuſcula, diaphana, ex albo flaveſcens, dum carbonibus inſpergitur, odorata, a nonnullis Succinum vegetabile vocata. Volunt, eſſe arborem, ex qua Copal colligitur, Populo nigro haud diſſimilem, & copioſe in inſulis Antillinis provenire. Sponte ex arboribus defluit, & non raro ab imbribus ad ripas fluminum abripitur, quod forſan, & cum prima facies Succinum referat, anſam dedit, Succinum vegetabile appellandi. A recentioribus botanicis, *Rajo*, *Pluckenet*, & *Clayton*, *arbor reſinoſam copal fundens*, *Rhus* vel *Sumach Virginiana* appellatur. *Jonſton* viginti ſpecies arborum, Copal proferentium, enumerat: Americani enim fere omnes reſinas transparentes, nomine Copal indigitare ſolent. Copal ſubſtantia ſua non mere reſinoſum eſt, ſed gummoſi quid occultat, unde difficilis eſt ſolutionis. *In Medicina rari, niſi ad ſuffimenta, eſt uſus, frequentius ad vernices ſeu laccas expetitur, atque peculiarem depoſcit encheireſin ſolutionis.*

Elemi, *Gomme Elemi*, **wild Oelbaum-Hartz.** Reſina eſt ſemidiaphana, pinguis, ex flavo albicans, ad viridem colorem inclinans, in maſſam coacta, & foliis arundinaceis involuta, odoris vinoſi ſuavis. Ex America, & præſertim nova Hiſpania & Braſilia advehitur. Arbor Elemifera folia habet pinnata, petiolis longis, pentaphyllis, ſemper virentia; floſculos tetrapetalos, verticillatos; Fructus purpureos, pyriformes, minores. Arbor, Gummi vel potius reſinam Elemi fundens, ab Illuſtr. *Linnæo* in *Horto Cliff. Elemifera foliis ternatis*, a cl. *van Royen*, *Frutex trifolius reſinoſus*, *floribus tetrapetalis albis*, *racemoſis* vocatur; A *Chabræo*, *Lentiſcus Peruviana.* Deſcribitur & alia arbor a *Breyn.* in *Prodrom.* 2. atque *Elemi* arbor ex *Surinama, myrti laureæ foliis*, appellatur; cujus tamen reſina, non pro vero, ſed ſpurio Elemi habetur; idcirco *Gummi Chibou*, *la Gomme Chibou*, in *Codice Pariſienſi pharmaceutico* ſalutatur. *Rajus* in *H. Pl.* ex *Baccio de vinis apulis* locum adducit, ubi Elemi, ex olea arbore vetuſta exſudaſſe, mentio fit: Quæ *Baccii* obſervatio forte anſam dedit, reſinam Elemi vernacula noſtra **wild-Oelbaum-Gummi** appellandi. Eligitur odoratum, purum, pingue. *Calefacit, digerit, reſolvit; & in vulneribus membra-*

nosarum & nervearum partium, bono cum effectu, adhibetur. Usus est in Balsamis vulnerariis & Emplastris.

Euphorbium, *Gomme Euphorbe*, **Euphorbium, ein scharfes Gummi.** Substantia est gummosa, in guttis sive granis pallescentibus, saporis acerrimi, urentis, nauseosi, odoris nullius. Colligitur ex planta Euphorbii, cerei effigie, caulibus crassioribus, spinis validioribus armati, in apice frugiferis, floribus Tithymali tetrapetaloidibus, quæ in Indiæ Orientalis regionibus & Mauritania crescit, hinc inde etiam *Tithymalus Mauritanicus, Aphyllus angulosus, spinosus*, apud *Bœrhavium* audit. Succus plantæ vulneratæ lactescens a sole condensatur. Eligatur albicans in granis majoribus. *Vim habet exurentem, inflammatoriam, vehementer humores viscidos fundit & educit; vix tamen, nisi Hydropicis fortioribus dari debet: corrigitur succo citri vel aliis acidis; externe Cariei ossium absumendæ inservit.*

Galbanum Gummi, *Gomme Galbanum*, **Galban, Mutter-Gummi.** Est succus in grumos condensatus gummosus, resinosis paucis particulis permixtus, coloris flavescentis, subfusci, saporis amaricantis acris, odoris gravis. Colligitur e *Ferula Syriaca Galbanifera, fruticosa*, foliolis pinnatifidis, pinnis linearibus, planis, trifidis, semper virentibus. Radices plantæ valde succulentæ & lactescentes sunt, caules fungosi medulla pleni; semina & flores, in umbella, ovata, tenuia, perampla, plerumque per maturitatem nigra. A *Tournefortio* planta vocatur *Oreoselinum Africanum Galbaniferum;* his a *Rajo* adduntur verba. *Frutescens anisi foliis: Tournefortius*, quem modo allegavimus, plantam *foliis anisi similibus, longioribus tamen & magis incisis* describit: addit *flores luteos, semina plana, orbicularia*, quibus se planta distinguit a *Ferula.* Tota planta lactescit, vel succo gummoso lacteo turget, qui succus vel sponte erumpens, vel ex planta vulnerata exsudans, coagulatur a solis calore in grana, quæ optimum Galbanum constituunt. Ex orientalibus regionibus, Arabia & Syria, advehitur. Eligendum Galbanum in lachrymis, sive granis, coloris flavescentis, vel rufi. *Emollit & maturat; interne in mensibus ciendis, & aliis uterinis affectibus adhibetur. Plurimus usus est in Emplastris.*

Guajacum, *Gomme de Gayac*, **Frantzosen-Holtz-Gummi.** Est substantia gummi-resinosa, friabilis, coloris viridescentis fusci, saporis acris, odoris fere nullius, cum vero carbonibus injicitur, haud ingrati. Distinguitur a Resina, quæ, mediante Spiritu Vini, Ligno extrahitur; hoc vero nativum est, & ex arbore, quæ Guajacum Lignum suppeditat, exsudat. Eligatur illud, quod in minoribus frustis advehitur, & corticibus adhæret Guajaci. *Incidit, attenuat, resolvit, & easdem vires habet, quas Resina, atque in iisdem affectibus, scilicet catarrhalibus, Lue venerea, gonorrhœa, scabie maligna, &c. &c. in forma pilulari, cum Extractis appropriatis, exhiberi potest. Dosis grana quatuor, ad octo.*

Gummi Gutta, Gutta Gamba, Gutta Cambodia, Gutta & Gitta Gemu, Gummi de Goa, Gummi de Peru, Gamandræ, *Gomme goutte*, **Gummi-Gut.** Est succus gummosus & parum resinosus, inspissatus, flavus, arboris Malabaricæ *Caddampulli* dictæ, pomiferæ, foliis conjugatis binis, floribus tetrapetalis, in summis surculis, fructu Mali Aurei æmulo. Succus e sauciato trunco emanans, flavescens colligitur, & addita aquæ pluviæ sufficiente quantitate, a fæcibus purgatur, defæcatus, lenissimo igne, ne nigrescat, inspissatur, atque, vel in cylindros efformatus, vel in bacillis, cerei instar,

con-

contortis, ad nos mittitur. Naſcitur in Malabaria. Eligendum eſt Gummi Gutta flavi vel aurei coloris, purum & a fæcibus liberum. *Acre eſt, & vehementer per ſuperiora & inferiora purgat, Hydropicis & Phlegmaticis datur, a granis octo ad decem; pictoribus vero plurimum inſervit.*

Hederæ Gummi, *Gomme de Lierre*, **Epheu-Gummi.** Lachryma eſt Hederæ arboreſcentis, quæ vel ſponte, vel ex trunco vulnerato ſtillat, ſaporis cauſtici ſive acris, ſimul adſtringentis, ſubſtantiæ aridæ, reſplendeſcentis, coloris utplurimum fuſci, fere nigri. Advehitur ex calidioribus regionibus. *Reſolvit, attenuat, urinam & ſudorem movet. Datur in forma pilulari, cum Extractis combinatum.*

Juniperi, vide Sandaracha.

Laccæ Gummi, *Gomme Lacque en graines, en baton, en oreilles*, **Gummi-Lacc.** Reſina eſt, & tres in Officinis ejus reperiuntur ſpecies, in ramulis ſive baculis, in granis, & tabulis. *Lacca in Baculis* dicitur, quia parvis arborum ramulis, ſuper quibus efformata eſt, adhærens, ad nos venit. Subſtantia ſua reſinoſa, fuſci coloris, ſuperficie inæquali, quaſi granulata, baculos circumcludit, ſaporis eſt ſubadſtringentis, parum reſinoſi, odoris fere nullius, & dum accenditur, haud ingrati. Quæ *in Granis dicitur*, pellucida, rubicunda, ſaporis reſinoſi eſt. Hæc fuſa & a fæcibus purgata illam, quæ *in Tabulis* vocatur, exhibet, atque ex flavo rubet, pellucida, & fragmentis Vitri Antimonii ſimilis eſt. Reperitur in ramulis arboris *Jujubæ Indicæ, Ber* dicta foliis majoribus, rotundis, trinerviis, ſubtus lanuginoſis, floribus pentapetalis, herbaceis. Advehitur e regnis Pegu & Martabane Indiæ Orientalis. Non ſponte ex arbore deſtillat, ſed opificium eſt inſectorum alatorum, formicis ſimilium, quæ materiam hujus concreti reſinoſi, vel ex ipſa arbore, vel aliunde colligunt, alvearia ex illa conſtruunt, atque ovula, ad novi examinis ſui generis productionem, in ea deponunt; ovula alveolis incluſa in Chryſalides, more aliorum inſectorum, abeunt, & hæ Chryſalides revera id ipſum ſunt, quod Laccæ colorem rubrum conciliat; quo major igitur harum Chryſalidum copia in dictis alveolis latet, eo præſtantior ad tingendum, & extrahendam Tincturam cenſetur. Quæ vero, a ramulis ſeparata, in granis advehitur, Indis, qui telas & varias res colore rubro, mediante Lacca, inficiunt, jam inſervivit, & ſuo colore orbata eſt. *Lacca in granis ad vernicis, in tabulis, ad ſigillatoriæ Laccæ confectionem, expetitur. In uſum medicum quando vocatur, plerumque in granis ſubintelligitur. Leniter adſtringit, & urinam movet. Ad Tincturæ vero præparationem, ob ſupra allegatas cauſas, illa, quæ baculis adhæret, requiritur. De Gummi Laccæ origine legi meretur obſervatio D. D.* Godofredi, Act. Phys. Med. Vol. III. Append. p. 60.

Ladanum, Labdanum, Ladan, *Gomme Ladanum*, **Ladan.** Eſt reſinoſa ſubſtantia, griſea, terra permixta, in ſpiras, cereorum inſtar, contorta; ſaporis amari, odoris, dum accenditur, fragrantis, non omnibus grati. Colligitur ex Ladani vel Ciſti Ladaniferæ planta, & quidem e caulium & foliorum ſuperficie. Plantæ frequens & copioſus eſt proventus in Candia, Cypro & Græcia. *Ciſtus* appellatur *Ladanifera Cretica, flore purpureo, roſaceo.* E calice ſurgit piſtillum, quod deinde abit in fructum ſubrotundum, apice dehiſcentem, multicapſularem, ſeminibus fœtum. Modus colligendi tam a *Bellonio*, quam *Tourneofortio* deſcribitur. Incolæ habent peculiare inſtrumentum, quod leniter Ciſto affricant, ſic adhæreſcit Ladanum inſtrumento, quod deinde

 colli-

colligitur. Barbis hircorum & caprarum inter Ciſtum paſcentium etiam adhæret, unde Ladanum de Barba appellatur, quod optimum eſſe cenſetur. Sit reſinoſum, pingue, inflammabile, odoratum. *Nervinum eſt, raro tamen interne datur. Uſus eſt in emplaſtris anticatarrhalibus & nervinis, & ad ſuffitus.*

Maſtiche, Reſina Lentiſcina, *Maſtic*, Maſtich, Maſtir. Lentiſcus, ex qua Maſtiche colligitur, copioſiſſime in inſula Chio, Ægæi maris provenit; naſcitur etiam in Ægypto, Syria, Gallia Narbonenſi, & nonnunquam in hortis Botanophilorum in Germania invenitur. Arbor eſt ramoſa, rami ſunt flexiles, cortice cinereo obducti. Folia myrtum referunt, per paria ad unam coſtam diſpoſita, non in unum folium deſinentem, ſemper viridia, tenera, odoris non ingrati, fortis, ſaporis adſtringentis, acidiuſculi. Flores ex foliorum alis naſcuntur, racemorum inſtar diſpoſiti, rubri, vel coloris herbacei ad purpureum accedentis. Fructus ſunt baccæ rotundæ, nigræ, ſaporis acidi, nucleum habentes oblongum nigrum, duram continentem medullam albam viridem. Duplex in officinis proſtat Maſtiche, electa ſive *in granis*, altera, quæ multis ſcatet impuritatibus, atque cinerei eſt coloris, *in Sorte* vocatur; Laudatiſſima vero ex *Chio* advehitur. Præfertur, quæ eſt in granis majoribus, alba, pellucida, friabilis, quæ tamen, dum maſticatur, picis inſtar, dentibus adhæret, & ductilis eſt, odoris grati. *Uſus eſt tam externus, quam internus; calefacit, ſubadſtringit, roborat.*

Myrrha, *Myrrhe*, Myrrhen. Eſt ſubſtantia gummoſa & parum reſinoſa, arida, fuſca, ſaporis amari, acris, aromatici, odoris fragrantis, non ingrati. Arbor, ex qua colligitur, nondum clare deſcripta eſt, dicunt ab Arabibus vocari *Pola*, eſſe bacciferam, atque in locis deſertis provenire. Ex Arabia, Ægypto & Æthiopia advehitur Myrrha. Eligenda friabilis, levis, in lachrymis quaſi, ubique concolor, amara, acris, aromatica & fragrans. Myrrha *Stacte* vocatur, quæ pellucida, vel ſaltem egregie ſplendens & pura eſt. *Calefacit, aperit, attenuat, diſcutit & putredini reſiſtit.*

Olibanum, Thus, *Encens*, Weyrauch. Eſt lachryma reſinoſa arboris Thuriferæ, e flavo palleſcens, duriuſcula, ſemidiaphana, in grana variæ magnitudinis concreta, ſaporis reſinoſi, amaricantis, odoris, dum accenditur, fragrantis. Stillat partim ſponte e ſauciata arbore; arbor vero, ex qua colligitur, nondum deſcripta eſt, alii enim Piri, alii Lentiſci, alii Lauri, alii Pini & Salicis folia illi tribuunt. Certum eſt, illam in Arabia, & præſertim ejus provincia, Saba, provenire. *Herbolet* in *Biblioth. Orient.* mentionem facit, *Gummi Laban*, apud *Cluſium Louan*, quod ex arbore lentiſco ſimili, quæ in *Arabia felici*, & quidem in provincia *Saba* copioſe provenit, colligitur. Arabs *al Edreſi* in *geographia Arabiæ*, ſcribit, Olibani, *Gummi Laban*, magnus eſſe proventus, in provincia *Schagiar*, circa fretum *Gicum*. Probatur album, in guttis, & friabile, corticibus arboris & quisquiliis non inquinatum, nec Thure ſilveſtri permixtum, quod eſt reſina Abietis & Pini, ex acervis Formicarum collectum. Quæ de Thure Mannæ, teſticulato & mammoſo, apud veteres auctores, leguntur, de Thure electo albo intelligenda ſunt, ſecundum enim figuram lachrymæ nomina impoſuerunt veteres. *Calefacit, ſiccat, roborat, & ſubadſtringit Olibanum; internus & externus ejus eſt uſus, plurimus in ſuffimentis.*

Opopanax, Gummi Panacis, *Opopanac*, Panax-Gummi. Gummi ſive ſuccus lacteus concretus, e vulnerata circa radicem planta, æſtivo

æſtivo tempore exſudans, atque ſponte concreſcens. Planta, quæ Botanicis *Sphondylium* majus, ſive *Panax Heracleum* audit, florem habet roſaceum, umbellatum, luteum, folia lata Paſtinacæ, verum magis compoſita ſive ramoſa, ſemina ampla, plana, bina, ovata. Gummi eſt quaſi ex granulis, e rufo & albo flaveſcentibus, in glebas compactum, ſaporis amaricantis, acris, ingrati, odoris gravis. Bonitatis ſignum eſt, ſi facile in aqua ſolvitur, lacteſcit & valde amarum eſt. In Syria, Bœotia & Macedonia provenit; colitur etiam in Botanophilorum hortis. *Emollit, digerit, flatus diſcutit, purgat pituitam lentam; externe etiam pro Galbano in emplaſtris adhiberi poteſt.*

Pix, *Poix, Reſine,* **Pech.** Eſt pars reſinoſa, ex arboribus reſiniferis, præſertim, e pino, abiete, larice collecta, cocta, & ab impuritatibus liberata. In uſum medicum præcipue venit, quæ ſequitur.

Pix navalis, Palampiſſa, *Poix ou Reſine noire, navale,* **Schiff=Pech.** Quæ navibus picandis adhiberi ſolet. Eſt reſina ſive pix magis cocta & fuſca. *Ex ſeptentrionalibus regionibus advehitur. Siccat, calefacit & diſcutit; uſus eſt in Emplaſtris.*

Reſina communis, vulgaris, *Poix ou Reſine blanche,* **Hartz, Fichten=Hartz.** Colligitur magna in quantitate in ſilva Martia, ex Abietibus & Pinis, atque a corticibus arboris & aliis heterogeneis, per liquationem & colationem, liberata, in parva vaſa lignea effunditur, atque longe lateque divenditur. Vocatur **Kübel=Hartz.** Coloris eſt flaveſcentis, ſolida & odorata. *Uſus eſt in Emplaſtris, emollit, diſcutit, digerit.*

Sagapenum, Serapinum, *Sagapenum,* **Sagapen.** Lachryma ſeu Gummi eſt Ferulæ Sagapeniferæ, ex qua ſauciata colligitur. Naſcitur in Media, Perſia & aliis orientalibus regionibus. Optimum cenſetur in granis translucidum, foris fulvi vel rufi coloris, intus dilutioris, guſtus acris, odoris ad Porrum accedentis. *Inter purgantia validiora habetur, auxiliari cum vino ſumtum a beſtiis venenatis commorſis* Raj. Hiſt. plant. *perhibet. Commendatur hydropicis, aſthmaticis, atque tuſſi inveterata laborantibus. Reſolvit, attenuat, & purgat lentos humores ex ventriculo & inteſtinis, menſes & urinam ciet, embryonem enecare creditur.*

Sandaracha Arabum, Vernix ſicca, Gummi Juniperi, *Gomme de Genevre,* **Wachholder=Hartz, Sandarach.** Reſina eſt pellucida, Maſtichis inſtar, in guttis tamen majoribus & longioribus, friabilis, ſaporis reſinoſi, odoris, dum accenditur, ſuavis, ſicut Maſtiche. Ex Africa advehitur, ubi ex arboribus Juniperi majoris bacca rufeſcente C. B. ſauciatis exſtillat & colligitur. Cedrus eam quoque ſuppeditat, qualis tamen raro ad nos venit. *Proxime ad Maſtichen accedit virtute. Ad ſuffitus etiam eſt uſus, plurimus tamen ad vernices varias.*

Sanguis Draconis, *Sang de Dragon,* **Drachen=Blut.** Reſinoſa eſt ſubſtantia rubra, igni admota facile liqueſcens, & attritu colorem dilute rubrum reddens. Saporis reſinoſi, adſtringentis. Affertur figuræ olivaris, in folliculis, e foliis arundinaceis, convolutis, & *Sanguis Draconis in Granis* vocatur. Maſſa illa obſcure rubra, quæ *Sanguis Draconis in Tabulis* audit, plerumque factitia, impura, opaca & vilioris pretii eſt. Colligitur e diverſis arboribus, quæ Palmis adnumeran-

merantur, inprimis ex illa ſpecie, quæ *Palma prunifera, foliis Juccæ*, vocatur, e cujus caudice reſinam rubram hanc promanare perhibent. Optima Sanguinis draconis reſina, cenſetur illa, quam producit arbor, quæ *Draco Indica, ſiliquoſa, populi folio, Angſana vel Angſana Javanica* vocatur. *Comelin. Hort. Amſt.* Etiam ex caudice inciſo arboris, quæ lignum nephriticum producit, gummi rubrum profluere, quo, loco Sanguinis draconis utuntur, *Rajus in Hiſt. plant.* perhibet. Plurimi putant, id, quod Sanguinem draconis vocamus, cinnabarim eſſe *Dioſcoridis*. *Kæmpferus* vero aliam methodum, Sanguinem Draconis, e fructibus ſtrobiliformibus *Palmæ coniferæ ſpinoſæ*, eliciendi deſcribit. Præfertur ille, qui ab aqua non diſſolvitur, clarus, pellucidus, friabilis & eleganter ruber, atque vel in granis, vel fruſtulis, digiti magnitudinis, foliis arundinaceis involutus, advehitur. *Virtutes ſunt adſtringentes & ſiccantes, pulverem ad caſum & Dentifricios ingreditur; dentes firmat, & gingivas Scorbuto affectas ſanat.*

Sarcocolla, *Sarcocolle, Collechair*, **Fleiſchleim-Gummi.** Sunt granula gummoſa, parva, ex albo rufeſcentia, friabilia, ſaporis amaricantis, acris, ſubdulcis, odoris nullius. E Perſia ad nos transfertur. Sunt, qui plantam ſive arborem ſiliquoſam, flore papilionaceo ſcribunt; alii Tithymalum Perſicum ſpinoſum eſſe affirmant: quod tamen ob ſuccum acrem, quo hoc genus plantarum abundat, vix credendum. Eligenda recens, (vetuſta enim rufeſcit,) coloris pallidi, ſaporis amari, ſubſtantiæ poroſæ, glutinoſæ. *Calefacit, adſtringit, conſolidat, glutinat, maturat, in oculorum fluxionibus, albugine, nubeculis, lacte humano vel aſinino maceratc commendatur.*

Senegal Gummi, Senica, *Gomme de Senegal*, illud eſt, quod ſub nomine *Gummi Arabici* in officinis proſtat, atque ex *Guinea* advehitur, & a fluvio celebri *Senegal* vel *Senega* nomen habere videtur. Productum eſſe *Acaciæ, ſiliquis compreſſis*, plurimi autumant. Vires ſunt eædem, quæ *Gummi Arabici. Plurimus uſus in arte tinctoria & ſericaria, ad luſtranda ſericea.*

Styrax, Storax Calamita, *Reſine de Storax*, **Storax.** Maſſa eſt reſinoſa, pinguis, e flavo rufeſcens, ſaporis ſubacris, odoris ſuavis, fragrantis. Ex Styrace arbore, folio lanuginoſo Cotonei Mali, flore monopetalo, velut infundibuliformi, multifido, fructu ſubrotundo, carnoſo, uno vel altero oſſiculo plerumque fœto, colligitur. In calidioribus Europæ regionibus nonnunquam reperitur, ſed non fundit reſinam, ſicut in orientalibus, Syria, Pamphilia, Cilicia, &c. Olim in calamis ſive cannis advehebatur, unde nomen *Calamitæ* accepit; nunc plerumque in maſſa, multis quisquiliis & raſura ligni inquinata, advehitur. Styrax in granis vero naturalis rariſſima eſt. Eligatur pinguis, multis granulis reſinoſis, albicantibus mixta, rufeſcens, odoris ſuavis conſtantis. *Calefacit, emollit, concoquit. Cephalica & nervina eſt, catarrhis & tuſſi medetur; ad ſuffitus adhibetur.*

Tacamahaca, *Tacamahac, Tacamaque*, **Tacamahac.** Reſina arida, flaveſcens, vel rufa, in glebas compacta, ſaporis reſinoſi, aromatici, odoris ſuavis, fragrantis eſt. Stillat ex arbore *Tacamahacæ*, quæ ad magnitudinem Populi accedit. Folia ſunt fruticis roſarum ſimilia, dentata, & utplurimum quinque, uno pediculo adhærentia. Flores parvi, albi, racematim congeſti; ſemen unicum, triangulare. Vocatur etiam a Batavis *Sadelhaut*, id eſt lignum, ad ephippia conficienda idoneum. Naſcitur in Hiſpania Nova copioſe, & haud raro in inſula Madagaſcar provenit. Duplex reperitur Tacamahaca, illa, quæ ſponte ex arbore non vul-

vulnerata profluit, & in corticibus cucurbitarum colligitur, atque a Gallis *Tacamahac en Coque* vocatur, raro ad nos venit; altera in lachrymis & glebis, variæ magnitudinis, advehitur. Sit modo pura, ſuaveolens & fragrans. *Roborat, reſolvit, maturat, emollit, dolorem ac flatus diſcutit. Internus uſus rarus eſt; externe in emplaſtris, præſertim odontalgicis & ſtomachicis, adhiberi ſolet.*

Tragacantha, *Gomme Adraganth, d'Adragan, ou d'Epine de Bouc,* **Tragantk.** Lachryma gummoſa lucida, tenax, levis, in aqua ſolubilis, mucilaginoſa eſt. Colligitur ex radice vulnerata fruticis Tragacanthæ, foliis pinnatis, non deciduis, coſta media, cui pinnulæ annexæ ſunt, in longam, rigidam, acutam ſpinam procurrente, flore papilionaceo, ſiliquis geminatis, in duplici alveolo, duplicem ſeminum ſeriem continentibus, quæ etiam *Aſtragalus aculeatus fruticoſus Maſſilienſis* a *Pluckenet* vocatur. Provenit planta copioſe in Syria, inprimis circa Aleppum, & in Candia. Haud raro etiam in Gallia, circa Maſſiliam, occurrit, ubi tamen gummi raro vel nunquam fundit. Eligenda eſt alba, pura, vermiculata; rufa & impura rejicitur. *Humectat, acrimoniam mitigat, incraſſat, atque in tuſſi a materia acri, dyſenteria, ardore urinæ, raucedine, nec non in collyriis ad ophthalmiam bono cum ſucceſſu adhibetur.*

CAPUT X.

DE RESINIS LIQUIDIS ET BALSAMIS NATIVIS.

Ambra liquida, Liquid Ambra, *Ambre liquide,* **flüſſiger Amber.** Eſt reſina liquida, e flavo fuſca, conſiſtentiæ plerumque Balſami Peruviani Nigri, ſaporis acris, aromatici, odoris ſuavis. Fluit vel ſponte, vel ex inciſa arbore Liquidambar ſeu Styracis Virginianæ, quæ a Rajo *Platanus Virginiana, Aceris foliis* quinquepartitis, floribus tripetalis, fructibus ſphæro-cephalis, ſeminibus minimis, oblongis vocatur, & in Virginia, nova Hiſpania, & aliis Indiæ occidentalis regionibus occurrit. *Reſolvit, emollit, maturat, & cum Balſamo Peruviano convenit. Uſus plurimus eſt externus.* Nierembergius in Hiſt. Nat. *etiam interne in affectibus ventriculi & uteri conducere perhibet.*

Balſamum Canadenſe, *Baume de Canada,* **Balſam von Canada.** Species eſt Terebinthinæ. Fluit ex abiete Canadenſi, quæ a *Pluckenetio, Abies minor, pectinatis foliis, conis parvis, ſubrotundis,* Gallis *Epinette* ou *Sapinette de Canada,* vocatur. Cum Terebinthina Veneta convenit.

Balſamum de Copaiba, Copahu, Copaivæ, *Baume de Copaiba, de Capahu,* **Balſam von Copaiva.** Eſt liquor reſinoſus, limpidus, pallidi coloris, ſaporis acriuſculi, amaricantis, odoris terebinthinacei, gratioris. Arbor *Copaiba,* hoc balſamum fundens, in *Braſilia Americæ* regione naſcitur, folia habet ſubrotunda, ſive ovalia, flores pentapetalos, ſiliquas monoſpermas. Balſamum non niſi ex vulnerata arbore fluit, magna tamen in copia, ut ſpatio trium horarum propemodum duodecim libræ colligi poſſint. Duplex reperitur, quale prius eſt liquor limpidus, poſterius vero craſſioris eſt conſiſtentiæ, inſtar Terebinthinæ; diſcrimen dependet ex diverſo colligendi tempore: illud enim, quod ſtatim poſt arboris inciſionem profluit, eſt admodum clarum, album, odoris reſinoſi; hoc autem, quod ſequitur, magis aurei coloris & conſiſten-

tiæ denſioris eſt; & ultimum hoc magna in copia ex Portugallia ad nos venit, alterum autem tenuius magis rarum eſt. Eligatur pellucidum, flaveſcens, liquidum, odoris fragrantis, & quod a Tinctura Tartari, vel alia alkalina totum ſolvitur, atque Oleum copioſum æthereum dat deſtillatum. *Uſus præcipuus eſt in gonorrhœa, dari vero etiam poteſt in diarrhœa & dyſenteria, niſi febris contraindicet. Doſis eſt ſcrupulus dimidius, ad integrum. Externe præbet Vulnerarium egregium.*

Balſamum Indicum album, Peruvianum album, *Baume blanc de Perou*, **weiſſer Indianiſcher, Peruvianiſcher Balſam.** Eſt liquor reſinoſus, coloris pallidi, odoris ad Benzoës accedentis, ſuavis, ſaporis acris, amaricantis, conſiſtentiæ mellis liquidi. Fluit ex arbore vulnerata, quæ *Cabareiba*, ſive Balſamum Peruvianum a *Piſone* vocatur. Creſcit arbor in America, & quidem Hiſpania nova, eſtque magnitudine Mali Medicæ, foliis Amygdali majoribus, tamen rotundioribus & magis acuminatis; floribus pentapetalis, in extremis ramorum flagellis luteis initio loculorum, oblongorum forma, ſed, procedente tempore, quorundam veluti foliorum ceteris latiorum. Fructus ſunt ſiliquoſi, breves, ac in ſingulis ſemen unicum continetur. Rarius in Officinis, quam Nigrum, reperitur, quamvis ex eadem arbore eliciatur. *Adſcribuntur vires potentiores Nigri, præſertim in pectoris affectibus, diarrhœis, gonorrhœa & ulceribus internis commendatur. Datur ex ovo ſorbili; doſis guttæ tres, quinque, ad decem. Externe etiam præbet Vulnerarium egregium.*

Balſamum Indicum, Peruvianum nigrum, *Baume noir de Perou*, **ſchwartzer Indianiſcher, Peruvianiſcher Balſam.** Subſtantia eſt reſinoſa, ponderoſa, fluida, coloris ex nigro rubentis, ſaporis acris, paululum amaricantis, odoris ſuavis, fragrantis. Coctione extrahitur, ramos atque etiam truncos arboris, modo ſub Balſami Indici albi titulo, deſcriptæ, aſſulatim & minutim conciſos, in lebetem ampliſſimum injiciunt, multaque inſuper affuſa aqua coquunt, quantum ſatis eſſe putant, igne ſublato frigeſcere ſinunt, & conchyliis Balſamum ſupernatans colligunt. Laudatur ſpiſſum, nigrum, ponderoſum, odore fragrans, & quod mixtionem cum Oleis expreſſis reſpuit. *Calidum eſt, diſſolvit, digerit, & roborat, præſtantiſſimum eſt Vulnerarium, & tam interne, quam externe in uſum venit; quia mixtionem cum omnibus liquoribus reſpuit, commode cum vitello ovi miſceri atque exhiberi poteſt. Doſis guttæ tres ad ſex.*

Balſamum Indicum ſiccum, *Baume rouge ſec, ou dur*, **trockener Indianiſcher Balſam.** Reſina eſt pellucida, coloris fulvi & rutili, ſaporis acris, odoris ſuavis Benzoës, fragrantioris tamen & gratioris, dum recens, picis inſtar ductile, inveteratum vero friabile. Ex balſamifera arbore, quæ præcedentia Balſama, album & nigrum, Peruviana ſuppeditat, colligitur: ramuli nimirum abſciſſi & cortex vulneratus liquorem fundunt, qui, in corticibus cucurbitinis ad ſolem condenſatus, ad nos transportatur. *Ejusdem virtutis cum Peruviano eſt, & commode in pilulis datur.*

Balſamum Orientale verum, Opobalſamum, Balſamum de Mecha, Ægyptiacum, *Baume de Judée, ou de Mecha*, **Balſam von Mecha.** Reſina eſt liquida, limpida, albicans, ſaporis acris, amaricantis, aromatici, odoris fragrantis, grati. Fluit & colligitur ex arbuſcula vulnerata, balſamifera, ſub titulo Carpobalſami deſcripta. Cum emanat, tenuiſſimum & albo colore tinctum eſt, mox

poſt

post paucos dies, color albus in viridiusculum mutatur, & consistentiam olei balsamum acquirit; demum, post aliquot annos, in consistentiam mellis liquidi, vel Terebinthinæ Venetæ, coloris aurei, abit. Carum atque valde rarum olim fuit, nunc vero, cum vires ejus magis innotuerunt, ab incolis Arabiæ, lucri causa, copiosius ac frequentius colitur, atque facilius obtineri potest; inprimis vero sincerum per Legatos ad aulam Turcicam, quibus ceu munus a Turcarum Magnatibus offerri solet, nonnunquam ad nos venit. Ceterum maxima pars Opobalsami, quæ nobis venditur, *Balsamo de Copaiba* adulterata est; imo ipsum Balsamum de Copaiba, cum Oleo e Carpobalsamo expresso mixtum, pro vero venditatur. Notæ sinceri & veri Opobalsami habentur: quod vehementis sit odoris, & quo magis recens est, acutioris, gratissimi, quod gustu sit amaricans, adstringens, modice acre, aquæ instillatum, tametsi parva sit gutta, supra totam aquæ superficiem expandatur, eamque liquatum totum supernatet, atque in ipsa coagulatum, totum stylo excipi ac auferri possit, quodque in laneam vestem fusum eam non, sicut oleum, inficiat, quanquam ei adhæreat; ætas vero Balsami ex colore & consistentia, uti supra monuimus, æstimari debet. *Balsamum hoc toto orbe celebratum, tam interne, quam externe in usum vocatur; confert asthmaticis, calculosis & pro medicamento habetur polychresto.*

Balsamum Tolutanum, de Tolu, *Baume de Tolu*, **Balsam von Tolu.** Liquor est resinosus sive Balsamum, coloris ex pallido ad aureum tendentis, consistentiæ Terebinthinæ Venetæ, glutinosæ, saporis dulcis, aromatici, odoris fragrantis, grati. Arbor balsamifera Tolutana pumilam Pinum refert, ramosam, cortice tenui, foliis Siliquæ, sive Ceratiæ, toto anno virentibus. Tam sponte, quam post incisionem factam, Balsamum effluit. Advehitur ex America, ubi circa urbem Tolu colligitur. *Cum Opobalsamo multum convenit, & vulnera recentia ita consolidare, ut nullam cicatricem relinquant, perhibetur.*

Styrax liquida, *Storax liquide*, **flüßiger Storax.** Est resinosa substantia, e fusco grisea, tenax, consistentiæ melleæ, odoris utplurimum gravis. Magna dissensio inter Auctores est, an Styrax liquida naturalis, vel factitia sit; sunt, qui putant, ex eadem arbore, quæ Ambram liquidam largitur, provenire. Certum est, Styracem liquidam, uti in Officinis prostat, vel adulteratam, vel totam esse factitiam. *Calefacit & siccat; raro tamen in usum venit, nisi in Unguentis ad scabiem & emplastris.*

Terebinthina communis, sive vulgaris, *Terebenthine ordinaire*, **gemeiner Terpenthin.** Est resina liquida, melleæ consistentiæ, ex Abietis & Pini arboribus extracta. Colligitur in multis Germaniæ & Galliæ Provinciis. Eligenda, quæ pura, alba & fluida. *Usus est in unguentis & emplastris, laudatur inprimis in scabie leprosa, aliisque cutis defœdationibus.*

Terebinthina Veneta, officinalis, *Terebinthine de Venise*, **Venetischer Terpentin.** Resina est liquida, Mellis recentis consistentia, coloris flavescentis, saporis acris, amaricantis, odoris haud ingrati, *Laricis, folio deciduo, brevi*, Cedrinorum in modum nascentis, conis parvis. Nascitur quidem Larix in regionibus pluribus etiam Germaniæ, sed modo in calidis Terebinthinam fundit; maxima pars Terebinthinæ Venetæ ex Gallia, ubi in Silva Lioniensi copiose colligitur, ad nos venit, & *Terebenthine du Bois de Pilatre a* Gallis vocatur. *Virtute vix a Vulgari differt; liquidior tamen, purior, & oleo ditior est. Tam interne, quam externe in usum*

vocatur; calefacit, emollit, abstergit & incarnat; usus inprimis est in gonorrhœa debellanda, urina cienda. Drachma una vitello ovi soluta & aqua diluta alvum movet, atque ad ardorem urinæ, ulcera renum & vesicæ magnopere commendatur.

Terebinthina vera, de Cypro, de Chio, *Terebinthine de Chypre*, **wahrer Cyprischer Terpentin.** Raro, aut nunquam in nostris Officinis occurrit. Vulgari est spissior, coloris candido-flavescentis, ad cœruleum vergentis, odoris grati, & saporis acris, amaricantis. Tractu temporis Terebinthina de Chio solidescit, atque formam & substantiam resinæ pellucidæ, solidæ, coloris subflavi, quæ dentibus non adhæret, induit. In Chio & Cypro ex Arbore Terebintho, seu Pistacea silvestri colligitur. Terebinthus habet folia pinnata, impari numero, decidua, flosculos stamineos, copiosos, fibris purpurascentibus contextos, e tuberculis ex ramorum lateribus, longo racemo, exeuntes, deciduis floribus, fructus apparent parvi, rubentes, oblongi, resinosum viscidum lentorem & nucleum includentes. *Præfertur reliquis, & ad Theriacæ confectionem requiritur; substituitur vero plerumque Veneta, seu laricea, quæ, si viribus non æqualis, tamen haud multo inferior est.*

CAPUT XI.
DE SUCCIS CONDENSATIS ET CONCRETIS.

Acaciæ Ægyptiacæ succus, *Suc d'Acacia veritable d'Egypte*, **Egyptischer Schotten-Dorn-Safft.** Ex Acaciæ Ægyptiacæ, (quæ est foliis Scorpioidis leguminosæ, siliquis albis compressis, isthmo interceptis, floribus luteis, monopetalis, infundibuliformibus, staminibus numerosis,) fructibus immaturis succus exprimitur, & lento igne inspissatur, qui in substantia solida, foris coloris nigricantis, intus rufescentis, saporis acerbi, austeri, adstringentis advehitur. Nascitur in Ægypto & Arabia. Eligendus, qui non nimis nigricans, nec friabilis, sed tenax est, atque totus in aqua solvitur. *Theriacam ingreditur, raro tamen ad nos pervenit, hanc ob causam Acaciæ Germanicæ succum substituunt. Adstringit, refrigerat & siccat.*

Acaciæ Germanicæ succus, *Suc des Prunes sauvages*, **eingetrockneter Schlehen-Safft.** Acacia Germanica, *Prunus silvestris* sub fructibus descriptus est. Succus exprimitur e fructibus maturis, atque lento igne in vase fictili terreo inspissatur. *Refrigerat & adstringit. Succo Acaciæ Ægyptiacæ substituitur.*

Aloë caballina, *Aloë caballine*, **Roß-Aloe.** Est succus *Aloës Guineensis Caballinæ*, vulgari similis, *Maculatæ*, succo fœtidiore. Odoris est nauseosi, picei, myrrhati; ponderosa, nec a fæcibus depurata, inspissata, coloris nigricantis.

Aloë hepatica, *Aloë hepatique*, **gemeine Aloe, Leber-farbige Aloe.** Succus est inspissatus, vel calore solis condensatus *Aloës vulgaris* C. B. foris colore fuscus, intus flavescens, hepatis instar. Exprimitur ex foliis, saporis est amarissimi, ingrati, parum adstringentis, odoris fragrantis, ad Myrrham accedentis. Colligitur in *China*, & inde advehitur; nascitur etiam planta in *Barbados*, *Americæ* Insula, & ibi succus inspissatur,

ſpiſſatur, qui, ſub nomine *Aloës Barbadenſis*, in cucurbitis adfertur, & Succotrina Aloë haud inferior eſt.

Aloë Succotrina, Socotrina, lucida, *Aloë Succotrin*, **feine Aloe, aus der Inſul Soccotora.** Succus eſt gummoſus & reſinoſus *Aloës veræ minoris, Succotrinæ, anguſtifoliæ, ſerratæ, ſpinoſæ, floribus ſuave-rubentibus*, fuſco-nigricans, e foliis vel vi expreſſus, vel e planta, circa radicem inciſa, ſponte deſtillans, atque a ſole poſtea condenſatus, coloris, quando teritur, crocei, ſaporis amari, odoris non ingrati. In Inſula Soccotora magnus eſt proventus hujus plantæ, & ſuccus condenſatus inde adportatur. Communis hucusque fuit opio, Aloës ſpecies, quæ in Officinis proſtant, ex una eademque planta colligi, atque ſaltem puritate inter ſe differre; ex præmiſſis vero innoteſcit, diverſas Aloës eſſe plantas ac ſpecies. Aloë quidem Epatica vera & Succotrina ex eadem ſpecie elici posſunt, & tantum ratione patriæ differunt, illaque, quæ ex China transportatur, Epatica, ex Succotora Inſula, Succotrina appellatur; Caballina vero e peculiari ſpecie Aloës maculatæ colligitur; fœtorem nunquam totum amittit, ſi multoties etiam aqua ſolvatur, atque rurſus inſpiſſetur. Notæ genericæ Aloës ſunt radix perennis, fibroſa vel tuberoſa; folia longa, integra, Sedis fere accedentia. Flos monopetalus, tubulatus, infra in ventrem prominens, ſupra anguſtior, ibique in ſex ſegmenta ſciſſus, nudus, ſex ſtaminibus præditus. Fructus oblongus, trilocularis, cilindraceus, hexagonus, fœtus ſeminibus planis, quaſi ſemicircularibus. Aloë eligenda Succotrina pura, lucida, odoris non adeo ingrati. Aloë Hepatica, quæ hodie a nonnullis Succotrinæ præfertur, easdem notas bonitatis habet, colore tamen dilutior eſt; ſæpius vero, imo ſemper, Aloë Caballina pro Hepatica divenditur, quæ tamen ab illa facile odore nauſeoſo myrrhato diſtingui poteſt. *Aloë, præter vim purgantem, etiam calefacientem habet, ſanguinem commovet, menſes & hæmorrhoides ciet, lumbricos enecat; frequenter tamen in uſum vocata noxia eſt, præſertim billioſis, hecticis, ad hæmoptyſin, fluxum hæmorrhoidalem nimium, & mulieribus ad abortum diſpoſitis.*

Hypociſtidis ſuccus, *Suc d'Hypociſte.* Subſtantia eſt nigra, nonnihil reſinoſa, auſteri, acidi & adſtringentis ſaporis. Non ſolum ex Creta inſula, ſed etiam ex Gallia Narbonenſi & Provincia, ubi planta copioſe provenit, advehitur. Hypociſtis planta ſpecies eſt *Orobanches*, quæ ſub Ciſto aſſurgit, flore monopetalo, campanulato, multifido. Reperitur menſibus Aprili & Majo. Tota abſciſſa contunditur, atque ſuccus expreſſus inſpiſſatur. *Refrigerat, ſiccat & adſtringit. Ad Theriacam & Mithridatium requiritur.*

Liquiritiæ ſuccus, Glycyrrhizæ, *Jus de Regliſſe en baton*, **Süß-Holtz-Safft, Lakritzen-Safft.** E radice Liquiritiæ exprimitur, ignis calore inſpiſſatur, & in Trochiſcos vel Magdaleones formatur. Affertur ex Hiſpania & Franconia, ubi in agro Bambergenſi copioſe Liquiritia colitur. Eligitur prior, qui totus in aqua ſolvitur, & ſaporis eſt dulcis, parum amaricantis. *Demulcet, expectorationem promovet, nephriticis & tuſſientibus prodeſt.*

Lycii ſuccus, *Suc de Lycium*, **Burdorn-Safft.** Extrahitur coctione & inſpiſſatione e ramulis Lycii, arbuſcula ſpinoſa, frequenter in Lycia, Aſiæ provincia, occurrente. Saporis eſt amari, auſteri & adſtringentis, coloris nigri. In glebis advehitur; raro verum in uſum venit. *Refrigerat & adſtringit; ad ulcera oris & gingivarum maſticatus commendatur.*

Manna Calabrina, *Manne de Calabre*, Manna. Est succus concretus, collectus ex Arbore *Fraxini* & *Orni*, in Calabria, Sicilia & agro Romano. Saporis dulcis, subacris, pinguis, odoris melliti. Arbores Fraxini diebus canicularibus, calidissimis horis, cœlo sicco sponte emittunt succum viscidum, subdulcem, qui a Sole condensatus & collectus, ulterius exsiccatur, & Manna vocatur. Spontanea *Manna*, incolis *di Corpo* dicta, a die vigesimo primo Julii, ad finem hujus mensis usque, e novellis ramulis effluit; Julio desinente, corticem Fraxinorum incidunt, tunc a meridie ad sextam horam fluit idem liquor, & in grumos crassiores, caloris ope, cogitur, atque *Manna forzata* dicitur. Nonnunquam, ob hujus succi copiam, in cortice arboris elevantur tubercula, unde cordex hiscit, & sponte succum plorat, qui solis calore in Mannam condensatur. Mannam non omnes Fraxini ac Orni arbores fundunt, sed juniores tantum, quarum cortex non scaber, sed levis est. Optima est in granis, sive granulata, quæ ex Calabria adfertur, alba, parum flavescens, dulcis, linguam tamen modice mordens, levis; *Cannulata* dicitur, quæ ex Arbore vulnerata stillans, canna vel arundine excipitur, condensatur, & in frustulis longis advehitur. *Leniter alvum movet, abstergit. Pueris; muliebribus prægnantibus & senibus tuto dari potest. Dosis drachmæ duæ ad octo vel duodecim.*

Mel, *Miel*, Honig. Liquida crassiuscula est substantia, dulcis, ex albo flavescens, ab Apibus, e variis vegetabilibus collecta. Sunt, qui credunt, Mel nihil esse aliud, nisi extractum Florum, cum subtiliori roris substantia conjunctum; alii Chylum Apum in ventriculis earum consummatum, & vomitu intra favos rejectum esse contendunt. Certum est, Apes ad mellis generationem multum conferre non solum colligendo mel e floribus, ubi a natura paratum prostat, sed etiam in ventriculo ulteriori coctione perficiendo, quamvis etiam fieri possit, ut mel, quod Apes intra cavum proboscidis colligunt, quæ plena est granulis, sive glandulis, in ea pariter nonnullam mutationem subeat. Mel differt tam ratione coloris, quam loci & varietatis plantarum, ex quibus collectum fuit. Habetur *Album*, quod Virgineum vocatur, & ex novellis favis, vel juniorum Apum examinibus, citra ignem, colligitur; *Flavum*, quod vetustiores favi suppeditant. Pro diversitate loci & plantarum pariter deprehenditur differentia; ubi enim plantæ nobiliores proveniunt, mel etiam gratius & melius existit, quod plantas, ex quibus collectum fuit, redolet, & sapore prodit; sic *Mel silvestre* plerumque Pinum & Resinam redolet; Mel vero *Narbonense*, ubi Rosmarinus aliæque nobiliores plantæ occurrunt, delicatius deprehenditur, unde reliquis etiam præfertur. Vilioris est pretii, quod ex Polonia advehitur. *Mel calidum est, abstergit, nutrit, aperit, pulmonibus confert, urinam ciet; præcipue senibus & phlegmaticis convenit, junioribus calidisque subjectis parcius propinandum, biliosis & hystericis raro vel plane nunquam.*

Opium, Meconium Thebaicum, *Opium de Thebes*, ausgetrockneter Mohn-Safft. Colligitur e capitibus *Papaveris sativi*, maturitati proximis, vulneratis. Culter, huic negotio inserviens, quintuplici acie est instructus, qui una sectione quinque infligit vulnera longa, parallela. E vulnusculis statim promanat liquor lacteus, qui a Sole condensatur, & postridie scalpro abstergitur; tum altera capitis facies eodem modo vulneratur, & Opium colligitur. Colitur expresse Papaver in agris, & in plantis ramosis majoribus superflua capita amputantur, ut reliqua magis grandescant, & succo impleantur majoris efficaciæ. Lachryma primæ collectionis præfertur, & majori pollet demulcendi virtute. Opium ita collectum aqua humectant, spata lignea optime permiscent, in glebas efformant,

& foliis Papaveris plerumque involutum, vendunt. Pauperes ex foliis ac stolonibus Papaveris Opii speciem excoquunt, quam Soli porro condensandam exponunt; hoc medicamentum *Poust* vocant, quod nobis sub nomine *Meconii* venit, & vilioris virtutis & pretii est. Opium, quod in regione Thebaica, Ægypto confini, colligitur, optimum censetur. Copiosissima etiam in Natolia, Cilicia, Cappadocia, aliisve Orientalibus regionibus collectio est. Eligendum, quod coloris e nigro rufescentis est, ponderosum, densum, inflammabile ac ardens, sapore amarum & acre, odoris fortis, narcotici, nauseosi, quod facile aqua diluitur, aut solvitur, nec multas fæces relinquit. Gummosæ substantiæ plurimum, resinosæ parum alit. *Variæ virtutes Opio adscribuntur, quarum primariæ somniferæ, anodynæ, diaphoreticæ & antispasmodicæ; Indi aliique Asiæ incolæ aphrodisiacas addunt. Certum divinum est Medicamentum, quo in Medicina vix aut nullo modo carere possumus, &, si Medicis hoc remedio non esset prospectum, tradente Bontio, frustra in calidissimis Indiæ regionibus Medicinam facerent dysenteriæ, choleræ, febribus ardentibus, ac reliquis biliosis affectibus, orgasmo turgentibus; sic etiam Confectiones illas celebres, Theriacam, Mithridatium, aliaque Philonia maximam suæ laudis & efficaciæ partem Opio debere, extra dubitationis aleam positum est. Crudum apud nos raro in usum venit, sed plerumque Extractum vario modo paratum, an vero hac prætensa correctione revera corrigatur, vel potius castretur? lis inter autores est. Dosis Opii vix determinari potest, sufficit unum aut alterum granum, imo præstat, in minima Dosi, exempli gratia, quartam grani partem, repetitis vicibus, quam majori, una vice, exhibere quantitate; præsertim in colica spasmodica caute cum illo mercandum, ne funesta paresis illam sequatur. Opio assueti facile majorem Dosin perferre possunt, & prostant exempla inter Germanos, qui spatio* 24. *horarum integram drachmam, absque ulla secuta noxa, devoraverunt.*

Saccharum, Mel Cannæ, Zuccarum, *Sucre*, Zucker.

Est succus ex Arundinibus Sacchariferis expressus, dulcis, concretus, & in salis formam redactus. *Arundo saccharifera herba graminifolia est, floribus imperfectis stamineis, media inter Miliaceas & Arundinaceas.* Radices sunt succulentæ, dulces, e quibus germina erumpunt, quæ transplantata adolescunt, & in cannas, sex pedes, vel etiam quandoque ultra longas, geniculatas, foliis angustis, striatis, circa genicula vestitas, excrescunt, fungosa medulla dulcissimo succo ubertim referta est. Cannas has, cum ad dimidiam sui altitudinem pervenerint, abscindunt, atque, separatis foliis, succum certis machinis molendinis exprimunt, statimque, ne acescat, in ahenis ebullire faciunt, despumant, &, addito lixivio e cineribus & calce viva, purificant, atque ad justam consistentiam redigunt. Saccharum hoc, quod farinaceum appellant, postea rursus solvitur, magis purificatur, &, pro gradu puritatis, & ratione formæ, varias dat Sacchari species, quod vel in cistulis, vel pyramidibus, variæ magnitudinis, charta cœrulea involutum, ad nos venit, atque vel *Saccharum Farinaceum*, vel *Melis*, *Refinatum*, *Canariense* & *Finissimum* vocatur. *Saccharum Thomæum*, *Rubrum*, Thomas-Zucker, nomen ab Insula St. Thomæ habere ajunt; paratur vero etiam e Syrupo, qui in efformatione pyramidum saccharinarum exstillat, & ad crystallisationem haud idoneus est, propter lentorem & pinguedinem facile humescit ac diffluit, saporem cæteris habet dulciorem & melleum, haud gratum. Quo solidioris & siccioris consistentiæ est, eo melius habetur.

Saccharum liquidum, *Sucre liquide*, Syrup-Zucker.

Liquor melleus est fuscus, & nunquam ad solidam consistentiam perduci potest, &, si in eam perducatur, tamen sponte iterum diffluit, e conis pyramidatis exstillat, & vilissimum omnium est.

Saccharum Candisatum, Canthum, paratur, cum Saccharum pyramidale in aqua solvitur, ad certum gradum crystallisationi aptum, lente coquitur, & in vasis, quæ fila hic ibi trajecta habent, ad crystallisationem reponitur. Quo purius adhibetur Saccharum, eo albidiores & pulcriores ex eo nascuntur crystalli, unde *Saccharum Candisatum Crystallinum Album*, vel *Rubrum*, diversæ speciei, obtinetur.

Usus Sacchari est notissimus, & tam medicus, quam culinarius. Sunt, qui credunt, Saccharum mucaginem in ventriculo generare; quod tamen non fit ex Sacchari lentore, cum sit sal potius Essentiale resolvens, & hoc respectu usus saccharinorum in febribus intermittentibus, ex visciditate & lentore humorum, & obstructione ortis, non solum plane innoxius, sed potius commendandus est, juxta nonnullos.

Scammonium, Scammonea, *Scamonée*, **purgirender Winden=Saft.** Est succus resinosus concretus, e radice *Convolvuli Syriaci, flore majori, Scammonea dicti*, vel *Convolvuli foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis ramosis, bifloris, Royen.* per incisionem prolectus, vel etiam expressus. Nascitur planta in regionibus calidioribus, præsertim in Syria, circa Antiochiam, in Lesbo & Samo insulis. Optimum censetur Scammonium Alepense, & illi, quod e Smyrna venit, longe præfertur. Sit purum, leve, nitidum, splendidum, resinosum, friabile, madefactum lactescens, & linguæ admotum non vehementer acre & urens. *Purgans est catholicum, & bene operatur. Male quidem apud nonnullos audit Scammonium, & sunt, qui illi vim drasticam, inflammatoriam, & quod cruciatus & tormina excitet, adscribunt: Verum enim vero Scammonium, si caute adhibeatur, & non delicatulis, siccis, hecticis & debilitate ventriculi laborantibus propinetur, semper bonum edit effectum, præsertim, si per liquiritiæ decoctum, uti in posteriori parte hujus Dispensatorii describitur, correctum est, atque salibus permixtum in usum vocatur. Dosis grana tria, ad duodecim.* Succis condensatis & concretis subjungimus aliud concretum, terreo-acido-oleoso-salinum, quod

Tartarus, *Tartre*, **Weinstein**, vocatur, & sal est Essentiale Vini, quo dolia, in quibus vinum asservatur, intus quasi incrustantur. Vel *ruber*, vel *albus* est, vina rubra rubrum, alba album Tartarum largiuntur. Optimus censetur albus, cui nullæ fæces adhærent, & qui crystallis albis in superficie ornatus est. Hispanica, Hungarica & dulcia Gallica vina parum suppeditant, Rhenana, Mosellana & Franconica magnam, Neccarina haud ita largam deponunt quantitatem. Difficile, & non nisi in vigecuplo aquæ ferventis, solvitur. Crudus, si in usum vocatur, aqua tepida prius ablui & iterum siccari debet. Sunt, qui ita ablutum etiam crystallis præferunt, atque a drachma una ad duas exhibent. *Purgat primas vias, absque ulla molestia, incidit, atque resolvit, summumque est corrigens biliosorum & acrium humorum. Nullum, præter Tartarum, cognitum est corpus, quod plus aëris elastici, dum crematur vel destillatur, generet, & tantos vapores omnino incoërcibiles exhalet. Non solum ad usus medicos & chemicos, sed & varios mechanicos expetitur.*

Terra Japonica, Terra Catechu, *Cachou*, **Japonische Erde.** Ad vegetabile regnum pertinet, estque succus condensatus, ex variis vegetabilibus expressus; basin succus Acaciæ Orientalis constituit, vel secundum *C. B.* fructus sessilis, Palmæ Arecciferæ, qui *Fausel dicitur.* Advehitur ex India Orientali, Pegu, Malabaria, Bengala & Zeilon. Eligenda resinoso-gummosa, dura & purpureo nigricans, & quæ facile in aqua tepida solvitur, menstruis tamen spirituosis pariter auscultat. *Adstringit & in fluxionibus alvi & hæmorrhagiis nimiis adhibetur.*

CAPUT

CAPUT XII.
DE FUNGIS ET MUSCIS.

Agaricus albus, Agaricum, *Agaric*, Lerchen-Schwamm. Est excrescentia fungosa arboris *Laricis*, rotundo-angulosa, inæqualis, pugni, non raro hepatis infantis magnitudine, substantia interna candida, friabili, externa corticosa, callosa, cinerea, subrufa, sapore subdulci, mox amaricante & acri, parum adstringente. Signa bonitatis sunt, ut sit fragilis, candidus, & splendens atque levis. Larix arbor juvenis Terebinthinam, quam Venetam vocant, fundit, senescens vero, loco Terebinthinæ, Agaricum progignit. In Galliæ Provinciis, Alpibus & Montibus Tirolensibus provenit. *Bilem, serum & pituitam educit, asthmaticis & tussi laborantibus confert. Veteres adhibere solebant, dum a remotis locis materiam peccantem educere voluerunt. Etiam menstrua ducit; unde & prægnantibus, monente* Rajo, *ejus usus interdicitur. Crudus nunquam, nisi in infuso, Trochiscatus in pilulis datur. Dosis in infuso drachmæ duæ vel tres. Adduntur pro stimulo* Sal gemmæ *vel* Cremor Tartari; *pro correctione* Zingiber *vel* Caryophylli.

Boletus cervinus, Fungus cervinus, Tubera cervina, *Boletus cervinus*, Hirsch-Brunst. Est fungus inæqualis, rotundus, magnitudine juglandis nucis, aliquando minoris, sub cortice coriaceo fusco includens medullam pulverulentam, ex purpureo nigrescentem subtilissimam, quæ exsiccata nullius est odoris. Nascitur in silvis. *Recens habetur pro aphrodisiaco, exsiccata interior pulverulenta substantia vero, vix operæ pretium præstabit; ad tingenda Balsamorum corpora autem utilis est.* Sunt, qui *Fungum Phalloidem fœtidum*, penis imaginem referentem, & qui insigni odore cæteros omnes antecellit, atque in silvis, mense Junio & Julio, in locis umbrosis crescit, pro cervino Boleto, qui e spermate cervi ortus sit, false offerunt; qui tamen potius ad noxios fungos pertinet, & nullius usus est in Medicina.

Bovista chirurgorum, Fungus rotundus, orbicularis, pulverulentus, Crepitus lupi dictus, sive ovatus, *Vesse de Loup*, Bofist. Vocatur etiam *Lycopertum*, & ad fungos pertinet noxios. Est levis, & non raro magnitudinem pugni excedit, cortice tenui cinereo vestitus, medulla, sive interiori parte spongiosa & compressa, pulverem subtilissimum, fuscum profundit. In pascuis & pratis siccioribus nascitur, atque copiose circa pagum *Deinacum*, ob acidulas, ibi scaturientes celebrem, in silva occurrit. *Adstringit & siccat, & abs Chirurgis ac vulgo ad hæmorrhagias sistendas in usum vocatur externum.*

Fungus Salicis, *Eponge de Saule*, Weiden-Schwammen. Fungus pileatus, lamellatus, pileolo, dum recens, superius flavescente, lamellis candicantibus, Salici adnascitur. *In Phthisi etiam consummata, & deplorata quasi, curanda celebratur, bis de die, a Drachma semis ad integram, ex ovo sorbili, vel in pulvere, sacchare mixtus, commendatur, ab aliis vero ad noxios fungos refertur.*

Fungus Sambuci, membranaceus, Auriculam referens, Auricula Judæ, *Oreille de Judas, ou de Juif*, Coloris e cinereo nigricantis, in caudice Sambuci nascens, Hollunder-Schwamm, Judas-Ohr. Fungis perniciosis accensetur, in

aqua molleſcit, & illam mucilaginoſam reddit. *Adhibetur tanquam refrigerans in oculorum inflammationibus, in aqua roſarum maceratus; additur etiam nonnunquam gargariſmis, ad faucium inflammationem.*

Spongia Cynosbati, ſeu Fungus Bedeguar, *Eponge d'Cynorhodon*, **Schlaff-Kuntzen, Schlaff-Apffel, Haagen-butten-Schwamm.** Pila hirſuta, ſeu excreſcentia quædam ſpongioſa, hirſuta, quæ nonnullis *Fungus comoſus* vocatur, & in meditullio alveolos, inſecti ſobole repletos, habet, atque frutici *Roſæ Silveſtris* adnaſcitur; coloris eſt rufi herbacei, odoris, dum recens, roſacei, magnitudinis nucis juglandis, ſæpe ad Mali mediocris accedentis. Ortum habet, ſicut Galla, ab inſectorum punctura, ovula deponentium, e quibus primo vermiculi, poſtea Nymphæ & tandem Muſcæ, colore ex aureo viridi coruſcantes prodeunt. *Adſcribitur illi vis adſtringens, antinephritica, ſi in pulverem trita, a ſcrupulo uno ad duos, exhibeatur, & hypnotica, ſi pulvinari ſubdatur.*

Muſcus Acaciæ, *Mouſſe de Prunier ſauvage*, **Schlehen-Mooß.** Muſcus vocatur ſubſtantia illa exſucca, incana, tenuibus filis contexta, arida, villoſa, arboribus adultis adnaſcens, *Bryon* quoque dicta. *Muſcus, qui Acaciæ Germanicæ vel Pruno ſilveſtri adnaſcitur, adſtringit, & ad balnea & fotus adhibetur, in prolapſu uteri & ani, aliisve morbis, ubi adſtrictione opus eſt.*

Muſcus arboreus, quernus, *Mouſſe de Chene*, **Baum-Mooß, Eichen-Mooß.** Eligendus albus ſive candidus, prolixus, qui barbæ inſtar e ramis Quercuum adultorum pendet. *Adſtringit, & inſigne eſt anodynum, hinc in tuſſi clangoſa, ferina, infuſum hujus Muſci laudatur; Ventriculum roborat, & fluxiones quaſcunque prohibet.*

Muſcus corallinus, ſive marinus; inter Marina quærendus, ſub tit. Corallina.

Muſcus terreſtris, clavatus, Lycopodium, *Mouſſe terreſtre*, dictus, ſub ſeminibus deſcriptus proſtat. *Adſcribitur plantæ huic vis ſingularis contra Plicam Polonicam. Virtutem habet travmaticam, ſcorbuticis, tuſſientibus, phthiſicis, hæmopticis, calculoſis, & aſthmaticis medetur. Exhibetur in infuſo, cum aqua fontana, vel vino albo.*

PARTIS

PARTIS PRIORIS

CLASSIS TERTIA.

REGNUM ANIMALE.

DE ANIMALIBUS ET EORUM PARTIBUS.

Ægagropilæ, Pilæ Damarum, Rupicaprarum, *Ægagropila, Bezoard d'Allemagne,* **Gemsen=Kugeln.** Ita vocantur, quia in primo, seu secundo ventriculo horum animalium inveniuntur. Raro sunt rotundæ figuræ, frequentius oblongæ, pondere levissimæ. Duplici constant substantia, quarum interior e fibris radicum, aut filamentis & cauliculis concreta esse videtur; exterior cortex est quasi coriaceus, mollis, interdum etiam lignosus, rarissime lapidescens, coloris utplurimum cineritii, fusci, ex luteo obscuri, vel ex pallido viridescentis. Magnitudinis sunt variæ, quæ tamen pugni magnitudinem vix vel nunquam excedit. Non in omnibus Damis & Rupicapris pilæ hujusmodi reperiuntur; concretum enim sunt præternaturale, quod de dispositione animalis morbosa testatur. Per cohæsionem fibrarum cum succo plantarum, nondum perfecte resoluto, ac muco ventriculi, successive formari, vero est simillimum. Ex Helvetia & Tirolensibus Alpibus, quas Rupicapræ incolunt, ad nos portantur. Sunt, qui ex fibris herbarum & radicum, additis pilis, ejusmodi Pilas efformare student, atque emtores decipiunt, quæ tamen fraus ab exercitato facile detegitur. Eligantur pilæ non adeo magnæ, leves & tamen solidæ, non ex pilis, sed potius e fungosa, fibrosa & foliacea substantia concretæ. *Adscribitur vis antepileptica, cephalica, alexiterica, & Bezoar Germanicum appellantur; prosunt in morbis malignis, partu difficili, atque Arthriticis commendantur.*

Album Græcum, Stercus caninum album, *Crotte de Chien,* **weisser Enzian.** Sunt excrementa alvina canis, ossibus nutriti, alba, non fœtentia. *Siccat & abstergit, discutit & aperit. Utiliter interne in Colico dolore & dysenteria, externe ad anginam & ulcera maligna exhibetur.*

Alcis Cornu, *Corne d'Elan,* **Elends=Horn.**

Alcis Ungulæ, *Ongle d'Elan,* **Elends=Klauen.**

Alces est animal gregarium, bisulcum, cornibus palmatis, in hoc genere maximum; mutat cornua, sicut cervus. *Tam Cornu, quam Ungula, præsertim vero hæc, pro infallibili Antepileptico habetur, & vix ullus prostat antepilepticus pulvis, cui non admixta est Ungula Alcis: Incenditur etiam & naribus admovetur, ad arcendos insultus epilepticos. Cornu cum Cornu Cervi convenit, de quo vide Præparata.*

Apri Dentes, *Dents de Sanglier,* **wilde Schweins=Zähne.** Aper ad porcinum genus pertinet, non ruminat, & bisulcus est. Reliqua sunt notissima. *Dentes specifice in pleuritide commendantur. Vide Præparata.*

Aselli, sive Millepedes, Millepedæ, Centipedes, *Cloportes,* **Mauer=Esel, Keller=Esel.** Sunt insecta terrestria, non

alata, exſanguia; adſcribuntur a nonnullis viviparis, ab aliis oviparis; gaudent quatuordecim pedibus, utrimque ſeptem, latera peripheriæ corporis ſerræ modo ſunt dentata, cutim habent quaſi ſquamoſam, e novem articulis inæqualibus conſtantem, quibus ſeſe contrahere & complicare, in orbem piluliformem poſſunt; inſtructa præterea ſunt antennis prominentibus; degunt in cellis, aliisque locis uliginoſis, in rimis parietum, & tepido vivunt humore. *Vires poſſident ſpecificas in viſciditate tartarea reſolvenda, in obſtructionibus viſcerum aperiendis, adeoque in morbo regio, dolore nephritico, aſthmate, & difficultate urinæ adhibentur.*

Bezoar Occidentalis, *Bezoard Occidental*, **Occidentaliſcher Bezoar.** Eſt concretum lapideum in *Capricervæ occidentalis, Cuguacu,* ventriculo natum. Orientali eſt fragilior, & laxior, minus levis, e multis ſibi invicem impoſitis lamellis, multo craſſioribus, coloris & magnitudinis varii, modo nigri, modo cinerei, modo videſcentis. In meditullio plerumque reperiuntur vel paleæ, vel pili. Lapides hi Bezoardici non in omnibus reperiuntur Capricervarum ventriculis, ſed, ſicut de Ægagropilis notavimus, præternaturalia & morboſa concreta eſſe videntur. Proprium hoc habet India occidentalis, quod vix reperiatur animal, in quo non tales lapides inveniantur, qui omnes, ſub nomine Bezoar occidentalis, adferuntur, & ideo differentis figuræ & coloris ſunt, atque tam vili pretio, reſpectu orientalium, venduntur. *Adſcribitur illis vis alexipharmaca, ſudorifera, antepileptica, cordialis, abſorbens, acrimoniam temperans, & urinam movens.*

Bezoar Orientalis, *Bezoard Oriental*, **Orientaliſcher Bezoar.** In Capricervæ orientalis, *Gazellæ indicæ, cornibus rectis, longiſſimis, nigris, prope caput tantum annulatis,* ventriculo reperitur. Patria hujus lapidis eſt Perſidis provincia *Laar*, aliæque. Animal pilis brevibus e cinereo rufis veſtitur, magnitudinem Capræ domeſticæ, ejusdemque caput barbatum obtinet, cornua fœminæ ſunt vel nulla, vel exigua; Hircus longiora & liberalius extenſa gerit, annuli in cornibus annos ætatis animalis referunt; timidiſſimum & fugitivum eſt animal, atque aſperrimos montes inhabitat; non autem in omnibus regionibus, quas inhabitat, lapides in hisce gignuntur animalibus. Lapidem Bezoar ferre judicantur annoſa, valde macilenta, quæ circumſpectius incedunt, & inſidias magis, quam ſodales, metuunt. Locus, in quo lapis invenitur, eſt Pylorus, ſive productior quarti, quem vocant, Ventriculi fundus, ad cujus latus plica quædam, ſive ſcrobiculus, mucoſo humore oblitus, lapillum ſuggerit. Lapides hos, vivente animali, nondum habere eandem duritiem, ſed molliores & friabiles eſſe, perhibent; propterea recens exſecti ne improvide frangantur, vel attacti nitorem perdant, ab inventore ore excipi, & aliquamdiu foveri, donec induruerint, mox Goſſypio involvi & aſſervari ſolent. Notæ bonitatis ſunt, quod lamellatim ſint concreti, quod cavitas interna eorum non plane vacua, quod in aquam injecti ejus limpiditatem non turbent, nec pondere vel diminuantur, vel augeantur, quod chartæ, creta vel calce, oblitæ, affricti, lineam ducant ex luteo viridem; falſum vero eſt, quod legitimi exinde cognoſcantur, quando candens acus intrudi poſſit, adulterini enim, ex materia reſinoſa compoſiti, acum etiam admittunt, legitimi vero plerique ita indurati ſunt, ut acum candentem reſpuant; nec etiam nota eſt factitii lapidis, ſi interiores laminæ deterioris ſubſtantiæ & coloris ſunt, ea enim diſparitas ex diverſitate alimenti provenit, dum genitrix beſtia locum paſtus mutat. Pro genuinis porro lapidibus orientalibus illi habentur,

bentur, qui inter resinæ & lapidis substantiam ambigunt, contusi in spiritu Nitri vel Salis dissolvuntur, ac Menstruum satis rubente colore imbuunt. *Bezoar alexipharmacum, absorbens acidum, & humores resolvens est, atque ad multas compositiones Pulverum Bezoardicorum requiritur.*

Bovis Fel inspissatum, *Fiel de Bœuf épaissi*, **eingetrocknete Ochsen-Galle.** Lento igne ad Extracti consistentiam evaporatur & servatur. *Plerumque ad unguenta & emplastra contra vermes adhibetur; interne sumtum alvum movet, & vermes enecat.*

Bufones exsiccati, Rubetæ terrestres majores, *Crapaux secs*, **gedörrte Kröten.** Animal hoc omnibus est notissimum. A veneno Bufonis oritur tumor, pallor, ad buxeum colorem inclinans, respiratio difficilis, anhelosa, oris halitus gravis, vertigo repentina, syncope, convulsiones, interrupta labia, linguaque nigricans & balbutiens, obtutus torvus, vomitus effrænis, sudor frigidus, tandem mors. *Antidota hujus veneni habentur vomitus ex hydrelæo, theriaca, mithridatium, lac præsertim humanum. Hasta vel palo perfossus siccatur in aëre, uritur in olla, & pulverem vel cinerem contra hydropem summis efferunt laudibus; urinam enim potenter movere fertur.*

Cancrorum Chelæ, seu Ungulæ, *Pattes des Ecrevisses de Mer*, **Meerkrebs-Scheeren.** Sunt denticulatæ Cancrorum marinorum forcipes. *Adscribitur illis vis alexipharmaca, antifebrilis, nephritica & absorbens. Ad Pulverem requiruntur bezoardicum Anglicum.*

Cancrorum oculi, Lapides, Lapilli, *Yeux d'Ecrevisses*, **Krebs-Augen, Krebs-Steine.** Sunt lapilli crustacei, duri, albi, orbiculati, pisorum & lentium, non raro fabarum magnitudinis, una parte compressi & sinuati, acetabuli in modum, altera convexi, saporis terrei, ex Astacis fluviatilibus collecti. Observationes de lapillorum horum ortu sunt sequentes: Astaci quotannis ægrotant, accidit hoc maribus circa medium mensis Junii, fœmellis mense Julio, ante testarum exuvium; vigente hoc morbo, per dies novem & amplius, velut semiexanimes ac immoti sunt; hoc interim spatio stomacho illorum obducitur membranula nova, inter quam & stomachum veterem, ex utroque latere, colligitur liquor quidam lacteus, qui sensim in lapideam obdurescens substantiam, superficiem convexam, illa vero parte, qua ventriculum attingit obducitque, concavitatem exhibet; vetus autem seu interior ventriculus abit in mucilaginem, & Astaco nutrimentum præbet; membranula vero, in qua liquor iste lacteus collectus fuit, ventriculum novum constituit, qui in veteris locum succedit; liquor lacteus partim coagulatur & abit in substantiam lapideam, quam Lapides vel Oculos Cancrorum vocamus, partim vero in nutrimentum animalis cedit; tandem ipsi lapilli resolvuntur, & cibi loco consumuntur; nihil enim interea, quam diu hi lapilli ad stomachum hærent, Astacus edit, nec quicquam in ejus ventriculo reperitur, vivitque viginti septem circiter dies, tam ex veteri stomacho suo, sensim absumto, quam ex lapidibus postea resolutis. Oculi seu lapides cancrorum e vivis desumti ad cœruleum vergunt colorem, e coctis vero albescunt. Tanta prostat horum lapidum quantitas, ut vix credibile videatur, omnes esse genuinos. E Polonia, Borussia, Bessarabia & Ucrainia maxima pars adfertur, ubi cancrorum tanta est copia, ut sues illis saginari possint. Modus colligendi hic est: Cancri vivi contunduntur in Magma, quod aqua diluitur, sic lapides fundum petunt, qui siccati servantur.

vantur. Adulterari ſolent vel ex creta, vel terra alba confectis, qui tamen facile a genuinis, qui e lamellis ſibi ſuperincumbentibus vel ſtriis compoſiti ſunt, dignoſcuntur. *Reſolvunt, abſtergunt, abſorbent, urinam & ſudorem movent. Uſus eſt frequentiſſimus in pulveribus.*

Cantharides, Muſcæ Hiſpanicæ, *Cantharides*, Spaniſche Fliegen. Sunt inſecta alata, oblonga, pedata, vaginipennia, coloris lucentis aurei & viridis, ſaporis acris, picei, cauſtici, erodentis, odoris, cum recentia, fœtidiſſimi. Inveniuntur in regionibus calidioribus, Hiſpania, in Gallia in agro Pariſienſi; occurrunt etiam in Germania, & fere tota Europa. Amant, præ cæteris, Fraxinum, Liguſtrum & Populum albam, reperiuntur tamen etiam ſuper aliis plantis. Cantharides noſtræ quidem recentes eundem edunt effectum, ac e regionibus calidioribus allatæ; virtus vero earum brevi perit. Extant diverſæ magnitudinis; præferuntur vero minores, integræ recentes, non pulverulentæ. *Vim habent cauſticam, quæ in ſale acri conſiſtit, potenter urinam cient, venerem ſtimulant, & pro ſpecifico in hydrophobia habentur. Hungari cantharides in aceto conſervare; & tam hominibus, quam equis & vaccis &c. a canibus rabioſis demorſis, exhibere ſolent. Suſpectus vero atque noxius eſt earum internus uſus; igitur nunquam, niſi ſumma neceſſitate exhiberi debent, incipiendo a doſi minori, grano dimidio ſcilicet, & ſi cum levamine ægroti, ad granum integrum vel duo aſcendere licet. Frequentiſſimus eſt uſus in veſicatoriis. Ardorem urinæ & mictum cruentum a Cantharidibus excitatum, lac, emulſiones, & oleum amygdalarum dulcium, vel ſeminis lini, mitigat.*

Carpionum Lapides, *Pierres des Carpes*, Karpfen-Stein. Sunt oſſicula triangularia cartilagine obducta, in acetabulo, quo ſpina dorſi capiti conjungitur, poſita. E Carpionibus ſive Cyprinis colliguntur. *Pleuriticis, colicis doloribus vexatis, calculoſis & epilepticis commendantur.*

Caſtoreum, *Caſtorée, ou Caſtoréum*, Biebergail. Folliculi ſunt duo, qui tam in maribus, quam in fœminis Caſtoris Animalis, utrinque in inguinibus ſtatim ſub cute, Ovorum gallinaceorum magnitudine, & ſæpius majores, reperiuntur, qui liquorem oleoſum, vivente Animali, fundunt; exſiccati vero, cum contentis, Caſtoreum exhibent. Caſtor animal eſt amphibium, quadrupes, & magnitudinem Felis ſuperat, pedes anteriores ſunt canum inſtar, quibus terram fodit, poſteriores anſerum pedibus conſimiles, quibus inter natandum potiſſimum utitur; caput non admodum diſſimile eſt Muris montani, cauda non ſolum piſcis caudam, ſed piſcem integrum refert, plano-compreſſa eſt, & pilis in totum nudata, quatuor circiter digitos lata, cineritii coloris, multis rugis & anfractibus, gyriſque inſtructa, excavata quaſi. Caſtores quidem ſemper ad ripas fluviorum ſpecus ſuos ædificare ſolent, & in Germania quoque nonnunquam, frequentius in Moſcovia & Polonia occurrunt, plurimi vero in Canada capiuntur. Probatur Caſtoreum, quod ex Ruſſia advehitur, ponderoſum, carnoſum, colore fuſcum, ſaporis acris, odoris gravis. *Calefacit, attenuat, aperit, flatus diſcutit, nervos roborat, venenis reſiſtit, anodinum, uterinum eſt, menſes promovet. Doſis grana quatuor ad decem.*

Cervi Cornu, *Corne de Cerf*, Hirſch-Horn. Cervus animal omnibus cognitum, & cornibus quotannis deciduis, ſolidis, ramoſis, ab aliis ruminantibus cornigeris facile diſtinguitur. *Adſcribuntur cornu crudo vires bezoardicæ, hinc in variolis, morbillis, aliisve morbis malignis commendatur; Gelatina Phthiſicis & tabe conſumtis præſcribi ſolet. In Officinis proſtat Cornu Cervi philoſophice præparatum, Cornu Cervi uſtum & raſpatum.*

Cervi

Cervi Priapus, *Priape de Cerf*, **Hirsch-Ruthe.** *Penis Cervi commendatur adversus venenatos morbos, pleuritidem, colicam & diarrhœam, pellit urinam & calculum, atque contra mictum cruentum ac ad venerem stimulandam celebratur. Usus est in pulveribus & electuariis.*

Ceti Priapus, *Priape de Baleine*, **Wallfisch-Ruthe.** Incredibilis magnitudinis, tres & plures ulnas longus nonnunquam invenitur; substantia est carnosa, semipellucida, quasi cornea, odoris non ingrati, saporis carnulenti. *Credunt Venerem excitare, vim suam vero magis abstringendo, exserit, hinc in diarrhœa & fluxionibus sanguinis adhiberi potest. Usus est in pulveribus vel electuariis. Dosis scrupulus unus, ad drachmam semis.*

Ceti Sperma, *Sperme ou Blanc de Baleine*, **Wallrath.** Est pinguedinosa, alba, squamosa, tenera, mollis, quasi ex parvis furfuraceis squamulis composita substantia, saporis oleosi, odoris unctuosi. Veteres persuasi fuere, substantiam hanc, quam sperma Ceti vocamus, revera esse semen, sive Ceti sperma; hodie vero edocti sumus, eam potius esse pinguedinosam materiam, cerebro circumfusam, & ipsissimum pingue cerebrum Balænæ, sive *Ceti dentati*, quæ *Orca*, *Byoris*, vel *Cachelot*, **Potfisch, Nord-Caper,** vocatur. Intra horum piscium crania, imo per totam carneam substantiam piscis tanta hujus materiæ quantitas invenitur, ut ex unico aliquot tonnæ repleri possint. Materia hæc, postquam ab oleosa substantia, transcolatione per saccum laneum est separata, maceratur in lixivio, ex Calce viva & cineribus facto, & manibus probe subacta per viginti quatuor horas relinquitur. Altero mane per saccum pilosum lixivium exprimitur, & separatur, quodque restitit, aqua pura abluitur, super linteum explicatur, & digitis diducitur ac exsiccatur; si non satis album deprehendatur, denuo cum lixivio subigitur, atque præscripto modo tractatur. Eligendum est Sperma Ceti probe candidum, pingue, recens, non flavum, nec rancidum. *Resolvit*, *demulcet*, *Anodinum & Cosmeticum est.*

Coccinilla, Cochinilla, *Cochenille*, **Coccinell, Kutzenell.** Insectum est, quod in Ficus Indicæ, *Tunæ* dictæ, surculis colligitur. Initio velut vesica quædam exigua apparet in surculis modo dictæ Opuntiæ, sive Ficus Indicæ, quæ postmodum calore solis in vermiculum Anthermitem evadit, qui processu temporis in insectum Scarabæiforme parvum, quod *Scarabæus nigricans alarum alias rubicundus limbis*, a *Meriana* in *Descript. insectorum Surinam.* appellatur, abit. Hæc insecta, cum jam debitam maturitatem adepta sunt, fumo denso ex materia aliqua combustili, ex ea parte, unde ventus in frutices, quos insecta depascuntur, spirat, sita, excitato, substratis prius sub fruticibus linteis, enecantur. Ita fumo suffocata, levi fruticum concussione, in lintea decidunt, adeoque magna copia, parvo vel nullo fere negotio, colliguntur; deinde super lintea expansa, in arenoso quodam aprico loco, solis calori exponuntur, donec corpusculis contractis, exsiccentur, quæ manibus leniter confricata, alis & pedibus decedentibus, in grana abeunt. Ex nova Hispania & Mexico advehitur. Eligatur integra, granulata, quæ albicet externe, trita vero purpurea, ponderosa sit. *Adscribuntur Coccinillæ vires cardiacæ, sudoriferæ, alexipharmacæ & antifebriles, atque in febribus malignis laudatur. Diuretica est, & ob vim, quam cum Millepedibus, & hujusmodi insectis communem habet, leniter stimulantem, commendatur. Alias vero usibus mechanicis tinctoriis plurimum inservit.*

Cochlearum Opercula, Folia, *Couvercles d'Escargots*, **Schnecken-Deckelein.** Sunt Cochlearum Domiportarum sive edu-

lium opercula, quibus ante hyemem domunculas claudere solent. *Virtutibus cum lapidibus cancrorum conveniunt; abluta & in pulverem trita pro Specifico diuretico habentur, & hydropicis commendantur.*

Cochlearum testæ, *Coquilles d'Escargots*, **Schnecken-Häußlein.** Earundem Cochlearum edulium sunt domunculæ, & eadem pollent virtute. *Præferuntur, absque prævia calcinatione, in pulverem tritæ calcinatis. Dosis Drachma semis.*

Cranium humanum, *Crane humain*, **Menschen-Hirnschale.** Nunquam crudum, sed præparatum in usum vocatur. Non fit hominis morbo, sed sani, & violenta morte perempti.

Ebur, *Yvoir*, **Helffenbein.** Sunt dentes e maxilla superiore Elephantum, e basi ampliori cava in cuspidem desinentes solidissimam, inflexi, diversæ magnitudinis, longitudinis & crassitiei, pro ætate ipsius belluæ, exterius coloris fusci, intus albicantis. Ex India Orientali & Africa advehitur Ebur. *Refrigerat, & moderate adstringit. In usum vocatur tam Rasura, quam Ebur præparatum.*

Equi testes, *Testicules de Cheval*, **Pferd-Geylen.** Testes sive testiculi equorum in castratione exscissi, dissecti, vino loti, & exsiccati in clibano. *Commendantur, tanquam præsentissimum remedium, ad fœtum mortuum & secundinas pellendas, & ad colicos dolores sedandos. Exhibentur plerumque in pulvere. Dosis scrupulus unus, ad scrupulos duos.*

Erinaceus combustus, *Herison calciné*, **gebrannter Igel.** Erinaceus quadrupes est animal, terrestre, Cuniculi magnitudine, proboscide porcina, aculeis undique armatum, uti Hystrix, præterquam in ima parte. Degit hiberno tempore in cavernis, in globum se volvit, cum de fuga desperat; ita in globum convolutus, atque in aquam calidam immissus, qua delectatur, se evolvit ac dilatat, ut pedibus apprehendi, & sic suspendio enecari possit. Enectus in olla, operculo leviter tecta, comburitur. *Cachecticis, ictericis, & hydropicis, specifice vero ad mictum involuntarium, seu incontinentiam urinæ commendatur. Dosis scrupulus unus ad drachmam dimidiam.*

Gallinæ ventriculi tunicæ interiores, *Gysieres*, **Hüner-Magen-Häutlein.** Non solum Gallinarum, sed & Gallorum & Caponum tunicæ membranosæ, ventriculos interne vestientes, lotæ & siccatæ promiscue in usum vocantur. *Commendantur tam adstringendi & corroborandi ventriculum & intestina, tum & calculum & sabulum pellendi fine.*

Hippopotami, Equi Marini, Dentes, *Dents d'Hippopotame, ou de Cheval marin*, **Wallroß, See-Pferds-Zähne.** Animal Hippopotamus est amphibium magnum, auriculis caret, & duobus dentibus magnis, prominentibus, recurvis præditum est. In basi concavi sunt dentes, versus apicem solidi, albidiores, duriores & ponderosiores Ebore, nec tam facile flavescunt. *Laudantur, qua antepileptici, antispasmodici, antipleuritici, & sanguinem, nec non fluxiones alvi sistentes. Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.*

Hirci sanguis exsiccatus, *Sang de Bouc sec*, **Bocks-Blut.** Hirci herbis vulnerariis per tempus pasti, atque postea mactati sanguinem excipere, & in clibano siccare jubent. *Commendatur ad sanguinem concretum resolvendum, nec non calculosis & dysentericis convenire credunt.*

Hirun-

Hirundines combuſtæ, *Hirondelles calcinées*, **gebrannte Schwalben.** Hirundo avicula, cauda longa, forcipata, vel bifida, Hauß-Schwalben, Gabel-Schwalben, omnibus nota. Hirundinum pulli adulti integri, in olla operculo tecta, in pulverem vel cinerem nigrum comburuntur. *Adſcribitur his cineribus vis ſpecifica antepileptica, & in angina & tonſillarum inflammatione cum melle adhibentur.*

Hirundinum nidi, *Nids d'Hirondelles*, **Schwalben-Neſter.** Colligendi ſunt, vel, cum pulli adhuc nido inſident, vel poſtquam adoleverint. *Non tam in nido, quam excrementis Hirundinum vis conſiſtit reſolvendi & diſcutiendi. Adhibentur in cataplaſmatibus ad Anginam.*

Ichthyocolla, Colla piſcium, *Colle de Poiſſon*, **Hauſen-Blaſen, Fiſch-Leim.** Paratur e cute, inteſtinis, ventriculo, veſica, pinnis & cauda *Huſonis* piſcis. Dictæ partes minutim inciduntur, ſectæ vel inciſæ macerantur in aqua calida, poſtea coquuntur lento igne, ad pultis conſiſtentiam, malaxantur, & antequam maſſa refrixerit, in pelliculas diducuntur, quæ deinde in ſpiras coactæ penitus exſiccantur. Maxima pars advehitur ex Moſcovia, & optima cenſetur alba, ponderoſa, ſolida, & facile ac tota diſſolubilis. *Uſus Ichthyocollæ eſt rarus in Medicina, ad gelatinas parandas adhiberi ſolet; frequentiſſimus ejus eſt uſus ad clarificanda vina, & conglutinandas varias res.*

Lepus combuſtus, *Lievre calciné*, **gebrannter Haaſe.** Animal notiſſimum totum medicinale; non ſolum enim ejus viſcera & plurimæ partes, ſed totus in uſum veniunt. Lepus junior totus, vel in fruſta diſſectus, in olla operculo tecta comburitur, & in pulverem tritus aſſervatur. *Præſtantiſſimum creditur eſſe remedium in Calculo, ad ſcrupulum unum vel duos exhibitum.*

Leporum tali, *Talons de Lievre*, **Haaſen-Sprünge.** Talus, ſive Aſtragalus eſt primum os inter oſſa Tarſi Leporis, in ſuffragine poſteriore, ſuperius per ginglymum tibiæ conjungitur, ex altera vero parte capitulo rotundo donatur. Oſſiculum eſt ſatis ſolidum. *Commendatur ad epilepſiam, pleuritidem, colicos dolores, & ad facilitandum partum.*

Lucii piſcis mandibulæ, *Machoires de Brochet*, **Hechts-Kieffer.** Lucius eſt piſcis fluviatilis, non aculeatus, unica pinna in dorſo donatus, dentibus acutis præditus. In uſum veniunt præcipue Mandibulæ, ſive Maxillæ inferiores. *Dantur in pleuritide ceu ſpecificum. Multi ſunt, quibus & nos ſubſcribimus, qui oſſiculis omnibus capitis hanc virtutem eſſe credunt communem; conferunt etiam in calculo & fluore albo.*

Lumbrici terreſtres, *Vers de terre ſecs*, **getrocknete Regen-Würmer.** Lumbrici animalcula ſunt apoda, longa, pennæ anſerinæ plerumque craſſitie, mollia, carnoſa & annulata, dilute ſanguinei coloris. Capiuntur per æſtatem, &, mundati atque vino extincti, mox in clibano calore lento exſiccantur. *Sunt virtutis anodinæ, diureticæ, antiſpaſmodicæ, diaphoreticæ; diſcutiunt, reſolvunt, podagricis conveniunt, & ſpecifice in arthritide ſcorbutica laudantur. Doſis ſcrupulus unus, ad grana triginta.*

Lupi epar, *Foye de Loup*, **Wolffs-Leber.** Lupus beſtia ferociſſima, cani perſimilis, diverſas partes pro Medicina exhibet, præcipue vero Hepar in uſum vocatur, quod, Vino & Abſinthio parum coctum & exſiccatum, in uſum venit. *Hydropicis & atrophicis commendatur; ſunt, qui ad hydrophobiam laudant.*

Manati lapis, Auris Ceti, *Pierre de Vache marine*, **Seekuhe-Stein.** Manati nonnullis *Vacca marina* dicitur. Amphibium est magnum, bipes, auriculis carens, phytivorum. Lapis Manati est os crustaceum, album, Ebori fere simile, circa aurem bestiæ situm, petrosum. *Summe commendatur ad renum & vesicæ calculos, & dolores colicos sedandos; cum dentibus Hippopotami convenit & adstringit. Sunt, qui etiam vim, vomitus ciendi, adscribunt, quod tamen experientia non comprobatum est. Datur a scrupulo semis ad scrupulum unum.*

Moschus, *Musc*, **Bisam.** Substantia hæc granulosa, pinguis ac unctuosa, sanguini congrumato fere similis, coloris ferruginei, saporis subacris, amaricantis, odoris fragrantissimi est. Animal Moschiferum neque e caprino, neque cervino genere esse videtur; cutis est variegata, caput lupinum, ex ore duo deorsum exporriguntur dentes, & infra umbilicum folliculo quodam instructum est, qui extus pilosus, magnitudine ovum gallinaceum adæquat, & in sua cavitate Nucistam continere valet, interiore vero superficie adhuc specialem habet pelliculam, Moschum cingentem, in qua præter vasa sanguifera, circa meatus moschiferi orificium, complures glandulas, procul dubio ad Moschi secretionem facientes, invenire licet. Reperitur autem hoc animal *Dorcas* caprea vocatum, in Tartaria, China & India, & occisis animalibus, folliculi moschiferi exscinduntur. Optimus Moschus censetur, qui e ferrugineo nigricantis coloris, unctuosus, saporis grati, amaricantis, odoris fragrantis, laminæ impositus ignitæ totus evaporat; verum, si carbonis ad instar quidpiam adustum remaneat, adulteratus est. *Moschus ab Anglo quodam, nomine* Cobb, *commendatur contra hydrophobiam, sive rabiem caninam. Exhiberi debet ad grana* 16. *usque, pro una dosi, cum æquali pondere Cinnabaris, in vehiculo spirituoso. Dosis modo dicta, scopo præservativo, singulis mensibus saltim dari debet. Ubi autem symptomata rabiei se jam produnt, secundam dosin, trium horarum spatio, post priorem, exhibendam esse,* James *in* Lexico medico *scribit, additque, plerumque duas doses hujus remedii sufficere pro curatione mali. Cæterum Moschus calefacit, attenuat, discutit; cardiaca, alexipharmaca & aphrodisiaca pollet virtute. Mulieres autem raro odorem perferre queunt, caute igitur in præscriptione procedendum. Plurimus usus est ad Odoramenta.*

Mures marini, **See-Mäuse.** Non sunt mures, sed duplicatæ & intus cavæ, e nigro fuscæ pelliculæ, latitudine circiter unius ac dimidii pollicis, glabræ, striatæ, & quadrangulæ, instar pulvinaris; in quatuor angulis oblongos angustosque apices habent. In Seelandia & Hollandia potissimum inveniuntur, & ob figuram muris compressi, quam exhibent, ita a vulgo vocantur. Ova vero sunt *Rajæ piscis*, atque in istis, tanquam ovis membranaceis, juniores Rajæ nascuntur, interdum adhuc in illis reperiundæ, quæ, si per anteriorem aperturam exierunt, a mari ad littus projiciuntur. *Ad hæmorrhoides cœcas dolentes in usum vocantur, atque locus dolens his pelliculis fumigatur, ex quo dolor statim remittit.*

Mustelæ piscis spinæ dorsi, sive vertebræ, *Arêtes de Murene*, **Aalruppen-Gräten.** Piscis est Mustela anguilliformis, fluviatilis, squamis carens. *Spina dorsi exsiccata, atque in pulverem trita, ad epilepsiam seu caducum morbum commendatur.*

Mumia, *Mumie*, **Mumien.** Sunt cadavera humana, Aloë, Myrrha & Asphalto, aliisque aromaticis & balsamicis speciebus condita, & exsiccata. Raro integra cadavera, sed in partes divisa advehuntur, & in substantia fusca, ad nigredinem inclinante, saporis amari, odoris fragrantis, venduntur. Ex Ægypto adportatur, atque, quo fragrantior

&

& ſplendidior eſt, eo melior habetur. *Laudantur ejus virtutes travmaticæ; frequentius tamen a veterinariis expetitur, & magis in emplaſtris, quam interne dari ſolet.*

Mumia Perſica nativa. Mentionem hujus facimus hoc loco nominis cauſa, pertinet enim ad Regnum Minerale, & eſt bitumen valde pretioſum, in caverna quadam, ſub radice montis Caucaſi, e rupe exſudans, cui miras adſcribunt in conſolidandis oſſibus & vulneribus virtutes. Coloris eſt nigri, odoris grati, & ex parte balſamici, ſaporis parum dulcis. Raro vel nunquam apud nos occurrit, niſi Ambram nigram pro Mumia Perſica ſumere velimus.

Oſſa de cordibus cervi, *Os de cœur de cerf*, **Hirſch-Creutz, Hirſch-Hertz-Bein.** Sunt oſſicula fere cruciformia, ex Aortæ fibris oſſificatis & induratis orta. In cervis non ſolum annoſis, ſed etiam bobus, reperiuntur. Eligenda ſunt candida, non nimis magna & alba; alias bovina ſe magis eſſe produnt. *Habentur cordialia, antepileptica, & alexipharmaca.*

Oſſa Sepiæ, *Os de Seiche*, **Fiſch-Bein, Black- oder Kuttelfiſch-Bein.** Candida, teſtacea, & levis eſt ſubſtantia, ſupina parte duriuſcula, corticoſa, lævis & glabra, inferna fungoſa, mollis, leviter aſpera, & friabilis, nata in dorſo Sepiæ piſcis. Capitur piſcis in Oceano, Mediterraneo mari, aliisve locis littoralibus, & in eſcam cedit. Oſſa eligantur alba, levia, integra, mediocriter magna & craſſa; friabilis, fungoſa vero ejus ſubſtantia interior ſaltem vocatur in uſum. *Exſiccant, abſtergunt, urinam movent, in gonorrhœa conferunt, & Septicum leniſſimum præbent.*

Ovorum teſtæ, *Coques des Oeufs*, **Eyer-Schaalen.** Quamvis teſtæ omnium ovorum viribus ſint eædem, tamen in uſum medicum vocantur potiſſimum gallinaceorum teſtæ, & cum in genere teſtæ ovorum præſcribuntur, hæ intelliguntur. Lotæ & a pellicula interiore mundatæ, in pulverem teruntur. *Cum oculis cancrorum conveniunt, & eadem doſi exhibentur. Teſtæ ovorum, e quibus per incubatum pulli excluſi fuerunt, præſtantiores ad nephritidem, & calculum pellendum creduntur; præferendæ etiam ſiccatæ, tritæ, calcinatis.*

Pavonis ſtercus, *Crotte de Paon*, **Pfauen-Koth.** Sunt excrementa alvina Pavonis utriusque ſexus, avis, ob pulchritudinem notiſſimæ. *Commendatur epilepticis & vertiginoſis. Uſus eſt in pulvere ad drachmam integram, vel in infuſo ad unciam dimidiam; adduntur etiam enematibus pro epilepticis.*

Percarum lapides, *Pierres de Perche*, **Kaulperſich-Berſing-Steine.** Oſſicula, ovalis figuræ, quodammodo in uno latere crenata, lapideæ duritiei, coloris albicantis, in capitibus Percarum, juxta ſpinæ dorſi exortum reperiuntur, bina, quæ ſicut in Carpionibus, Carpionum, ita hæc in Percis, Percarum lapides vocantur. Perca piſcis eſt ſatis cognitus fluviatilis, pinnis dorſalibus ſpinoſus, ichthyophagus. *Lapilli hi cum Carpionum lapidibus conveniunt viribus, magis tamen diuretici creduntur.*

Porcinus lapis, Hiſtricinus Malacenſis, Bezoar porci, Pedra de porco, *Pierre de Malacco, Bezoard de Porcépi des Indes*, **Bezoar von Stachelſchwein.** Coagulum eſt bilioſum,

ſum, rotundum, compactum, utplurimum nucis Myriſticæ vel Juglandis magnitudine, leve, coloris rufi, ſubſtantiæ quodammodo unguinoſæ, ſaporis amareſcentis. Reperitur in veſicula fellea Hyſtricum, terræ Malaicæ, unde *Lapis Melacenſis* vocatur. Plerumque ſphæris vel circulis aureis armatur, adnexa ex eodem metallo catenula, cujus adminiculo commodius tractari queat. Uſus ejus eſt, ut ſuſpendatur per horas aliquot, vel una alteraque vice agitetur in hauſtu aquæ communis, quam, vix grani pondere imminutus, amarore imbuit. *Concretum hoc, ob raritatem & eximias virtutes, valde pretioſum, habetur cordiale & alexipharmacum, tum in ictero, febribus putridis, malignisque, & in quibuscunque viſcerum obſtructionibus medicamentum efficaciſſimum.*

Advehitur etiam ejusmodi coagulum bilioſum ex inſula Ceylana, quod a *Kæmpfero*, *Pedra de Porco ſpuria* vocatur; Malacenſi quodammodo ſimile, ſed nigrius, informe & pilis permixtum eſt. Coagulum hoc non in veſicula biliari, ſed in ventriculis Hyſtricum invenitur, proditque beſtia crebro ructu ac vomitione latitantem lapidem. *Eædem de illo prædicantur vires, debiliores tamen, licet majori propinetur doſi.*

Reguli uſti, *Roitelets brulées*, **gebrannte Zaun-Könige, Zaunſchlüpfferlein.** Regulus ſeu *Paſſer Troglotydes* in olla combuſtus. *Valdopere ad nephritidem, & calculum pellendum & præſervandum commendatur.*

Rhinocerotis Cornu, *Corne de Rhinoceros*, **Rhinoceros- oder Nashorn-Horn.** Rhinoceros bellua, Elephantis magnitudine, cruribus tamen brevioribus. Cornu foris nigrum, intus album, fiſſile, ulnam circiter longum, firmum, grave & ſolidum, incurvatum, in baſi craſſum, in ſuperiori vero parte acutum, e proboſcide vel naſo hujus animalis exſurgit. *Pro vero habetur unicornu veterum, & ad venena, contagioſos morbos, & epilepticos motus commendatur.*

Sericum crudum toſtum, *Soye brulée*, **gebrannte Seyden-Bälglein.** Folliculi ſericei, ſive textura Bombycum aperiuntur, & ſi forſan Aurelia vel Bombyx mortua in illis latet, ſeparatur, folliculi vero in olla comburuntur. *Uſus eſt rarus; ad Species Temperatas tamen Cordiales requiritur, & antepilepticum habetur. Olim ex his folliculis, Spiritus deſtillari ſolebat, cui virtutes cordiales, alexipharmacas & antepilepticas adſcribebant.*

Serpentum exuviæ, *Depouilles de Serpent*, **Schlangen-Häutlein, Bälge.** Cutis animalis eſt ſponte depoſita, quæ colorem nativum cum figura retinuit. Serpens diſtinguitur a Vipera, quod ſit ovipara, atque ova ſua in fimetum, aliumve locum calidum deponat, ubi calore fota excluduntur. *Exuviæ partum facilitare, ventri vel lumbis alligatæ; hydropicis in forma pulveris conferre, & ad vulnera conglutinanda valere perhibentur.*

Scinci marini, Stinci, Zinci marini, *Scinc marin*, **Meer-Stintz.** Animalcula ſunt quadrupedia, ovipara, Lacertis ſimilia, niſi, quod dorſum habeant latius, magis glabrum, cuti ſquamoſa albicante tecta, cœſia a capite ad caudam decurrente linea. In Nilo fluvio, & Mari rubro degunt; veſcuntur herbis odoriferis, & Polio vel Abſinthio condita adportantur. *Diuretici ſunt Scinci, creduntur etiam aphrodiſiaca & bezoardica virtute pollere; Theriacam, Mithridatium & Diaſatyrium ingrediuntur.*

Stru-

Struthionis ova, Struthio-Cameli ova, *Oefs d'Autruche*, **Straußen-Eyer.** Struthio avis in Africa haud infrequens, maxima, ob corporis molem, & alarum parvitatem volare inepta, Ova ponit infantis caput magnitudine æquantia, imo ſuperantia, teſta eſt craſſitie calami ſtraminei, foris pallide flaveſcens, intus alba. In Africa, circa promontorium Bonæ Spei copioſe ſunt obvia, indeque adferuntur. *Adſcribitur teſtis horum Ovorum peculiaris vis diuretica & calculum pellendi.*

Talpæ combuſtæ, *Taupes brulées*, **gebrannte Maulwürffe.** Talpa animal ſubterraneum, notum, quadrupes, pilis mollisſimis, e cinereo nigricantibus, roſtro ſuillo, oculis minimis, cruribus breviſſimis. Capitur, atque integra in olla comburitur. *Intrinſecus laudatur ad arthritidem vagam; externe opponitur lepris, ſtrumis, ulceribus & fiſtulis.*

Tauri Priapus, *Priape de Taureau*, **Ochſen-Senne, Ochſen-Ruthe.** *Cum Priapo cervi convenit; præcipue in diarrhœa & dyſenteria laudatur.*

Viperarum ſpinæ, *Epine des viperes*, **Vipern- oder Nattern-Rückgrat.** Differt Vipera a cæteris Serpentibus non modo, quod ſegnius ſerpat, neque in altum exſiliat, ſed præcipue, quod illius fœtus in utero materno omnimodam perfectionem conſequantur, & vivi prodeant. Mares & fœminæ, cum adultæ ſunt, medio ſui corporis pollicem craſſitie adæquant, in fœminis vero, cum fœtus maturos gerunt, craſſior eſt truncus, longitudinem utplurimum bipedalem attingunt, plus minus; collum in maribus plerumque craſſius eſt, quam in fœminis; cauda in maribus ſemper longior & craſſior continet membra generationi dicata, & longitudinem digitorum quatuor transverſorum, in fœminis trium tantummodo habet. Viperæ pellis ſemper eſt variegata, fundi tamen color variat, modo enim candicat, modo ſubrubeſcit, alias eſt cineracei coloris, alias flavi, alias ferruginei; fundum hunc diſtinguunt perpetuo maculæ nigræ; pellem totam obtegunt ſquamæ, quas cum cute bis in anno exuere ſolent. Viperæ nunquam terram effodiunt, latebras quæſituræ, ſed utplurimum inter lapides & ruinas ædificiorum reperiuntur, ſereno tempore Rubos quærunt & denſas herbas; morſu tantum ſunt venenoſæ, venenum in duabus veſiculis, circa dentes poſteriores deliteſcens, ira percitæ, in hoſtem vibrantes, intus ſumtæ totæ medicinales. Non ſolum in Italia & aliis regionibus calidioribus reperiuntur, ſed etiam in Germaniæ quibusdam locis occurrunt, præferuntur vero ex Italia allatæ. *Adſcribitur vis alexipharmaca, diuretica & reſtaurativa. Laudantur ad ſanguinem purificandum in lue venerea, lepra, ſcabie ferina, & ulceribus malignis. In uſum veniunt, cute, capite & cauda exutæ, vel recentes in juſculis medicis, vel exſiccatæ & in pulverem tritæ. Doſis a ſcrupulo dimidio, ad drachmam ſemis. Theriacam ingrediuntur, & Bezoardicum animale conſtituunt.*

Vulpis pulmones, *Poumons des Renards*, **getrocknete Fuchs-Lungen.** Pulmones recentes vino abluuntur & ſiccantur. *Ad vitia pulmonum commendantur, & pro Loch de vulpis pulmone requiruntur.*

Unicornu marinum, verum Monoceros, *Licorne veritable*, **Einhorn.** E Cetaceo animali, quod in Mari boreali, circa Grœnlandiæ & Islandiæ littora, degit, & *Narhval* vocatur, depromitur. Alii putant eſſe dentem, alii, quia non habetur animal unico dente præditum, cornu vocant. Eſt candidum, teres, ſtriatum & tornatile, aliquot ulnas, plus minus, longum, durum, grave, in baſi excavatum,

vel ſecundum longitudinem, ad apicem fere usque, perforatum, odoris & ſaporis nullius. *Cum aliis dentibus & cornibus convenit. Veteres adſcripſere ei virtutem alexipharmacam, & contra omnia venena valentem: potius vero virtus ejus demulcens, antacida, antiſpaſmodica, & diaphoretica reputatur. Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam.*

Unicornu foſſile, Ebur foſſile, *Unicorne mineral*, **gegraben Einhorn.** Sunt dentes vel cornua, vel alia oſſa animalium in lapideam quaſi ſubſtantiam, longo temporis ſucceſſu, mutata, vel quaſi calcinata. Reperiuntur, quæ ſicut oſſa calcinata friabilia, & alia, quæ Margæ ſpeciem referunt; alia autem cum ſic dictis philoſophice calcinatis conveniunt, atque artificio parari poſſunt, ſi cornu Cervi vel Eboris fruſtum magnæ quantitati Calcis vivæ immergatur, & Calx, aqua affuſa, extinguatur, ſic brevi tempore calcinabitur, & ſpeciem ſic dicti Unicornu foſſilis exhibebit. Invenitur hoc foſſile in multis Germaniæ locis, etiam in Ducatu Wirtenbergico, prope Cantſtadium maxime, Elephantini dentes, incredibilis magnitudinis, reperti, in Cimeliarchio proſtant Stutgardienſi, quos animalis eſſe proſapiæ, ignis probavit aperte. *Abſorbet, adſtringit, & ſudorem movet.*

Umbilici marini, inter Marina occurrunt.

Zibethum, *Civette*, **Zibeth.** Pinguis & unctuoſa eſt ſubſtantia, a natura ſecreta, & collecta in folliculo glanduloſo, in mare inter penem & teſtes, in fœmina inter vulvam & anum ſito, *Cati Zibethici*, ſive *Hyænæ odoriferæ;* animal Lupum potius æmulatur, quam Felem; corpus habet albicans & cinereum, Lupi colore, maculis aſperſum nigris, crura & pedes parvos, pedis digitos quatuor & hallucem ſimul, a reliquis digitis parum diſtinctum; ungues ſunt canini, nigri, breves, craſſi & obtuſi, minime adunci. Reperitur in pluribus Indiæ Occidentalis & Orientalis regionibus. Delectari videntur cicurata animalia, dum folliculi auriſcalpio exinaniuntur. Optimum cenſetur, quod ſubpallidum habet colorem, pingue, moderate liquidum, tractu temporis craſſeſcens, papyro impoſitum & affrictum ſolubile, ſine craſſamento, quo ipſo diſtinguitur ab adulterino, odoris fragrantis, ſaporis amaricantis. *Calidum atque anodinum eſt. Uſus ad Odoramenta, & in dolore colico umbilico inungitur.*

Regno animali etiam adſcribenda ſunt Seva, Axungiæ & Ceræ. Sunt vero uſitatiora:

Sevum Bovinum, *Suif de Bœuf*, **Rinder-Inſchlitt.**
 Cervinum, *Suif de Cerf*, **Hirſchen-Inſchlitt.**
 Hircinum, *Suif de Bouc*, **Bocks-Inſchlitt.**

Sevum, Sebum eſt adeps liquatus, & a membranis ſeparatus, conſiſtentia duriuſcula. Diſtinguitur vero adeps a pinguedine, quod adeps ſit craſſior, durior, calore difficilius ſolvatur, & promte coëat, ac præſertim in brutis biſulcis inveniatur, bobus ſcilicet, hircis, cervis, ovibusque. Seva omnia virtute utplurimum conveniunt emolliente & leniente. Uſus plurimus eſt in emplaſtris.

Axungiæ uſitatiores in noſtris Officinis ſunt:

Axungia Anatis, - - *Axonge de Canard*, **Enten-Schmaltz.**
 Anguillæ, - - - *d'Anguille*, **Ahl - Aal-Schmaltz.**
 Anſeris, - - - *d'Oye*, **Ganß - Schmaltz.**
 Ardeæ, - - - *de Heron*, **Reiher-Schmaltz.**

Axun-

Axungia Aſchii, ſive
Aſchiæ, piſcis, *Axonge de Thymallus*, Aſchen-Schmaltz.
Canis, - - - - *de Chien*, Hunds-Schmaltz.
Caponis, - - - *de Chapon*, Capaunen-Schmaltz.
Caſtorei, - - - *de Caſtoreum*, Bibergail-Schmaltz.
Caſtoris, - - - *de Caſtor*, Biber-Schmaltz.
Cati ſilveſtris, - - *de Chat ſauvage*, wild Katzen-Schmaltz.
Ciconiæ, - - - *de Cicogne*, Storchen-Schmaltz.
Coturnicis, - - *de Caille*, Wachtel-Schmaltz.
Cuniculi, - - - *de Lapin*, Caninchen-Schmaltz.
Equi e collo,
ſ. juba, - - - *de Col de Cheval*, Kammfett-Pferde-Schmaltz.
Gallinæ, - - - *de Poule*, Hüner-Schmaltz.
Hominis, - - - *Humaine*, Menſchen-Schmaltz.
Leporis, - - - *de Lievre*, Haaſen-Schmaltz.
Lucii, piſcis, - - *de Brochet*, Hecht-Schmaltz.
Lupi, - - - - *de Loup*, Wolffs-Schmaltz.
Muris Alpini,
Montani, - - *de Marmotte*, Murmelthiers-Schmaltz.
Porci, - - - - *de Porc*, Schwein-Schmaltz.
Serpentum, - - *de Couleuvre*, Schlangen-Schmaltz.
Taxi, - - - - *de Blaireau*, Dachſen-Schmaltz.
Viperarum, - - *des Viperes*, Vippern-Schmaltz.
Urſi, - - - - - *d'Ours*, Bären-Schmaltz.
Vulpis, - - - - *de Renard*, Fuchs-Schmaltz.

Axungiæ ſunt pinguedines animalium eliquatæ, & a partibus membranaceis cellularum, in quibus reconditæ fuerunt, ſeparatæ, ſuntque partim conſiſtentiæ liquidæ, inſtar olei, partim vero craſſeſcunt; quo liquidiores vero, eo penetrantiores etiam ſunt. *Omnes axungiæ vim habent emolliendi, digerendi, & leniendi; præſertim vero*

Axungia Anatis,
Anſeris,
Canis,

Axungia Caponis,
Caſtoris,
Equi,
Gallinæ,
Hominis,
Porci.

Attenuandi & reſolvendi vis adſcribitur ſequentibus:

Axungiæ Ardeæ,
Cati ſilveſtris,
Ciconiæ,
Coturnicis,
Cuniculi,
Leporis,
Lupi,
Muris Alpini,
Serpentum,
Taxi,
Viperarum,
Urſi,
Vulpis,

Vim autem calefaciendi, detergendi & ſepticam habent

Axungia Anguillæ,
Aſchiæ, ſive Thymalli,
Lucii Piſcis.

Eligantur ſeva & pinguedines, & inprimis axungiæ liquatæ recentes, non vetuſtate & rancore corruptæ, & quæ fœtore nares feriunt; præcipue vero, ubi in linimentis adhibentur, quæ lenire & demulcere debent; rancidæ enim omnes calorem concitant, & affluxum augent. *Axungia Canis* etiam haud raro interne, ad leniendos ſpaſmos, & acrimoniam humorum temperandam ſumitur, quo in caſu vero ex animali recens mactato, & non per vetuſtatem rancida eſſe debet.

Axungia Caſtorei pretio non multum differt ab ipſo Caſtoreo, hinc tanta copia, ut membra ea inungi poſſint, vix præſcribitur, etiamſi antiſpaſmodicum & nervinum ſit egregium. *In affectibus vero hyſtericis, balſamis ad odoratum, & unguentis abdomini illinendis admiſcetur.*

Cera flava, *Cire jaune*, **gelbes Wachs.** Eſt ſubſtantia pinguis oleoſa, condenſata, flaveſcens, e favis Apum, ignis calore liquata & expreſſa, ſaporis lenti, oleoſi, odoris grati.

Cera alba, *Cire blanche*, **weiſſes Wachs.** E flava, frequenti adſperſione aquæ, & inſolatione paratur.

PROPOLIS, *Propolis*, **Stopf-Wachs.** Eſt craſſa illa ceroſa materia, qua apes favos agglutinant, rimas & latera alveorum obducunt, atque domicilium non ſolum firmant, ſed & externi aëris acceſſum impediunt.

Cera & Propolis digerunt, maturant, emolliunt & dolores mitigant. Uſus plurimus eſt in emplaſtris; a nonnullis cum pomo Cydonio toſto interne ſumta ad dyſenteriam commendatur.

DESCRIPTIO

Simplicium quorundam exoticorum, quæ tam propter eximias illis attributas virtutes, quam curiositatis gratia, nonnunquam in Officinis pharmacevticis reperiuntur.

Apalachine, Paraguay, *Thée de la Mer du Sud.* Angl. *Cassio-berry-busch*, Cassina Floridanorum. Species est *Alaterni*, & sub nomine *Apalachine* ante aliquot lustra in Gallia celebris fuit. Ab aliis frutex *Alaternoides Lauri serrato folio*, appatur. Non solum in America, sed & in Africa reperitur. Apud Americanos vero magni æstimatur, & eorum fere unicum solatium est. Hinc quotannis, sicut apud nos, ad fontes salutares, etiam apud illos, certo anni tempore ad ripas maris, ubi frutex copiose provenit, magnus est confluxus. Infundunt folia recentia aqua fervente & in circulo consessi vas hoc infuso repletum unus alteri porrigit. Hoc plerumque per tres dies insequentes continuare solent, atque interim quilibet quantitatem horum foliorum, secum domi transportandam, colligit. Vires hujus infusi sunt emeticæ, & absque omni molestia, etiam sine capitis inclinatione, ventriculum purgat.

Ex effectu indoles plantæ, quæ ad Thymelæam refertur, cognoscitur. Ipsi etiam Americani plantam olim fuisse venenatam, sed ex benedictione S. Bartholomæi salutarem nunc habere effectum, tradunt. Præ aliis, metallicolis & Peruani regni circa celebres illas minas montis Potosi incolis, bona est Medicina. Folia hæc & eorum infusum intense sunt amara. Apud Hispanos audiunt *Yerba de Palos & Yerba de Camini:* & præferri solent illa, *Yerba de Camini*, quæ & ab Anglis *Paraguay*, vocantur; frutex vero, quæ *Yerba de Palos* profert, *Cassio-berry-Busch* insignitur.

Caa-apia. Planta est pusilla & depressa. Ex radice enim pennam anserinam crassa, verrucosa, filamentis ad latera & inferius prædita, exterius e griseo flavescente, interius alba, tres vel quatuor pullulant pediculi teretes, quorum quilibet unicum folium sustinet, obrotundum, vel oblongum, tenerrimum, superius splendidum, viride, inferius paulum albicans. Florem producit in proprio petiolo radiatum, floris bellidis æmulum. Radix gustu est acris, & fere ejusdem virtutis, quæ Ipecacuannhæ: mitior tamen agit, & majori dosi, cum vomitus excitare debet, exhibenda. Quandoquidem ejusdem virtutis cum Ipecacuannha celebratur; charactere tamen botanico, longe ab illa, secundum descriptionem, quam Piso dedit, differt. Ipecacuannha enim est planta baccifera, secundum illustrem Linnæum. Hort. Cliffort. & a Rajo Herba Paris Brasiliana po-

lycoccos vocatur. Patriam etiam agnoſcit Braſiliam. Indigenæ plantam contundunt integram, & ſuccum expreſſum hauriunt, nec non vulneribus a colubris vel ſagittis venenatis inflictis inſtillant. Ex quibus virtus hujus radicis alexipharmaca facile cognoſcitur.

Cajeput. Oleum ex India Orientali advehitur, & pro oleo ex ſpecie quadam Cardamomi deſtillato habetur. *Uſus ejus eſt tam internus, quam externus. Laudatur ſpecifice ad colicam flatulentam, menſtrua ſuppreſſa & fœtum mortuum pellendum. Ad dentium dolores, ſugillationes & ſuffuſiones diſcutiendas vix ſimile haberi dicunt remedium. Doſis guttæ tres quinque vel ſex ſaccharo albo inſtillatæ, cum infuſo theæ.*

Caroli Sancti radix, ob inſignes facultates ita dicta. *Garcias ab Horto* ſequentibus verbis plantam deſcribit. Noſtro lupulo ſimilis eſt, & perticis ſe convolvit illius more, quibus ſi careat, humi ſpargitur & diffunditur. Folia etiam lupulo ſimilia, colore viridi, ſed obſcuriore, odore gravi. Neque florem, neque fructum fert. Radix craſſo capite eſt, ex quo aliæ oriuntur digiti majoris craſſitudine, colore candicantes: cortex radicum, qui pro optima & medicinali parte plantæ habetur, facile abſcedit, & odoris eſt aromatici, guſtus amari, cum quadam acrimonia. Naſcitur temperatiſſimis provinciæ Mechoacan locis, ſolo neque nimium ſicco, neque humido. *Cortex hujus radicis aliquanto matutino tempore commanducatus, multam pituitam, aliosque humores ex capite elicit, eamque ob cauſam rhevmatiſmos, capitis dolores & defluxiones curat. Gingivis abſcedentibus auxilio eſt, dentes ſtabilit, eosque a corruptione defendit ac liberat. In nonnullis etiam vomitu multam bilem & pituitam e ſtomacho expellit. Menſes movet, & ad Epilepſiam commendatur.*

Exhibetur tam in pulveris forma, quam in decocto. Doſis in ſubſtantia non definitur, parva tamen eſſe debet, Auctor monet. Drachmas duas in tribus aquæ ſextariis, ad dimidias coqui ſuadet, additis ſub fine coctionis citri & cinnamomi corticibus. Decocti hujus ſex uncias ſingulis diebus mane, addito ſaccharo ſumere jubet.

Non ſemper tamen emeticum habere effectum, ſed & per ſudorem operari hoc decoctum, Monardes auctor eſt.

Caſſummuniar, Riſagon, M. Lond. R. Bringalle Indorum. Zedoaria, radice lutea Breyn. Prodr. Radix eſt tuberoſa ad digitum & amplius craſſa, in taleolas transverſim ſecta: Superficie laterali, circulis uti Galanga quaſi geniculatis notata; foris cinerea, intus flaveſcens, ſapore ſubacri, amaricante, aromatico, odore fragrante. Ex India adfertur Orientali, & *vires ſummopere prædicantur nervinæ & confortantes, hinc in affectibus hyſtericis, colica, vertigine, apoplexia & motibus convulſivis commendatur. Doſis in ſubſtantia ſcrupulus ſemis ad drachmam ſemis. B. Geofroy* Caſſummuniar nomen ad celandam plantam impoſitum eſſe autumat.

Cipo de Cameras. Hujus radicis Acta phyſic. Med. N. C. Vol. 1. mentionem faciunt, & cum Hypecacuanha easdem vires adſcribunt, mitiores tamen, & quod ſine moleſtia operatur: addunt, quod ſit coloris ſanguinei, majoris etiam pretii. Forſan hæc radix eſt Ipecacuannha flava & Species Caa-apiæ.

Con-

Contra Yerva nova, alba, major, Mexicana, Psoralea, foliis quaternis & quinis, Act. Acad. Reg. Paris. 1744. Toto cœlo a Contra Yerva sive *Drackena* officinali differt. Character tamen botanicus adhuc latet. Describitur radix digitorum vel pollicum duorum craffitiei. Cortex est inæqualis, nodofus, fufci coloris. Subftantia radicis alba cum medulla lignofa guftu deprehenditur aromatica, fubdulcis. Nafcitur in Provincia Americæ meridionalis Gujana, & easdem habet virtutes, quas *Contra Yerva officinalis.*

Gentiana Indica. Sub hoc nomine a Lufitanis radix quædam geniculata, pallide flavefcens, variis nodulis ac circulis inftar Hypecacuannhæ calamiftrata, ante aliquot annos ex America allata fuit. Tantæ, & tam penetrantis aromaticæ, neutiquam tamen ingratæ amaritudinis deprehenditur, ut gentiana noftra, centaurium minus, colocynthis, aliaque amara cum hac collata, infipida ac inertia vocari mereantur.

De charactere botanico, ficut de multis aliis ex America allatis, nihil nobis conftat: *Laudatur adverfus omnium male moratarum febrium indolem, atque unicum hujus radicis fcrupulum, ad febrile fermentum ex vifceribus excutiendum, plus efficere, quam plures Corticis Chinæ drachmæ. Quin imo plurimos ex fola hujus radicis Gentianæ Indicæ maflicatione, & faliva deglutita, tanquam incantamento reftitutos fuiffe,* Excell. D. Schendo, Rufforum exercituum medicus, *perhibet.* Act. ph. med. Vol. I.

Gummi Galda coloris eft fubgrifei, & multum cum Elemi Gummi, tam quoad odorem, quam virtutem convenit. De arbore nihil nobis conftat.

Gummi Look. Colore fuccinum æmulatur. Ex Japonia affertur, & ficut maftiche electa *temporibus contra dolores dentium & cephalalgiam imponitur.*

Gummi Olampi ex America advehitur transparens, durum, coloris pallidi, faporis fubdulcis, parum adftringentis. Videtur cum Arabico Gummi multum convenire.

Helenæ S. Radix, Cyperus Hernand. Nodofa eft, craffitudine pollicari, foris nigra, intus alba, faporis aromatici Galangæ inftar. Plantam tradunt ramos per terram diffundere, & folia ampla viridia habere. A botanicis pro fpecie Cyperi habetur. Ex radicum nodis diffectis & perforatis faciunt fphærulas, recitandis ad numerum precibus idoneas, quibus de collo fufpenfis, tam Hifpani, quam Indi multas tribuunt virtutes. Indi radices recentes lapidibus conterunt, totique corpori fibi balneaturis inducunt, perfuafi, cutim conftringere & membra roborare. *Interne pulvis radicis ex vino hauftus ad ventriculi dolores & urinæ difficultatem commendatur.* Hæc Monardes, qui plantam pro Cyperi fpecie habet.

Ikan Radix, mole parva, oblonga, teres, tenuem in caudam exporrecta; Intus refinofa, flava, inftar curcumæ, quam & aliis dotibus æmulatur, fapore tamen magis aromatico excellens. Crefcit in Chinenfi Provincia Suchuan. *Virtutes adfcribuntur fanguinem purificantes, emmenagogæ, ftomachicæ, carminativæ & fudoriferæ. Dofis fcrupuli duo, ad drachmam unam ex vino vel cerevifia.*

Jujaba, cortex Peruvianus. Cujus radicis vel arboris sit, nobis non constat. Afferri ex America, cordi confortando inservire, sapore gratissimo, ac mire balsamico se commendare, suavitate enim Vainiglias superare, hinc inde ad Chocoladæ confectionem præferendum illis esse, *Seba in Thesauro natural.* tradit. Alii saporem amygdalinum, suave amaricantem, huic cortici adscribunt.

Kikekunemalo Gummi. Habetur pro specie Copal, atque puritate, elegantia & perspicuitate, præ ordinario Copal se commendat. Facilius etiam solvitur, hinc pro nitida alba vernice paranda, vix aliquid aptius reperitur. Arbor, ex qua fluit, ignota, certum tamen ex America advehi. *Ad affectus erysipelaceos & arthriticos, carbonibus injectum, & partes affectas fumigando juvare dicunt.*

Lapis sive Bezoar Coromandel. A regione, unde advehitur, ita dictus. Variæ hi lapides sunt magnitudinis & coloris diversi. Alii enim dilute virides sunt, alii magis ad fuscum colorem vergentes, alii dilute flavescunt, alii ex modo dictis coloribus variegati. Colorem facile attritu chartæ communicant. Intuitu molis sunt leves, substantia fissiles atque friabiles. In centro, uti plerique lapides hujus originis, straminum, foliorum, aut pilorum particulas, inter se convolutas, exhibent. Igni admoti flammam concipiunt, & odorem haud ingratum spargunt. Sunt, qui factitios hos esse lapides, autumant; certum vero est, in ventriculis & intestinis Bubalorum inveniri, atque genuinas esse concretiones in modo dictis animalibus ortas. Bestiæ hæ in Orientalibus Indiis admodum sunt frequentes, atque loco boum & equorum ad agriculturam adhibentur. Vagantur per silvas, foliisque arborum gummoso-resinosarum vescuntur, quæ procul dubio ab ipsorum stomacho difficulter soluta, coagulum hoc formant, quod appositione novæ lamellæ sensim augescit, & in calculi mollioris foliacei substantiam abit.

Copiose sæpius inveniuntur, & vel a bestia cum excrementis ejiciuntur hi lapides, vel mole & numero graves hospitem interficiunt.

Vires hujus concreti habentur bezoardicæ ac sudoriferæ, & in febribus malignis commendatur. Dosis scrupulus unus & plura grana.

Moringa Radix, arboris Lentisci foliis, fructu magno, angulosо, in quo semina Ervi *Joh. Bauhin.* a *Christophoro Acosta* Libr. Aromat. describitur. Frutex Lentisci magnitudine, cui folia persimilia, paucis prædita ramis. Multis scatet nodis, adeoque fragilis est, ut facillime cum ipse frutex, tum rami confringantur. Fructum fert pedalem, octangulis insignitum, semina rotunda, Ervo similia. Radices pastinaceas hortenses luteas referre, nisi quod annulis numero pluribus, calamistratæ, celebris instar *Ginseng*, conspiciantur. *Odoris sunt aromatici, & substantia videntur resinosæ, Zingiberis instar. Lapidis Bezoar vices radix hæc supplet, veraque Theriaca, qua vulgo incolæ utuntur, est; cum adversus omnis generis venenatorum animalium morsus, & puncturas insectorum, tam interne, quam externe adhibetur. In cholerica passione singularis efficaciæ est, atque anthelmintica celebratur: præcipue ad Elephantiasin commendatur.* Radice has Hystrices perdite delectari ajunt, & ab illa vis bezoardica, lapidis illius celebris *Pedra de Porco* originem habere. Abunde provenit in Indiæ Orientalis provinciis, præsertim vero apud Malabaros.

Pesaulina Radix. Ex Provincia Chinensi Junnan adferri tradunt, & propter colorem lacteum, quem recens habet radix, a Malayis *Lac tigrinum* appellari. Substantia est spongiosa, Agarici instar. Cortice ob-

obducitur nigro, & non ſemper ejusdem reperitur magnitudinis. In medio, ſicut pleræque radices, lignoſa ſubſtantia prædita eſt. Nunquam ante tertium ætatis annum effodiunt. Ex viribus & denominatione judicare licet, plantam hanc, non ſicut aliæ lacteſcentes, ſuccum vehere acrem, ſed potius dulcem, uti Tragopogon, Scorzonera &c. *Sicca in pollinem trita, albedine farinam tritici æmulatur, atque ſingulari gaudet virtute confortante: hanc ob cauſam hecticis, tabe conſumtis & hæmoptoicis commendari ſolet. Acrimoniam ſanguinis & humorum temperat, & tam junioribus, quam ſenibus proficua æſtimatur. Præcipue vero gravidis, quod deliquia & nauſeam abolet, datur. Confert etiam nephriticis, & illis, qui catarrhis ex acri materia cum febricula vexantur. Exhibetur in decocto, & quotidie quantum V. vel VI. vaſcula porcellana, theæ ſorbillationi deſtinata, capiunt, ſumere ſuadent.*

Rackaſira Balſamum, Copaivæ Balſamo tam ſapore, quam odore aromatico, & viribus longe præcellens. Americæ productum, arbor vero etiam ignota.

Sagu, Zagoe, nonnullis *Sego*, ſunt granula pallida, Milii, imo Sinapi ſemine paullo majora, quæ ex India orientali afferuntur. Arbor, ex qua Sagu colligitur, ad Palmites refertur, & apud Botanicos Palma japonica, ſpinoſis pediculis, polypodii folio, Palma indica caudice in annulos protuberante diſtincto, fructu pruniformi, Palmam referens arbor, farinifera, audit. Naſcitur in Japonia, & plurimis Indiæ orientalis regionibus, præſertim vero in Terenate & Amboina inſulis. Tres arboris ſpecies Sagu proferentis a Jonſtonio recenſentur: prima, quæ Zagu fert in orbiculato capite, quod in ſummo veſtigio braſſicæ capitatæ inſtar extuberat. Secunda, quæ eam in trunco fert, & tertia, quæ materiam duntaxat ſuppeditat.

Plurimi putant, Sagu, quod ad nos defertur, præparatum, & ex farina, ſive medulla arboris aqua ſubacta, certa encheiriſi granulatum, & ſiccatum eſſe. Quod & vero ſimile eſt. Granula enim Sinapi ſemine haud majora, in lacte vel juſculo carnis cocta, grandeſcunt ad hordei excorticati magnitudinem. *Non ſolum delicii loco habetur Sagu, ſed & morbo conſumptis & emaciatis bonus eſt cibus, imo medicina refrigerans & demulcens.*

Salab. Sunt *Orchidis Perſicæ* unifoliæ bulboſæ, ſubſtantia quaſi cornea, ſaporis glutinoſi. Sinenſes & Perſæ magni pendunt has radices, & illis vim adſcribunt aphrodiſiacam, atque fere easdem virtutes, quas Japonenſes de ſua *Ginſeng*, prædicant. Drachma una hujus radicis in pulverem trita, atque aquæ fontanæ unciis octo macerata, leni calore, fere tota in gelatinam vel mucilaginem ſolvitur, quæ acrimoniam bilioſam, in inteſtinis hærentem mitigat, & dolores demulcet; hinc inde non ſolum dyſentericis, ſed etiam ad colicos dolores & convulſiones infantum commendantur. *B. Geofroy* docuit etiam noſtratis orchidis radices, ad modum radicum Salab præparare, atque ablato cortice, in aqua fontana frigida, per aliquot horas macerare, poſtea parum coqui, & filo mediante acu trajecto appenſas in aëre calido, ſiccare jubet. Sic quaſi corneam & ſemi diaphanam acquirunt faciem, atque in pulverem tritæ & aqua fervida dilutæ, pariter, ſicut perſicæ, in mucilaginem abeunt. *Pro una doſi ſufficiunt grana XXIV.*

Sanley. Sunt radices *Acori veri paluſtris.* Creſcunt in regno Chinenſi, circa urbem *Canton* in Provincia *Suchuam*, ubi recentes in tenues taleolos ſciſſæ, ſiccatæ in plumbeis receptaculis, uti herba Thee, ne virium jacturam faciant, aut ab aëre marino corrumpantur, aſſervantur. *Apud Chinenſes magno habentur pretio, ob plurimas, quibus pollent, virtutes medicas: Præcipue laudatur vis earum in febribus malignis & contagioſis morbis. Dari*

Nn 2 *ſolet*

ſolet in pulvere a granis XX. ad XL. bis vel ter de die cum vehiculo idoneo. Serviunt etiam hæ radices uſui externo ad morſus animalium venenatorum, atque pulvis vino ſubactus, parti affectæ applicatur. Plura *Acta Phyſico-Medic. Vol. IV.* habent.

Seneka. Eſt *Polygala Virginiana*, caule ſimplici erecto, foliis ovato-lanceolatis, alternis integerrimis, racemo terminatrice erecto. *Rattle Snak Root. Gronov. Flor. Virgin.* E radice perenni ſemi ſpithamam vel etiam ſpithamam longa, variæ pro ætate craſſitiei, utplurimum digitum circiter minimum craſſa, varie contorta, in plures ramos divaricata, fibris ſtipata lateralibus, & margine veluti membranaceo, extuberante, ſecundum longitudinem decurrente, foris ſublutea, intus alba, ſapore acri, amaricante, nonnihil aromatico prædita, multos profert caules, alios ſurrectos, alios humi ſparſos, tenues, ſimpliciſſimos, ramis deſtitutos, teretes, glabros, vix pedales, debiles, foliis veſtitos ovato-lanceolatis, alternis unciam circiter longis, glabris, integerrimis.

Remedium apud Virginiæ incolas eſt ad morſus viperæ caudiſonæ, pleuritidem, peripnevmoniam, aliasque febres phlogiſticas. In officinis noſtris olim non uſitata fuit Polygala, experimento vero Virginienſium, Pariſienſes Medici noſtram exhibuere, eventu feliciſſimo & eodem, licet vi debiliori gaudeat. Vomitus & catharſis quandoque hoc remedio benigne cientur, idque ſatis feliciter. At ſi æger admodum debilitatus fuerit, nec vomitum facile pertulerit, emeſin ſiſtent abſorbentia quævis teſtacea.

Paratur Eſſentia ex Radicum Seneka unciis tribus, Valerianæ ſilveſtris uncia una ſemis, Vini Canarienſis libris duabus. Doſis tria cochlearia, mox vel ſtatim poſt venæ ſectionem, quæ doſis ſingulis ſex horis repetenda.

Simaruba, Simarouba. Eſt cortex fibroſus, pallidi coloris, ſaporis amari, haud ingrati, parum adſtringentis. Ex America primo MDCCXIII. in Europam translatus. Patriam agnoſcit non ſolum Cayennam, ſed in aliis etiam inſulis ad ventum provenit. De charactere botanico nihil certi habemus. Arborem ferunt eſſe ſatis magnam, folia longa acuta, pallide vireſcentia. Cortex ex radice colligitur, & tiliæ inſtar, longis fibrillis intertextus eſt. Lignum, quod leve & fibroſum, ob amaritiem, ſe ab omnium inſectorum injuria defendit: in uſum vero culinarium vocari nequit, quia cibos ad illud coctos amarore perfundit. *Cortex hic gummi-reſinoſarum partium eſt, quod ex lacteo colore, quo aquam, in qua coquitur, impertit, cognoſcitur. Vi tamen quadam irritante ventriculum & inteſtina præditus etiam eſt. Vomitus enim nonnunquam, præſertim, quando decoctum nimis ſaturatum eſt, & copioſiores dejectiones, nec non ſudores valde incommodos excitare ſolet. Correctis vero doſibus, experientia magiſtra, ſalubritatis punctum attingit.*

Coquuntur drachmæ duæ hujus corticis in aquæ fontanæ libris duabus, ad dimidiæ partis exhalationem. Quantitas hæc tres doſes, ſingulis trihoriis ſumendas, conſtituit.

Hac methodo exhibitus, Degnerus effectum lenem, & propemodum inſenſibilem promittit, atque concludit, corticem hunc ſua amaritie non ſolum bonum eſſe corrigens & temperans, ſed & ad firmanda viſcera, tutiſſimum tonico-roborans & ſedativum; hinc inde reliquis præferendum. Vid. laudati Degneri Hiſtor. Med. de Dyſenteria bilioſa contagioſa.

PHAR-

PHARMACOPOEÆ WIRTENBERGICÆ PARS ALTERA,

COMPOSITA ET PRÆPARATA EORUMQUE MODUM PRÆPARANDI EXHIBENS.

*** *** ***

ACETUM BEZOARDICUM.

REC. Radicum Angelicæ,
Enulæ,
Imperatoriæ,
Hirundinariæ,
Zedoariæ ana drachmas ſex,
Herbarum Scordii,
Rutæ,
Salviæ ana unciam unam,
Baccarum Juniperi unciam ſemis,
Flavedinis Corticum Citri drachmas ſex.

Minutim inciſis affundantur:
Aceti Vini optimi, non deſtillati, libræ tres.

Poſt ſufficientem digeſtionem exprimantur, & filtratum acetum ad uſum reponatur.

In morbis contagioſis, præcipue peſte, tam internus quam externus uſu ad odoratum & collutionem oris commendatur.

Propinatur ab uncia dimidia ad integram.

ACETUM LAVENDULÆ.

REC. Florum Lavendulæ libram dimidiam,
Aceti Vini boni albi libras tres.

Reponantur ad uſum.

Uſus eſt externus, Epithematibus & odoramentis inſervit.

Nota: Durabiliora quidem ſunt aceta compoſita e deſtillato parata, at non efficaciora; imo, tam quoad externum quam internum uſum, longe præferendum eſt acetum ſimplex deſtillato: gratius enim, odoratius & ſecurius eſt.

ACETUM ODORATUM.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Galangæ minoris,
Zedoariæ ana unciam ſemis,
Herbarum Roriſmarini,
Salviæ,
Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Roſarum rubrarum ana drachmas tres,
Ligni Rhodii,
Cinnamomi,
Caryophyllorum aromaticorum,
Corticum Citri recentium, ana drachmas duas,
Aceti Vini albi libras duas.

Inciſis & contuſis ſuperfundatur acetum, & poſt digeſtionem per triduum, ad uſum reponatur.

Uſus eſt externus, pro odoramentis & epithematibus ad pulſus. Reficit atque ſpirituoſis longe præferendum eſt.

ACETUM PAPAVERIS,
ROSARUM,
RUTÆ,
SAMBUCI,
TUNICÆ,

Eodem modo, quo acetum lavendulæ, parantur.

Vires habent vegetabilium, quibus impregnantur, & præcipue ad uſum externum commendantur.

ACETUM SATURNINUM, SIVE LITHARGYRII.

REC. Lithargyrii triti libram unam,
Aceti Vini deſtillati libras quatuor.

Coquantur lento igne in vaſe figulino probe vitreato, ſpatula lignea perpetuo agitata, donec acetum probe ſaturatum ſit, quod per chartam filtratum, ſervetur.

Ad inflammationes, ulcera maligna exſiccanda, & affluxum prohibendum, applicari ſolet.

ACETUM SCILLITICUM.

REC. Scillæ præparatæ & exſiccatæ uncias octo,
Aceti Vini albi acerrimi libras octo.

Scillæ radices minutim inciſæ macerentur in aceto per plures dies, acetum per pannum colatum ad uſus reponatur.

Adhibetur in pectoris infarctu viſcido expediendo, tuſſi difficili, aſthmate humido: Gravitatem auditus a pituita ortam gargarizatione emendat.

Doſis drachma una ad unciam dimidiam.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

REC. Aceti Vini fortis, quantum libet.

Deſtilletur e cucurbita magna vitrea lento igne; prodit primo phlegma, quod ſequitur, acetum eſt. Continuetur deſtillatio, usque dum a duodecim vel quindecim libris, vix libra una & dimidia reſtet, alioquin, ſi ad ſiccitatem acetum abſtraheretur, empyrevma contraheret.

Utimur hoc aceto deſtillato potiſſimum, ad ſolutiones coralliorum, oculorum cancrorum, ſaccharum Saturni conficienda, & arcanum tartari parandum.

Ad internum uſum acetum ſimplex merito præfertur.

ÆS VIRIDE CRYSTALLISATUM, SIVE ÆRIS FLORES.

REC. Æruginis, ſive viridis æris in pulverem triti libram unam,
Aceti Vini deſtillati libras ſex.

Immittantur cucurbitæ vitreæ, macerentur in loco calido, acetum tinctum, per inclinationem vaſis, effundatur, novumque affundatur. Hoc fiat aliquoties, & tandem in vaſe cupreo æs viride, addita ſufficienti aceti quantitate, coquatur, ut ſolvatur. Tincturas omnes per filtrum trajectas, leni calore evaporari permitte ad cuticulam, & ad cryſtalliſandum, in locum frigidum repone. Cryſtallos inter chartam leniſſimo calore exſiccatos ſerva.

Rarus in Medicina uſus, niſi ad unguenta mundificantia & Spiritum Veneris deſtillandum. A pictoribus & mechanicis frequentius expetuntur.

ÆS USTUM.

Æris laminæ ſtratificantur Sale culinari, atque in crucibulo probe lutato cæmentantur per duodecim horas, vel usque dum friabiles exiſtant, quæ in pulverem tritæ ad uſum reponuntur.

Uſus eſt externus, in exſiccandis præſertim ulceribus.

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS.

REC. Antimonii crudi puriſſimi optime triti uncias duas,
Mercurii vivi e Cinnabari reſuſcitati unciam unam.

Terantur multum & diu, in mortario vitreo, usque dum omnes globuli mercuriales evaneſcant, quod longa & patienti tritura perficitur. Serventur in vitro, vel pyxide lignea.

Vires ſunt eædem, ac ſequentis Æthiopis mineralis.

Doſis a ſcrupulo dimidio, ad drachmam ſemis.

ÆTHIOPS MINERALIS.

REC. Mercurii vivi e Cinnabari reſuſcitati uncias tres,
Florum ſulphuris uncias duas.

Miſceantur & terantur in mortario vitreo vel marmoreo diu & diligenter, donec Mercurius plane diſpareat, & cum floribus Sulphuris in pulverem nigrum redactus ſit.

Eximiæ huic pulveri ſulphurato mercuriali adſcribuntur vires, in tumoribus glandularum colli, exulcerationibus antiquis, fiſtuloſis, ſcabie ſicca, febre quartana, & ubi vermium ſuſpicio eſt.

Datur

Datur infanti tenero ad grana tria vel quinque, adultiori ad scrupulum dimidium, homini adulto ad drachmam dimidiam, & per complures dies, absque metu salivationis, usus ejus continuari potest.

AGARICUS TROCHISCATUS.

Agaricus albissimus radula comminuitur, atque per cribrum transmittitur, postea in mortario lapideo, pistillo ligneo, cum vino, in quo zingiber infusum fuit, in massam cogitur, quæ massa in trochiscos majores formatur, qui, ut eo magis albescant, hieme sunt parandi, & in frigore exsiccandi.

Per trochiscationem, quam vocant, correctior habetur, atque in vinis medicatis infusus, pectoris vitiis, humores crassos & viscidos educendo, mederi creditur.

ALCIS CORNU PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

Cornu Alcis in frusta dissectum, in magna copia aquæ fontanæ coquitur, ut mollescat, & medullosa exteriorque corticosa pars culto auferri queat. Cornu exsiccatum in pulverem tenerrimum teritur & asservatur.

Præ aliis ossibus calcinatis parum prærogativæ habet. Præstat cornu alcis in scobem redactum & in subtilissimum pulverem tritum, adhibere: additur pulveribus antepilepticis & antispasmodicis.

Dosis a scrupulo uno ad duos.

ALOE DEPURATA, SIVE LOTA.

REC. Aloës Succotrinæ libram unam, solvatur in
Aquæ fontanæ calidæ libris quinque,
Succi Citri depurati libra una.

Solutio reponatur in vase vitreo per unum aut alterum diem, ut resinosa substantia cum fæcibus subsideat, quo facto clarum a spisso separetur per decantationem & colationem, lentoque igne ad extracti consistentiam evaporetur.

Longe securius, promtius & minori quantitate sumpta, alvum laxat, quam sola Aloë Succotrina. Per hanc depurationem separatur illa resinosa substantia, hæmorrhoidalium motuum sæpius causa, qui frequentiorem aloëticorum usum sequuntur. Tale Aloës extractum basis est pilularum Celeberrimi Stahlii, & pro basi pilularum laxantium adhiberi potest.

Grana octo sufficiunt pro alvo stimulanda, pro laxanda verum dari possunt grana quindecim.

ALOE INSUCCATA.

REC. Aloës Succotrinæ pulverisatæ libram unam, solvatur succis sequentibus, scilicet:
Succi Rosarum libris duabus,
Violarum
Borraginis,
Buglossæ ana unciis quindecim.

Solutio, per pannum calide transcolata, evaporetur ad extracti consistentiam.

Aloës insuccatæ præparatio nititur prisca illa persuasione, aloëm hepar lædere: quare factum est, ut succi herbarum, quas cor & hepar juvare putabant, additi fuerint; quibus etiam particulæ resinosæ magis disjunguntur, ut facilius per intestina transeant, nec illis adhærescentes tormina & hæmorrhoides excitent.

Dosis est eadem, quæ præcedentis.

ALOE ROSATA ET VIOLATA.

Fiunt, si loco succorum modo dictorum, tantundem succi vel infusionis saturatæ Rosarum vel Violarum adhibeatur.

Dosis & Virtus est eadem cum præcedenti.

ALUMEN SACCHARINUM.

REC. Aluminis crudi vulgaris uncias ſex,
Ceruſſæ Venetæ albæ drachmas ſex,
Vitrioli albi drachmas tres,
Sacchari albi Canarienſis unciam unam ſemis.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui albumine ovorum & aceti deſtillati æquali portione, in mellis liquidi conſiſtentiam, diluatur, probeque agitatus, formis chartaceis, parvis, conicis infundatur & ſiccetur.

Uſus præcipuus eſt in Collyriis & Coſmeticis; detergit & carnem luxuriantem aufert.

ALUMEN USTUM.

REC. Aluminis vulgaris albi quantum volueris, coquatur & calcinetur in olla fictili, nova, donec totum Alumen, ſpiritibus expulſis, leve, poroſum, & quaſi ſpumoſum evaſerit.

Ad dentifricia & carnem luxuriantem abſumendam, adhiberi ſolet.

ANTIHECTICUM POTERII.

REC. Reguli Antimonii ſimplicis uncias ſex,
Jovis, ſive Stanni Anglici uncias duas.

Fundantur in crucibulo, fuſa effundantur, terantur in pollinem, & cum Nitri puri, probe ſiccati, triplo, vel unciis viginti quatuor mixta, in crucibulo detonentur. Refrigeſcant, maſſa alba cœruleſcens iterum teratur, & ſufficienti copia aquæ fontanæ calidæ edulcoretur, tandem aqua copioſa diluatur, ut ponderoſior pars fundum petat, levior autem cum aqua, per inclinationem vaſis, ab illa ſeparari queat. Pulvis ſubtilior ita paratus eluatur, leni calore ſiccetur, & uſui ſervetur.

Vires hujus pulveris adſtringentes ſunt. Ad ſanguinis & ſeminis fluxus cohibendos inſervire, & hecticorum etiam colliquativos ſudores minuere poteſt.

Datur a ſcrupulo ſemis ad drachmam dimidiam.

ANTIMONII BUTYRUM ET CINNABARES.

REC. Mercurii ſublimati corroſivi libras tres,
Antimonii crudi libram unam.

Trita in mortario marmoreo vel vitreo optime miſceantur, & aquæ fontanæ uncia una irrorentur. Immittantur retortæ capaci, & inſtituatur deſtillatio igne arenæ, per gradus aucto; educto liquore craſſo, butyri inſtar, ignis augeatur, atque etiam ſuppreſſionis per tres vel quatuor horas adhibeatur, ut Cinnabaris in collum retortæ ſublimetur. Refrigeratis omnibus Cinnabaris ſublimata, conteratur ſubtiliter, abluatur aqua fontana, & denuo e cucurbita ſublimetur; Butyrum vero ſeorſim ſervetur.

Butyrum Antimonii a chirurgis, loco cauterii, adhibetur; eſt enim concentratiſſimus ſalis ſpiritus, qui etiam ad varios chymicos & pharmaceuticos labores eſt utilis.

Cinnabari huic ſpecifica quædam virtus antepileptica & antiſpaſmodica adſcribitur; verum, an multum a vulgari factitia, rite elaborata, differat? dubitant plures.

Dari poteſt a granis quinque ad ſcrupulum unum.

ANTIMONII CLYSSUS.

REC. Antimonii crudi,
Nitri,
Sulphuris ana libram ſemis.

Pulveriſata miſce, & in retortam tubulatam candentem, recipiente magno, cui aquæ ſimplicis libra una infuſa, adaptato, nec exacte nimis lutato, ſucceſſive ad drachmas duas una ingere, ac mox fruſtulo luti madidi, linteolo involuto, tubulum bene claude; ubi nebulæ in recipiente ceſſaverint, perge ingerendo, donec omnis materia ingeſta detonuerit; tum liquo-

liquorem omnem, in recipiente collectum, recipientem hinc inde agitando, effunde, filtra, atque aquam ad dimidias abstrahe, & clyssum sive liquorem acidum residuum in vase clauso serva.

Sitim & calorem nimium extinguit, & in febribus etiam malignis, loco spiritus vitrioli, potui ordinario & julapiis addi, & ad tincturas florum rosarum & aliorum exaltandas adhiberi solet.

Dosis vix determinari potest, sufficiunt plerumque guttæ quindecim.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

REC. Limaturæ Martis,
Antimonii crudi, bene triti, ana uncias octo.

Misceantur & immittantur crucibulo candenti, agitentur baculo ferreo, usque dum in scorias mixtura abiisse videatur, quæ accurate contrita, & cum triplo nitri crudi purissimi & siccissimi mixta, in crucibulo candenti detonetur, atque, post lenem calcinationem, in aquæ tepidæ sufficienti copia solvatur: sic subsidebit pulvis e luteo fuscus, qui, addita copiosa aqua, diluatur, ut levior ac subtilior a graviori separetur, quem edulcoratum atque leni calore siccatum serva.

Propter Martis particulas leniter adstringit, tonum ventriculi & intestinorum roborat, cachecticis & ictericis prodest.

Dosis grana quindecim ad scrupulum.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM SIMPLEX.

REC. Mineræ Antimonii purissimæ libram unam,
Nitri crudi crystallini siccissimi libras tres.

Exacte misceantur, atque in crucibulo magno, per vices ingesta, detonentur. Agitentur spatula ferrea inter detonationem, ut materia æqualiter deflagret & calcinetur. His peractis, massa albicans sufficiente quantitate aquæ dissolvatur, pulvis albus fundum petens, copiosa affusa aqua diluatur, ut commovendo subtilior pars cum ea decantari possit, quæ edulcorata atque siccata usui servetur.

Adscribuntur vires absorbentes, alexipharmacæ, diapnoicæ, sanguinem purificantes. Datur in febribus cujuscunque generis.

Dosis a granis quindecim ad drachmam dimidiam.

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Plantæ, ex quibus aquæ destillantur, sunt vel
Succosæ, succo abundanti præditæ, vel
Viscosæ & minus succulentæ, vel
Succo acri turgentes, vel
Odoriferæ, oleum aromaticum æthereum reddentes.

Plantæ succo abundantes usitatiores, e quibus aquæ destillari solent, sunt:

ACETOSA,
ACETOSELLA,
ANAGALLIS,
BELLIS MINOR,
BORRAGO,
BUGLOSSA,
LACTUCA,
PORTULACA,
SEDUM,
SQUAMARIA,
URTICA,

His & similibus recentibus, parum concisis, ad singulam libram duplum ponderis, i. e. libræ duæ aquæ fontanæ adduntur, & ex qualibet libra herbæ, libra una & dimidia aquæ, destillatione ex vesica cuprea, per alembicum, stanno probe obductum, elicitur.

Plantæ usitatiores viscosæ & minus succulentæ sunt:

ARGENTINA, sive ANSERINA,
BETONICA,
BURSA PASTORIS,
CALENDULA,
CARDUUS BENEDICTUS,
CARDUUS MARIÆ,
CENTAURIUM MINUS,
CHELIDONIUM MAJUS,
CICHORIUM,
EUPHRASIA,
FRAGARIA,
FUMARIA,
GALEGA,
HEPATICA NOBILIS,
PLANTAGO,
PRUNELLA,
QUERCUS FOLIA,
SAXIFRAGIA,
SCABIOSA,
SCORDIUM,
SCORZONERA,
SIGILLUM SALOMONIS,
SOLANUM,
TARAXACUM,
TILIÆ FLORES,
TUSSILLAGO,
VALERIANA,
VERBENA,
VERONICA.

Hæ triplum aquæ exposcunt, & dimidiam partem reddunt.

Plantæ succo acri turgentes usitatæ sunt:

BECCABUNGA,
COCHLEARIA,
NASTURTIUM,
RAPHANUS HORTENSIS & RUSTICANUS,
TRIFOLIUM FIBRINUM.

Hæ in duplo aquæ macerari, & postea destillari debent, atque ex qualibet libra herbæ, libra una & dimidia aquæ prolici.

Plantæ odoriferæ, oleo æthereo dotatæ, sunt:

ABSINTHIUM,
ANGELICA,
ARTEMISIA,
CHAMÆMELUM, sive CHAMOMILLA,
CHÆREFOLIUM,
FOENICULUM,
HEDERA TERRESTRIS,
HYSSOPUS,
LAVENDULA,
LEVISTICUM,
MAJORANA,
MATRICARIA,
MELILOTUS,
MELISSA,
MENTHA,
MILLEFOLIUM,
PETROSELINUM,
PULEGIUM,
ROSMARINUS,
RUTA HORTENSIS,
SABINA,
SALVIA,
SERPILLUM,
TANACETUM.

His omnibus quadruplum aquæ affundi, & duæ libræ aquæ destillatione elici possunt.

Cum floribus sequentibus integris atque recentibus:

ACACIÆ,
AURANTIORUM,
CYANI,
FABARUM,
KEIRI,
LILIORUM ALBORUM, CONVALLIUM,
NYMPHÆÆ,
POEONIAE,
PRIMULÆ VERIS,
ROSARUM,
SAMBUCI.

Affuso triplo aquæ, statim destillatio instituenda, & ex qualibet libra

libra florum, libra una cum dimidia aquæ elicienda.

SEMINA ANISI,
CARVI,
CORIANDRI,
FOENICULI.
BACCÆ JUNIPERI,
LAURI.
RADICES ANGELICÆ,
CALAMI AROMATICI.
LIGNA SASSAFRAS,
RHODIUM.
CORTICES CHACARILLÆ,
WINTERANI.

Omnia sextuplum aquæ, & macerationem per aliquot dies, ante destillationem, exposcunt. Ex quavis libra, aquæ lacteæ, oleosæ, libræ tres elici possunt.

CORTICES FRUCTUUM AURANTIORUM & CITRI.

Absque prævia maceratione, statim destillantur, atque ad libram corticum aquæ libræ quatuor affundi, & libræ duæ destillatione abstrahi debent.

FRUCTUS HALICACABI, sive ALKEKENGI, minus succulenti

quatuor partes aquæ exposcunt, atque unam semis reddunt.

CERASORUM,
FRAGORUM,
RUBI IDÆI

duplum aquæ poscunt, & e qualibet libra, libram unam aquæ destillatæ fragrantis exhibent.

Pro vehiculo aliorum medicamentorum ut plurimum inserviunt. Ex herbis, floribus & fructibus frigidis paratæ vix annum durant; oleosorum & odoratorum simplicium aquæ durabiliores sunt.

AQUA ACOVISTICA.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Radicum Iridis Florentinæ,
Levistici,
Valerianæ ana unciam semis,
Herbarum Majoranæ,
Origani,
Rorismarini,
Rutæ hortensis,
Salviæ hortensis,
Serpilli,
Florum Lavendulæ,
Sambuci ana drachmas tres,
Seminum Coriandri,
Fœniculi,
Rutæ,
Baccarum Juniperi,
Lauri ana unciam semis,
Ceparum incisarum uncias duas semis,
Castorei drachmas duas.

Incisa & contusa immittantur cucurbitæ vitreæ, & superaffundantur
Aquæ epilepticæ Langii,
Spiritus Baccarum Juniperi ana unciæ quindecim,
Succi Raphanorum libra una semis.

Digerantur per biduum, postea, additis
Cinerum clavellatorum drachmis quatuor,
Salis ammoniaci drachmis duabus,
Camphoræ drachma una.

Destillentur ex cucurbita vitrea, & liquoris spirituosi volatilis unciæ sedecim prolicіantur, qui in vase probe clauso servandus.

Applicatur vel in frusto panis calidi, e clibano modo extracti, auribus, vel gossypio aliquot guttæ exceptæ immittuntur auri. Crassos humores, nervos & auditorios meatus obstruentes, attenuat, atque tympani atoniæ roborando, medetur.

AQUA ANHALTINA.

REC. Radicum Galangæ minoris,
Florum Anthos ana drachmas sex,
Seminis Fœniculi,

Baccarum Lauri ana unciam dimidiam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum,
Nucum Moſchatarum.
Cinnamomi acuti,
Maſtiches ana drachmas ſex,
Thuris unciam unam,
Terebinthinæ Venetæ libram dimidiam.

In pulverem contrita infundantur in ſpiritus vini rectificati libris quinque, & digeſta per dies ſex, addita aquæ fontanæ libra una, deſtillentur, leniſſimo balnei calore, libræ quinque.

Vires hujus aquæ ſpirituoſæ ſunt inſignes in ventriculo roborando, colica flatulenta, urina pellenda; verum adhibenda prudenter, ne ſanguis nimium commoveatur. Externus uſus eſt frequentior, ventriculo applicata, vomitum & diarrhœas ſiſtit, & in roborandis membris, debilitatis a paralyſi, valet.

AQUA ANTISCORBUTICA TEMPERATA.

REC. Herbarum, omnium recentium,
Acetoſæ,
Nummulariæ,
Beccabungæ,
Bellidis minoris,
Chærefolii,
Fumariæ,
Trifolii fibrini,
Veronicæ ana uncias octo,
Fructuum Rubi idæi libram unam.

Inciſa miſceantur, ſuperfuſis aquæ fontanæ libris quindecim, deſtillentur, atque libræ ſex eliciantur.

Parata eſt ex herbis antiſcorbuticis temperatis, & æque omnibus convenit, ubi affectus æſtuoſi, febriles cum diatheſi ſcorbutica complicantur.

Dari poteſt ad uncias duas treſve.

AQUA APOPLECTICA SPIRITUOSA.

REC. Florum Liliorum convallium recentium,
Lavendulæ recentium,
Primulæ veris,
Tiliæ,
Betonicæ,
Tunicæ, ana unciam unam,
Herbæ Rorismarini,
Majoranæ,
Baſilici,
Salviæ,
Serpilli,
Mari veri ana unciam unam ſemis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum drachmas ſex,
Nucum moſchatarum unciam unam;
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Zedoariæ,
Galangæ,
Sandali citrini ana unciam ſemis.

Flores & herbæ recentes colligantur ſucceſſive per æſtatem, & in ſpiritus vini rectificati libris quinque macerentur. Poſtea aromata, minutim inciſa & contuſa, vini generoſi libris quinque infundantur, & poſt digeſtionem per biduum, cum priori infuſo commixta, e veſica, lento igne, deſtillentur. Clarum & magis ſpirituoſum ſeorſim, pro uſu externo, ſervandum; quod ſequitur oleoſum albicans, pro uſu interno.

AQUA APOPLECTICA MINUS SPIRITUOSA.

REC. Herbæ, cum floribus, Salviæ uncias octo,
Majoranæ,
Serpilli ana unciam unam,
Florum Liliorum convallium uncias tres,
Lavendulæ,

Florum

Florum Anthos ana uncias duas,
Cinnamomi electi unciam unam ſemis,
Cubebarum unciam ſemis,
Caryophyllorum drachmas tres,
Macis drachmas duas,
Vini albi generoſi libras duodecim.

Macerata per triduum deſtillentur ad dimidiæ partis remanentiam.

Aquæ hujusmodi ſpirituoſæ in Apoplexia, quam ſanguineam vocant, internæ ſumtæ non conveniunt; externe autem ad partes debilitatas roborandas & ad odorandum præcipue adhibentur. In morbis vero a cauſa frigida ortis, colica flatulenta & ventriculi debilitate, bono cum effectu, a drachmis duabus ad ſex, vel integram unciam, propinari poſſunt.

AQUA ASTHMATICA.

REC. Radicum Enulæ,
Liquiritiæ,
Iridis Florentinæ ana uncias duas,
Herbarum Hederæ terreſtris,
Tuſſilaginis,
Botryos ana libram ſemis,
Hyſſopi,
Marrubii albi,
Pulegii,
Salviæ ana uncias tres,
Seminum Aniſi,
Fœniculi ana unciam unam.

Inciſa infundantur ſpiritus vini rectificati libra una, aquæ fontanæ libris duodecim, & præmiſſa digeſtione per triduum, libræ ſex vel ſeptem e veſica deſtillentur.

Senes tuſſi humida vexatos, mane ad unciam unam vel duas ſumpta, juvaſſe viſa eſt.

AQUA BALSAMICA AD GONORRHÆAM RIVERII.

REC. Radicis Iridis Florentinæ uncias tres,
Foliorum Dictamni Cretici,
Menthæ ſiccæ ana unciam unam ſemis,
Seminis Fœniculi uncias duas,
Rutæ unciam unam,
Terebinthinæ claræ Venetæ libram ſemis,
Vini albi libras decem.

Poſt infuſionem per triduum deſtillentur ad dimidium ex veſica.

Ad gonorrhæam virulentam, tam inveteratam, quam recentem, laudatur, partes enim exulceratas detergit, & materiam corroſivam educit.

Doſis a drachmis quatuor ad unciam unam.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

REC. Herbæ Serpilli in umbra ſiccatæ libras duas,
Saturejæ floreſcentis,
Thymi floreſcentis,
Florum Chamomillæ Romanæ ana uncias duas,
Cinnamomi uncias tres,
Macis unciam ſemis.

Inciſa & contuſa miſce, atque, per biduum vini albi generoſi libris octodecim infuſa, lento igne libræ octo eliciantur.

Prodeſt illis, qui catarrhis & defluxionibus vexati ſunt, nervos & ventriculum, cum reliquis viſceribus, corroborat, aſthmaticis ſubvenit, urinam, calculum & menſes movet, omnibusque aquis, quas vocant apoplecticas, fortaſſe præferenda eſt.

Doſis ab uncia ſemis ad integram.

AQUA CALCIS VIVÆ.

REC. Calcis vivæ libram dimidiam.

Superfundantur aquæ foliorum quercuum, vel fontanæ libræ quinque; poſt ebullitionem decantetur aqua ſupernatans, atque ſervetur.

Uſus plerumque externus eſt ad inflammationes, ambuſta, ulcera, & id genus affectiones. Interne in frigidis morbis, chronicis inprimis, unciæ duæ, bis de die propinantur, ſcopo ſiccandi & detergendi.

AQUA CAPONIS.

REC. Caponem eviſceratum atque in fruſta inciſum, depoſita pinguedine, decoque in ſufficiente quantitate aquæ, donec carnes ab oſſibus ſeparentur: contundatur ad pultis formam, adde
Aquæ Borraginis,
Bugloſſi ana libram unam ſemis,
Brodii ſive decocti caponis libras duas ſemis,
Florum quatuor cordialium ana drachmas duas,
Cinnamomi electi unciam.
Deſtillentur ex M. B.

Vires habentur analepticæ atque tabidis & a morbo longo extenuatis commendatur.

Doſis uncia una ad duas usque.

Quanquam eandem cum Zwölfero ſententiam tenemus, aquis ex animalium partibus deſtillatis, juſcula vel decocta eorum longe præferenda: tamen ut mulierculis, aquam hanc ſummopere laudantibus & nonnunquam expetentibus, ſatisfaciamus, deſcriptionem dare voluimus.

AQUA CARBUNCULI.

REC. Herbæ Majoranæ,
Salviæ ana unciam unam ſemis,
Florum Lavendulæ uncias quatuor,
Liliorum convallium,
Roriſmarini,
Roſarum,
Cinnamomi,
Cardamomi minoris ana unciam unam,
Nucis moſchatæ,
Macis,
Caryophyllorum ana unciam ſemis,
Zinziberis,
Galangæ,
Baccarum Juniperi ana drachmas tres.
Spiritus vini rectificati libram unam,
Aquæ rubi idæi,
lavendulæ ana libras tres.
Fiat infuſio per octiduum, in loco tepido, poſtea deſtillatio ad dimidias. Liquori deſtillato, ſplendoris vulgo expetiti cauſa, folia auri immergi ſolent.

Uſus frequens eſt externus ad epithemata cordis & pulſuum; ad fœtum roborandum gravidarum abdomini, cum aqua embryonum imponitur. Internus uſus rarior eſt. Nomen inde habere ajunt, quod carbunculos & bubones peſtilentiales expellat, & retroceſſionem eorum prohibeat.

AQUA CARMINATIVA.

REC. Herbæ Abſinthii pontici unciam ſemis,
Centaurii minoris,
Pulegii,
Origani ana drachmas duas,
Florum Chamomillæ Romanæ,
Chamomillæ vulgaris ana libram unam ſemis,
Seminis Anethi uncias duas,
Aniſi,
Fœniculi ana unciam unam,
Carvi unciam ſemis,
Corticum aurantiorum exteriorum uncias duas.
Inciſa & contuſa infundantur per quatriduum in aquæ fontanæ libris duodecim, poſtea ad reſiduum unius tertiæ deſtillentur.

Experti uſus eſt in affectibus colicis, hyſtericis, doloribus poſt partum, & in menſibus dolorificis; cum non adeo calida ſit, ubique tutius adhibetur.

Doſis ab uncia dimidia ad integram & ultra.

AQUA CARMINATIVA SPIRITUOSA.

REC. Calami aromatici,

Herbæ

Herbæ Menthæ crispæ,
Serpilli florescentis ana uncias duas,
Florum Chamomillæ Romanæ libram semis,
Seminis Anisi,
Fœniculi ana uncias duas semis,
Cinnamomi acuti uncias tres,
Nucum moschatarum,
Baccarum Lauri,
Juniperi ana unciam semis,
Corticum Aurantiorum recentium uncias duas.

Incisa infundantur spiritus vini rectificati libris novem, aquæ fontanæ libris quinque, digerantur per triduum, postea destillentur ex vesica libræ decem.

Prodest contra flatus, & loco alterius spiritus, post pastum, ad unciam unam dari potest.

AQUA CARMINATIVA PER INFUSIONEM.

REC. Seminum Coriandri,
Fœniculi,
Dauci,
Anisi,
Carvi,
Anethi, ana unciam semis,

Parum contusis affunde
Spiritus vini optimi, libras quatuor.

Stent per aliquot dies in digestione, postea addantur
Sacchari clarificati unciæ duodecim,

& liquor per chartam emporeticam filtratus usui servetur.

Flatus discutit & pellit; dosis uncia dimidia ad unam usque. In codice medicamentario Parisiensi sub nomine: Claretum e sex seminibus *venit; aliis ob eximias virtutes,* aqua immortalis & Rossolis des six graines *vocatur.*

AQUA CARYOPHYLLORUM AROMATICORUM.

REC. Caryophyllorum aromaticorum uncias tres, in pulverem tritis adde
Aquæ fontanæ libras quatuor.

Macerentur per triduum, postea destillentur leni igne, & aquæ oleosæ lacteæ libræ tres eliciantur.

Inter aquas cordiales & stomachicas referri meretur, & ob gratum saporem mixturis cordialibus addi potest.

AQUA CEPHALICA CAROLI QUINTI.

REC. Summitatum Majoranæ,
Melissæ,
Origani,
Florum Anthos,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Rosarum rubrarum,
Salviæ ana uncias duas,
Caryophyllorum,
Nucum moschatarum ana uncias duas,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Granorum Paradisi,
Macis ana unciam semis.

Incisa & contusa grosso modo infunde in spiritus vini optimi libris octo, stent per dies sex in loco calido, & postea, addita aquæ fontanæ libra una semis, destillentur.

Si libuerit,
Ambræ griseæ &
Moschi grana aliquot
aliquotæ illius destillatæ parti, aut rostro etiam alembici imponi poterunt, pro iis, qui odorem ferre possunt, & tunc completa vocari.

Quæ de Aqua apoplectica diximus, etiam hic repetenda esse censemus: hanc nempe pariter in affectibus, a causa frigida ortis, feliciter adhiberi; si vero in morbis sanguineis in usum vocetur,

majus damnum ab usu interno expectandum esse.

AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA.

REC. Cinnamomi acuti contusi uncias sex,
Aquæ Buglossi libras novem.
Macerentur per biduum, postea destillentur lento igne, & aquæ libræ sex eliciantur.

AQUA CINNAMOMI CORDIALIS.

REC. Aquæ Borraginis,
Buglossæ,
Rosarum,
Violarum ana libram unam & semis,
Cinnamomi electi uncias quatuor.
Post triduanam infusionem fiat destillatio, ita, ut tertia pars sit residua.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

REC. Succi Cydoniorum recenter expressi, libras sex,
Cinnamomi electi uncias quatuor.
Fiat infusio per triduum, postea destillentur, ut residuum tertiam partem æquet.

AQUA CINNAMOMI SINE VINO.

REC. Cinnamomi acuti libram unam,
Aquæ cerasorum nigrorum libras duodecim.
Misceantur, digerantur per triduum, destillentur ex vesica, donec tertia pars solum restet.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

REC. Cinnamomi acuti uncias sedecim,
Vini albi spirituosi libras duodecim,
Spiritus vini rectificati libras duas & semis.
Infusa per biduum destillentur per vesicam, lentissimo igne, & liquoris spirituosi lactescentis libræ octo proliciantur.

AQUA CINNAMOMI VINOSA.

REC. Cinnamomi electi uncias novem.
Minutim concisis superfundantur Vini albi generosi libræ duodecim, macerentur in vase clauso, postea destillentur ad dimidias.
Cum Cinnamomi virtus analeptica sit & nervina, sapor vero & odor omnibus gratus esse soleat, cunctis aquis cordialibus, analepticis & apoplecticis hæ admiscentur, & certe vix ullum est, in totius materiæ medicæ farragine, suavius ac efficacius aroma. Hinc in omnibus morbis adhiberi potest, habita ratione, quo cum liquore aqua fuerit destillata. Phlegmaticis & senibus spirituosa, aliis sine vino destillata propinetur. Admiscentur vero potionibus analepticis, vel solæ etiam ad cochlearia duo vel tria offerri possunt.

AQUA CONFORTATIVA sive PERLATA.

REC. Aquæ Cerasorum nigrorum libram unam & semis,
Tiliæ uncias sex,
Cinnamomi vinosæ unciam unam semis,
Margaritarum occidentalium præparatarum scrupulos duos,
Coraliorum alborum præparatorum drachmam unam,
Cornu cervi usti præparati scrupulos quatuor,
Julepi rosati uncias tres.
Est Aqua, quam confortativam vocant, ordinaria, & infantibus ac aliis, qui medicamenta reformidant, offerri solet. Dosis est ab uncia dimidia ad integram. Hic autem pharmacopœi monendi sunt, ne nimiam ejus quantitatem saccharo temperatam, sed potius, ne acescat, non saccharatam reponant, &, si

si necesse sit, Julepum rosarum, ad edulcorandum, addant.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

REC. Cinnamomi acuti uncias duas & semis,
Corticum citri recentium e pomis octo,
Sandali citrini unciam unam,
incisa & contusa infundantur in
Aquæ Buglossæ,
Acetosæ ana libra una,
Cerasorum nigrorum,
Rosarum fragrantissimæ,
Rubi idæi ana libra una & semis,
Misceantur, destillentur ad tertiæ partis remanentiam e vesica.

In morbis acutis ac malignis febribus, ubi calida, & nimium aromatica, merito fugiuntur, optimi effectus est, & admiscetur potionibus & mixturis.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

REC. Cinnamomi acutissimi uncias tres, drachmas duas,
Corticum citri exteriorum recentium unciam unam,
Sandali citrini unciam semis,
Galangæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucum moschatarum ana drachmam unam semis,
Cardamomi minoris drachmas tres,
Florum Lavendulæ drachmas sex,
Borraginis unciam unam,
Rosarum uncias duas semis.
Incisis & tritis adde
Vini albi generosi,
Succi Pomorum redolentium,
Fructuum Rubi idæi ana libram unam,
Aquæ Borraginis,
Buglossi ana libram unam semis,
Rosarum libras duas semis,
Rubi idæi,
Cerasorum nigrorum,
Melissæ ana libram semis.
In vase vitreo bene clauso, per dies quatuor, digerantur, deinde in balneo destillentur ad dimidias, id est libras sex.

In morbis malignis & inde prostratis viribus, potionibus additur; prodest etiam a morbo convalescentibus, ad vires restaurandas.

Dosis ab uncia dimidia ad integram.

AQUA CORNU CERVI CITRATA.

REC. Rasuræ cornu cervi uncias sex,
Pomorum citri, cum corticibus incisorum, numero quatuor.
Infunde per nycthemeron
Aquæ Rosarum,
Scabiosæ,
Acetosæ,
Cardui benedicti,
Melissæ,
Scordii ana libra una.
Postea destilla ad quartæ partis remanentiam.

Analeptica & alexipharmaca deprædicatur; hinc in febribus malignis utilis. Adposuimus formulam, quia jam a longo tempore a pluribus in usum vocatur.

Dosis uncia una ad duas.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM CUM VINO.

REC. Corticum aurantiorum recentium libram unam;
Concisi in vini albi libris octo infundantur, & destillentur ad dimidias.

Carminativa & stomachica est.

Dosis uncia una, vel una semis.

AQUA E CORDE CERVI.

REC. Cor cervi recens scindatur in partes minores, addantur

Foliorum Meliſſæ,
Borraginis recentium ana unciæ duæ,
Florum Roſarum,
Tunicæ ana uncia una,
Corticis ligni Saſſafras,
Cinnamomi,
Sandali citrini ana drachmæ ſex,
Caryophyllorum,
Nucis moſchatæ ana drachmæ duæ.

Inciſis & contuſis affundantur
Vini albi libræ quatuor,
Aquæ Meliſſæ,
Borraginis ana libra una ſemis.

Deſtillentur ſtatim ex veſica, leni igne, ut reſiduum libras tres æquet.

In confeſſo quidem eſt, aquas deſtillatas ab animalium partibus tantum haud accipere, quod vulgo creditur, ideoque hanc aquam vix quidquam virtutis e corde cervi nanciſci; cum vero abs plebe frequenter e pharmacopoliis petatur, in Diſpenſatorio hoc noſtro locum illi concedere voluimus.

Habet autem eandem, a reliquis ingredientibus, vim, quam aqua cordialis temperata, & ab uncia ſemis ad unciam unam ſola hauriri, vel potionibus admiſceri poteſt.

AQUA DIURETICA E NUCLEIS.

REC. Amygdalarum amararum,
Nucleorum Perſicorum,
Ceraſorum ana uncias duas,
Florum Sambuci uncias ſex,
Vini generoſi libras octo.

Contuſa digerantur per biduum in loco calido, dein deſtillentur ad dimidias.

Commendatur nephriticis & calculoſis, in quibus neque inflammationis, nec mictus cruenti metus eſt, poſt copioſam infuſi Theæ vel calidæ potionem, ad unciam dimidiam aut integram ſumenda. Tormina ſedat & urinam pellit.

AQUA SIVE BALSAMUM EMBRYONUM.

REC. Nucum moſchatarum uncias tres ſemis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Cubebarum,
Granorum Paradiſi,
Zedoariæ ana uncias duas,
Macis unciam ſemis,
Galangæ drachmas tres,
Croci orientalis drachmas duas,
Florum Tunicæ,
Tiliæ ana libram unam,
Lavendulæ,
Herbæ Salviæ,
Seminum Carvi,
Fœniculi ana uncias tres,
Menthæ criſpæ,
Radicum Pœoniæ,
Seminum ejuſdem,
Viſci querni ana uncias duas,
Medullæ panis tritici a furno calentis libras duas,

Inciſa & contuſa infundantur in
Vini malvatici libris decem,
Aquæ Borraginis,
Bugloſſæ ana libris quatuor,
Florum Liliorum convallium libris duabus & unciis octo,
Fragorum,
Roſarum, ana unciis ſedecim,

Digerantur per triduum, poſtea deſtillentur lento igne ex veſica ad dimidias.

Deſcriptio, quam modo dedimus, eſt Pharmacopœæ Auguſtanæ, in qua, cum a longo tempore apud nos in uſu fuerit, nihil immutare voluimus.

Conſtat ex aromatibus & calidis ſanguinem commoventibus, unde caute mulierculis ad abortum diſpoſitis, ſiquidem

dem plethoricæ ſint, commendanda eſt, ne hæmorrhagias excitet. Prodeſt vero flatulentis & debilibus, poteſtque loco aquæ carminativæ adhiberi; externe non ſine fructu, cum cruſta panis calida, abdomini imponitur.

Ab uncia ſemis ad integram hauriri poteſt.

AQUA vel BALSAMUM EMBRYONUM correctior, *ſive* ELIRIX VITÆ MULIERUM.

REC. Galangæ,
Zedoariæ ana unciam ſemis,
Herbæ Menthæ,
Meliſſæ ana unciam unam,
Florum Stœchadis Arabicæ,
Tunicæ,
Tiliæ ana drachmas quinque,
Seminis Sileris montani,
Fœniculi Cretici ana unciam ſemis,
Nucum moſchatarum unciam unam,
Cinnamomi drachmas ſex,
Corticum Aurantiorum recentium,
Citri recentium ana unciam unam ſemis.

Inciſa & contuſa infundantur Vini albi libris decem. Poſt digeſtionem viginti quatuor horarum, deſtillentur ad dimidias.

Cum præcedenti convenit, tamen non adeo aromatica, calida & pretioſa, atque ad internum uſum magis commendabilis eſt.

Doſis cochlearia duo vel tria.

AQUA EPIDEMICA LONDINENSIS.

REC. Radicum Angelicæ,
Tormentillæ,
Gentianæ,
Zedoariæ,
Liquiritiæ,
Herbarum Chelidonii majoris,
Roriſmarini,
Rutæ,
Salviæ,
Artemiſiæ,
Abſinthii,
Anagallidis,
Dracontiæ,
Scabioſæ,
Agrimoniæ,
Meliſſæ,
Scordii,
Centaurii minoris,
Cardui Benedicti,
Betonicæ,
Roris ſolis ana unciam unam.

Macerata in vini albi libris duodecim, deſtillentur ad dimidias.

Medicis Anglis magni uſus eſt hæc aqua in febribus epidemice graſſantibus, malignis, & cum paucæ apud illos aquæ deſtillatæ ſimplices proſtent, aquam hanc, cujus vires theriacales, vel, ſi mavis, bezoardicæ ſunt, ſalubri inſtituto, in uſum vocaſſe videntur.

Doſis ab uncia una ad uncias duas.

AQUA EPILEPTICA LANGII.

REC. Florum Liliorum convallium recentium uncias ſex,
Lavendulæ unciam unam,
Roriſmarini,
Stœchadis Arabicæ,
Tiliæ ana unciam ſemis,
Cinnamomi drachmas ſex,
Nucum moſchatarum unciam ſemis,
Piperis longi,
Cubebarum ana drachmas duas,
Viſci querni,
Radicum Pæoniæ,
Fraxinellæ, ſive Dictamni noſtratis ana unciam ſemis.

Macerata in Vini generoſi libris octo per triduum, deſtillentur ad dimidias.

Ad epilepſiam, vertiginem, apoplexiam, tum præſervandi, tum curandi fine, in ipſo paroxyſmo, vulgo commendari ſolet;

ſolet; cum vero aqua ſit aromatibus dives, facilis erit conjectura, quid in his morbis valere poſſit.

Aſſumi poteſt ea quantitate, qua aliæ aquæ ſpirituoſæ.

AQUA FLORUM OMNIUM.

REC. Stercoris vaccini recentis, menſe Junio collecti, quantum placet,

Includatur ſacco lineo; & cum triplo aquæ fontanæ, ex veſica, leni igne deſtilletur, atque ex qualibet libra ſtercoris, libra una ſemis aquæ, proliciatur.

Laudatur ad arthritidem, colicam, calculum, & urinæ ſuppreſſionem; externe inter coſmetica numeratur.

AQUA FORTIS.

REC. Vitrioli vulgaris ad rubedinem calcinati,
Nitri puriſſimi ana libras duas.

Trita miſceantur & deſtillentur per retortam terream, igne aperto gradatim adhibito, in vas recipiens valde capax, juncturis luto probe obturatis, cui aquæ fontanæ libra una ante ſit infuſa.

Rarus ejus uſus in medendo, ſed plurimum a chymicis & artificibus aliis expetitur.

AQUA AD GONORRHOEAM HOFFMANNI.

REC. Radicum Iridis Florentinæ uncias duas,
Herbæ Menthæ ſiccæ uncias tres,
Dictamni Cretici unciam unam,
Seminis Agni caſti,
Rutæ ana uncias duas ſemis,
Terebinthinæ Venetæ uncias decem,
Vini albi generoſi libras decem.

Fiat deſtillatio ex Mariæ Balneo ad dimidias.

Non ſolum in gonorrhœa, ſed & fluore albo fœminarum, præmiſſa purgatione, inſignis eſt utilitatis.

Dentur, ſuadente auctore, ægrotis mane horis duabus vel tribus ante paſtum, & veſperi quatuor horis a cœna duo cochlearia.

AQUA GRISEA.

REC. Mercurii vivi,
Aquæ fortis ana unciam unam,
reponantur in locum calidum, ut ſolvatur Mercurius; ſolutioni adde decoctum ſequens:

REC. Radicis Chelidonii majoris,
Ariſtolochiæ longæ,
Herbæ Rutæ hortenſis,
Scordii,
Florum Roſarum ana unciam unam.

Coque in aquæ fontanæ libris quinque, ut poſt colaturam remaneant libræ quatuor,

Miſceantur calide, & ſtatim abibunt in mixturam griſei coloris.

Commendatur ad ulcera phagedænica, & ſpecifice ad Synoviam.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

REC. Pullorum Hirundinum vivorum, in partes diſſectorum numero quadraginta,
Foliorum Rutæ hortenſis recentium uncias duas,
Caſtorei orientalis veri unciam unam,
Vini albi libras octo.

Miſceantur, & ſtatim ex veſica deſtillentur ad dimidias.

Vires ſunt antepilepticæ & hyſtericæ.

Doſis ab uncia ſemis ad unciam unam per ſe vel cum aliis.

AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

REC. Pullorum Hirundinum diſſectorum numero triginta,
Viſci querni,

Ra-

Radicis Pœoniæ ana unciam unam ſemis,
Seminis ejusdem unciam unam,
Florum Liliorum convallium uncias quatuor,
Sambuci unciam unam ſemis,
Aquæ fontanæ libras decem.

Miſceantur, deſtillentur ad dimidias.

Convenit cum præcedente, & infantibus etiam, qui caſtoreum plerumque nauſeant, & ſpirituoſa non ferunt, cum potionibus & mixturis, a drachmis duabus ad ſex, præſcribi poteſt.

AQUA HUNGARICA, ſive REGINÆ HUNGARIÆ.

REC. Herbæ & florum Rorismarini, una collectorum, libras quatuor,
Herbæ & florum Salviæ libram ſemis.
Zinziberis uncias duas.

Parum inciſa infundantur Spiritus Vini rectificati libris duodecim, aquæ fontanæ libris duabus, & deſtillatione ex veſica, leni igne, libræ undecim eliciantur.

Ujus omnibus notus eſt externus, quippe in decubitu humorum, contuſionibus &c. adhibetur, vel ſola, vel aliis ſpirituoſis admixta.

AQUA HYSTERICA.

REC. Radicum Pœoniæ,
Zedoariæ,
Leviſtici,
Imperatoriæ ana unciam unam,
Herbarum Meliſſæ,
Matricariæ,
Menthæ,
Florum Chamomillæ Romanæ ana unciam unam ſemis,
Seminis Carvi,
Sileris montani,
Fœniculi,
Corticis Citri exterioris ana unciam unam.

Inciſa & contuſa infundantur
Spiritus vini rectificati libra dimidia,
Aquæ fontanæ libris ſeptem.

Digeſta per biduum deſtillentur lento igne, ex veſica, donec libræ quatuor liquoris habeantur.

Carminativa eſt & anodyna. Prodeſt fœminis hyſtericis, & in defectu menſium, doloribus poſt partum, colicis & ſimilibus affectibus, non ſine ſucceſſu adhibetur.

Doſis ab uncia una ad unam ſemis.

AQUA LIGNI SASSAFRAS COMPOSITA.

REC. Lign. Saſſafras odorati libram ſemis,
Cinnamomi acuti uncias tres,
Vini generoſi libras decem.

Stent in digeſtione per aliquot dies, poſtea deſtillentur ad dimidias.

Carminativa & ſtomachica eſt, atque ſenibus & phlegmaticis in affectibus catarrhalibus conducit.

Doſis drachmæ duæ vel tres.

AQUA LILIORUM CONVALLIUM CUM VINO.

REC. Liliorum convallium recentium, absque ſtipitibus, libram unam.
Vini albi libras octo.

Poſt digeſtionem per triduum deſtillentur leni igne, ex veſica, ad dimidias.

Commendatur apoplecticis & paralyticis, nervina, cordialis & ſtomachica eſt.

Doſis uncia una.

AQUA LOCH SANI ET EXPERTI.

REC. Radicum Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ,
Herbarum Hyſſopi,
Capillorum Veneris,
Calaminthæ montanæ, ana uncias duas,

Seminum Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Cinnamomi electi uncias duas.

Incisa & contusa macerentur in aquæ fontanæ libris decem, & post digestionem per triduum, destillentur ex vesica, usque dum libræ quatuor restent.

Est saporis & odoris grati, nec etiam effectu pectorali destituta. Cum illa paratur Loch sic dictum sanum & expertum.

In dosis copia non facile exceditur, & ab uncia una semis ad duas exhiberi potest.

AQUA MAGNANIMITATIS.

REC. Formicarum, Majo vel Junio collectarum, libras duas,
Spiritus Vini rectificati libras tres.

Macerentur per quinque vel sex dies, & postea in Balneo Mariæ abstrahatur spiritus ad siccitatem, in quo denuo infundantur
Cinnamomi electi uncia una,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cardamomi minoris ana drachmæ sex,
Cubebarum uncia semis,
Zedoariæ drachmæ decem.

Post digestionem per triduum abstrahantur in Balneo Mariæ.

Commendatur ad vitia nervorum frigida, venerem languidam, & id genus alia; articulos a paralysi debilitatos externe adhibita mire corroborat.

Dosis drachmæ duæ ad unciam semis.

AQUA MASTICHINA.

REC. Masticbes uncias quatuor,
Nucum moschatarum unciam unam.

Contusis, & per triduum in spiritus vini rectificati libra una maceratis, addantur aquæ fontanæ libræ quatuor, destillentur ex vesica, leni igne, donec residuum sit librarum duarum, liquor lacteus prodiens servetur.

Aqua hæc vires habet stomachum confortantes, hinc in singultu, ciborum fastidio, flatulentia, diarrhoea & vomitu commendatur.

Dosis ab uncia dimidia ad integram.

AQUA ANTI-MELANCHOLICA.

REC. Radicum Buglossi recentium uncias quatuor,
Florum Borraginis,
Buglossi,
Anthos ana unciam unam,
Croci Austriaci drachmas duas,
Flavedinis corticum Citri uncias duas,
Fructuum sive pomorum Cydoniorum recentium, odoratorum uncias sex,

Incisa infundantur in vini albi libris octo, maceratione per viginti quatuor horas peracta, destillentur ad dimidias.

Commendatur melancholicis, atque mentis torporem, mœstitiam & timorem auferre creditur.

Dosis uncia una vel duæ.

AQUA MELISSÆ ANTHYSTERICA.

REC. Foliorum Melissæ recentium libram unam,
Baccarum Lauri,
Seminis Cumini ana unciam unam,
Myrrhæ electæ unciam semis,
Castorei drachmas duas,
Vini albi spirituosi libras duodecim,

Post sufficientem digestionem destillentur ad dimidias.

Vires ex titulo patent, nimirum anthystericæ, carminativæ.

Dosis uncia semis ad integram.

AQUA MELISSÆ CUM VINO.

REC. Herbæ Melissæ recentis libras duas,
Vini albi libras octo.

Destillentur ad dimidias.

Cen-

Censetur stomachica, cordialis & hysterica.

Dosis uncia una vel una semis.

AQUA MELISSÆ SPIRITUOSA COMPOSITA, *EAU DES CARMES*, DICTA.

REC. Herbæ Melissæ recentis libram unam semis,
Flavedinis corticum citri recentium uncias quatuor,
Nucum moschatarum,
Seminis Coriandri ana uncias duas,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum ana unciam unam.

Incisis affundantur
Spiritus vini rectificati libræ sex,
Aquæ Melissæ libræ duæ.

Post digestionem per biduum, destillentur ad quintæ partis remanentiam; spiritus eductus servetur.

Inter aquas spirituosas eminet; commendatur adversus apoplexiam, paralysin, & quoscunque morbos nervorum, a causa frigida ortos. Stomachicum & carminativum est egregium; externe adhibetur ad spasticos & rhevmaticos dolores, cephalalgiam, vomitum, colicam &c.

Dosis a drachma una ad drachmas tres.

Pro usu externo tinctura Croci tingi solet.

AQUA MERCURIALIS AD USUS EXTERNOS.

REC. Cerussæ Venetæ unciam unam,
Aluminis crudi drachmas sex,
Lithargyrii unciam semis,
Mercurii sublimati corrosivi,
Salis ammoniaci ana drachmam unam,
Aquæ Solani,
Plantaginis,
Rosarum,
Nymphææ ana uncias quatuor,
Aceti Vini libram semis.

Trita & commixta modicum bulliant, postea non colata serventur.

Prodest cuti deformatæ, ad verrucas, scabiem malignam, serpiginem, ficus, fissuras, ulcera venerea, vel, ubi mundificante opus est, penicillo illita.

AQUA MYRRHÆ.

REC. Myrrhæ rubræ uncias octo,
In pulverem comminutis, infunde
Aquæ fontanæ libras sex,
& post digestionem per triduum, in loco calido factam, destilla lento igne, atque aquæ oleosæ, suavissimi odoris, libras quatuor elice.

Commendatur in affectibus, a vitio mensium ortis, & morbis pectoris atque ventriculi.

Dosis uncia una.

E residuo in vesica extractum Myrrhæ parari potest, si per pannum laneum colatur, & leni igne ad mellis consistentiam evaporatur.

AQUA ODORIFERA.

REC. Herbæ Rorismarini,
Majoranæ ana unciam unam,
Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Rosarum ana uncias duas,
Ligni Rhodii,
Corticis citri recentis ana unciam unam semis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum unciam unam semis.

Mixtis & contusis affundantur
Spiritus vini rectificati libræ octo,
Aquæ fontanæ libræ quatuor,
& post digestionem per triduum, leni igne tres quartæ inde destillentur.

Ob odoris fragrantiam in animi deliquiis non solum naribus, sed & pectori & pulsibus applicari solet.

AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

REC. Aquæ calcis vivæ libram unam,
Salis armoniaci drachmam unam.

Miſceantur, ſtent per viginti quatuor horas in vaſe cupreo, a quo aqua, colorem ſapphireum nacta filtretur & ſervetur.

Præfertur aliis collyriis, atque ad pleroſque oculorum affectus commendatur. Vim habet refrigerantem, deſiccantem & mundificativam. Inſtillatur vel oculis, vel mediantibus linteis applicatur.

AQUA PANIS.

REC. Cruſtæ panis recenter e clibano extracti, & adhuc calentis, libras duas,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum,
Nucum moſchatarum ana unciam dimidiam,
Vini albi ſpirituoſi libras octo.

Deſtillentur leni igne ad dimidias.

Inter aquas ſtomachicas & analepticas eminet, & guſtui grata eſt.

Doſis uncia dimidia ad integram.

AQUA PHAGEDÆNICA.

REC. Aquæ calcis vivæ libram unam,
In hac diſſolve
Mercurii ſublimati corroſivi drachmam unam,
Solutioni adde
Spiritus Vini non rectificati uncias quatuor,
Serva.

Ad exulcerationes externas, & fœda inprimis ulcera venerea, feliciter adhibetur.

AQUA PHYSAGOGA.

REC. Seminis Aniſi libram unam,
Sileris montani unciam unam ſemis,
Cinnamomi acuti uncias duas,
Nucum moſchatarum,
Galangæ,
Macis,
Caryophyllorum aromaticorum ana unciam ſemis,

Contuſa macerentur per triduum in
Vini albi generoſi libris ſedecim,
Spiritus vini rectificati libris duabus,
& deſtillentur leni igne ad dimidias.

Ventriculum & inteſtina roborat, & nomen ſuum tuetur.

Doſis ab uncia dimidia ad integram.

AQUA PROPHYLACTICA, ſive ACETUM BEZOARDICUM SYLVII.

REC. Radicum Angelicæ,
Zedoariæ ana unciam unam,
Petaſitidis uncias duas,
Foliorum Rutæ hortenſis uncias quatuor,
Meliſſæ,
Scabioſæ,
Florum Calendulæ ana uncias duas,
Nucum juglandium immaturarum, conſciſſarum libras duas,
Pomorum Citreorum recentium, conſciſſorum libram unam.

Contuſis omnibus affunde aceti vini optimi libras duodecim. Digerantur per noctem, mane deſtillentur igne lento, ad ſiccitatem fere, cavendo empyrevma.

Summis laudibus celeberrimus Author effert ad curationem febrium, continuarum inprimis, & admiſceri jubet potui ordinario, mixturis, potionibus, juſculis &c. exhibet eam ad ſudores modeſte proliciendos, bilis acrimoniam obtundendam, ſitim compeſcendam, vomitum cohibendum, oris amarorem emendandum, præſertim in peſte & cunctis affectibus epidemicis

demicis eximiam esse vult; externus ejus usus est, ut pulsibus & naribus admoveatur.

Exhiberi solet ab uncia semis, ad unciam unam semis.

AQUA REGIS.

REC. Aquæ fortis uncias sex,
Salis ammoniaci albi unciam unam.
Mixta serventur.

Usus chymicus potissimum est ad solvendum aurum; medicus non, nisi rarissime, si unquam.

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

REC. Foliorum Salviæ recentium uncias octo,
Rorismarini,
Serpilli,
Thymi ana unciam unam,
Cardamomi utriusque drachmas sex,
Macis,
Nucum moschatarum,
Caryophyllorum,
Zedoariæ,
Galangæ,
Calami aromatici, ana unciam dimidiam,
Vini spirituosi libras octo,
Spiritus vini rectificati libras quatuor,
Post sufficientem digestionem, destillentur lento igne ad quartæ partis remanentiam.

Vires cum Aquæ apoplecticæ spirituosæ viribus conveniunt.

Dosis uncia semis ad drachmas sex.

AQUA SAPPHIREA.

Videatur AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

AQUA SPERMATIS RANARUM.

Destillatur, sine alius aquæ additione, ex recens collecto spermate, sacculo lineo, ne alembicum transcendat, incluso, ad tertiæ partis remanentiam.

Usus est cosmeticus, & ad faciei ruborem, atque in collyriis adhibetur.

AQUA SPLENETICA.

REC. Aquæ Melissæ,
Menthæ,
Epilepticæ Langii ana uncias tres.
Mixturæ simplicis Ludovici drachmas tres,
Essentiæ Castorei drachmam unam,
Elæosacchari Succini drachmas duas.
Misceantur.

Usus in affectibus splenetico-hystericis ad unciam semis, vel drachmas sex.

AQUA STOMACHICA.

REC. Summitatum Menthæ crispæ recentis uncias tres,
Galangæ,
Nucum moschatarum,
Cinnamomi ana unciam unam,
Vini spirituosi libras octo.
Destillentur ad dimidias.

Vires ex ipsa denominatione patent.

Dosis uncia semis ad integram.

AQUA THERIACALIS COMPOSITA.

REC. Radicum Angelicæ,
Valerianæ,
Cardopatii,
Ostrutii,
Zedoariæ ana unciam unam,
Herbarum Scordii,
Rutæ ana unciam unam semis,
Corticum Citri recentium uncias duas,
Baccarum Juniperi unciam unam,
Theriacæ Andromachi libram semis.
Aquæ fontanæ libras decem.
Misceantur, & proliciantur per destillationem aquæ libræ sex.

 Est

Est alexipharmaca, stomachica, atque carminativa, & in febribus malignis, affectibus ventriculi, vomitu, torminibus, dysenteria, additur mixturis & potionibus.

Dosis ab uncia dimidia ad integram.

AQUA THERIACALIS SIMPLEX.

REC. Theriacæ Andromachi uncias quatuor,
Vini albi libras quinque.
Abstrahantur libræ duæ semis.

Alexipharmaca censetur, & a theriacæ ingredientibus vim habet stomachum confortandi & carminativam.

AQUA TYPHORUM CERVI COMPOSITA.

REC. Typhorum Cervi succulentorum libras duas semis,
Radicum Pæoniæ unciam unam,
Herbæ Melissæ,
Florum Borraginis,
Buglossi,
Rorismarini,
Tunicæ ana unciam unam semis,
Rosarum unciam semis.
Incisis affundantur
Vini albi spirituosi libræ duodecim.
Destillentur leni igne ad dimidias.

Vires habentur alexipharmacæ, cordiales & antimelancholicæ.

Dosis uncia una, vel duæ.

AQUA TYPHORUM CERVI SIMPLEX.

REC. Cornua cervi recentia succulenta conscindantur in frustula, & ad libram unam addantur libræ tres Vini generosi, destillentur ex Mariæ Balneo ad dimidias.

Ad partum difficilem, & in febribus malignis magnarum prædicatur esse virium.

Dosis ad unciam unam, vel unciam unam semis.

Destillatur etiam per se, absque vini additione ex M. B. grata satis, sed & cara.

AQUA VERONICÆ CUM VINO.

REC. Herbæ Veronicæ florescentis libras tres,
Vini albi libras octo.
Destillentur lento igne ad dimidias.

Balsamica, vulneraria & tonica est. Commendatur tam in tussi pulmonali, quam hypochondriaca, inprimis senibus asthmaticis & ad marasmum dispositis convenit.

Dosis bis vel ter in die ab uncia una ad unciam unam semis.

AQUA VISCERALIS MAUCHARTI.

REC. Rad. recent. Symphyti majoris,
Liquiritiæ,
Farfaræ ana uncias quinque,
Herb. recent. Bugulæ,
Chærefolii,
Hederæ terrestris,
Hyperici florentis,
Plantaginis minoris,
Scabiosæ,
Veronicæ, ana manipulos quatuor,
Seminis Anisi stellati drachmas sex,
Macis drachmam unam,
Mastiches electæ drachmas tres,
Cancrorum fluviatilium vivorum Nro triginta,
Pulmonem vituli recens mactati,
Incisis superfundantur
Aquæ Buglossi,
Chærefolii,
Hederæ terrestris,
Veronicæ, ana libra una semis,
Destillentur per Balneum Mariæ, atque libræ quatuor liquoris eliciantur.

Vul-

Vulneraria est, demulcet, & præsertim phthisicis, atrophicis & hecticis convenit.

Dosis uncia una, aut altera.

AQUA VITÆ MULIERUM.

Videatur AQUA EMBRYONUM correctior.

AQUA VULNERARIA, Gallis *Eau d'arquebusade* dicta.

REC. Herb. recent. Agrimoniæ,
Alchimillæ ana manipulos duos,
Aristolochiæ,
Artemisiæ ana manipulos quatuor,
Bellidis majoris, minoris,
Betonicæ,
Buglossi ana manipulos duos,
Consolidæ Saracenicæ manipulos quatuor,
Fœniculi,
Hyperici,
Plantaginis utriusque,
Saniculæ ana manipulos duos,
Salviæ hortensis manipulos quatuor,
Scrophulariæ,
Verbenæ ana manipulos duos.

Incisis affundantur vini spirituosi libræ quadraginta, & post digestionem per biduum, in conclavi tepido, destillentur lento igne, ex vesica ad dimidias; aqua spirituosa servetur.

Laudatur aqua hæc ad contusiones, sugillationes, luxationes, ambusta, inflammationes, gangrænam præcavendam, ad vulnera, nec non ad partes roborandas. Sunt, qui etiam interne adhibere solent, ad flatus & tormina discutienda, spirituosa enim est & aromatica.

Descriptio est e Dispensatorio Brandenburgico, atque pro genuina habetur, idcirco in officina aulica regia usualis.

AQUÆ VULNERARIÆ descriptio *Pharmacopœæ Parisiensis.*

REC. Radicis Symphyti majoris,
Foliorum ejusdem,
Bellidis majoris & minoris,
Bugulæ,
Saniculæ,
Betonicæ,
Scrophulariæ,
Plantaginis,
Agrimoniæ,
Hyperici cum summitatibus,
Vincæ per vincæ,
Hederæ terrestris,
Artemisiæ,
Veronicæ,
Verbenæ,
Telephii majoris,
Millefolii ana uncias quatuor,
Salviæ,
Angelicæ,
Tanaceti,
Absinthii,
Chelidoniæ majoris,
Fœniculi,
Aristolochiæ clematitidis,
Menthæ,
Hyssopi,
Nicotianæ ana uncias octo,
Rutæ,
Chamomillæ,
Scordii,
Majoranæ,
Rorismarini ana uncias quatuor,
Summitatum & Florum,
Lavendulæ,
Origani,
Calaminthæ, ana uncias sex.

Macerentur per quatriduum in vini generosi libris quinquaginta, pon-

ponderis civilis, postea destillentur ad dimidias.

Si spirituosa expetitur hæc aqua vulneraria, loco vini, herbis modo præscriptis spiritus vini non rectificati superaffundantur libræ quinquaginta, atque destillentur.

Vires sunt eædem, quæ præcedentis.

AQUA ZEDOARIÆ ANISATA.

REC. Zedoariæ uncias sex,
Seminis Anisi uncias tres,
Corticum citri unciam unam.

Incisa infunde per triduum in vini generosi libris decem.

Postea destillentur ad dimidias.

Easdem cum succedenti habet vires, flatus discutit, & tormina exinde oborta.

Ab uncia dimidia ad unciam integram assumi potest.

AQUA ZEDOARIÆ SIMPLEX.

REC. Zedoariæ uncias octo,
Vini generosi libras octo.

Destillentur ad dimidias.

Est carminativa & alexipharmaca.

Dosis uncia dimidia ad integram.

ARCANUM CORALLINUM.

REC. Mercurii vivi purissimi uncias quatuor.

Solvantur in Spiritus nitri sufficienti quantitate, vel unciis circiter octo; solutio committatur retortæ, & leni igne liquidum evocetur. Tunc augeatur ignis, & retorta undique carbonibus vivis obruatur, ut omnes spiritus expellantur; quo peracto refrigescat. Retorta caute diffracta, invenietur in ejus fundo Mercurius præcipitatus, coccineo colore splendens; sublimatum quod ad collum retortæ hæret, corrosivum, provide separari debet. Præcipitatum rubrum, quod in fundo reperitur, in mortario vitreo optime tere, inter terendum Olei Tartari per deliquium uncias tres vel quatuor affunde, atque diu & multum pistillo agita; tandem, affusa aqua copiosa, omnem salsedinem elue, & pulverem rubrum exsicca. Cicuratur hac trituratione cum Oleo Tartari alcalino, corrosivum acidum; quod ad grana duo, tria, vel quatuor, sine periculo, dari potest.

Usus Arcani corallini, in diaphoresi promovenda, a multis commendatur, stimulum alvum ducentibus pharmacis addit, & ad ciendum salivæ fluxum interdum adhibetur.

ARCANUM DUPLICATUM, sive NITRUM VITRIOLATUM.

REC. Vitrioli Ungarici, vel alius martialis, libras duas,
solvantur in
Aquæ calidæ fontanæ libris octo, vel decem;
Nitri fixi tantundem in aquæ fontanæ libris quinque soluti.

Ambas solutiones filtratas sensim commisce, Nitri fixi solutionem Vitrioli lente infundendo; præcipitabitur terra metallica; cum quodam effervescentiæ indicio; affundatur solutio alcalina ad punctum saturationis usque; filtretur postea permixtus liquor. Terra præcipitata eluatur affusa aqua calida, ut omnis extrahatur salsedo. Evaporentur permixti liquores ad cuticulam, & ad crystallisationem reponantur.

Sal medium hoc, Tartaro vitriolato Tacheniano per omnia simile; medicamentum in malo hypochondriaco, febribus, verbo, in obstructionibus, & detergendis ventriculo atque intestinis a viscidis humoribus, egregios effectus præstat. Alvum ducit, a scrupulo ad scrupulos duos & drachmam integram exhibitum. Commiscetur vero plerumque absorbentibus, & ita etiam administratum, ad incidendos viscidos humores in primis viis, multum valere deprehenditur. Animadvertendum magno-

magnopere est, ut bene sit præparatum, atque metallicæ particulæ penitus sint præcipitatæ, (quod fit sufficiente solutionis Nitri fixi additione,) alias facile nauseam & vomitum excitat.

Nota. Parari plerumque solet sic dictum hoc Arcanum duplicatum ex residuo Aquæ fortis, quod vero, nisi vehementissimo igne calcinetur, vel, addita alcali portione, acidum saturetur, vitriolicum saporem metallicum retinet, & nauseam movet. Cum etiam hoc residuum Aquæ fortis non ubique ad manus sit, & securius atque breviori via, secundum hanc, quam modo dedimus, præscriptionem, parari possit, merito illam antiquæ præferendam esse censemus.

ARCANUM TARTARI, sive TERRA FOLIATA TARTARI.

REC. Salis Tartari albissimi uncias quatuor,
Aceti vini destillati libras sex,

Commisceantur, & evaporetur acetum in vase figulino probe vitreato, ad siccitatem, in fine lenissimum ignis gradum adhibendo. Si non satis forsan alcali ab aceto saturatum fuerit, quod gustu deprehendetur, alia libra aceti vini destillati affundatur, atque eodem modo tractetur. Remanentia salina denuo aqua fontana solvitur, atque solutio per chartam bibulam filtrata, rursus, uti antea dictum, evaporatur, & siccata, in vitro probe clauso, loco calido, ne liquescat, servatur.

Incidit, resolvit, abstergit, urinam & alvum movet.

A scrupulo uno, ad drachmam unam, in vehiculo aquoso, exhiberi potest.

Solvitur penitus a spiritu vini, & tincturam eximiam præbet splenéticam, antihypochondriacam, arthriticam, nephriticam, & quintæ essentiæ vini nomen meretur, quæ a guttis XL. ad LX. commendari solet. Videatur LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI.

AURUM FULMINANS.

REC. Auri purissimi drachmas duas,
Solvantur in
Aquæ Regis unciis duabus,

Solutioni instilletur spiritus salis armoniaci volatilis aquosi, quantum satis, ad plenariam auri præcipitationem; præcipitatum, repetita affusione & ablutione aquæ fontanæ, edulcora, & pulverem luteo-fusci coloris, charta bibula exceptum, & lenissimo calore exsiccatum, in vitro ad usum serva.

Nota. Aurum fulminans, si non ex puro Auro, ut vulgo fieri solet, præparatum fuerit, tormina vehementia excitat. Neque vero nummi, quos *Ducatos* vocant, ex purissimo Auro cusi sunt, sed semper aliquid & circiter vigesima quarta pars cupri vel argenti additur, quod monetarii *legare* dicunt; Cuprum vero ab aqua regis etiam solvitur, & cum auro præcipitatur. Opus igitur est, ut depuretur antea, quod optime per encheiresin illam, quam in arte separatoria periti *quartam* vocant, fit: Auri nimirum pars una, cum tribus argenti, funditur, postea in aqua forti solvitur; ita aurum in fundo remanet. Ut autem constet, omne argentum auro extractum & ab aqua forti solutum esse, superaffundatur alia, repetatur tertio, & leni calore ebulliat; denique effundatur aqua fortis, & regia ejus loco affundatur, qua solvetur aurum, purum jam

jam & aptum, ex quo fulminans paretur.

Refertur aurum fulminans ad purgantia; ſolet vero, ſi multos in primis viis humores acidos inveniat, ſatis vehementer atque copioſe evacuare, ſin minus, mitius eſt. Sunt, qui teneris infantibus præſcribunt, magnas autem nonnunquam anxietates illis excitaſſe compertum eſt, ut caute hoc medicamento in delicatulis utendum præcipiamus. Excrementa colore nigro, ſicut martialia ſolent, tingit; aliquando, loco purgationis per alvum, valida ſatis diaphoreſis evenit.

Doſis granum unum ad quinque.

BACILLI AD FORNACEM.

Videatur MASSA AD FORNACEM.

BACILLI DE LIQUIRITIA ALBI.

REC. Gummi Arabici,
Specierum diaireos ſimplicium,
diatragacanthæ ana unciam ſemis,
Radicis Liquiritiæ,
Amyli ana unciam unam.

Terantur omnia in pollinem ſubtiliſſimum, cui addantur
Sacchari albi pulveriſati libræ duæ,
Mucilaginis Tragacanthæ quantum ſatis;

Pinſantur in mortario, fiat maſſa, ex qua formentur, pro lubitu, bacilli, qui ſub nomine LIQUIRITIÆ ALBÆ COCTÆ reponantur.

BACILLI DE LIQUIRITIA CITRINI.

REC. Liquiritiæ pulveriſatæ unciam unam,
Iridis florentinæ,
Amyli albi ana unciam ſemis,
Croci ſubtiliſſime triti ſcrupulum unum,
Sacchari albi libram unam.

Fiat, ſufficiente quantitate mucilaginis Tragacanthæ, maſſa, ex qua formentur bacilli.

In catarrhis & defluxionibus acribus ad fauces, indeque orta tuſſi ſicca, & raucedine proſunt.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

REC. Olei Nuciſtæ expreſſi uncias tres ſemis,
Jasmini,
Cinnamomi,
Ligni rhodii ana drachmam unam ſemis,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Rutæ,
Succini ana ſcrupulum unum,
Moſchi,
Ambræ ana grana ſedecim,
Zibethi ſcrupulum ſemis,
Balſami Peruviani ſcrupulos duos,
Spodii nigri præparati quantum ſatis pro colore.

Oleo nuciſtæ lento igne liquato, inſtillentur olea deſtillata, Moſchus & Ambra cum ſpiritu roſato trita, Zibethum & balſamum Peruvianum in fine addantur.

Parari etiam absque Moſcho, Ambra & Zibetho debet, pro illis, qui horum odorem perferre nequeunt.

Apoplecticorum naribus, vertici, temporibusque illitum, potiſſimum vero, ob odoris commendationem, expeti ſolet.

BALSAMUM ARCÆI.

REC. Terebinthinæ Venetæ,
Gummi, vel potius reſinæ Elemi,
Sevi cervini ana uncias duas,
Olei Hyperici unciam unam,
Sandali rubri drachmam unam.

Gummi Elemi in Terebinthina leniſſimo igne ſolvitur, quibus ſucceſſive adduntur ſevum & oleum Hyperici, in alio vaſe liquata, tandem

tandem pulvis Sandali ſubtiliſſimus admiſcetur.

Præſtans vulnerarium & digeſtivum eſt, quod in vulneribus feliciter adhibetur.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

REC. Olei deſtillati Caryophyllorum drachmam unam,
Nuciſtæ expreſſi drachmas duas ſemis,
Mixtis colorem concilia pulvere tenuiſſimo caryophyllorum, vel Boleti cervini.

Balſama ſimplicia ex olei virtute, e quo parata ſunt, æſtimantur.

BALSAMUM CEPHALICUM SAXONICUM.

REC. Olei deſtillati Lavendulæ,
Succini albi ana ſcrupulum unum,
Pulegii,
Majoranæ,
Salviæ,
Anthos,
Saturejæ ana grana quindecim,
Macis,
Rutæ ana ſcrupulum ſemis,
Menthæ,
Origani ana grana duodecim,
Nucis moſchatæ expreſſi unciam unam.
Miſceantur & fiat Balſamum.

Cephalicum eſt, nervinum, ſtomachicum, roborans, &c.

BALSAMUM CINNAMOMI.

REC. Olei deſtillati Cinnamomi drachmam unam,
Nuciſtæ expreſſi, ope ſpiritus Vini, odore ſuo privati, drachmas duas ſemis,
Fiat Balſamum, Bolo Armena tingendum.

Præſtantiſſimum eſt in omnibus affectibus, in quibus balſamo opus eſt, & propter ſuaviſſimum odorem, quem nemo facile faſtidit, omnibus commendari poteſt.

BALSAMUM COMMENDATORIS DE PERNE.

REC. Balſami Indici ſicci unciam unam,
Styracis in granis uncias duas,
Benzoës electæ uncias tres,
Olibani electi unciam ſemis.
Trita ſolvantur in
Spiritus Vini rectificatiſſimi unciis quindecim.
Solutio per chartam filtrata ſervetur.
Seorſim infundantur, in
Spiritus Vini rectificatiſſimi unciis decem,
Radicis Angelicæ,
Herbæ Millefolii,
Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ ana uncia dimidia.
Digeſta & ſufficienter extracta exprimantur; Eſſentia, pariter per chartam filtrata, ſuperiori ſolutioni addatur, & optime per digeſtionem mixta ſerventur.

Multis laudibus evehitur hoc balſamum a Pometo, qui nobis deſcriptionem ſuppeditavit, & tam internus ejus uſus, quam externus, magnopere in variis morbis, & omnis generis vulneribus & ulceribus commendatur; nec etiam laude ſua Eſſentiam hanc balſamicam privandam eſſe cenſemus. Monemus tamen, interne illud cum circumſpectione, & in parva doſi, ne ſanguinem exæſtuet, præſcribere; ſufficiunt guttæ decem, vel quindecim, vitello ovi vel ſacchari pulvere, mixtæ, cum vehiculo aquoſo exhibere.

BALSAMUM EMBRYONUM.

Videatur AQUA EMBRYONUM.

BALSAMUM LAVENDULÆ.

REC. Olei deſtillati Lavendulæ drachmam unam,
Nuciſtæ expreſſi, odore & colore ope ſpiritus

ſpiritus vini viduati,
drachmas duas ſemis.

Mixta tingantur cœruleo montano.

BALSAMUM LOCATELLI.

REC. Olei Olivarum uncias ſex,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Vini Canarienſis uncias quinque.

Leni igne, ad conſumtionem vini coctis, adde
Terebinthinæ Venetæ claræ uncias ſex,
Balſami Peruviani drachmas duas,
Sandali rubri unciam ſemis.

Ad vulnera, contuſiones, variasque læſiones internas pariter, ac externas, commendatur;

Interne propinatur a drachmis duabus, ad unciam ſemis in juſculo.

BALSAMUM MAGICUM PFORTZHEIMENSE.

REC. Radicum Succiſæ,
Valerianæ,
Filicis,
Hirundinariæ,
Leviſtici ana unciam ſemis,
Herbæ Antirrhini,
Sideritidis,
Adianti aurei,
nigri,
albi,
Salviæ ſilveſtris,
Rutæ, cum ſummitatibus,
Menthæ criſpæ ana unciam ſemis,
Florum Hyperici uncias quatuor,
Viſci corylini,
querni ana unciam unam,
Fructus Momordicæ uncias duas,

Radices, herbæ, flores recentes & reliqua incidantur & contundantur, atque in
Olei Olivarum puriſſimi, & vini boni ana libris duabus ſemis

Macerentur, poſtquam per viginti quatuor horas ſteterint, ad humiditatis conſumtionem, leni igne coquantur, & expreſſis addatur
Olei Scorpionum compoſiti,
Terebinthinæ Venetæ,
Axungiæ hominis ana uncia una ſemis,
Ceræ citrinæ libra ſemis.

His refrigeratis porro admiſceatur
Pulveris Mumiæ,
Maſtichis,
Olibani,
Myrrhæ ana uncia una,
Aſæ fœtidæ uncia ſemis.

Probe ſubacta ſerventur in vitro.

Vires hujus balſami prædicantur antimagicæ, contra maleficia & incantationes. Externe adhibitum, nervoſum genus roborat, interne calculum & vermes expellit, ulceraque ſanat.

Doſis interne a drachmis tribus ad ſex.

BALSAMUM MAJORANÆ.

REC. Olei Majoranæ deſtillati drachmam unam,
Nucis moſchatæ expreſſi drachmas duas ſemis.

Miſceantur, & tingatur Balſamum Magiſterio herbarum.

Vires ſunt cephalicæ, nervinæ & errhinæ.

BALSAMUM NUCISTÆ.

REC. Olei Nuciſtæ expreſſi drachmas duas,
deſtillati ſcrupulos duos,

Miſceantur.

Vires habet ſtomachicas, cephalicas, nervinas, atque bono cum effectu in diarrhœa infantum adhibetur.

BALSAMUM ODONTALGICUM.

REC. Olei ligni ſancti drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam,
Opii,
Camphoræ ana ſcrupulos duos,
Olei Nuciſtæ expreſſi drachmas ſex,

Opi-

Opium & Camphora ſpiritus vini pauxillo ſoluta, miſceantur cum reliquis.

Vires in ſiſtendis graviſſimis dentium doloribus compertæ ſunt, ſi vel ſolum, vel goſſypio exceptum, cavitatibus dentium applicetur.

BALSAMUM RUTÆ.

Fit eodem modo, quo Balſamum Lavendulæ, loco Olei Lavendulæ, Oleum Rutæ ſumendo, atque pauxillo florum viridis æris tingendo.

Commendatur hyſtericis atque epilepticis.

BALSAMUM SOMNIFERUM.

REC. Unguenti Populei,
Olei Nuciſtæ expreſſi ana unciam unam,
Opii, in ſpiritu vini diſſoluti drachmam unam,
Olei ligni Rhodii guttas ſedecim.

Miſce, fiat balſamum.

Naribus, temporibus, & pulſibus illitum, in capitis dolore ſopiendo, & impediendis nimiis vigiliis, prodeſt.

BALSAMUM STOMACHICUM.

REC. Olei Abſinthii deſtillati,
Corticum Aurantiorum,
Caryophyllorum,
Macis,
Menthæ ana drachmam ſemis,
Balſami de Peru drachmam unam,
Olei Nuciſtæ expreſſi unciam unam.

Miſce, fiat balſamum.

Ventriculum confortat, vomitus & ſingultum ſiſtit, flatus & ructus pellit ac diſcutit, epigaſtricæ regioni illitum.

BALSAMUM SUCCINI.

REC. Olei Nucis Moſchatæ expreſſi drachmas duas ſemis,
Olei deſtillati Succini drachmam unam.

Miſce, fiat balſamum.

In affectibus hyſtericis, cephalalgia mulierum, & ſpaſmis infantum externe adhiberi ſolet.

BALSAMUM SULPHURIS AMYGDALATUM.

REC. Florum Sulphuris unciam unam,
Olei Amygdalarum dulcium recens expreſſi uncias ſex.

Digerantur in arena calore convenienti, donec oleum colore ſit tinctum rubro.

Convenit ad ulcera tam interna, quam externa, & ſecure dari poteſt a guttis quindecim ad triginta.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

Eodem paratur modo, quo præcedens, ſubſtituto Oleo Aniſi deſtillato, loco Olei Amygdalarum; quod & de ſubſequis, ſuccinato & terebinthinato, eſt capiendum.

Prodeſt in colica flatulenta, & affectibus catarrhalibus, pectus infeſtantibus.

Doſis guttæ quinque, ad duodecim.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDI.

REC. Sulphuris citrini uncias duas,
Olei Terebinthinæ uncias tres,
Lini libras duas.

Sulphuri liquato adde oleum lini, & coque lentiſſimo igne, donec acquiſiverit colorem fuſcum; his aliquantum refrigeratis infunde oleum terebinthinæ, digere leniſſimo calore, & ſerva uſui.

Uſus eſt externus; præcipue vero ad Emplaſtrum ſulphuris Rulandi adhibetur.

BALSAMUM SULPHURIS SUCCINATUM.

Eodem modo, quo Balſamum ſulphuris aniſatum, parari debet.

Sanguinem excalefacit, emmenagogum eſt, diureticum & carminativum; caute vero & minuta doſi commendari debet, guttis ſcilicet quatuor ad ſcrupulum dimidium.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

Modus parandi idem eſt, qui præcedentis.

Diureticum est, & in gonorrhœa felici effectu commendatur; externe ad ulcera & vulnera partium tendinosarum, una nimirum aut altera gutta instillata, si valde doleant & madeant, adhibetur. Præstat autem, hoc balsamum spiritus vini rectificati triplo diluere, & tum ad vulnera adhibere.

BALSAMUM VITÆ AD MODUM HOFFMANNI.

REC. Olei destillati Lavendulæ,
Majoranæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi,
ana scrupulum unum,
Rutæ,
Succini albi
ana scrupulum semis,
Citri, e corticibus recens expressi, scrupulum unum,
Ambræ griseæ scrupulum semis.

Olea cum Ambra & Balsami Peruviani scrupulo uno misceantur, atque in spiritus vini rectificatissimi unciis decem solvantur.

Balsamum vitæ non solum externe ad odorandum, & partes debilitatas confortandas, ad ventriculi affectus, nauseam, ructus, colicam & diarrhœam adhibetur, sed & interno usui ad eosdem morbos, a guttis decem ad viginti feliciter commendatur.

BALSAMUM VULNERARIUM.

REC. Spiritus Vini rectificatissimi uncias sex,
Terebinthinæ Venetæ unciam unam semis.

Mixta solvantur in liquorem aurei coloris.

Ad vulnera recentia, præcipue nervosarum partium, punctim inflicta, non sine insigni fructu adhibetur.

BALSAMUM VULNERARIUM DIPPELII.

Videatur LIQUOR.

BALSAMUM VULNERARIUM MINDERERI.

REC. Terebinthinæ claræ Venetæ unciam unam semis,
Gummi Elemi pulverisati unciam semis.

Solvatur lenissimo igne, postea addantur
Olei Hyperici, ex floribus per infusionem parati, uncia una semis,
Ceræ destillati scrupuli duo.

Misce, fiat balsamum.

In vulneribus noviter inflictis, linteis applicatum, laudatur.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Est pulvis Viperarum Italicarum.

Vim habet alexipharmacam, sudoriferam, in morbis malignis, & a morsibus venenatorum animalium ortis, nec non in lepra, morbo venereo & Arthritide commendatur.

Dosis scrupulus unus, ad drachmam dimidiam.

BEZOARDICUM JOVIALE.

REC. Reguli Antimonii simplicis uncias quatuor,
Stanni Anglici uncias duas.

Fundantur simul in crucibulo, effusa atque refrigerata pulverisentur, postea additis
Mercurii sublimati unciis octo,
atque optime in mortario vitreo mixtis, ad intimiorem solutionem, reponantur per aliquot dies noctesque in cellam, tum retortæ immissa destillentur, butyri Antimonii instar; liquor, qui prodit, affusa magna aquæ fontanæ quantitate diluatur, & præcipitabitur pulvis albus, qui, repetita aquæ tepidæ affusione, edulcoratus & siccatus, cum triplo Nitri detonetur. Postea, affusa multa aqua, omni salsedine privatus servetur.

Commendatur ad hystericos affectus, & ei magnæ attribuuntur vires diaphoreticæ & anodynæ.

Dosis a granis decem, ad scrupulum unum.

BE-

BEZOARDICUM MARTIALE.

Eadem methodo, qua præcedens Bezoardicum joviale paratur, loco reguli jovialis, regulum martialem ſumendo.

Parum de Marte participat, & viribus a diaphoretico Martiali ſuperatur; hinc, cum multo pretioſior etiam ejus præparatio ſit, merito a Diſpenſatorii Brandenburgici editoribus Diaphoreticum martiale Ludovici ſubſtituitur, quibus & nos ſubſcribimus. Viennenſes ſpecificum ſtomachale Poterii ejus loco commendant.

Adſcribuntur vires roborantes, acidum abſorbentes, & tranſpirationem promoventes.

Doſis grana XV. ad grana viginti quinque.

BEZOARDICUM MINERALE.

REC. Mercurii vitæ uncias duas,
Nitri cryſtalliſati exſiccati uncias ſex.

Miſceantur, & in crucibulo, per vices ingerendo, leniſſime detonentur. Maſſa alba ſalina aqua fontana ſolvitur atque edulcoratur. Pulvis ſubſidens leni calore exſiccatur.

Earundem cum Antimonio diaphoretico ſimplici virium eſt, & eadem Doſi propinari poteſt.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus Armena pulveriſata, aqua fontana diluitur, aqua turbida, tenuiſſimis Boli particulis mixta, leni inclinatione ſeparatur a ſpiſſo, novaque aquæ quantitas toties affunditur, & effunditur leniter, donec, præter arenulas & craſſiores partes nihil remaneat. Bolus, quæ paulatim in aqua decantata ſubſedit, effuſa illa, ſervatur exſiccata.

Tribuuntur Bolo vires alexipharmacæ & acidum abſorbentes; merito vero inter adſtringentia refertur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

BUTYRUM ANTIMONII.
Vide ANTIMONII BUTYRUM.

BUTYRUM CACAO.
Vide OLEA EXPRESSA.

BUTYRUM MAJORANÆ.
RUBRUM.
VIRIDE.
Vide UNGUENTA.

CANDELÆ FUMALES.

REC. Styracis calamitæ unciam unam ſemis,
Benzoës,
Maſtiches,
Caryophyllorum aromaticorum,
Sacchari albi ana drachmas ſex,
Carbonum Tiliæ, vel ex alio ligno levi optime exuſtorum uncias quindecim.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui mucilaginis Tragacanthæ ſufficiente quantitate, in juſtam conſiſtentiam ſive maſſam redigendus eſt, ex qua, pro lubitu, candelæ formari poterunt.

Si maſſæ modo præſcriptæ
Balſami Peruviani uncia ſemis,
Olei deſtillati Caryophyllorum,
Ligni Rhodii,
Lavendulæ ana ſcrupulus unus,
addantur, candelæ fragrantiores, & ſic dictæ COMPLETÆ formari poſſunt.

CASSIA EXTRACTA.
Vide PULPA CASSIÆ.

CAUTERIUM POTENTIALE.

Fit ex Lixivio ſaponariorum acerrimo, cum calce viva parato, in ſartagine ferrea tam diu coquendo, donec omnis fere humiditas ablata ſit, atque reſiduum ſalinum ſicceſcere & concreſcere incipiat. Tunc ab igne removetur, & maſſa jam ſolideſcens ſpatula

spatula ferrea eximitur, inque vase vitreo sicco, accurate clauso, prope fornacem calidam asservatur.

Inservit ad excitandos fonticulos, vel auferendas excrescentias præternaturales.

CERA ARBOREA.

REC. Ceræ citrinæ,
Resinæ Pini,
Colophoniæ ana libram semis,
Terebinthinæ vulgaris,
Adipis suillæ ana uncias duas.

Liquescant & colentur.

Utuntur ea hortulani ad insitionem & læsiones arborum.

CERA SIGILLARIS RUBRA.

REC. Ceræ citrinæ uncias sedecim,
Resinæ Pini uncias sex,
Terebinthinæ Venetæ uncias tres,
Cinnabaris factitiæ præparatæ, uncias tres.

Liquetur cera & resina, atque mixturæ colatæ addatur cinnabaris modico olei lini trita, & effundatur in formas consuetas.

CERA SIGILLARIS VIRIDIS.

Eodem modo paratur, loco Cinnabaris, addendo æruginis, sive Viridis Æris probe triti, & in olei lini drachmis duabus soluti, unciam unam.

Ceræ rubræ in Medicina nullus usus est, viridi ad clavos & verrucas nonnunquam utuntur Chirurgi.

CERATA.

Ab emplastris parum differunt, nisi, quod sint molliora ac tractabiliora, hanc ob causam omnia in classem Emplastrorum retulimus.

CHALYBIS PRÆPARATIO.

Limatura Martis vel ferri purissimi aqua fontana sæpius abluatur, & a sordibus mundetur; postea exsiccata in mortario ferreo in subtilissimum pollinem teratur, & in Porphyrite lævigata servetur.

Adstringit, & ad tonum viscerum roborandum facit. Datur ad ventriculi imbecillitatem, cachexiam & mensium vitia, non tamen sine circumspectione præscribenda est; præstat parvas doses, a granis quinque vel sex, præcipue si continuandus est usus, exhibere, quam largiores præbere. Signum felicis successus habetur, si feces alvi nigræ secedant.

CHALYBS SULPHURE PRÆPARATUS.

REC. Limaturæ Martis uncias quatuor,
Sulphuris citrini uncias duodecim.

Optime misceantur, atque in patina terrea, sub perpetua agitatione, leni igne calcinentur, usque dum chalybs, per deflagrationem Sulphuris, in pulverem ferrugineum calcinatus fuerit.

Alii frustum Martis candefaciunt, atque illud sulphuris magdaleoni admovent, sic Mars cum sulphure funditur, & in vas suppositum, aqua frigida repletum, destillat, qui colligitur, in pulverem teritur, atque leni igne calcinatur.

Vires Martis seu Chalybis sunt adstringentes; adstrictione vero vasa & partes solidas roborat, sicque secretiones & excretiones adjuvat; acidum ventriculi absorbet, atque cachecticis prodest.

Dosis grana quinque ad duodecim.

CHOCOLATA.

REC. Fructuum Cacao, parum tostorum, & a corticibus mundatorum, libram unam.

Pinsantur diu & diligenter in mortario calido, ut abeant in massam pultiformem tenuissimam, addatur successive
Sacchari albi, subtilissime triti, libra una,

&

& in fine
Vanigliarum, optime tritarum, Nro quatuor.

Misceantur, atque pro lubitu, tabulæ vel cilindri formentur.

Nonnulli etiam
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum aromaticorum ana drachmas duas & guttas aliquot Balsami Peruviani nigri
addere solent.

Vires sunt nutrientes, corroborantes & demulcentes; sine aromatibus parata hecticis & tabe consumtis prodest, atque senibus convenit.

CINNABARIS ANTIMONII.

Videatur ANTIMONII CINNABARIS.

CINNABARIS FACTITIA.

REC. Sulphuris citrini purissimi uncias quatuor,
Mercurii vivi purissimi uncias duodecim.

Fluat Sulphur in vase figulino satis capaci, cui per vices, Mercurius, in tigillo calefactus, addatur; misceantur fistula, qua fumum Tabaci haurimus, exacte; solet tum fieri subito magnus sibilus, & exoriri fumus densus atque cum sonitu inflammari materies; operculo igitur vas tegendum. Refrigerata postea massa nigra, immittatur cucurbitæ vitreæ, vel vasi sublimatorio, cui imponatur alembicus; lutetur luto ex argilla & calce facto, ponatur in furnum sic, ut vas sublimatorium fere fundum capellæ attingat, obruatur arena paulo altius, quam materies; adhibeatur ignis per gradus, ad summum usque. Ascendit primo parum phlegmatis, deinde flores subalbidi, postea nigri, & tandem cinnabaris. Ubi ignis summus per tres horas applicatus est, frigescant sponte, & cinnabaris ab adhærente nigredine separata servetur.

Cinnabaris talis factitia, minori constans pretio, ac colore exaltatior, rite præparata, non minores habet virtutes, ac cinnabaris nativa.

Datur secure in eadem dosi, atque pulveribus addi potest, ubi alias cinnabaris nativa adhiberi solet.

CINNABARIS NATIVÆ RECTIFICATIO.

Cinnabaris nativa cruda, in pulverem trita, immittitur vitro sublimatorio, atque igne arenæ per tres horas adhibito fortissimo, sublimatur, quæ, postea super marmore lævigata & aqua pura lota, vocatur

CINNABARIS NATIVA PRÆPARATA.

Cinnabaris raro vel nunquam sola præscribitur, sed plerumque antispasmodicis, diapnoicis, nitro & salibus neutris jungitur, atque raro ultra grana tria vel quatuor pro dosi porrigitur.

In Cephalæa tamen & rebellibus affectibus spasmodicis largior etiam dosis, ad grana duodecim vel quindecim, conceditur, qualis, si frequenter repetatur, & ipsum inducere solet subinde Ptyalismum.

CLARETUM E SEX SEMINIBUS.

Vid. AQUA CARMINAT. PER INFUS.

COLCOTHAR.

Est Vitriolum viride ad rubedinem calcinatum.

Usus est in emplastris siccantibus.

CONCHÆ CITRATÆ.

REC. Concharum, a mucore mundatarum & subtilissime pulverisatarum, libram unam,
affundatur
Succi Citri libra semis,
& leni calore, in patina vitrea, exsiccatæ serventur ad usum.

Loco Succi Citri, etiam aceto destillato saturari possunt.

Vires cum succedentium præparatarum conveniunt, magis tamen diureticæ deprehenduntur.

Dosis a scrupulo dimidio ad drachmam dimidiam.

CONCHARUM PRÆPARATIO.

Affundatur teſtis concharum oblongarum, acetum forte, macerentur, ut ſordes atque mucor abradi queant. Mundatæ exſiccentur, pulveriſentur ſubtiliſſime & ſuper marmore lævigentur.

Abſorbentes ſunt, febrifugæ, & ſudorem ac urinam cient.

Doſis eadem cum citratarum.

CONDITA.

Corticibus AURANTIORUM & CITRI recentibus ſuperfundatur lixivium e cineribus clarum, ſic, poſt unam vel alteram ebullitionem in vaſe figulino, molleſcent. Quo facto abluantur aqua fontana calida, &, mundati ab albedine, cribro inverſo imponantur, ut ſuperfluo humore orbentur. Poſtea in vaſe vitreo repoſitis affundatur Saccharum clarificatum, & fere ad conſiſtentiam tabulati coctum, ad ſupereminentiam unius digiti, ſerventur.

FRUCTUS CYDONIORUM,
RADICES CALAMI,
CICHOREI,
ENULÆ,
SATYRII,
ERYNGII,
SCORZONERÆ,
& CÆTERÆ

in aqua fontana coquuntur, usque dum molleſcant, & a ſuperflua humiditate exſiccatis, ſaccharum ſuperfunditur, ad conſiſtentiam tabulati coctum, quantum ſufficit.

FRUCTUS vero BERBERUM,
CERASORUM,
RIBIUM, &
RUBI IDÆI,

ſine prævia coctione, ſaccharo, ad conſiſtentiam tabulati cocto immerguntur.

NUCES JUGLANDES immaturæ feſtuca perforantur, atque per ſex vel octo dies in aqua frigida macerantur, quotidie aquam recentem ſuperaffundendo. Poſtea ad mollitiem coquuntur, & ſaccharo clarificato, ad conſiſtentiam tabulati cocto, immerguntur.

CARYOPHYLLI,
NUCES INDICÆ, &
ZINGIBER

ex Indiis condita advehuntur.

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA, ſive SINE MOSCHO & AMBRA.

REC. Succi pomorum borsdorffienſium uncias decem,
Granorum Kermes Monſpelio allati,
Sacchari albi ana uncias ſedecim.

Mixta ſolvantur unica ebullitione, lento igne; colatis per linteum addantur

Ligni Aloës,
Cinnamomi acutiſſimi, ſubtiliſſime triti, ana drachmæ ſex,
Lapidis Lazuli præparati,
Margaritarum orientalium præparatarum ana drachma una ſemis,

quibus ſplendoris gratia addi poſſunt

Foliorum Auri puriſſimi numero triginta,

& coloris ergo

Coccinellæ, cum aliquot guttulis Olei Tartari per deliquium tritæ, drachma ſemis.

Probe mixta aſſerventur.

CONFECTIO ALKERMES COMPLETA.

REC. Confectionis Alkermes incompletæ, modo præſcriptæ, libram unam,

adde

Ambræ gryſeæ optimæ, cum drachmis duabus Sacchari albi tritæ, ſcrupulum unum,
Moſchi, in aqua roſata ſoluti, ſcrupulum ſemis.

Miſce.

Vim

Vim habet subadstringentem, ori & ventriculo haud ingratam, & cum Coccinella & grana Kermes, ex quibus succus paratur, qui basis est hujus confectionis, animalis prosapiæ sint, & sal blande stimulans, ad vires millepedum accedens, possideant, facile quilibet deprehendet, unde vis laudata analeptica & aphrodisiaca derivanda sit.

Completa a drachma semis ad integram, incompleta ad drachmas duas administrari solet.

CONFECTIO ANISI LAXATIVA.

REC. Seminis Anisi electi unciam unam semis,
Sacchari albi libram unam,
Diacrydii sulphurati drachmam unam,
Mechoacannæ albæ,
Jalappæ resinosæ ana unciam semis,
Cinnamomi acuti drachmam unam.

Immittitur Semen Anisi integrum aheno confectorio, super ignem collocato, atque affunduntur aliquot cochlearia Sacchari clarificati, moxque inspergitur de purgantium pulvere subtilissimo non nihil, exsiccato leni calore Aniso, denuo affunditur Saccharum & inspergitur pulveris portio, atque labor, Saccharum affundendo, pulverem inspergendo & Anisum rursus exsiccando, continuatur, usque dum omnis pulvi inspersus, & Anisum Sacccharo probe incrustatum fuerit.

Inservit pueris, atque illis, qui alia medicamenta laxantia reformidant.

Datur a drachma ad unciam dimidiam & ultra.

CONFECTIO CINNAMOMI REGIA.

REC. Succoladæ Indicæ uncias quatuor,
Nucum Moschatarum, in India conditarum, majorum, numero tres,
Syrupi Cinnamomi libram dimidiam,
Confectionis Alkermes incompletæ unciam unam,
Olei Cinnamomi drachmam semis.

Misce, fiat confectio liquida.

Analepticum gratissimum, & stomachicum egregium præbet hæc confectio. Datur etiam parturientibus, ad fœtum pellendum, & vires restaurandas.

Dosis est drachma una ad duas.

Viliori hæc constat pretio, illa, quæ a Minsichto traditur, & ipsis hystericis fœminis, quia Moscho & Ambra caret, exhiberi potest.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

REC. Specierum de Hyacintho unciam unam,
Syrupi acetositatis Citri uncias tres.

Mixta reponantur in vase porcellano satis magno, ne ob effervescentiam vas rumpatur.

Attribuuntur vires cardiacæ & stomachicæ, atque in nimiis hæmorrhagiis, aliisque fluxionibus moderandis, ad drachmam integram, cum fructu, adhibetur.

CONFECTIONES SICCÆ,
ANISI,
CORIANDRI,
CUBEBARUM,
FOENICULI,
SINAPIS,

& reliqua non tam a Pharmacopœis, quam sic dictis Conditoribus parantur, atque pro tragea grossa expetuntur.

SEMEN CYNÆ

vero, Sacccharo incrustatum, pro pueris, qui reliqua anthelmintica nauseant, in usum vocatur.

CONSERVA MILLEPEDUM.

REC. Millepedum vivorum libram unam,
Sacchari albissimi libras duas semis.

Contundantur in mortario marmoreo, & in vase vitreo vel porcellano serventur.

In ictero, tussi ferina, asthmate, febre quartana & nephritide, optimo cum effectu, adhibetur.

Dosis drachma una ad duas.

CONSERVÆ SIMPLICES parantur

E floribus & herbis recentibus minutissime incisis. Singulis libris adduntur libræ duæ Sacchari albi, in pulverem triti, deinde in mortario marmoreo, pistillo ligneo, probe contunduntur. Siccioribus herbis & floribus modicum aquæ additur, & omnes in vasis porcellanis vel vitreis servantur. Usitatiores

Conservæ, quæ ex herbis sive foliis parantur, sunt

ABSINTHII,
ACETOSÆ,
ACETOSELLÆ,
BECCABUNGÆ,
COCHLEARIÆ,
EUPHRASIÆ,
FUMARIÆ,
HEDERÆ TERRESTRIS,
MAJORANÆ,
MENTHÆ,
SCABIOSÆ,
VERONICÆ,

Ex floribus

ANTHOS,
BELLIDIS,
BETONICÆ,
BORRAGINIS,
BUGLOSSI,
CICHOREI,
FARFARÆ,
PAPAVERIS ERRATICI,
PÆONIÆ,
PRIMULÆ VERIS,
ROSARUM RUBRARUM,
PALLIDARUM,
VITRIOLATA,
additis Spiritus Vitrioli drachmis duabus, ad libram Conservæ Rosarum rubrarum.
SALVIÆ,
TUNICÆ,
VIOLARUM.

CITRI ex PULPA, abjectis seminibus, corticosa albedine, & tunicis, quæ cellulas constituunt, parari solent.

Calices nonnullorum florum, e. g. Borraginis, Buglossi, Primulæ veris, violarum, demuntur.

Conservæ vires vegetabilium, ex quibus parantur, retinent, & pro basi electuariorum inserviunt.

CONSERVA SPAGYRICA.

REC. Salis Absinthii uncias duas,
Melissæ,
Urticæ ana unciam unam,
Tartari vitriolati unciam semis,
Arcani duplicati uncias duas.

Misceantur, & fiat pulvis, cui affundantur
Spiritus Sulphuris per campanam, drachmæ duæ.

Postquam deferbuerint, addantur
Conservæ florum Rosarum rubrarum,
Tunicæ ana libra una,
Olei Cinnamomi,
Corticum citri,
Anisi ana drachma una,
Fœniculi,
Menthæ ana drachma semis,

Misceantur, &, si completa hæc conserva desideretur, addantur
Ambræ griseæ grana quindecim, in spiritu Rosarum solutæ.

Per incompletam intelligunt nonnulli, quæ non Ambra modo, sed & oleis destillatis caret.

Laudatur ad obstructiones viscerum reserandas, in ictero, febribus quartanis chronicis, & mensium obstructione.

Vix sola præscribitur, sed plerumque aliis additur electuariis vel conservis.

Sola vero a drachma una ad unciam semis dari potest.

CO-

CORALLIORUM ALBORUM ET RUBRORUM PRÆPARATIO.

Probe trita cum aqua, ſuper Porphyrite, ſubtiliſſime, usque dum nullum ſtridorem inter dentes edant, lævigentur, & rurſus exſiccata, atque in pulverem redacta, ſerventur ad uſum.

Abſorbent, leniter adſtringunt, & antepileptica vulgo cenſentur.

Doſis ſcrupulus unus ad ſcrupulum unum ſemis.

CORNU ALCIS PRÆPARATUM.

Lima in ſcobem redigitur, deinde in pollinem ſubtilem teritur, & ſervatur.

Vires antepilepticas adſcribunt.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

CORNU CERVI AURATUM.

REC. Cornu Cervi uſti præparati unciam unam,
Foliorum Auri puriſſimi libellos octo.

Miſceantur & terantur in mortario marmoreo, donec Aurum diſpareat; poſtea calcinentur in crucibulo probe tecto, per tres horas, & pulvis purpurei coloris ſervetur.

Adſcribuntur vires cordiales & alexiteriæ, atque in febribus malignis, variolis & morbillis nonnunquam in uſum vocatur.

Doſis ſcrupulus dimidius ad integrum.

CORNU CERVI PHILOSOPHICE, ſive SINE IGNE, PRÆPARATUM.

REC. Cornu Cervi, in majora fruſta ſecti, quantum placet.

Coquantur in ſufficienti quantitate aquæ fontanæ, donec molleſcant; poſtea medulla & cortex exterior nigricans cultro ſeparetur, & cornu albicans exſiccatum in pollilinem ſubtiliſſimum teratur.

Vires habet adſtringentes, abſorbentes, diaphoreticas. Laudatur in variolis, morbillis, & aliis febribus malignis.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

CORNU CERVI USTUM.

Calcinatur C. C. in fruſta diſſectum, aperto igne, ad albedinem.

Majorem poſſidet vim adſtrictivam, quam philoſophice præparatum; vires etiam anthelminticæ illi tribuuntur.

CORNU RHINOCEROTIS PRÆPARATUM.

Lima in ſcobem redactum, in ſubtiliſſimum pulverem, qui per linteum tenue trajiciendus, teritur, atque ſervatur.

Venenis reſiſtere, ſudorem movere, & epilepticis prodeſſe creditur.

Doſis grana quindecim ad drachmam dimidiam.

CRANIUM HUMANUM PRÆPARATUM.

REC. Cranii hominis, violenta morte perempti, ab integumentis & omni immunditie liberati, quantum volueris; contunde, atque in tenuiſſimum pollinem redige.

Tribuuntur illi vires ſpecifice antepilepticæ, & hinc pulveribus epilepticis additur.

Datur infanti tenello a granis tribus ad quinque; adultiori ad ſcrupulum dimidium, & adultis a ſcrupulo integro ad drachmam dimidiam.

CREMOR vel CRYSTALLI TARTARI.

REC. Tartari albi, aqua calida aliquoties a ſordibus externis abluti & in pulverem contuſi, libras duas.

Coquendo in libris viginti quatuor aquæ fontanæ, in vaſe figulino, diſſolvantur, & fervens adhuc decoctum trajiciatur per manicam Hippocratis, in aliud vas terreum; ubi refrixerit, cryſtallos exhibet, in ſuperficie autem liquoris cruſtam, *cremoris* nomine notam, qui, cum cryſtallis, frigida fontana aqua abluatur, & exſiccatus, ſuper Porphyrite, in pulverem albiſſimum conteratur.

Cryſtalli Tartari ſal ſunt eſſentiale Vini. Craſſos & viſcidos humores incidunt, alvum blande ſtimulant, appetitum excitant, hypochondriacis, febricitantibus & cachecticis proſunt. Purgantibus additi vires eorum augent.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmas duas, imo ad unciam dimidiam. Difficulter, & non, niſi in liquore calido, ſolvi poſſunt.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

REC. Limaturæ ferri uncias quatuor.

Diſſolve in ſpiritus Vitrioli & aquæ fontanæ ana unciis octo, ſolutionem ad ſiccitatem in vaſe ferreo evapora, & forti igne in pulverem rubicundum calcina.

Vires ex nomine patent; verum ad internum uſum vix commendatur, ſed emplaſtris exſiccantibus & adſtringentibus addi ſolet.

CROCUS MARTIS APERITIVUS ANTIMONIATUS STAHLII.

REC. Clavorum ferreorum libram unam,
Antimonii libras duas.

Fluant optime in crucibulo, quibus adde
Cinerum clavellatorum uncias quinque.

Cum omnia colliquata fluxerint, effunde in conum fuſorium, & regulum a ſcoriis ſeparatum ſerva.

Scoriæ, fuſci coloris, fruſtillatim contuſæ, ſive aëri umbroſo, humida tempeſtate, vel cellæ expoſitæ, dilabuntur in pulverem ſubnigrum. Hunc pulverem, aqua tepida multa dilutum & probe agitatum, ita ſepara, ut quicquid ejus, poſt craſſiorum particularum ſubſidentiam, ac aliquam moram, aquæ turbidum adhuc internatat tenuiſſimum, cum hac effundas; craſſiore parte, ſedimenti inſtar, in fundo remanente. Exit vero tenerioris hujus ſubſtantiæ oppido parum, quæ ſeorſim aſſervanda eſt, & cum triplo Nitri puriſſimi, in crucibulo leviſſime candeſcente, detonanda; Maſſa inde nata rubicunda, edulcoretur, atque pulvis dilute rubens, ſub titulo: *Croci Martis aperitivi tenuioris*, ſervetur. Subſidens vero illa altera portio ſimiliter tractanda, edulcoranda, ſiccanda, & cum triplo Nitri detonanda, quæ rurſus edulcorata & ſiccata, dat *Crocum Martis aperitivum*, obſcurioris coloris, quam præcedens tenuior.

In hæmorrhagiis uteri, hæmorrhoidum nimio fluxu, diarrhœis, febribus intermittentibus, laudabilem & ſæpe præſentaneam operam navat. Dandus tamen vix tenuior ille ultra quatuor vel ſex grana, cum effectu ſatis luculento; quemadmodum in lochialibus puerperarum turbis, non tam hæmorrhagicis, quam ſpaſticis flatulentis, perfrequenter Cl. Auctor eo uſus eſt, & non minus, atque in atrophicis affectibus puerorum, quibus tincturam ſuam commendat Ludovici, cum Arcano duplicato exhibitum, expectationi ſatisfeciſſe teſtatur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS VULGARIS.

REC. Vitrioli Martis uncias quatuor, ſolvantur in aquæ fontanæ calidæ libra una. Solutioni inſtilletur ſalis alcali vel cinerum clavellatorum lixivii aqua fontana calida facti, & per chartam emporeticam filtrati, quantum ad ſaturationem acidi vitriolici, & præcipitationem Martis, ſatis. Pulvis præcipitatus aqua fontana calida edulcoretur, & leniter ad rubedinem calcinetur. Liquor ſalinus evaporari ad cuticulam poteſt, qui ad cryſtalliſationem repoſitus, largitur Tartarum vitriolatum.

A praecedenti non differt, nisi quod magis adstringere deprehendatur.

Dosis grana tria ad quatuor.

CROCUS METALLORUM.

REC. Antimonii crudi in pulverem triti,
Nitri crudi purissimi & siccissimi ana libras duas.

Probe mixta detonentur in mortario, & cum refrixerint, massa regulina, a scoriis separata, in pulverem teratur. Quae massa, ob colorem, etiam

HEPAR ANTIMONII

vocatur.

Vehemens est emeticum, & nunquam in substantia praeberi debet. Grana tria vel quatuor per noctem in vini unciis duabus infusa, virtute emetica vinum imbuunt. Veterinarii ad equos purgandos, pro una dosi, ad unciam semis, imo ad drachmas sex, devorandum praebent. Paratur etiam ex hoc Croco metallorum, Tartarus emeticus.

CROCUS SOLIS.

REC. Auri, per Antimonium depurati, partem unam,
Mercurii, a Cinnabari revivificati, partes sex.

Fiat amalgama, cui probe commisceatur duplum Sulphuris triti, & sub tegula fulminatoria rudicula ferrea continue movendo, donec omne Sulphur & Mercurius avolarit, igne sufficienti calcinetur, sic Aurum in pulverem abibit rufum, subtilissime super marmore terendum.

Bezoardicas & cordiales vires illi tribuere vulgo solent.

Dosis granum unum ad duo.

CROCUS VENERIS.

Ex vitriolo vel crystallis Veneris, per calcinationem, paratur, & affusa aqua calida edulcoratur.

Internus nullus, externe in unguentis & emplastris exsiccantibus ejus est usus.

CRYSTALLUS MONTANA PRAEPARATA.

Sicut de Coralliis supra dictum est, paratur.

Usus ejus in Diarrhoea biliosa commendatur, & ad lac augendum adhiberi solet. Contra vertiginem & Arsenicum assumtum vulgo etiam, sed frustra laudant.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

DENTES APRI.

In pollinem subtilissimum terantur & serventur.

Specifice in pleuritide commendantur, & in nimiis haemorrhagiis frequenter adhibentur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

DENS HIPPOPOTAMI PRAEPARATUS.

Eadem ratione praeparatur, *easdem habet vires*, eademque *exhibetur Dosi.*

DIACRYDIUM LIQUIRITIA EDULCORATUM.

Solvitur libra dimidia Scammonei Aleppensis in mortario, sub perpetua agitatione, decocto Liquiritiae fervente; solutio lactea a fecibus nigricantibus, per inclinationem mortarii, separatur, atque lenissimo igne, vel in Balneo, ad extracti consistentiam, evaporatur, residuum, leni calore exsiccatum, in pulverem teritur.

Decoctum ex unciis duabus Liquiritiae, in aquae fontanae libris tribus, ad consumtionem librae dimidiae coctis, paratur.

Multum, per hanc praeparationem, de suo nauseoso odore & sapore perdit, nec tamen sua efficacia purgandi privatur Scammoneum. Facile solvitur a ventriculi humoribus, & sine torminibus seram & viscidos humores educit. Hydropicis, omnibusque, quibus purgatione opus est, convenit. Datur,

tur, uti Diacrydium ſulphuratum, verum in aliquantum majori doſi.

DIACRYDIUM ROSATUM.

REC. Scammonii triti uncias quatuor.

Tractetur eodem modo, quo de Diacrydio Glycyrrhiza edulcorato dictum eſt, decocti loco, infuſionem Roſarum ſumendo.

Mitius & gratius eſt, quam ſulphuratum.

Doſis grana decem ad quindecim.

DIACRYDIUM SULPHURATUM.

REC. Scammonei electi uncias tres.

In pulverem teratur, & ſupra chartam albam, acu perforatam, tenuiter ac æqualiter expandatur, atque ſupra cratem, cui carbo vivus ſit ſubditus, in quem Sulphuris uncia ſucceſſive injiciatur, ſuffumigetur, & ne liquefiat vel chartæ adhæreat, neque comburatur, ſpatula ferrea diligenter moveatur.

Eſt ingrediens & baſis pulveris Cornachini. Purgat ſatis valide, & vel pilulis additur, vel ſale quodam neutro miſcetur.

Doſis a granis quatuor ad grana duodecim, raro ultra grana quindecim aſcendendo.

DIAPHORETICUM JOVIALE

eſt

ANTIHECTICUM POTERII.

DIAPHORETICUM MARTIALE

eſt

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

EBUR PHILOSOPHICE CALCINATUM.

Eadem methodo, qua cornu Cervi philoſophice paratum eſt, & hoc medicamentum conficitur.

Cum quo viribus & doſi convenit.

EBUR USTUM ALBUM ſeu SPODIUM.

REC. Eboris, in tenues lamellas ſeu fruſtula diſſecti, libram unam,

Igne aperto ad albedinem calcinetur, tandem cum aqua, ſuper marmore, lævigetur, & exſiccetur.

Vires, & doſis, quæ Cornu Cervi uſti.

ELATERIUM.

REC. Cucumerum agreſtium ſive aſininorum, intra octiduum collectorum, quantum volueris.

Scindantur caute apice cultelli, circa petioli inſertionem, ut matura ſemina e fructibus proſiliant, ſemen reliquum & mucago ſuper cribrum proliciantur, quæ poſtea in mortario, piſtillo ligneo, affuſo ſenſim liquoris tenuis, e fructibus conciſis extillantis, & aquæ pluviæ tantillo, contundantur, dum liquor pinguis & oleoſus, e medulla ſeminis in pulpam contritus, per cribrum ſetaceum tenuiſſimum & novum, transmitti poſſit; qui leniſſimo calore evaporatus, redigatur in conſiſtentiam maſſæ pilularis.

Violenter, præſertim humores ſeroſos, per alvum educit.

In hydrope aliis purgantibus, ad grana tria vel quatuor, addi ſolet.

ELÆOSACCHARA, ANISI, CINNAMOMI, MACIS, SUCCINI.

Fiunt, oleorum eorundem deſtillatorum guttas ſedecim, cum uncia una Sacchari albiſſimi, terendo.

AURANTIORUM, CITRI.

Saccharum Canarienſe pomis Aurantiis vel Citreis recentibus affricatur, donec ſapore & odore bene imbutum ſit.

Præ-

Præstat vero illa, dum exposcuntur, demum parare.

Vires ex oleis destillatis, unde parata sunt, dijudicantur.

Adduntur pulveribus & trageis, dosi ea, quam commodam duxerit medicus.

ELÆOSACCHARUM ERRHINUM.

Videatur PULVIS STERNUTATORIUS ALBUS.

ELECTUARIUM DE ACORO.

REC. Radicum Pseudoacori recentium, mediante instrumento culinari, quod scabinam (Reibeisen) vocant, in rasuram redactarum, uncias sex.

Coque in vase figulino, addita
Vini rubri libra una,
ad remanentiam unciarum decem;
adde
Sacchari albi uncias triginta,
Radicum Calami aromatici, conditarum & minutim incisarum,
Zinziberis, in India conditi, minutim incisi, ana uncias quatuor,
Corticum Aurantiorum conditorum,
Citri conditorum ana unciam unam semis,
Cardamomi minoris,
Nucis Moschatæ,
Piperis longi ana drachmas tres,
Caryophyllorum aromaticorum drachmas quinque,
Cinnamomi acuti unciam unam,
Conservæ Rosarum libram unam.

Misce, fiat electuarium.

Electuarium hoc non solum se commendat gratissimo sapore, sed & virtute sua, ventriculum roborandi; digestionem juvat, in senibus, frigidis, & phlegmaticis, quibus etiam præcipue dicatum est.

Dari potest ab uncia dimidia ad integram.

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

REC. Baccarum Lauri unciam unam semis,
Foliorum Rutæ,
Menthastri,
Origani,
Seminum Ammeos,
Cumini,
Nigellæ,
Ligustici,
Carvi,
Dauci,
Calami aromatici,
Piperis nigri,
longi,
Castorei ana drachmas duas,
Sagapeni unciam semis,
Opopanacis drachmas tres,
Omnia trita excipiantur
Mellis despumati unciis quatuordecim.

Misceantur.

Usus rarus internus est, & non, nisi in clysmatibus, decocto carminativo mixtum, adhibetur.

ELECTUARIUM CATHOLICUM.

REC. Polypodii querni libram semis,
decoquatur in
Aquæ communis libris quatuor,
ad consumtionem quartæ circiter partis. In decocto colato dissolvantur
Pulpæ Cassiæ,
Tamarindorum ana unciæ quatuor,
Sacchari albi libræ quatuor,
quibus, leni igne, ad mellis consistentiam redactis, pulveres subtilissime tritos cibratosque
Radicum Polypodii,
Rhabarbari veri ana uncias duas,
Liquiritiæ drachmas duas,

 Folio-

Foliorum Sennæ orientalium uncias quatuor,
Florum Violarum,
Seminis Anisi ana uncias duas,
paulatim insperge, & misce pro electuario.

A majoribus nostris valde æstimatum fuit, & pro purgante universali habitum; blande laxat alvum, ab uncia dimidia ad integram exhibitum.

Admiscetur etiam clysmatibus in eadem dosi.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

REC. Limaturæ Chalybis, in alcohol redactæ, uncias septem,
Cinnamomi,
Nucis Moschatæ ana drachmas sex,
Rhabarbari electi drachmas quatuor,
Specierum aromaticarum rosatarum drachmas sex,
Sacchari albi, in succi Cydoniorum unciis sex soluti & rursus ad tabulati consistentiam cocti,
Mellis despumati ana libram unam.

Fiat miscendo electuarium.

Laudatur ad virginum morbos, retentionem mensium, cachexiam; & ad drachmam unam, quæ Martis grana duodecim continet, præscribi solet.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

REC. Radicum Satyrii recentium, succulentarum, uncias quatuor.

Minutim incisis & contusis in mortario lapideo adde
Sacchari albi, ad consistentiam tabulati cocti, uncias duodecim,
Nucis Indicæ conditæ,
Zinziberis conditi,
Pinearum recentium,
Pistaciorum non rancidorum, omnium minutim incisorum, ana unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi acuti,
Stincorum marinorum ana unciam semis,
Brodii Zinziberis conditi, quantum satis ad consistentiam electuarii.

Analepticum, venerem languidam excitans, semenque augens venditatur.

Dosis uncia dimidia ad drachmas sex.

ELECTUARIUM DIASCORDII FRACASTORII.

REC. Radicum Bistortæ,
Tormentillæ,
Gentianæ,
Herbarum Dictamni Cretici ana unciam semis,
Scordii nostri unciam unam,
Seminis Acetosæ drachmam unam semis,
Cinnamomi acuti,
Cassiæ ligneæ ana unciam semis,
Piperis longi,
Zinziberis ana drachmas duas,
Opii Thebaici drachmam unam semis,
Gummi Arabici,
Galbani,
Styracis ana unciam semis,
Boli Armenæ unciam unam semis,
Terræ Lemniæ unciam semis,
Conservæ Rosarum rubrarum libram unam,
Mellis despumati uncias triginta.

Opium, Gummi Arabicum & Galbanum in unciis tribus vini albi solvantur, & optime cum melle misceantur, postea reliqua, in pollinem subtilem trita, adjiciantur, tandem conserva Rosarum addatur, atque omnia, probe agitando in electuarium redigantur.

Egre-

Egregium est pharmacum, & sudorifera, ac inprimis alexipharmaca, anodyna & styptica virtute commendabile; hinc ad Diarrhœam quoque sistendam laudatur. Quælibet uncia hujus electuarii circiter grana duo habet Opii.

Dosis drachmæ duæ vel tres.

ELECTUARIUM GINGIVALE.

REC. Laccæ pictoriæ in globulis uncias duas,
Terræ Japonicæ,
Mastichis,
Myrrhæ electæ,
Caryophyllorum aromaticorum,
Aluminis usti,
Tabaci Hispanici,
Seminis Cochleariæ ana drachmas duas,
Salis armoniaci drachmam unam,
Balsami Peruviani scrupulos duos.
Optime in pulverem tritis & Balsamo Peruviano irroratis, adde
Mellis rosati uncias octo.

Fiat electuarium.

Dentes firmat, mundat, & a carie præservat, gingivarum laxitati & scorbuto oris medetur.

Gingivæ & dentes mane & ante somnum hoc electuario fricandi, & os Aqua Salviæ vel fontana eluendum.

ELECTUARIUM HIERA PICRA SIMPLEX.

REC. Aloës Succotrinæ uncias duodecim,
Asari,
Cinnamomi,
Croci,
Mastiches,
Spicæ Indicæ,
Xylobalsami, aut ejus loco Ligni Aloës ana drachmas sex,
Mellis libras quatuor cum semisse.

Misce pulveres melli fere refrigerato pro electuario.

Nullus ejus hodie fere usus est, præterquam in clysteribus.

Dosis uncia semis ad drachmas sex.

ELECTUARIUM LENITIVUM FLORENZOLÆ.

REC. Polypodii querni uncias duas,
Glycyrrhizæ unciam semis,
Herbæ Adianthi nigri,
Mercurialis ana unciam unam,
Florum Violarum unciam semis,
Hordei decorticati,
Passularum minorum ana uncias duas,
Jujubarum,
Sebesten ana unciam unam,
Incisa coquantur in
Aquæ fontanæ libris duabus semis,
ut remaneat libra una, in qua colata dissolvantur,
Pulpæ Cassiæ,
Prunorum,
Tamarindorum,
Sacchari albi ana unciæ sex.
Coquantur ad justam electuarii consistentiam, addantur
Conservæ Violarum unciæ sex,
Foliorum Sennæ electorum, subtilissime pulverisatorum, unciæ tres semis.

Exacte misceantur.

Hodie quidem rarus hujus electuarii est usus, nisi in enematibus; blande tamen alvum laxat, bilem educit, & in renum affectibus dari potest.

Dosis uncia dimidia ad integram. Drachmæ decem hujus electuarii drachmam unam foliorum Sennæ continent.

ELECTUARIUM DE MANNA.

REC. Mannæ electæ,
Sacchari albi ana uncias duas,
solvantur in
Aquæ florum Acaciæ unciis duabus,

per linteum colatis addatur

Radicis Iridis Florentinæ, in tenerrimum pulverem tritæ, drachma una,

Olei Amygdalarum dulcium uncia una.

Miſceantur, fiat Electuarium.

Alvum leniter laxat. Tenellis, & præſertim recens natis, ad educendos humores vitioſos & meconium datur.

Doſis drachma una ad quatuor.

ELECTUARIUM MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

REC. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ veræ,

Phu pontici ana uncias quatuor ſemis,

Calami aromatici uncias quinque drachmas tres,

Gentianæ uncias ſeptem ſemis,

Mei athamantici uncias tres, & drachmas ſex,

Zingiberis albi uncias quindecim,

Herbarum Dictamni Cretici uncias ſeptem ſemis,

Polii montani,

Scordii Cretici ana uncias decem ſemis,

Foliorum Indorum uncias duodecim,

Florum Hyperici uncias tres ſemis,

Stœchadis Arabicæ uncias duodecim,

Roſarum rubrarum,

Spicæ Celticæ ana uncias ſeptem ſemis,

Nardi Indicæ uncias quindecim,

Schœnanthi uncias tredecim,

Seminum Thlaſpios uncias quindecim,

Seſeleos uncias duodecim,

Seminum Dauci Cretici uncias decem ſemis,

Petroſelini Macedonici,

Fœniculi ana uncias ſeptem ſemis,

Aniſi uncias quatuor ſemis,

Baccarum Juniperi unciam unam,

Piperis longi uncias duodecim,

albi,

Carpobalſami ana uncias decem ſemis,

Cardamomi minoris uncias ſeptem ſemis,

Croci optimi uncias quindecim,

Cinnamomi uncias quindecim ſemis,

Coſti veri uncias duodecim,

Caſſiæ ligneæ uncias decem ſemis,

Agarici trochiſcati uncias quindecim,

Caſtorei uncias duodecim,

Stincorum marinorum uncias tres ſemis,

Myrrhæ electæ uncias ſedecim,

Olibani uncias quindecim,

Bdellii uncias decem ſemis,

Gummi Arabici uncias ſeptem ſemis.

Radices, herbæ & ſemina, leni calore ſiccata, cum aromatibus & reliquis mixta, in ſubtiliſſimum pulverem rediguntur, & per cribrum trajecta, ſeorſim ſervantur; his peractis

REC. Gummi Galbani,

Opopanacis ana uncias duodecim,

Sagapeni uncias quatuor ſemis,

Succi Hypociſtidis uncias duodecim,

Acaciæ uncias quatuor,

Opii electi uncias ſeptem ſemis.

Sol-

Solvantur in
Vini generosi libris octo,
soluta commisceantur cum
Mellis despumati libris centum & sedecim,
& successive, inter perpetuam agitationem, pulvis reliquorum inspergatur, tandem
Styracis in granis unciæ duodecim, in
Terebinthinæ claræ unciis quatuordecim,
liquatis, &
Opobalsami unciæ duodecim addantur,
atque agitatio, ad perfectam ingredientium mixtionem, per aliquot horas continuetur. Denique in vase satis magno, ut fermentare & commode singulis octiduis, spatula magna lignea, agitari ac commoveri queant, reponantur.

Pro alexipharmaco insigni, & fere universali medicina habetur. Stomachicum, confortans & anodynum haud contemnendum præbet. Qualibet uncia grana habet duo Opii, & grana quatuor Croci.

Dosis a drachma una ad drachmas quatuor.

ELECTUARIUM five PHILONIUM ROMANUM.

REC. Piperis albi,
Seminum Hyoscyami ana drachmas decem,
Apii drachmas duas,
Petroselini Macedonici,
Fœniculi,
Dauci Cretici ana scrupulos quatuor,
Cassiæ ligneæ,
Cinnamomi ana drachmas tres,
Castorei,
Myrrhæ ana drachmas duas,
Croci orientalis,
Spicæ Indicæ,
Zedoariæ,
Pyrethri ana scrupulos duos,
Opii drachmas quinque,
Mellis despumati uncias octodecim,
Opium in
Vini albi uncia una semis,
solutum cum reliquis, optime tritis, melli admiscetur, & sic probe mixta servantur.

Qualibet drachma hujus electuarii ultra granum unum & semis Opii continet, ex hoc & reliquorum pondere facile dosis constitui potest, adulto scilicet nunquam ultra drachmas duas in summo.

Somniferum est, & dolores sedat; hinc in colica flatulenta a nonnullis adhiberi solet. Veteres etiam tussi vehementi, & imminenti hinc vasorum pulmonis crepaturæ destinabant.

ELECTUARIUM five REQUIES NICOLAI.

REC. Florum Rosarum rubrarum,
Violarum ana drachmas sex,
Seminis Hyoscyami albi,
Papaveris albi,
Lactucæ,
Psyllii ana unciam dimidiam,
Corticum radicum Mandragoræ,
Nucum Moschatarum,
Cinnamomi,
Zingiberis albi,
Opii depurati ana drachmas tres,
Sandali albi,
rubri,
Tragacanthi,
Spodii ex Ebore ana drachmas duas,
Sacchari albi uncias viginti,
Opium
Vini albi unciis tribus diluatur,
reliqua in pulverem terantur, &
Saccharum in
Aquæ florum Rosarum unciis decem solvatur,
atque omnia optime permisceantur.

A longo tempore in noſtris officinis in uſu eſt hoc electuarium, atque infantibus, ad conciliandum ſomnum, dari ſolet; hanc ob cauſam haud quicquam in ejus compoſitione immutare, multo minus plane proſcribere voluimus.

Uncia una habet Opii grana quinque.

Infanti tenero non ultra grana duo, vel tria, facile adhibentur.

ELECTUARIUM RESUMPTIVUM.

REC. Radicum Liquiritiæ,
Herbæ Hederæ terreſtris,
Veronicæ ana unciam ſemis.
Infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis libris quinque,
macerentur per noctem, mane colentur, in colatura coquantur
Radicum Farfaræ recentium, minutim inciſarum,
Paſſularum minorum ana unciæ ſedecim,
usque quo molleſcant; contundantur in mortario marmoreo, atque per cribrum trajiciantur. Magmati vel pulpæ addantur
Sacchari albi unciæ triginta duæ,
coquantur leni igne ad juſtam conſiſtentiam; refrigeratis admiſceantur
Amygdalarum dulcium, minutim inciſarum, unciæ ſeptem,
Flavedo citri a tribus pomis recentibus deraſa,
Cinnamomi acuti uncia ſemis,
Caryophyllorum aromaticorum drachmæ tres.
Fiat Electuarium.

Hecticis, tabidis, nec non tuſſi acri ſicca laborantibus convenit.

Doſis uncia ſemis ad integram, bis vel ter per diem ſumenda.

ELECTUARIUM SANANS FULLERI.

REC. Spermatis ceti recentis drachmam unam,
Ceræ citrinæ odoratæ drachmas tres,
Olei Amygdalarum dulcium unciam unam,
Liquentur leni igne, atque ab igne remotis & probe, usque refrixerint, agitatis, addantur
Conſervæ Roſarum rubrarum unciæ duæ,
Mellis deſpumati uncia una.

Commendabile eſt ad primarum viarum eroſiones, tuſſim acrem, nec non in dyſenteria.

Doſis drachmæ duæ vel tres.

NB. Quia facile rancorem contrahit hoc electuarium, non, niſi dum expetitur, parandum.

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

REC. Pulpæ Tamarindorum uncias quatuor,
Paſſularum minorum,
Prunorum ana unciam unam ſemis.
Miſceantur; poſtea adde
Foliorum Sennæ electæ pulveriſatorum, unciam unam ſemis,
Cremoris Tartari drachmas ſex,
Cinnamomi acuti,
Seminis Fœniculi ana drachmas duas,
Olei Nuciſtæ deſtillati guttas decem.
Miſce, fiat, addita ſufficienti quantitate ſyrupi roſati ſolutivi, electuarium.

Bilioſos humores blande educit.

Doſis ab uncia dimidia ad integram.

ELECTUARIUM THERIACÆ ANDROMACHI.

REC. Radicum Dictamni albi, ſive Fraxinellæ,

Radi-

Radicum Scillæ præparatæ ana libras duas,
Iridis Florentinæ libram unam,
Pentaphylli uncias ſex,
Calami aromatici,
Phu pontici ana uncias quinque,
Rhabarbari veri,
Zingiberis albi ana uncias ſex,
Angelicæ,
Gentianæ ana uncias quatuor,
Ariſtolochiæ longæ veræ uncias duas,
Aſari drachmas quinque, ſcrupulum unum,
Herbarum Scordii Cretici libram unam,
Dictamni Cretici uncias ſex,
Chamædryos uncias quatuor,
Marrubii albi,
Calaminthæ montanæ ana uncias ſex,
Polii Cretici,
Chamæpityos ana uncias quatuor,
Centaurii minoris uncias duas,
Majoranæ,
Mari veri ana unciam ſemis, ſcrupulos quatuor,
Foliorum Indorum uncias quinque,
Florum Roſarum rubrarum libram unam,
Stœchadis Arabicæ uncias ſex,
Hyperici uncias quatuor,

Seminum Napi libram unam,
Amomi racemoſi uncias octo,
Petroſelini Macedonici uncias ſex,
Aniſi,
Fœniculi Cretici,
Ammios,
Seſeleos,
Thlaſpios ana uncias quatuor,
Dauci Cretici uncias duas,
Schœnanthi uncias ſeptem,
Spicæ vel Nardi Indicæ uncias octo,
Celticæ uncias quatuor,
Piperis longi libras duas,
albi,
nigri ana uncias ſex,
Cardamomi minoris,
Carpobalſami vel Cubebarum ana uncias quatuor,
Cinnamomi acuti uncias octo,
Coſti aromatici uncias ſeptem,
Ligni Aloës ſive Xylobalſami unciam unam,
Aſphalati drachmas quinque, ſcrupulum unum,
Agarici trochiſcati libram unam,
Myrrhæ electæ uncias octo,
Olibani electi uncias ſex,
Maſtiches ſcrupulos octo,
Gummi Arabici uncias quatuor,
Bituminis judaici, vel Aſphalti uncias duas,
Terræ Lemniæ uncias quatuor,
Caſtorei uncias duas,
Viperarum Italicarum libras duas.

Eligantur ſimplicia præſcripta optimæ notæ, quæ herbis, floribus, radicibus, & aliis ſiccationis indigis, leni calore ſiccatis, admiſcean-

sceantur, & simul in pulverem subtilissimum redacta, seorsim serventur.

Squinanthum & Spica Indica, minutim incisa, cum Gummi Arabico, in aqua soluto, probe pinsentur, & leni calore rursus exsiccata, in pulverem redacta, reliquis addantur.

Flores Rosarum seorsim terantur, & cum

Chalcitidis, vel Vitrioli Martis, ad albedinem calcinati, unciis quatuor,

Croci Austriaci, optime triti, unciis octo,

Vino diluantur; sequentia vero in Vini Malvatici sufficiente quantitate solvantur:

Opii Thebaici libræ duæ,
Succi Liquiritiæ libra una,
Hypocistidis,
Acaciæ,
Sagapeni ana unciæ quatuor,
Galbani unciæ duæ.

Soluta & colata commisceantur cum

Mellis optime despumati triplo, vel libris centum & sedecim;

addantur Crocus, Chalcitis, & flores Rosarum vino diluta, agitentur diligenter, semper de pulvere priori inspergendo per cribrum. Tandem

Styracis in granis unciæ quatuor, in

Terebinthinæ claræ unciis sex solutæ, &

Opobalsami veri, vel in ejus defectu Olei Nucistæ expressi unciæ tredecim

adjiciantur, & per horæ unius spatium, ut exactissime misceantur, agitentur, atque in vase capaciori, ut fermentare, & aliquoties per mensem moveri queant, reponantur.

Virtutes hujus electuarii etiam plebi sunt notissimæ; olim pro panacea habebatur, & hodie etiam vulgus multa ac crebriori experientia edoctus, bono cum effectu, eo in plurimis morbis utitur. Nec etiam revera laude sua privandam esse hanc confectionem censemus, etiamsi nonnulli hujus seculi doctissimi Medici, tanquam ex nimis calidis & sanguinem incendentibus ingredientibus compositam, raro, caute & circumspecte in usum vocare jubeant. Nobis est alexipharmacum, adstringens, balsamicum, stomachicum & anodynum.

Quælibet uncia continet Opii grana sex, & Croci grana duo. Datur vel per se, vel cum commodo quodam vehiculo.

Dosis est a drachmis duabus ad tres.

ELIXIR ANTICOLICUM CROCATUM.

Videatur ELIXIR CORDIALE & STOMACHICUM, vulgo GARRUS. *Pharmacop. Parisiens.*

ELIXIR ANTIFEBRILE.

REC. Radicum Gentianæ rubræ unciam unam,
Serpentariæ Virginianæ,
Herbarum Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Trifolii fibrini,
Absinthii Pontici ana drachmas tres,
Corticis Peruviani unciam unam semis,
Chacarillæ,
Winterani ana unciam semis,
Florum salis armoniaci martialium drachmas sex.

Incisa

Incisa infunde in
Spiritus Vini rectificati libris duabus,
post digestionem per quatuor dies, exprimantur, & Elixir per chartam filtratum usui servetur.

In declinatione febrium intermittentium, ad tonum restaurandum, & appetitum excitandum, inservit.

Dosis a drachma semis ad scrupulos duos.

ELIXIR APERITIVUM CLAUDERI.

REC. Salis Tartari, vel cinerum clavellatorum depuratorum, unciam unam,
Solvantur in
Aquæ florum Sambuci,
Cochleariæ,
Nasturtii ana unciis quinque;
solutio filtretur, & affundatur
Aloës,
Myrrhæ ana unciæ uni,
Croci unciæ semis.
Per triduum digerantur, filtretur & ad usum servetur Elixir.

Ad obstructiones viscerum reserandas, & menses pellendos inservit. Hypochondriacis, scorbuticis, atque obstructione alvi laborantibus convenit.

Dosis drachma dimidia ad integram.

ELIXIR BALSAMICUM PECTORALE EDINBURGENSE.

REC. Balsami Tolutani,
Benzoës electæ,
Styracis calamit.
Myrrhæ electæ ana drachmas tres,
Croci optimi drachmas duas,
Spiritus Vini rectificati uncias viginti.
Digerantur, atque post sufficientem extractionem filtrentur.

Vere balsamicum est hoc Elixir, & tam ad internos, quam externos usus commendabile.

Dosis guttæ triginta ad quadraginta usque.

ELIXIR BALSAMICUM SPIRITUOSUM HOFFMANNI.

REC. Herbæ Scordii unciam unam,
Centaurii minoris,
Flavedinis corticum Aurantiorum,
Myrrhæ electæ ana unciam semis,
Zedoariæ,
Nucistæ ana drachmas tres,
Ligni Aloës drachmam unam semis,
Croci Austriaci drachmam unam,
Succini drachmas tres.
Incisis & contusis superfundatur
Spiritus Vini rectificati libra una semis,
digerantur, post sufficientem digestionem exprimantur, & liquori per filtrum trajecto addantur
Olei Cardamomi,
Caryophyllorum ana guttæ decem, in spiritus salis armoniaci vinosi uncia una solutæ.

Alexipharmacum & anticatarrhale est, ventriculum roborat, chylificationem promovet, & ab Illustri Auctore, præsertim ad diarrhœas chronicas, ex intestinorum lævitate, commendatur.

Dosis guttæ 60. *bis in die.*

ELIXIR BALSAMICUM STOMACHICUM TEMPERATUM HOFFMANNI.

REC. Extracti Absinthii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Gentianæ ana unciam unam,
Flavedinis corticum aurantiorum amarorum, ab omni albedine mundatorum, uncias quatuor.
Affunde
Vini Hungarici optimi libras duas,
Spiritus corticum aurantiorum rectificati uncias duas.

Stent per triduum infuſa in digeſtione, poſtea filtrata reponantur.

Tonum ventriculi roborat, appetitum & concoctionem auget, atque inprimis iis, qui ſpirituoſa non ferunt, inſervit.

Doſis drachma una ad duas.

ELIXIR CORDIALE & STOMACHICUM, vulgo GARRUS.

Pharmacop. Pariſiens.

REC. Aloës Succotrinæ uncias duas ſemis,
Myrrhæ unciam ſemis,
Croci Orientalis drachmas duas,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatæ ana ſcrupulum unum.

Pulveriſatis affunde:
Spiritus Vini rectificati libras duas,
Aquæ fontanæ uncias duas.

Digerantur per viginti quatuor horas, poſtea ex M. B. ad ſiccitatem deſtillentur.

REC. Spiritus hujus prolecti,
Syrupi capillorum Veneris ana libram unam,
Aquæ Naphæ unciam unam.

Miſceantur.

Vires ſunt anodynæ, ſtomachicæ & carminativæ, præſertim vero, in colica, a menſtruo fluxu mulierum non rite ſuccedente orta, commendari poteſt.

Doſis cochlear unum, vel duo.

ELIXIR MYRRHÆ LONDINENSE.

REC. Extracti Sabinæ unciam unam, diſſolvatur in
Eſſentiæ Myrrhæ libra una,
Caſtorei libra dimidia,

poſt ſufficientem digeſtionem Elixir filtretur.

Multum cum Elixir uterino Crollii convenit, atque ad menſium & uteri vitia commendatur.

Doſis guttæ quadraginta ad quinquaginta usque.

ELIXIR PECTORALE REG. DAN.

REC. Radicis Angelicæ uncias tres,
Leviſtici, unciam ſemis,
Florum Chamomillæ Romanæ unciam unam ſemis,
Seminis Aniſi uncias octo,
Fœniculi uncias quinque,
Macis drachmas tres,
Nucum Moſchatarum,
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Cinerum clavellatorum uncias octodecim.

Inciſis & contuſis affundantur, in cucurbita vitrea,
Spiritus Vini rectificati libræ quatuor,
Aquæ Fœniculi libra una;

Stent in digeſtione per triduum. Tunc adde:
Salis armoniaci pulveriſati libram unam,

deſtillentur, juncturis vitri probe clauſis, lento igne, ad reſiduum libræ unius, liquor prolectus volatilis ſuperfundatur
Succi liquiritiæ Hiſpanicæ unciis quinque,
Croci Orientalis drachmis duabus.

Digerantur per aliquot dies, poſtea Elixir, per chartam filtratum, ſervetur.

Eſt ſpiritus vini ſale volatili & oleis vegetabilium impregnatus, ſucco liquiritiæ edulcoratus, & multum convenit cum ſpiritu ſalis armoniaci aniſato, & liquore oleoſo Sylvii, tonum pulmonum roborando, & decubitum humorum tenacium diſſipando. Excellens etiam eſt remedium carminativum, atque ad colicos dolores mitigandos, ventriculum roborandum, & urinam pellendam, commendabile.

Doſis guttæ triginta ſex ad quinquaginta.

ELIXIR PECTORALE WEDELII.

REC. Radicum Helenii,
Iridis Florentinæ,
Scillæ præparatæ ana unciam unam,
Liquiritiæ unciam semis,
Ligni Sandali rubri unciam unam,
Herbæ Rorellæ unciam unam semis,
Seminis Anisi unciam semis,
Benzoës drachmas sex,
Myrrhæ unciam semis,
Gummi Ammoniaci drachmas duas,
Croci drachmas tres.
Extrahantur
Spiritus Vini rectificati libris duabus;
Exprimantur & filtrentur.

Commendatur ab Authore ad asthma, catarrhos, tussim & raucedinem. Resolvit, & in hujus generis morbis non sine fructu adhibetur.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

Nota. Gummi Ammoniacum, Myrrha & Benzoë seorsum infundi, atque post sufficientem digestionem & expressionem, ambæ extractiones commisceri debent.

ELIXIR POLYCHRESTUM HALENSE.

REC. Extracti Panchymagogi unciam unam,
Spiritus Vini rectificati uncias sex,
Vitrioli drachmas tres,
Misceantur, digerantur & serventur.

Vim habet catharticam, atque tam ad alvum stimulandam, in minori dosi ad guttas triginta vel quadraginta, quam in majori, ad alvum ducendam, a guttis sexaginta, usque centum datur.

Pharm. Wirt. P. II.

ELIXIR PROPRIETATIS ALBUM HELMONTII.

REC. Aloës Succotrinæ lucidæ,
Myrrhæ electæ,
Croci optimi ana unciam unam,

In pulverem trita indantur cucurbitæ vitreæ, quæ alembico cæco munita, ad digestionem in Mariæ Balneum reponatur; augeatur ignis per gradus, ut aqua ebulliat, & materia in massam coalescat, atque guttulæ flavæ ad latera cucurbitæ in conspectum veniant. Frigescant & massæ affundatur
Aquæ Cinnamomi spirituosæ libra una,
post digestionem, e Balneo destillentur, & liquor prodiens, sub nomine Elixirii albi, servetur.

Vires sunt balsamicæ, stomachicæ & carminativæ.

Dosis drachma una, vel duæ.

ELIXIR PROPRIETATIS HELVETII.

REC. Myrrhæ electæ,
Aloës Succotrinæ ana unciam unam,
pulverisatis superfundantur
Tincturæ Tartari unciæ octo.

Post solutionem & sufficientem digestionem clarum a spisso separetur, atque cum tinctura ex uncia una croci Orientalis & tinctura tartari, unciis quatuor, parata permisceantur.

Addantur
Olei Cinnamomi scrupuli duo
serventur.

Vires cum Elixir Proprietatis dulcis conveniunt; gratius tamen est propter Oleum cinnamomi, & penetrantius propter Tincturam Tartari.

Dosis guttæ triginta ad quadraginta cum vino vel vehiculo aquoso exhibendæ.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM ACIDO BOERHAVE.

REC. Myrrhæ,
Aloës,
Croci Auſtriaci ana unciam unam.
Tritis affunde
Aceti vini albi libras quatuor;

Immittantur cucurbitæ vitreæ, ebulliant leniſſimo igne, per aliquot horas. Frigefacta requieſcant, ut fæces ſubſideant; liquorem clarum per inclinationem a fæcibus effunde, reſiduo adde
Novi aceti libras duas,

Ebulliant iterum, ut prius; frigeſcant, atque, ut ſpiſſum a claro ſeparetur, quieſcant, effundatur clarum, & cum priori extractione per telam raram coletur.

Tincturas miſtas leni igne, ex cucurbita vitrea, deſtilla, ut unciæ decem reſtent, quibus adde
Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias decem.

Digerantur, filtrentur & ſerventur.

Egregium celeberrimo Authori eſt remedium, acidum, aromaticum, in praxi medica infiniti uſus. In febre intermittente, ſcorbuto, hypochondriaco malo, ictero, cachexia, ſanguinem ſua balſamica virtute imbuit, putredini reſiſtit, vermes necat. Externe ulcera putrida, janioſa, fœtida, fiſtuloſa emendat, depurat, labiorum, gingivarum, linguæ & faucium ulcera ſanat.

Dari poteſt juxta Auctorem a drachma dimidia, ad drachmas duas, ex vino, vel alio vehiculo; qui & vel mane vacuo ventriculo, vel ad minimum, duodecim horis a paſtu, ſumere jubet.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO BOERHAVE.

REC. Aloës optimæ,
Croci,
Myrrhæ ana unciam unam.

Trita immittantur cucurbitæ vitreæ, affundatur liquor ex
Tartari tartariſati unciis tribus, in
Aquæ fontanæ unciis ſex ſolutis, paratus.

Digerantur per triduum in Balneo, & ſpeciebus integre ſolutis ſuperfundantur
Spiritus vini rectificatiſſimi libræ duæ,

Denuo digerantur, eo calore, ut ad finem ebulliant. Frigeſcant, & poſtquam per quetem ſpiſſum ſubſederit, clarum effundatur, novaque
Spiritus vini libra una ſuperfuſa

Digeſtio continuetur; ſeparetur dehinc clarum, & repetatur, donec omnia fere ſoluta ſint, omnes liquores filtrentur per chartam bibulam, & ſpiritus ſuperflui eo usque, per deſtillationem evocentur, donec unciæ viginti reſtent, quæ ſerventur pro Elixirio.

Elixir hoc ſale medio paratum prodeſt in obſtructionibus chronicis & inveteratis morbis; potenter reſolvit, nec acido, nec alcalino ſuo principio, noxium eſt.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM ACIDO PARACELSI.

REC. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ ana uncias duas,
Croci optimi unciam unam,
In pulverem tritis affunde
Spiritus Vini rectificati, per octiduum cum Spiritus Sulphuris unciis tribus digeſti, libram unam ſemis.
Stent in digeſtione per aliquot dies; liquorem tinctum effunde, atque ſpeciebus denuo
Spiritus ejusmodi libram dimidiam ſuperfunde.

Poſt digeſtionem extractiones conjunge, atque per chartam bibulam filtratas ſerva.

Multum de hoc Elixirio author Paracelſus, pro more ſuo, promittit, ad vitam ſanam & longam, ad pleros-que morbos, etiam peſtem, vincendos. Ven-

Ventriculum roborat, digestionem adjuvat, vermes necat, menses & hæmorrhoides movet. Caute igitur hoc, & aliis medicamentis aloëticis uti debent hypochondriaci, biliosi, hæmorrhoidarii, & ad hæmorrhagias dispositi.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO, sive DULCE.

REC. Myrrhæ electæ,
Aloës Succotrinæ,
Croci optimi, ana unciam unam semis,
In pulverem redactis addantur
Olei Tartari, per deliquium parati, unciæ duæ, misceantur,
ut pultis consistentiam induant, & digestis in vitro commodo, probe obturato, per viginti quatuor horas, affunde
Spiritus Vini rectificatissimi libras duas;
Stent in digestione balnei quatuor dies, vase exactissime clauso, agitando aliquoties de die vas, donec saturate rubens extractum sit Elixir.

Satis efficax remedium est ad morbos ventriculi, a causa frigida ortos, alvum simul stimulat, digestionem promovet; sanguinem autem exagitat, uti reliqua aloëtica.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

ELIXIR PROPRIETATIS CUM RHABARBARO.

REC. Aloës Succotrinæ drachmas sex,
Myrrhæ electæ drachmas duas,
Croci orientalis drachmam unam semis,
Rhabarbari optimi unciam semis.
Concisis & contusis, in phiala capaci affunde
Vini Malvatici generosi uncias octo,
Spiritus Salis rectificati unciam unam;
Stent, vase optime obturato in loco tepido per octiduum, tum filtrentur & serventur.

Ad ventriculum & intestina expurganda & roboranda, hepatis & hypochondriorum obstructiones expediendas, appetitum excitandum, mulierum menstruas purgationes in ordinem redigendas, & vermes necandos atque expellendos commendatur.

Dosis guttæ quinquaginta ad octoginta.

ELIXIR SALUTIS.

REC. Radicum Enulæ,
Liquiritiæ,
Rhabarbari veri ana unciam unam,
Foliorum Sennæ Orientalium uncias duas,
Seminis Anisi,
Carvi,
Coriandri ana unciam unam,
Uvarum passarum, absque acinis, uncias quatuor,
Salis Tartari drachmas duas.
Incisis & contusis affunde
Aquæ fontanæ ferventis libram unam, refrigeratis adde
Spiritus Vini rectificati libras duas,
Digerantur, & post sufficientem extractionem exprimantur & filtrentur.

Commendatur illis, qui a tarditate alvi & flatibus vexantur.

Dosis drachmæ duæ ad unciam semis.

ELIXIR VITÆ MATTHIOLI; JUXTA DISPENSAT. VIENNENS.

REC. Radicum Galangæ minoris,
Zinziberis,
Zedoariæ ana unciam unam,
Calami aromatici,
Foliorum Majoranæ,
Menthæ,
Thymi,
Serpilli,
Florum Rosarum,
Salviæ,
Rorismarini ana unciam semis,

Seminis Anisi,
Fœniculi ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti uncias tres,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Macis ana unciam unam,
Cubebarum,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Cardamomi minoris ana unciam semis,
Corticum Citri recentium uncias tres,

Incisa & contusa macerentur in Spiritus vini rectificati libris duodecim per triduum, postea addantur aquæ fontanæ libræ quatuor,

& lento igne ex Balneo destillentur circiter libræ tredecim.

Si completum desideretur Elixir,
Ambræ griseæ &
Moschi ana scrupuli duo,
addantur, atque, pro lubitu,
Croco tingatur.

Singularis efficaciæ prædicatur hæc aqua spirituosa, Elixir Vitæ dicta, tam interne, quam externe adhibita. Epilepticis, animo deficientibus, præcipue autem in morbis a causa frigida ortis, commendatur. Flatus discutit, ventriculum roborat.

Dosis a drachma una ad unciam semis.

ELIXIR VITÆ MULIERUM.

Videatur AQUA EMBRYONUM correctior.

ELIXIR VITRIOLI MYNSICHTI.

REC. Calami aromatici unciam unam,
Galangæ minoris unciam unam semis,
Zinziberis albi drachmas tres,
Menthæ crispæ,
Salviæ acutæ ana unciam semis,
Caryophyllorum,
Cinnamomi electi ana drachmas tres,
Cubebarum,
Nucis Moschatæ ana drachmas duas,
Ligni Aloës ponderosi,
Corticum Citri ana drachmam unam.

Incisis & contusis superfunde
Spiritus vini rectificati libram unam semis,

Macerentur per quatuordecim dies, deinde addantur
Spiritus Vitrioli unciæ duæ,

Digerantur per sex dies, tum expressa per emporeticam colentur.

Residuo
Spiritus Vini uncias quinque vel sex affunde,

Digere, & essentiam reliquam extrahe, quam cum priori conjunge, &
Sacchari albi, parum tosti, unciis quatuor superfunde,

atque post digestionem, a fecibus mediante filtro separatam, serva.

Stomachicum est egregium, præsertim biliosis convenit, & appetitum excitat.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta quinque.

ELIXIR UTERINUM.

REC. Herbæ Artemisiæ uncias tres,
Incisis affunde
Spiritus Vini rectificati uncias quindecim,
Extracta per digestionem, exprime, & colatam hanc essentiam affunde
Castorei Orientalis unciæ uni semis,
Croci pulverisati unciæ semis.

Digerantur leni calore, exprimantur, & per chartam bibulam filtratis adde
Olei destillati Anisi,
Angelicæ,
Succini ana guttas quadraginta.

Serventur.

Perspicit B. L. præcipua Elixiris Crolliani ingredientia heic servari,

vari, reliqua, ex justis rationibus, partim omitti, partim ipsum præparationis modum mutari.

Commendatur ad uteri morbos, mensium retentionem, fluorem album, &c.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

REC. Olei libras duas,
Cerussæ libram unam semis,
Ceræ albæ uncias quatuor,

Cerussam cum oleo, leni igne, ad debitam consistentiam coquendo, sub coctione modicum aquæ fontanæ continuo instillando, & tandem ceram in eo liquefaciendo, fiat emplastrum.

Leves cutis exulcerationes, intertrigines sanat; siccat, refrigerat, & vulneribus ac ulceribus cicatricem inducit.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

REC. Unguenti Dialtheæ unciam unam semis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Resinæ Pini unciam unam.

Super ignem colliquatis & colatis adde
Pulveris radicis Bryoniæ,
Iridis Florentinæ,
seminis Fœni græci ana drachmas sex.

Misceantur, & in fine addantur,
Gummi Ammoniaci, in aceto soluti, unciæ duæ,
Emplastri de Meliloto uncia una.

Fiat emplastrum.

Emollit & discutit, maturat & dolores mitigat.

EMPLASTRUM ANTIPODAGRICUM.

REC. Olei seminis Hyoscyami,
Papaveris,
Lini ana uncias quatuor,
Minii rubri libram unam,
Aquæ Sambuci libram semis.

Coque lento igne, ad solutionem Minii; adde
Saponis Veneti uncias tres;

Hoc soluto adjiciantur,
Ceræ citrinæ unciæ duæ.

Fiat lege artis emplastrum.

Viribus paregoricis hoc præfertur emplastro saponato Barbette, tenuiter super lintea extensum, partibusque dolentibus & spasmo affectis superpositum, dolores mitigat.

Nobis tamen, uti tantum non omnia, maxime vero repellentia, emplastica, contra dolores podagricos minus tutum videtur.

EMPLASTRUM PRO APOPLECTICIS.

REC. Gummi Galbani,
Opopanacis ana drachmas duas,
Radicum Pyrethri,
Piperis longi,
Castorei ana drachmam unam,
Terebinthinæ Venetæ drachmas tres,
Olei destillati Succini scrupulum unum.

Fiat emplastrum.

In morbis soporosis, apoplexia & paralysi, capiti raso applicari potest.

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

REC. Baccarum Lauri uncias quatuor,
Cyperi rotundi,
Costi amari, vel corticis Winterani,
Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ ana unciam unam.

Fiat omnium pulvis; postea

REC. Ceræ citrinæ uncias octo,
Resinæ uncias duas,

Super ignem liquatis adde
Olei laurini,
Terebinthinæ ana uncias duas.

Quibus pulverem reliquorum immisce, ut fiat emplastrum.

Discutit & resolvit; hinc in tympanitide, hydrope, & affectibus a flatibus ortis, abdomini super imponitur.

EMPLASTRUM, sive CERATUM DE BETONICA.

REC. Ceræ flavæ,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ ana uncias duas.

Liquefactis resina & cera, colatisque, ac aliquantum refrigeratis Terebinthinam adde, hisque unitis pulveres subtilissimos
Betonicæ unciam unam,
Mastiches,
Mumiæ,
Thuris ana drachmas duas.

M. Fiat emplastrum.

Chirurgi hoc emplastro utuntur in contusionibus & vulneribus capitis; est etiam ad cephalalgiam, catarrhos & alios capitis morbos utile; capillis prius derasis vertici imponitur, & temporibus applicatur.

EMPLASTRUM CAPUCINORUM.

REC. Gummi Ammoniaci,
Olibani,
Mastichis,
Tutiæ præparatæ ana unciam unam,
Euphorbii,
Pyrethri,
Salis communis ana uncias duas,
Picis navalis uncias tres,
Terebinthinæ unciam,
Ceræ flavæ uncias tres.

Pix, terebinthina & cera leni igne fundantur, quibus colatis reliqua in pulverem trita immisceantur.

Rev. Patres Capucini, qui preces per multas horas, genibus flexis exsequuntur, hoc emplastro uti solent, ad nodos duros resolvendos; unde nomen.

Potenter resolvit & discutit. Propter Euphorbium etiam rubefaciens est, hinc cum circumspectione & caute applicandum.

EMPLASTRUM DE CERUSSA.

Videatur EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

EMPLASTRUM DE CICUTA, CUM AMMONIACO.

REC. Succi Cicutæ uncias sedecim,
Aceti scillitici,
Gummi Ammoniaci ana uncias octo.

Dissolvatur Gummi ammoniacum in aceto scillitico, coletur, & addito succo cicutæ, rursus inspissetur ad pultis consistentiam, addantur,
Pulveris Cicutæ unciæ octo,
Ceræ liquatæ libra una,
Olei Capparum unciæ quatuor.

Misceantur leni calore, ut fiat emplastrum.

Potentissimum est resolvens & emolliens, hinc in scirrhis & tumoribus, præcipue lienis, adhibetur.

EMPLASTRUM, sive CERATUM CITRINUM.

REC. Resinæ libram unam,
Ceræ citrinæ uncias octo,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ uncias duas.

Fiat emplastrum, omnia liquando & colando, atque pro colore pulveris
Curcumæ unciam semis addendo.

Ad ulcera & vulnera maturanda valet.

EMPLASTRUM AD CLAVOS ET VERRUCAS PEDUM.

REC. Galbani unciam unam,
Picis navalis unciam semis,
Diachyli simplicis drachmas duas,
Viridis æris,
Salis armoniaci ana scrupulum unum.

Gal-

Galbano in aceto diſſoluto, & ad ſpiſſitudinem evaporato, addatur pix & emplaſtrum diachylon, in fine ſal armoniacum & viride æris pulveriſata. Fiat emplaſtrum.

Super verrucas & clavos in pedibus, dolorem & impedimentum inceſſui adferentes, poſitum, tertio aut quarto die juviſſe, deprehenſum eſt.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

REC. Cruſtæ panis, abunde fermentati, mediocriter toſtæ, in pulverem tritæ, & aceto forti maceratæ, uncias duas,
Tacamahacæ unciam unam,
Maſtiches electæ,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucis Moſchatæ,
Menthæ ana unciam ſemis,
Ceræ citrinæ uncias ſex,
Terebinthinæ,
Olei Maſtiches,
Cydoniorum ana unciam unam.

Ceræ, cum terebinthina colliquatæ, olea & reliqua commiſcendo, fiat emplaſtrum.

Stomachale eſt, inque vomitionibus puerorum, & ubi concoctio non recte ſuccedit, ventriculi regioni applicatur.

EMPLASTRUM DE CUMINO.

REC. Ceræ citrinæ,
Emplaſtri Diapalmæ,
Olei Olivarum,
Seminis Cumini ana uncias ſex,
Baccarum Lauri uncias duas,
Olei deſtillati Cymini drachmam unam.

Cera, oleum & emplaſtrum leni igne liquentur, quibus pulvis ex cumino & lauri baccis optime immiſceatur; tandem Oleum deſtillatum Cymini addatur & emplaſtrum, veſicæ bubulæ involutum, reponatur.

Reſolvit, flatus diſcutit, roborat, tympaniticis & hyſtericis prodeſt.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM FELICIS WURZII.

REC. Ceræ citrinæ libram unam,
Reſinæ uncias duas,
Sevi hircini uncias ſex,
Terebinthinæ unciam unam,
Pulveris herbæ Alchimillæ uncias ſex.

Miſce, fiat emplaſtrum.

NB. Si viridius deſideretur, ſingulis libris emplaſtri hujus adjicito Indici coloris cœrulei, optime triti, ſcrupulum unum, vel drachmam dimidiam.

Leniter adſtringit, refrigerat, & nimium affluxum humorum a partibus affectis arcet.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

REC. Ceræ flavæ libras duas,
Reſinæ unciam unam,
Olei Roſarum uncias quatuor,
Calcis vivæ, in aqua roſarum lotæ, & iterum exſiccatæ
Laterum, vel tegularum,
Boli Armenæ ana drachmas decem,
Minii ſubtiliſſimi unciam ſemis,
Camphoræ, in oleo ſolutæ, drachmas duas.

Calx, tegulæ & bolus in pollinem ſubtiliſſimum redacta, immiſceantur ceræ & reſinæ cum oleo liquefactis, quibus ſemi refrigeratis camphora additur, & fiat emplaſtrum.

Imponitur ad inflammationes arcendas, præcipue in vulneribus & ulceribus, ad præcavenda ſymptomata, & partes roborandas.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM WEPFERI.

REC. Butyri recentis,
Olei Lini ana uncias ſex,
Corticum viridium Sambuci recentium uncias quatuor.

Coquantur leni igne, ad humiditatis consumtionem; exprimantur. Expresso addantur
Ceræ flavæ,
Minii rubri ana unciæ sex.
Misceantur, fiat emplastrum.
Usus est in ulceribus antiquis, & per vesicatoria excitatis, ubi inflammationis metus est; in cancro ipso exulcerato palliative confert, & dolores mitigat.

EMPLASTRUM DIABOTANUM BLONDELLI.

REC. Herbarum recentium, cum radicibus, Bardanæ,
Petasitidis,
Calendulæ,
Cicutæ,
Chamæpytheos,
Levistici,
Valerianæ majoris,
Angelicæ hortensis,
Enulæ campanæ,
Raphani rusticani,
Cucumeris silvestris,
Scrophulariæ,
Illecebræ, sive Sedi teretifolii,
Chelidonii majoris,
Chelidonii minoris,
Gratiolæ ana uncias tres.
Coque in aquæ fontanæ libris viginti, ad dimidias, cola, & expressis adde
Succorum Cicutæ,
Chelidonii majoris,
Hormini ana libras duas,
Illecebræ libram semis,
Evapora ad extracti mollioris consistentiam; hujus extracti
Recipe libram semis, admisce
Gummi Galbani,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, omnium in aceti scillitici sufficienti quantitate solutorum, & iterum inspissatorum, uncias duas, repone.
Dehinc
REC. Lithargyrii pulverisati libram unam,
Olei Lumbricorum,
de Catellis,
Meliloto,
Mucilaginibus ana uncias quatuor.
Aquæ fontanæ uncias decem.
Coque una ad emplastri consistentiam, cui successive admisce extractum, cum gummis permixtum, &
Sulphuris vivi, tenuissime triti, uncias septem semis,
Radicum Iridis Florentinæ,
Cyclaminis,
Ranunculi tuberosi,
Coronæ imperialis,
Serpentariæ,
Ellebori albi ana drachmas tres,
Sigilli Salomonis,
Ari ana unciam semis,
trium Aristolochiarum ana drachmam unam,
Baccarum Lauri drachmas duas,
Seminum Angelicæ,
Nasturtii ana drachmas tres,
Cumini unciam unam semis,
Fimi columbini unciam semis,

Pul-

Pulveris Bituminis judaici,
Olibani,
Maſtiches ana uncias quatuor,
Tacamahacæ uncias ſex,
Bdellii,
Myrrhæ ana unciam unam ſemis.

His permiſcendo adde ſucceſſive
Ceræ citrinæ &
Picis liquatæ ana libram ſemis;

tandem admiſce
Styracis liquidæ repurgatæ uncias ſex,
Camphoræ drachmas ſex, in
Olei Caryophyllorum uncia ſemis ſolutæ,
Olei de Lateribus drachmas decem.

Fiat emplaſtrum.

Nomen habet ab inſigni vegetabilium quantitate, ex quibus componitur.

Reſolvit tumores pituitoſos & ſcirrhoſos, & præfertur a nonnullis emplaſtro de ranis.

EMPLASTRUM DIACHALCITEOS.

Vide EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

EMPLASTRUM DIACHYLON COMPOSITUM, ſive CUM GUMMI.

REC. Emplaſtri Diachyli ſimplicis libram unam, adde
Gummi Ammoniaci,
Galbani, in aceto ſolutorum, ana unciam unam,
Croci pulveriſati drachmam unam ſemis.

Miſceantur.

Emollit, maturat, & digerit abſceſſum fientem, jam vero facti atque rupti reliquam duritiem reſolvit, ac emollit egregie.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

REC. Mucilaginum Fœni græci,
Lini,
Radicum Altheæ ana libram unam,
Olei clari Olivarum libras tres,
Lithargyrii, in ſubtiliſſimum pulverem triti, libras duas,

Coque Oleum & Lithargyrium leni igne, perpetua agitatione, ſemper unciam unam aut alteram aquæ fontanæ inſtillando, ad ſolutionem Lithargyrii, & emplaſtri albi, ſubgriſei conſiſtentiam.

Poſtea addantur mucilagines, & continuata lenta coctione, ad juſtam emplaſtri conſiſtentiam redigantur.

Juvat maturationem tumorum durorum, ad ſuppurationem tendentium.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ, ſive DIACHALCITEOS.

REC. Axungiæ porcinæ,
Olei Olivarum,
Foliorum Quercus teneriorum ana libras duas,

quæ conſcindantur & impaſtentur cum axungia & oleo; poſtea coquantur ad humiditatis conſumtionem, colentur & exprimantur. Colaturæ adde
Lithargyrii, in ſubtiliſſimum pollinem triti, libras duas.

Lentiſſimo igne, ſub perpetua agitatione, una coquantur, ſemper de ſolutione
Vitrioli unciarum trium, in Aquæ fontanæ libris duabus

facta, parum inſtillando, donec conſiſtentiam emplaſtri acquiſiverint, coloris albi ſubcinerei.

Deſiccat; hinc ad ulcera ſordida, œdemata & contuſiones, abs chirurgis adhibetur.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYNSICHTI.

REC. Ceræ flavæ uncias undecim,
Colophoniæ,
Bdellii ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi Ammoniaci,
Terebinthinæ puræ ana uncias duas,
Galbani,
Sandarachæ ana unciam unam,
Mastiches,
Thuris electi ana unciam semis.

Cera cum Colophonia liquetur & coletur; quibus, ab igne sepositis & semifrigeratis, Terebinthina & reliqua in pulverem contrita immiscendo, fiat secundum artem emplastrum.

Potenter discutit ac humores extrahit, tonum confortat, in ischiatico malo, parotidibus, tumoribus œdematosis pedum, & luxationibus applicari solet.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

REC. Olei Solani libras duas semis,
Ceræ albæ uncias triginta,
Cerussæ,
Plumbi usti ana libram semis,
Pompholygos,
Olibani ana uncias quatuor,

Cerussa & oleum lenissimo igne, una cum
Aquæ Solani libra una
coquantur, ad unguenti spissioris consistentiam; quibus addatur Cera alba, &, cum sub perpetua agitatione fere refrixerint, reliqua subtilissime trita, admisceantur.

Refrigerat, exsiccat & dolores lenit.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS RULANDI.

REC. Balsami Sulphuris Rulandi,
Ceræ citrinæ,
Colophoniæ ana uncias sex,
Pulveris Myrrhæ uncias octodecim.

Misce, fiat emplastrum.

Resolvit, mundat, exsiccat, & consolidat; atque inprimis ad resolvendas strumas laudatur.

EMPLASTRUM DIVINUM.

REC. Lithargyrii optime triti libram unam semis,
Olei Olivarum libras tres.

Coquantur lento igne, sub perpetua agitatione, ad emplastri consistentiam, adde
Ceræ flavæ uncias octo,
Lapidis Magnetis præparati libram dimidiam,
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii ana uncias tres,
Myrrhæ,
Olibani,
Mastiches,
Æruginis,
Aristolochiæ rotundæ, omnium subtilissime tritorum, ana unciam unam semis,
Terebinthinæ uncias quatuor.

Probe mixta serventur.

Cum emplastro Opodeldoch convenit, & nomen videtur sortitum esse ob egregias vires resolventes, detergentes & confortantes.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ.

REC. Ceræ albæ,
Sevi cervini ana libram unam,
Axungiæ Anseris,
Gallinæ ana libram semis.

Fundantur lento igne, fiat emplastrum.

Anodynum est, resolvit, ad pleuriticos & spasticos dolores, pectori applicitum, commendatur.

EM-

EMPLASTRUM AD FRACTURAS ET LUXATIONES.

REC. Ceræ libram ſemis,
Picis libram unam,
Terebinthinæ uncias duas.
Super ignem liquatis inſpergantur
Pulveres radicum Conſolidæ majoris,
Barbæ caprinæ,
Boli Armenæ ana unciæ duæ.
Probe mixta ſerventur.

Luxationibus ac fracturis oſſium a chirurgis imponitur.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM MYNSICHTI.

REC. Gummi Galbani in aceto ſoluti,
Emplaſtri de Meliloto,
Diachyli ſimplicis ana uncias tres,
Ceræ,
Terebinthinæ ana unciam unam,
Croci Orientalis pulveriſati drachmas ſex.
Miſce, fiat emplaſtrum.

Tumores duros emollit, reſolvit, dolores mitigat.

EMPLASTRUM GRISEUM.

REC. Lapidis calaminaris præparati unciam unam,
Lithargyrii uncias duas,
Thuris electi,
Maſtiches ana unciam ſemis,
Myrrhæ drachmas duas,
Tutiæ præparatæ unciam ſemis,
Ceræ uncias tres,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ unciam unam ſemis,
Camphoræ drachmam unam ſemis.
Cera & ſevo liquatis, Terebinthina addatur, quibus ſemi-refrigeratis pulveres, ſub perpetua agitatione piſtillo ligneo, admiſceantur, tandem Camphora, cum pauxillo Spiritus vini trita, adjiciatur. Fiat emplaſtrum.

Siccat ulcera, & cicatricem accelerat.

EMPLASTRUM PRO HERNIOSIS.

REC. Terebinthinæ Venetæ uncias quatuor,
Maſtiches electæ unciam unam ſemis.
Liquefiant invicem, quibus adde
Ceræ flavæ uncias ſex,
Pulveris Myrrhæ,
Olibani,
Sanguinis Draconis ana drachmas ſex,
Radicis Symphyti majoris,
Seminis Perfoliatæ ana unciam unam,
Lapidis Hæmatitæ præparati,
Vitrioli ad flavedinem calcinati ana unciam ſemis,
Fiat emplaſtrum.

Plus emolumenti infantibus, quam adultis, ab ejusmodi emplaſtris expectare licet, & adultioribus, niſi bracherio commodo muniti ſint, vix quidquam proderit.

EMPLASTRUM DE HYOSCYAMO.

REC. Olei e ſeminibus Hyoſcyami expreſſi,
Succi Hyoſcyami ex herba ana libram unam.
Coquantur ad humiditatis conſumtionem; colaturæ adde
Ceræ citrinæ uncias quindecim,
Terebinthinæ unciam unam ſemis,
Pulveris herbæ Hyoſcyami uncias duas.
Miſceantur, fiat emplaſtrum.

Ad rhevmaticos dolores, tumores partium glanduloſarum, earum inflammationes, atque ſplenis affectus laudatur.

EMPLASTRUM INCOGNITUM.

Videatur EMPLASTRUM SANTALINUM.

EMPLASTRUM ISCHIATICUM.

REC. Picis navalis uncias duas.
Gummi Galbani unciam unam,
Sulphuris vivi,
Succini citrini ana drachmas duas,
Seminis Cymini,
Florum Chamomillæ ana drachmam unam semis,
Olei petræ rubri unciam dimidiam.

Galbanum in aceto solvatur, atque cum pice optime permisceatur, quibus addantur reliqua in pulverem trita, & denique oleum petræ instilletur; præstat tamen emplastrum tempore usus demum Petroleo malaxare.

Discutit, resolvit & roborat, atque egregie in doloribus ischiaticis, aliisve rhevmaticis conducit.

EMPLASTRUM DE LAURI BACCIS.

Videatur EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

REC. Sagapeni,
Ammoniaci,
Galbani ana uncias tres,
in aceto dissolutis adde
Ceræ flavæ,
Terebinthinæ ana uncias quinque,
Magnetis arsenicalis subtilissime triti uncias tres,
Terræ Vitrioli dulcis,
Olei Succini rubri ana unciam unam.

Misceantur exacte & serventur.

Maturat & attrahit. Usus præcipuus est in carbunculis pestilentialibus.

EMPLASTRUM MALACTICUM CUM GUMMI.

REC. Ceræ citrinæ uncias tres,
Terebinthinæ drachmas decem,
Sevi cervini,
Resinæ ana unciam unam,
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Pulveris Curcumæ,
Fœni græci,
Lini ana unciam semis,
Altheæ drachmas duas,
Farinæ Fabarum,
Tritici ana drachmas tres.

Ceræ, sevo & resinæ liquefactis, colatis, postea ab igne sepositis & semi refrigeratis, pulveres ac terebinthinam immiscendo, fiat emplastrum.

Emollit, resolvit & maturat.

EMPLASTRUM MALACTICUM SINE GUMMI.

REC. Ceræ citrinæ uncias octo,
Terebinthinæ,
Colophoniæ ana uncias tres,
Olibani uncias duas,
Tartari albi drachmas duas,
Myrrhæ,
Seminis Fœni græci,
Lini ana unciam unam,
Radicum Altheæ,
Curcumæ,
Farinæ Fabarum ana uncias duas,
Olei Lini unciam unam semis.

Misceantur, fiat emplastrum.

Viribus cum antecedente convenit.

EMPLASTRUM MAMMILLARE.

REC. Spermatis ceti uncias duas,
Emplastri de Spermate ranarum, unciam unam semis,
Olei chamomillæ cocti, drachmas sex.

Fundantur leni igne; addantur
Pulveris seminis carvi uncia,
Olei destillati carvi drachmæ duæ,

Cam-

Camphoræ drachma una.

Misceantur, fiat Emplastrum.

Tensiones dolorosas mammarum, a lactis abundantia, mitigat, coagulationem lactis impedit, & coagulatum resolvit.

EMPLASTRUM MATRICALE.

REC. Gummi Galbani,
Sagapeni,
Asæ fœtidæ ana unciam unam semis.

Solvantur in aceti Rutæ sufficienti quantitate, atque ad spissitudinem pultis redigantur; adde
Terebinthinæ Venetæ unciam unam semis,
Ceræ citrinæ, seorsim liquatæ & aliqualiter refrigeratæ, uncias quatuor,
Myrrhæ unciam unam,
Castorei drachmam unam,
Olei destillati Angelicæ,
Succini ana scrupulum unum.

Misce.

In uteri affectibus prodest; calefacit, flatus discutit, & dolores sedat, abdomini impositum.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

REC. Herbæ & florum Meliloti uncias quatuor,
Florum Absinthii,
Chamomillæ,
Baccarum Lauri,
Seminis Apii ana drachmas sex,
Styracis unciam semis,
Gummi Ammoniaci unciam unam.

Optime in pulverem trita excipiantur
Ceræ citrinæ unciis octo,
Sevi hircini unciis quatuor,
Terebinthinæ,
Resinæ ana uncia una semis,
Olei Chamomillæ unciis duabus.

Fiat emplastrum.

Ad inflammationem & tumores glandularum maxillarium, & parotidum resolvendos adhibetur.

EMPLASTRUM MERCURIALE.

REC. Emplastri diachyli simplicis libram unam,
Gummi ammoniaci libram semis,
Mercurii vivi uncias octo,
Terebinthinæ unciam unam,
Styracis liquidæ unciam semis.

Misce secundum artem.

Cum Emplastro de ranis cum mercurio, convenit, & breviori manu paratur.

EMPLASTRUM sive CERATUM DE MINIO RUBRUM.

REC. Ceræ citrinæ,
Sevi cervini,
Olei Rosarum ana libram semis;

Cera & Sevo liquatis atque fere refrigeratis, adde
Minii rubri, cum Oleo rosato optime triti, uncias sex,
Camphoræ drahmam unam semis.

Fiat emplastrum molle.

Ad partes inflammatas, ambustas, & e vesicatorio applicito suppurantes & dolentes, demulcendas, leniendas atque consolidandas inservit.

EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

REC. Cerussæ libras duas,
Lithargyrii,
Minii ana libram semis,

subtilissime tritis adde
Olei Olivarum libras tres.

Coquantur lenissimo igne, addantur
Saponis Veneti rasi unciæ quatuor,

solutis, & ad emplastri paulo durioris

rioris consistentiam coctis, admisceantur
Camphoræ uncia una,
Baccarum Lauri, subtilissime tritarum, uncia semis.

Polychrestum & miraculosum quasi habetur ad ulcera antiqua & vulnera etiam noviter inflicta.

EMPLASTRUM NERVINUM HOFFMANNI.

REC. Gummi Ammoniaci,
Resinæ Elemi ana unciam semis,
Tacamahacæ,
Mastiches,
Olibani ana drachmas tres,
Carannæ drachmas sex,
Succini citrini drachmas duas.

Omnia pulverisata excipiantur
Terebinthinæ Venetæ unciis duabus,
Ceræ flavæ libra semis.

Fiat emplastrum.

Ad nervorum, artuum & ischiaticos dolores utile est, roborat & attrahit; hinc etiam ad luxationes adhiberi potest.

EMPLASTRUM DE NICOTIANA *LE MORT.*

REC. Nicotianæ uncias quatuor,
Olei olivarum libram unam,
Vini rubri uncias quinque.

Coquantur leni igne ad consumtionem humiditatis, exprimantur, & expresso addantur
Ceræ citrinæ,
Colophonii ana libra una.

Admisceatur
Tacamahacæ,
Elemi,
Myrrhæ,
Aloës ana uncia una,
Olei Tabaci per descensum destillati unciæ duæ.

Fiat emplastrum.

Commendatur ab Authore spleneticis. Abdomini impositum, alvum obstructam reserare expertum est.

EMPLASTRUM NORICUM

REC. Olei rosati libram unam,
Minii rubri uncias octo,
Aceti Vini uncias quatuor.

Coque ad emplastri, brunei coloris & mollioris consistentiam; adde
Ceræ citrinæ unciam unam semis,
Camphoræ drachmas duas.

Misce, effunde in scatulas.

Ulcera exsiccat, & nervosas partes roborat.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

REC. Tacamahacæ,
Elemi,
Mastiches electæ ana unciam unam,
Opii drachmas duas;

Omnia probe trita excipiantur
Terebinthinæ claræ Venetæ drachmis duabus.

Misce, fiat emplastrum.

Non solum ad dolores dentium, sed & cephalalgiam & defluxiones catarrhales inservit. Spatula calefacta super sericum extenditur, atque temporibus applicatur.

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

REC. Lithargyrii triti libram unam semis,
Olei Olivarum libras duas.

Coque lento igne, additis
Aceti Vini, &
Aquæ fontanæ ana unciis quatuor,
ad colorem dilute fuscum.

His adde
Ceræ flavæ libram semis,
Terebinthinæ uncias quatuor,
agitentur pistillo ligneo, ut citius refrigescant & spissescant, addantur
Gummi Ammoniaci,
Bdellii ana unciæ duæ,
Galbani,

Opo-

Opopanacis ana uncia una,
in Aceto solutis, & in mellis consistentiam redactis
Pulveris Aristolochiæ rotundæ veræ,
Aristolochiæ longæ veræ,
Lapidis calaminaris præparati,
Thuris,
Myrrhæ,
Mastiches ana uncia una,
Olei Laurini uncia una semis.

Commisceantur, semper agitando, usque dum refrigescant.

Vulnera sanare, spicula, tela, aut vulneribus illapsa extrahere, affluxus humorum arcere, & symptomata periculosa præcavere credunt.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

REC. Ceræ,
Picis,
Colophoniæ ana libram unam,
Croci,
Terebinthinæ,
Galbani,
Ammoniaci,
Myrrhæ,
Olibani,
Mastiches ana uncias quatuor.

Cera, pix & colophonia invicem liquentur & colentur, quibus dein, ab igne sepositis & semirefrigeratis, terebinthina addatur, postea reliqua, in pulverem subtilissimum redacta, ammoniacum, galbanum & crocus, aceto soluto, jungantur, fiatque emplastrum.

In luxationibus, & doloribus inde ortis, resolvendo & vi paregorica efficax deprehenditur; propter calorem vero, quem conciliat, ab usu diuturno abstinendum esse, nonnulli monent.

EMPLASTRUM DE PANIS CRUSTA.

Videatur EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

EMPLASTRUM DE RANIS, SINE MERCURIO.

REC. Ranarum viventium decem,
Lumbricorum terrestrium viventium uncias quatuor,
Schœnanthi,
Stœchadis Arabicæ,
Matricariæ,
Croci orientalis ana drachmas quatuor,
Radicum Enulæ,
Ebuli ana uncias tres,
Vini albi libras duas,
Aceti Vini optimi libram unam semis.

Incidantur incidenda, & lento igne ad dimidias coquantur & colentur; colaturam serva. Postea recipe
Olei Olivarum uncias duodecim,
Lithargyrii optime triti totidem.

Coquantur lenissimo igne, spatula semper agitando, & decocti superioris subinde addendo, ad consistentiam emplastri durioris. Ab igne remotis adde
Olei Laurini expressi,
Terebinthinæ claræ,
Ceræ flavæ ana uncias duas,

his liquatis
Pulveris Olibani drachmas sex,
Euphorbii drachmas quinque,
Styracis liquidæ unciam semis.

probe pistillo ligneo commiscendo, fiat emplastrum.

Commendabile est ad solvendos & emolliendos tumores frigidos, & ad dolores a causa frigida ortos mitigandos.

EMPLASTRUM DE RANIS; CUM MERCURIO SIMPLO.

Fit, si
Emplastri modo præscripti libræ uni
additur
Mercurii vivi, in Terebinthina extincti, uncia una semis.

Ad tumores & dolores glandularum, præsertim ex inquinamento venereo ortos, adhibetur.

EMPLASTRUM REGIUM BURRHI.

REC. Ceræ citrinæ libram unam semis,
Resinæ Pini libram semis,
Terebinthinæ Venetæ libram unam,
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii,
Asæ fœtidæ,
Hederæ,
Tacamahacæ,
Elemi,
Olibani,
Sanguinis Draconis ana unciam unam,
Tragacanthæ uncias decem,
Castorei unciam semis,
Extracti Opii,
Croci ana drachmas duas,
Salis volatilis Ammoniaci,
Cornu Cervi ana drachmas sex.

Cera & resina lento igne liquentur & colentur, quibus, ex parte refrigeratis, admisceantur Tacamahaca, Elemi, Olibanum, Sanguis Draconis, omnia in subtilissimum pollinem trita; postea Gummi Ammoniacum, Galbanum, Opopanax, Bdellium, Asa fœtida, Hederæ, cum extractis, in aceto soluta, & expressione per linteum colata, atque leni igne in mellis consistentiam redacta, addantur. Tandem Terebinthina Veneta, Tragacantha, Castoreum & salia volatilia adjungantur, & perpetua ac diligenti mixtione fiat emplastrum, quod in cylindros crassiores formatum, vesicæ bubulæ involvatur & servetur.

Nervinum est, resolvit, dolores sopit; in tumoribus inprimis oedematosis commendatur.

EMPLASTRUM sive CERATUM SANDALINUM, alias INCOGNITUM.

REC. Ceræ novæ,
Resinæ ana uncias quatuor,
Sandali rubri unciam unam semis,
Croci drachmas duas,
Olibani,
Mastiches,
Myrrhæ,
Aluminis ana drachmam unam semis.

Cera cum resina liquefacta & colata, iterumque semi-refrigerata, Sandalum & Crocum trita, atque Vini spiritu diluta, cum reliquis in pulverem redactis, misceatur, fiatque emplastrum.

Hepatis indurationi & obstructioni dicatum olim fuit. Prodest etiam ad ischiaticos dolores.

EMPLASTRUM SAPONATUM BARBETTE.

REC. Olei rosati libram unam,
Cerussæ,
Minii rubri ana uncias quatuor.

Coquantur, sub perpetua agitatione & additione aliquot unciarum aquæ fontanæ, ad solutionem Cerussæ & Minii promovendam, atque adustionem emplastri præcavendam, in emplastri mollioris consistentiam; addantur
Saponis Veneti rasi uncias quatuor;
quibus solutis, ab igne removeantur, &

Cam-

Camphoræ in ſpiritu Vini ſolutæ uncia ſemis

admiſceatur:

Ad dolores arthriticos & ſpaſticos leniendos communiter laudatur; alvum quoque infantibus, abdomini impoſitum, reſeraſſe obſervatum eſt. Reſolvit tumores frigidos, & ictericis, ubi durities ſub hypochondriis ſentitur, commendari ſolet.

EMPLASTRUM SATURNINUM MYNSICHTI.

REC. Sevi hircini,
Ceræ citrinæ ana uncias quinque,
Terebinthinæ claræ,
Plumbi uſti, optime loti & ſubtiliſſime triti, ana uncias duas,
Lapidis Calaminaris præparati,
Ceruſſæ albæ ana unciam ſemis,
Nihili albi,
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Myrrhæ,
Maſtiches,
Olibani,
Aloës,
Nitri ana drachmam unam,
Camphoræ drachmam ſemis.

Omnia in ſubtilem pulverem redacta, Ceræ, Sevo & Terebinthinæ liquatis, & ab igne remotis, admiſceantur. Fiat emplaſtrum.

Ab authore Mynſichto ad ulcera fœtida exeſa, inflammationes & ambuſta commendatur.

EMPLASTRUM DE SCROPHULARIA.

REC. Foliorum Scrophulariæ,
Digitalis purpureæ recentium ana uncias octo.
Axungiæ ſuillæ libram unam.

Coque ad humiditatis conſumtionem, expreſſo adde
Ceræ citrinæ,
Reſinæ pini ana uncias ſex,
Terebinthinæ Venetæ,
Æruginis ana unciam,
Miſceantur, fiat emplaſtrum.

Laudatur ad ulcera antiqua & ſcrophulas etiam exulceratas.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

REC. Ceræ albæ uncias quatuor,
Spermatis Ceti uncias duas,
Olei Amygdalarum dulcium,
Gummi Galbani ana unciam ſemis,
Terebinthinæ claræ unciam dimidiam.

Cum cera liquata commiſceantur, oleum, terebinthina, ſperma ceti, & tandem gummi galbanum tritum. Fiat emplaſtrum.

Dicitur etiam mammillare, quia mammis puerperarum & lactantium imponi ſolet. Lac coagulatum reſolvere, & tumores glandularum duros emollire creditur.

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM.

REC. Olei ſpermatis ranarum,
Ceruſſæ tritæ ana libras quinque.

Coquantur perpetua agitatione, leniſſimo igne, ſemper aliquid aquæ fontanæ & aceti deſtillati addendo, tam ob aduſtionem præcavendam, quam ſolutionem ceruſſæ promovendam, ad emplaſtri albi conſiſtentiam; cui, ab igne remoto & piſtillo ligneo probe agitato, adde
Aluminis crudi uncias quinque,
Camphoræ unciam unam in Spiritu Vini ſolutæ.

NB. Præstat Alumen in aquæ fontanæ libra una semis vel duabus dissolvere, & inter coquendum semper parum hujus solutionis addere; Ita perfectius uniuntur, & citius cerussa solvitur.

Ad ulcera sordida antiqua mundificanda & curanda, inflammationes & dolores arcendos laudatur; refrigerat, adstringit, & exsiccat.

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

REC. Cicutæ,
Foliorum Ebuli ana uncias duas,
Nicotianæ,
Florum Genistæ ana unciam unam,
Aceti Vini libram unam.

Macerentur per biduum, ebulliant, & exprimantur. In colatura dissolve
Gummi Ammoniaci libram unam;

Solutioni per pannum colatæ, & ad mellis consistentiam inspissatæ, adde
Ceræ citrinæ libram semis,
Resinæ Pini,
Terebinthinæ,
Olei Capparum ana uncias duas;

Quæ, seorsum in sartagine liquata, & semirefrigerata, misceantur exactissime.

Usus ex nomine cognoscitur. Resolvit, discutit, & cum emplastro de Cicuta convenit.

EMPLASTRUM STICTICUM, sive STIPTICUM.

REC. Lithargyrii,
Lapidis Calaminaris,
Minii ana libram semis,
Olei Lini,
Olivarum ana libram unam,
Vitrioli albi unciam unam,

Oleum Lini & Olivarum, cum Lithargyrio, Minio, & Lapide calaminari tritis, lenissimo igne, perpetua agitatione coquuntur; quibus Vitriolum, in libra una aquæ fontanæ solutum, successive additur, donec justam acquisiverint consistentiam; adjiciantur
Colophoniæ,
Ceræ citrinæ ana libra una,
Terebinthinæ claræ,
Olei Laurini expressi ana libra semis.

Mixtis addatur
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Bdellii,
Myrrhæ,
Aloës hepaticæ,
Mumiæ,
Aristolochiæ longæ veræ,
Sanguinis Draconis,
Lapidis Hæmatitæ præparati ana uncia una.

Probe misceantur, & fiat emplastrum, coloris spadicei.

Non solum ad recentia vulnera, sed etiam ad antiqua ulcera, egregium est remedium. Exsiccat, mundificat, ac in rhevmaticis doloribus bono effectu non destituitur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM DE TACAMAHACA.

REC. Ceræ citrinæ uncias octo,
Tacamahacæ uncias quatuor,
Terebinthinæ unciam unam,
Balsami Peruviani,
Olei destillati Menthæ ana drachmas duas,
Caryophyllorum drachmam unam.

Ceræ cum Terebinthina liquefactæ & semirefrigeratæ admisceatur Tacamahaca trita, ac tandem Balsamum cum oleis.

In vomitu, diarrhœa, & aliis ventriculi morbis, ex imbecillitate ortis, ad ventriculum roborandum convenit, flatus etiam dissipat.

EM-

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM.

REC. Minii optime triti,
Aceti Vini albi ana libram unam,
Olei Rosarum libras duas.
Coquantur, leni igne, ad emplastri consistentiam, coloris fusco-spadicei, cui nonnihil refrigerato adde
Camphoræ, cum spiritu Vini tritæ, unciam unam semis.
Misceantur, & emplastrum in scatulas effundatur.

Cum emplastro Norico convenit, siccat, & ad ulcera antiqua commendari meretur.

EMPLASTRUM CONTRA VERMES.

REC. Pulveris Aloës hepaticæ,
Trochiscorum Alhandal,
Radicis Asari,
Herbarum Tanaceti,
Sabinæ,
Absinthii,
Myrrhæ ana drachmas tres,
Fellis Tauri recentis uncias tres.
Misce, ut fiant pultis instar, cui successive, una liquata, sub perpetua agitatione, addantur
Ceræ citrinæ unciæ tres,
Olei Absinthii cocti,
Terebinthinæ Venetæ ana drachmæ sex.
Tandem adjiciatur
Olei destillati Sabinæ,
Petræ albi ana drachma una.
Fiat emplastrum.

Pueris alia medicamenta reformidantibus præscribitur. Abdomini nimirum impositum vermes necat, atque alvum movet.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

REC. Cantharidum in pulverem tritarum uncias quatuor,
Ceræ flavæ uncias decem,
Terebinthinæ Venetæ,
Olei Rosarum ana uncias duas semis,
Camphoræ drachmas tres.
Misce, fiat emplastrum.

Ad vesicas excitandas, supra corium extensum, imponitur; globuli exinde formati, atque fonticulis impositi, fluorem promovent.

EMULSIO EXTERNA E NUCLEIS.

REC. Nucleorum Persicorum unciam unam,
Seminis Cannabis,
Papaveris ana unciam dimidiam,
Aquæ Meliloti,
Nymphææ ana uncias quatuor.
Fiat Emulsio. Adde
Spiritus Vini camphorati unciam semis.

Usus est externus. Linteis quadruplicatis fronti & temporibus imposita, in dolore capitis ex febri & catarrho, bonam præstat opem.

EMULSIO VIOLATA MYNSICHTI.

REC. Amygdalarum dulcium unciam unam semis,
Seminum Violarum drachmas tres,
Papaveris albi drachmam unam semis.
Contundantur cum
Aquæ Nymphææ,
Lactucæ ana unciis sex,
Violarum libra una.
Expressæ Emulsioni addantur
Julepi violati drachmæ duodecim.

Refrigerat & humectat, dolores mitigat, somnum conciliat, & in febribus malignis, ad æstum temperandum, nec non in Nephritide feliciter adhibetur.

Dosis unciæ quatuor ad sex.

ESSENTIA ABSINTHII COMPOSITA.

REC. Comarum Absinthii vulgaris unciam unam,
Radicum Zedoariæ unciam semis,
Caryophyllatæ drachmas duas,
Foliorum Cardui benedicti,
Florum Centaurii minoris ana unciam semis,
Corticum Aurantiorum,
Citri ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum drachmam unam.

Incisis & contusis affunde
Spiritus Vini rectificati libram unam,

Stent in digestione per dies quatuor, in vase optime clauso; postea prelo exprimantur, expressum per chartam bibulam filtretur & servetur.

Stomachica & carminativa est.

Datur a drachma dimidia ad integram.

ESSENTIA ABSINTHII SIMPLEX.

REC. Summitatum Absinthii floridarum, & ad maturitatem proxime accedentium, cum foliis minoribus, in umbra siccatarum, uncias quatuor,
Spiritus Vini rectificati libras duas,

Post digestionem exprimantur, expressum aliis superaffundatur Absinthii unciis duabus,

atque, post sufficientem digestionem exprimantur & filtrentur.

Vires Absinthii habet, stomachicas, carminativas, anthelminticas.

Dosis drachma una ex vino.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

REC. Radicum Angelicæ,
Imperatoriæ,
Helenii ana unciam unam,
Radicum Carlinæ,
Hirundinariæ,
Pimpinellæ ana unciam unam semis,
Herbæ Scordii uncias tres,
Spiritus Vini rectificati libras duas semis.

Post sufficientem extractionem exprimantur, & per filtrum trajecta Essentia servetur.

Medicamentum est vere polychrestum. Ventriculum roborat, flatus dissipat, urinam & transpirationem promovet; hinc in omnibus fere morbis, febribus etiam malignis, catarrhalibus & intermittentibus, lymphæ & sanguinis vitiis prodest.

Commendatur a guttis quadraginta ad quinquaginta.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA TEMPERATA STAHLII.

REC. Radicum Pimpinellæ albæ,
Hirundinariæ ana uncias tres,
Herbæ scordii uncias duas.

Incisa infundantur & extrahantur
Spiritus Vini rectificati libris tribus.

Exprimantur & filtrentur, atque tertia pars Spiritus per destillationem ex Mariæ Balneo evocetur, residuum servetur.

Temperatior & mitior est ordinaria, ideoque secure, etiam ad exæstuationem sanguinis pronis, dari potest.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta.

ESSENTIA AMARA.

REC. Herbarum Tanaceti unciam unam,
Scolopendrii,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Radicis Gentianæ,
Lapathi acuti ana drachmas tres,
Corticum Aurantiorum recentium viridium unciam semis.

In-

Incisa macerentur in
Spiritus Vini tartarisati unciis duodecim,
Post sufficientem extractionem exprimantur, & expressum per chartam filtretur.

Digestionem promovet, ventriculum roborat, flatus dissipat, vermes necat.

Dari potest a guttis quinquaginta ad septuaginta, ex vino.

ESSENTIA AMBRÆ BALSAMICA DIPPELII.

REC. Ambræ griseæ,
Balsami Peruviani ana drachmas duas,
Salis Tartari drachmas sex.
Terantur & exacte misceantur in mortario marmoreo, addantur
Spiritus Vini rectificatissimi unciæ novem,
Digerantur, in fine augeatur calor, ut mixtura ebulliat, refrigescant, & liquor tinctus, a fæcibus separatus, filtretur.

Vires sunt analepticæ, stomachicæ & balsamicæ: Præscribitur cum aliis essentiis tonicis & stomachicis.

Dosis guttæ quindecim ad triginta.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

REC. Ambræ veræ griseæ scrupulum unum;
Immittatur phialæ, & lenissimo igne carbonum liquetur, affundantur postea
Liquoris anodini pariter calefacti unciæ duæ,
addantur
Moschi Orientalis grana quatuor.
Servetur usui.

Analepticum, cordiale & cephalicum est medicamentum. Commendabile in apoplexia, vertigine, memoria confortanda; additur etiam aphrodisiacis.

Dosis guttæ viginti ad quadraginta.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

REC. Ambræ griseæ drachmam unam,
Moschi in spiritu Rosarum soluti scrupulum semis,
Olei Cinnamomi destillati guttas quinque,
Sacchari albissimi uncias duas,
Misce & asserva in vase vitreo, bene clauso.

Analepticum est, & cum pulvere cordiali, sive Elæosacchara Cinnamomi cinnabarino, mixta, in apoplexia serosa, & aliis capitis morbis, illis, qui Ambram & Moschum perferre queunt, dari potest. Trageis etiam additur.

Dosis a granis decem ad scrupulum unum.

ESSENTIA ANGELICÆ.

REC. Radicum Angelicæ uncias tres, in
Spiritus Vini optime rectificati unciis quindecim
macerentur per aliquot dies, ut extrahatur essentia, filtranda & servanda.

Vires habet Angelicæ radicis alexipharmacas, stomachicas, diureticas, carminativas.

Dosis a drachma semis ad scrupulos duos.

ESSENTIA ANODINA OFFICINALIS.

REC. Extracti Opii, aqua fontana parati, unciam unam,
Aquæ Cinnamomi spirituosæ uncias novem,
Post sufficientem digestionem filtrentur.

Dolores sedat, somnum conciliat, & easdem, quas Laudanum opiatum, virtutes possidet.

In scrupulo uno duo sunt grana opii.

Dosis guttæ quinque, decem, quindecim, ad viginti.

ESSENTIA ANODINA LUDOVICI.

REC. Extracti Opii, aqua fontana parati, unciam unam,
Aquæ apoplecticæ spirituosæ,
Spiritus Vitrioli roridi, cum spiritu volatili mixti, ana uncias quatuor.

Extrahe, ut artis est, essentiam, filtra & serva.

Vires ex nomine patent, anodinæ scilicet, dolores mitigantes & somnum conciliantes.

Dosis guttæ septem, duodecim, ad quindecim. Drachma una hujus Essentiæ grana sex & dimidium habet opii.

ESSENTIA ANTARTHRITICA, J. M. HOFFMANNI SINE OPIO.

REC. Lumbricorum terrestrium præparatorum uncias tres,
His affunde
Olei, sive liquoris Salis Tartari per deliquium, uncias duas;
stent in vitro bene clauso per viginti quatuor horas, postea affundantur
Spiritus Vini rectificatissimi unciæ duodecim,
addantur
Castorei drachmæ duæ,
Croci drachma una;

Stent denuo per triduum in digestione. Liquor tinctus, per chartam emporeticam filtratus, servetur.

ESSENTIA ANTARTHRITICA CUM OPIO, EJUSDEM.

REC. Lumbricorum terrestrium præparatorum uncias duas,
Radicis Cynoglossæ unciam unam,
Castorei drachmas duas,
Croci austriaci drachmam semis,
Opii drachmam unam.
Affunde tritis
Spiritus Vini rectificati libram unam,

Post sufficientem extractionem & filtrationem adde
Spiritus Cochleariæ unciam unam.

Ambæ commendantur a clarissimo autore in doloribus arthriticis, aliisque scorbuticis & spasmodicis mitigandis; ad icterum, asthma convulsivum, retentionem urinæ.

Dosis prioris, sine opio, guttæ quinquaginta ad septuaginta: posterioris, cum opio, guttæ quindecim ad triginta.

Uncia una habet opii circiter grana quinque.

ESSENTIA ANTHYDROPICA HOFFMANNI.

REC. Radicum Hirundinariæ,
Bryoniæ ana drachmas sex,
Herbæ Absinthii,
Florum Sambuci ana unciam semis,
Aloës Succotrinæ drachmas sex,
Myrrhæ drachmam unam,
Gummi Ammoniaci drachmas tres,
Macis,
Caryophyllorum aromaticorum ana drachmas duas,
Millepedum,
Lumbricorum terrestrium ana drachmam unam semis,
Croci drachmam unam,
Salis armoniaci,
Salis Tartari ana drachmas duas.

Incisis & contusis superfundantur
Aquæ florum sambuci unciæ quatuor,

Digerantur per aliquot horas, postea addatur
Spiritus Vini optime dephlegmati libra una semis,

Fiat, lento calore digerendo, Essentia.

Celeberrimus autor hanc essentiam in cachexia, levcophlegmatia & hydrope commendat.

Dosis sunt scrupuli duo, mane sumendi.

ES-

ESSENTIA ANTISCORBUTICA.

REC. Radicum Ari,
Lapathi acuti ana unciam unam,
Herbæ Trifolii fibrini unciam unam,
Sedi vermicularis,
Centaurii minoris,
Seminis Lapathi acuti ana drachmas ſex,
Corticum Winterani uncias duas,
Fraxini,
Saſſafras ana unciam unam,
Myrrhæ electæ unciam unam,
Salis Tartari unciam unam ſemis.

Inciſa & contuſa infundantur in Spiritus Cochleariæ libris tribus;

Digerantur per aliquot dies, poſtea exprimantur, expreſſo addantur

Eſſentiæ Succini unciæ tres,
Spiritus Vitrioli dulcis uncia una ſemis.

Digerantur & filtrentur.

Vires ſunt antiſcorbuticæ, incidentes, attenuantes, reſolventes, diureticæ, ſtomachicæ.

Doſis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA BALSAMICA FRID. HOFFMANNI.

Videatur ELIXIR.

ESSENTIA BALSAMICA GMELINI.

REC. Corticum Aurantiorum,
Citri ana uncias duas,
Cinnamomi,
Nucis Moſchatæ ana drachmas quinque,
Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas,
Salis Ammoniaci uncias quindecim,
Cinerum clavellatorum tantundem,
Spiritus Vini non dephlegmati libras quatuor.

Deſtillentur ex cucurbita, & ſpiritus volatilis libræ duæ cum dimidia proliciantur, in quibus infundantur

Corticum Aurantiorum,
Citri ana unciæ tres.

Digerantur poſt octiduum, poſtea clarum a ſpiſſo, per inclinationem vaſis ſeparetur. Reſiduum exprimatur, &, poſt filtrationem, claro admiſceatur.

Stomachica & carminativa eſt.

Doſis guttæ triginta, quinquaginta.

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

REC. Balſami Peruviani optimi unciam ſemis, cum
Spiritus Vini optime dephlegmati unciis tribus,

per dies aliquot, loco tepido digere, eſſentiam extractam per bibulam cola ac ſerva.

Revera balſamicum eſt, calidum tamen medicamentum, quod cum circumſpectione offerri debet; Ventriculum roborat, & vitia lymphæ corrigit.

Externus uſus eſt ad ulcera, abſceſſus & vulnera etiam partium tendinoſarum.

Interne doſis guttæ triginta, ad quinquaginta.

ESSENTIA BENZOES COMPOSITA.

REC. Benzoës electæ pulveriſatæ unciam unam,
Styracis calamitæ unciam ſemis,
Balſami Peruviani drachmam.

Affunde
Spiritus Vini rectificati uncias octo,

digerantur, & poſt ſufficientem ſolutionem filtrentur.

Nota. Balſamum Peruvianum cum pulvere Benzoës commiſceri debet.

Uſus externus eſt coſmeticus innocens, nimirum aquæ calidæ inſtillata reddit eam lacteam, quæ nitorem gratum cuti conciliat, & eam mollem ſervat. Interne pectorale præbet medicamentum non contemnendum.

ESSENTIA BENZOES SIMPLEX.

REC. Florum Benzoës drachmas tres,
Spiritus Aniſi uncias tres.

Digere leniſſimo calore, atque ſolutio ſive eſſentia flavi coloris ſervetur.

Pectoralis, ſtomachica, carminativa & alexiterica eſt.

Doſis guttæ octo ad viginti.

ESSENTIA CARDAMOMI.

REC. Cardamomi minoris in pulverem triti uncias tres,
affunde
Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias ſedecim.

Digerantur, exprimatur & filtretur eſſentia.

Flatus potenter diſcutit, ventriculum & cerebrum confortat, urinam movet.

Doſis drachma ſemis, ad drachmam unam, cum vehiculo idoneo.

ESSENTIA CARDUI BENEDICTI.

Paratur ad normam Eſſentiæ Abſinthii ſimplicis, ſuperius deſcriptæ; cum qua etiam viribus convenit, & in eadem doſi exhiberi poteſt.

ESSENTIA CARMINATIVA WEDELII.

REC. Radicum Zedoariæ uncias quatuor,
Carlinæ,
Calami,
Galangæ ana uncias duas,
Florum Chamæmeli Romani,
Seminum Aniſi,
Carvi ana unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Baccarum Lauri ana drachmas ſex,
Macis unciam ſemis,
Corticum Aurantiorum unciam unam.

Conciſa & contuſa groſſo modo macerentur, in
Spiritus corticum citri libris quatuor ſemis,
Spiritus Nitri dulcis unciis duabus ſemis, per ſex dies.

Expreſſa & filtrata eſſentia uſui ſervetur.

Vires ſunt ſtomachicæ, carminativæ, & diureticæ.

Doſis drachma dimidia ad ſcrupulos duos.

ESSENTIA CASTOREI.

REC. Caſtorei Orientalis veri, minutim inciſi, uncias tres,
Spiritus Vini rectificati uncias quindecim.

Per octiduum macerentur, exprimantur, & poſtea filtretur eſſentia.

Commendatur interne ad affectus ſpaſticos, hyſtericos & colicos, etiam ad odoratum præbetur mulieribus, atque Clyſteribus in Colica hyſterica, ad drachmam integram, addi poteſt.

Interne exhibetur a guttis triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA CATECHU.

Videatur ESS. TERRÆ CATECHU.

ESSENTIA CENTAURII MINORIS.

Uti Eſſentia Abſinthii ſimplex, ſpiritu Vini optime rectificato, parari ſolet.

Doſis eadem.

Stomachica eſt & anthelmintica, atque

in febribus intermittentibus conducit.

Ad drachmas duas exhibita alvum movere compertum est.

ESSENTIA CEPHALICA.

REC. Radicis Calami aromatici drachmas tres,
Herbarum Betonicæ,
Mari veri,
Salviæ,
Florum Lavendulæ ana drachmas duas,
Ligni Aloës ponderosi,
Sandali citrini odoratissimi,
Corticum Culilawan ana drachmas tres,
Cinnamomi acuti,
Nucis Moschatæ,
Cubebarum,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum ana drachmas duas.

Incisis & contusis superaffundantur
Aquæ apoplecticæ spirituosæ,
Elixirii vitæ Matthioli incompl. ana unciæ octo.

Digerantur, & sufficienter extracta, exprimantur atque filtrentur.

Senibus & phlegmaticis conducit, quibus cerebrum & ventriculum confortat; ad colicam flatulentam, eructationes & cardialgiam valet, atque essentiis vel elixiriis stomachicis admisceri potest.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

ESSENTIA CHINÆ CHINÆ SIMPLEX.

REC. Corticum Chinæ Chinæ pulverisatorum uncias tres,
Spiritus Vini rectificati uncias duodecim.

Digerantur aliquamdiu, postea essentia bene saturata expressa filtretur.

Præstat quidem Corticem Peruvianum in substantia exhibere; quia vero multi pulveres & electuaria reformidant, essentia ex illo parata dari potest, non solum autem in febribus, sed etiam, ubi tonum relaxatum oportet roborare.

Dosis guttæ sexaginta ad octoginta.

ESSENTIA CHINÆ COMPOSITA HELWIG.

REC. Corticum Chinæ Chinæ uncias tres,
Serpentariæ Virginianæ uncias duas,
Contrayerv. unciam.

In pulverem tritis affunde
Spiritus vini rectificati uncias sedecim.

Post sufficientem extractionem exprimantur, & essentia per chartam bibulam filtrata reponatur.

Alexipharmaca, antifebrilis, tonica & carminativa est.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM SPIRITUOSA.

REC. Corticum Aurantiorum, ab interiori albedine separatorum, libram unam;
affundantur
Spiritus Vini rectificati libræ tres semis.

Post sufficientem extractionem exprimantur, & per chartam emporeticam filtrentur.

Egregium est stomachicum, carminativum & tonicum.

Dosis guttæ triginta ad sexaginta.

Nota. E corticibus fructuum Aurantiorum immaturorum recentibus, vel ex ipsis tenellis fructibus pari modo essentia parari potest, quæ, si ordinariæ e siccis maturis corticibus non præcellit, tamen haud inferior est virtutibus.

ESSENTIA CORTICUM AURANTIORUM CUM VINO MALVATICO.

REC. Vini Malvatici libram unam semis,

Flavedinis corticum Aurantiorum ſiccatorum, uncias tres.

Macerentur per biduum, colentur, & filtrentur.

Stomachica, tonica & carminativa eſt.

Doſis uncia ſemis ad integram.

ESSENTIA CORTICIS CHACARILLÆ.

REC. Corticum Chacarillæ griſeæ & reſinoſæ uncias quatuor.

In pulverem groſſum tritis affunde Spiritus vini rectificatiſſimi libram unam ſemis.

Digere per quatriduum, filtra & ſerva.

Ventriculi vitiis medetur & pulmonibus prodeſt, tonum viſcerum relaxatum inſtaurat, ſedativum eſt, & ſtrictu-ras partium dolentes blande reſolvit.

Doſis guttæ triginta ad ſeptuaginta quinque.

ESSENTIA CULILAWAN.

Eodem modo, quo præcedens eſſentia Chacarillæ, paratur.

Aromatica eſt, ventriculum roborat, flatus diſcutit.

ESSENTIA DULCIS.

REC. Terræ foliatæ Tartari drachmas duas,

Sacchari albiſſimi uncias duas,

Aquæ fontanæ unciam unam ſemis.

Coquantur in vaſe figulino probe vitreato, ſub perpetua agitatione, usquequo colorem acquiſiverint ſubnigrum vel fuſcum; removeantur ab igne & affundantur

Menſtrui infra deſcripti unciæ duodecim.

Digerantur, & bis vel ter in Mariæ Balneo cohobentur, atque eſſentia per chartam emporeticam filtrata ſervetur.

MENSTRUUM pro ESSENTIA DULCI.

REC. Spiritus vini gallici, vel alius puriſſimi, rectificati, libras quatuor,

Aluminis vulgaris puri, in pulverem triti, uncias octo.

Aquæ fontanæ libram unam.

Miſceantur & deſtillentur, e cucurbita vitrea, atque libræ tres primo prodeuntes ſeorſum ſerventur pro menſtruo.

Fuerunt, qui medicamentum corroborans, ſapore & odore gratum, quodque delicatioribus atque infantibus, alia medicamenta reformidantibus, in parva doſi exhiberi poſſet, expetiverunt; quibus ut ſatisfaciamus, Eſſentiam hanc, quæ virtutem non ſolum habet corroborantem, ſed & aperientem, balſamicam, diureticam & expulſivam, ac quæ ſapore & odore grato ſe commendat, adponere voluimus.

Doſis pro adultis guttæ triginta ad ſexaginta; infantibus & pueris guttæ tres, quatuor, vel duodecim ſufficiunt. Datur in vehiculo aquoſo, vel ſi libet, adultis in vino.

ESSENTIA FULIGINIS CLAUDERI: alias HÆMATO-CATHARTICA ET ALEXIPHARMACA DICTA.

REC. Cinerum clavellatorum puriſſimorum uncias ſex,

Salis Armoniaci unciam unam.

Solve ſeparatim, & quidem Cineres clavellatos in libris duabus, & Sal Armoniacum in libra una aquæ fontanæ puræ vel pluviæ; liquores ſalinos ſeparatim per chartam emporeticam filtra, filtratos commiſce, atque ſuperfunde

Fuliginis ex camino ſplendentis pulveriſatæ unciis duabus.

Digere in vitro probe clauſo, per aliquot dies, poſtea liquorem tin-

tinctum, per chartam bibulam filtratum, serva.

Liquor salinus est oleo fuliginis impraegnatus, & praebet medicamentum resolvens, atque excretiones omnis generis promovens. In morbis chronicis, febre quartana, ictero, cachexia, fausto cum successu adhibenda.

Dosis guttae quinquaginta ad sexaginta.

ESSENTIA FUMARIÆ.

Paratur, ut Essentia Absinthii.

Ad sanguinis & lymphae vitia commendatur.

Dosis guttae quinquaginta ad octoginta.

ESSENTIA GALANGÆ.

REC. Rad. Galangae minor. minutim incisarum uncias duas,
Spiritus Vini rectificati uncias octo.

Extrahatur essentia leni calore, exprimatur, & per chartam filtretur.

Commendatur interne ad ventriculum confortandum & humores viscidos resolvendos: Externe ad cariem ossium, membra tabida & paralysin linguae.

ESSENTIA GENTIANÆ.

Fit eodem modo, quo Essentia radicum Angelicae.

Amarum quidem, praestantissimum tamen stomachicum, tonicum, anthelminticum & antifebrile est medicamentum.

Datur a guttis quinquaginta ad octoginta.

ESSENTIA HYPERICI.

REC. Florum Hyperici uncias quatuor,
Spiritus Vini rectificati libram unam & uncias tres.

Digerantur per triduum, postea exprimantur & filtrentur.

Commendatur specifice melancholicis, vulneratis, verminosis, nec non ad morbos fascino imputatos. Etiam externe vulneribus applicatur.

Dosis guttae quinquaginta ad septuaginta quinque.

ESSENTIA LEVISTICI.

REC. Radicum Levistici uncias duas,
Seminis ejusdem unciam unam,

Incisa & contusa infundantur in Spiritus vini unciis decem.

Digerantur, & post sufficientem extractionem exprimantur, atque essentia per chartam filtrata servetur.

Alexipharmaca, carminativa & diuretica est, atque in hydrope, nec non doloribus post partum commendabilis.

ESSENTIA LIGNI ALOES.

REC. Rasurae ligni Aloës resinosi unciam unam semis,
Spiritus Vini tartarisati libram semis.

Macerentur & filtrentur.

Tribuuntur illi vires stomachicae, uterinae, cephalicae & analepticae. Additur aliis medicamentis, ad virtutes eorum exaltandas; caute tamen adhibendam esse, ob vim inebriantem, nonnulli perhibent.

Dosis guttae viginti ad quadraginta.

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS SIMPLEX.

REC. Corticum ligni Sassafras unciam unam semis,
Spiritus Vini rectificati uncias octo.

Macerentur per triduum, postea filtrentur & serventur.

Anticatarrhalis est, & ad vitia lymphae & sanguinis commendatur.

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS COMPOSITA.

REC. Corticum ligni Sassafras uncias quatuor,
Salviae nobilis uncias duas,

Nucis Moſchatæ unciam unam,
Cinnamomi unciam ſemis,
Aniſi ſtellati drachmas tres,
Spiritus Vini rectificati libras duas.

Digerantur per triduum, exprimantur; expreſſum filtretur & ſervetur.

Ad catarrhales affectus, arthritidem, flatulentias & ſcabiem humidam laudari meretur.

Doſis guttæ quinquaginta ad ſeptuaginta quinque.

ESSENTIA LIGNORUM.

REC. Ligni Saſſafras cum cortice uncias duas,
Sancti uncias tres,
Rhodii unciam ſemis,
Sandali rubri,
citrini ana unciam unam.

Inciſa, & in
Spiritus Vini libris duabus infuſa,
per octiduum digerantur, poſtea exprimantur & filtrentur.

Ad maſſam ſanguinis purificandam & lympham corrigendam, ad gonorrhœam etiam & luem veneream inſervit.

Doſis drachma ſemis ad integram, in idoneo vehiculo.

ESSENTIA LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

REC. Lumbricorum terreſtrium exſiccatorum, in pulverem tritorum, uncias quatuor,
affunde
Olei Tartari per deliquium unciam unam;
Miſceantur, addatur
Spiritus Vini rectificati libra una.

Digerantur & filtrentur.

Commendatur arthriticis, ſcorbuticis & ictericis, urinam & ſudorem ciet.

Doſis guttæ quinquaginta ad ſexaginta.

ESSENTIA MARTIATA APERITIVA.

REC. Radicum Galangæ,
Calami aromatici,
Zedoariæ,
Cinnamomi acuti, ana drachmas duas,
Flor. Hyperici,
Tanaceti ana drachmam unam,
Limaturæ Martis, unciam ſemis.

Minutim inciſis ſuperaffundantur
Spiritus Vini rectificati unciæ ſex,
Vitrioli uncia ſemis.

Digerantur leni calore, & poſt ſufficientem extractionem exprimatur & filtretur eſſentia.

Eſt Tinctura Martis aromatiſata, atque lienoſis & atonia viſcerum laborantibus commendari meretur, nec non inter anthelmintica locum invenit.

Doſis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA MILLEFOLII.

REC. Millefolii uncias tres,
Spiritus Vini rectificati uncias ſedecim.

Infundantur, & poſt digeſtionem per triduum exprimantur; in expreſſo denuo
Millefolii unciæ duæ
macerentur, & poſt ſufficientem extractionem expreſſa Eſſentia per chartam bibulam filtretur.

Commendatur ad motus hæmorrhoidales moderandos, ad nimium fluxum menſium, nephriticorum vomitum, & reliquos morbos viſcerum, cum vena portæ connexorum. Cum eſſentia croci mixta, dolores & tormina, a quibus menſtruatæ ſæpius vexantur, mitigat.

Doſis guttæ quinquaginta ad ſexaginta quinque.

ESSENTIA MILLEPEDUM.

REC. Millepedum in pulverem ſatis tenuem tritorum uncias tres.

Irro-

Irrorentur
Olei tartari per deliquium drachmis duodecim,
postea statim affundantur
Spiritus Vini rectificati unciæ decem.
In vase bene obturato digerantur per triduum; Essentia filtrata ad usum reponatur.

Vires easdem, quas millepedes habent, possidet, potenter resolvit, urinam pellit; hinc in ictero, asthmate, & obstructionibus viscerum utiliter adhibetur.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulum unum semis.

ESSENTIA MUMIÆ PURIFICANS CLAUDERI.

REC. Mumiæ Ægyptiacæ, in pulverem tritæ,
Salis Tartari ana unciam unam,
Aquæ Fumariæ libram unam.
Misceantur & digerantur per triduum, postea filtrentur.

Ab auctore ad sanguinem depurandum magnopere laudatur.

Dosis drachma dimidia ad scrupulos duos.

ESSENTIA MYRRHÆ.

REC. Myrrhæ rubræ electæ uncias duas,
tritæ affunde
Spiritus Vini rectificatissimi uncias decem.
Digere, filtra & serva.

Alexipharmaca est, balsamica & anthelmintica, sanguinem valde expandit, ejusque motum accelerat, datur igitur ad menstrua pellenda.

Dosis guttæ tringinta ad quinquaginta. Externus usus est vulnerarius, ad ulcera purganda & consolidanda.

ESSENTIA MYRRHÆ ALCALISATA.

REC. Myrrhæ electæ, in pulverem tritæ, libram dimidiam,
Salis alcali, sive cinerum clavellatorum uncias octo,
Aquæ fontanæ libram unam semis.
Digerantur per sex vel octo dies, postea aqua ex cucurbita, lento igne, ad mellis consistentiam abstrahatur, residuo autem unciæ viginti Spiritus Vini rectificati affundantur, atque essentia per digestionem extrahatur, quæ filtretur.

Magis recluditur Myrrha alcali, quod & essentiam saturatiorem reddit. Cum præcedente ejusdem est virtutis, ad vulnera vero non facile adhiberi debet, propter alcali, quod dolores excitat.

ESSENTIA PAREIRÆ BRAVÆ.

Paratur ad normam Essentiæ Angelicæ.

Vires sunt diureticæ & anticatarrhales.
Dosis guttæ quinquaginta ad septuaginta.

ESSENTIA PIMPINELLÆ ALBÆ.

Spiritu Vini optime rectificato, Essentiæ Angelicæ instar, paratur.

Diaphoretica, alexipharmaca & diuretica est, in torminosis, colicis affectibus, & lymphæ vitiis corrigendis, convenit.

Dosis a guttis quadraginta ad septuaginta.

ESSENTIA PINI.

REC. Extracti turionum Pini aqua fontana parati, uncias tres,
Spiritus Cochleariæ libram unam.
Fiat digerendo essentia.

Scorbuticis convenit, atque arthriticis commendatur.

Dosis guttæ sexaginta ad septuaginta quinque.

ESSENTIA POPULI VULNERARIA.

REC. Oculorum Populi arboris recentium libram ſemis,
Spiritus Vini rectificatiſſimi libram unam ſemis.

Digerantur per aliquot dies, exprimantur, & filtretur eſſentia, cui adde
Eſſentiæ florum Hyperici libram ſemis,

atque poſt digeſtionem, ſpiritus dimidia pars abſtrahatur in Balneo, liquor reſiduus ſervetur.

Commendari meretur hæc Eſſentia, non ſolum ad externos uſus in vulneribus, ſed etiam interne in ulceribus pulmonum, renum & aliarum partium, alvi fluxione diuturna, gonorrhoea & fluore albo conducit.

Doſis guttæ triginta ad quinquaginta & ultra.

ESSENTIA SCILLÆ.

REC. Salis tartari unciam ſemis,
Aceti ſcillitici, per infuſionem aceto deſtillato parati, & probe ſaturati uncias duodecim.
M. & evaporetur acetum leni igne ex vaſe figulino probe vitreato ad mellis ſpiſſitudinem. Maſſa ſalina reſidua diſſolvatur in Spiritus Vini rectificatiſſimi unciis ſex.

Stent in digeſtione per aliquot dies, poſtea clarum a ſpiſſo, per inclinationem vaſis, ſeparetur & ſervetur.

Cenſetur antaſthmatica, reſolvens & diuretica, atque hydropicis commendari meretur.

Doſis guttæ quadraginta ad ſexaginta.

ESSENTIA SCORDII.

Ad modum eſſentiæ Millefolii paratur.

Egregium eſt alexipharmacum & diaphoreticum.

Doſis guttæ ſexaginta.

ESSENTIA DE SCORDIO COMPOSITA, ſive DIASCORDIUM LIQUIDUM, JOH. MAUR. HOFFMANNI.

REC. Radicum Angelicæ,
Vincetoxici,
Leviſtici,
Zedoariæ,
Contrayervæ,
Tormentillæ,
Valerianæ ana unciam ſemis,
Gentianæ drachmas ſex,
Herbæ Scordii uncias duas,
Florum Sambuci drachmas duas,
Myrrhæ electæ drachmas ſex,
Croci drachmas duas ſemis,
Corticum citri unciam unam,
Succini,
Ligni Aloës ana drachmas tres,
Opii drachmam unam.

Miſce, fiat omnium pulvis; ſuperaffundantur
Spiritus Vini a baccis Juniperi abſtracti libræ tres.

Digerantur loco calido in vitro probe clauſo; poſt ſufficientem extractionem filtrentur, & ſerventur.

Virtutes ſunt alexipharmacæ, anodinæ, ſtomachicæ, feliciter in febribus epidemicis, dyſenteria, & ubi tinctura bezoardica locum habet, adhibetur.

Uncia una Eſſentiæ continet duo circiter grana Opii.

ESSENTIA SERPENTARIÆ VIRGINIANÆ.

REC. Radicum Serpentariæ Virginianæ, minutim inciſarum, uncias duas ſemis,
affunde
Spiritus Vini rectificati libram unam;

Poſt digeſtionem & ſufficientem extractionem exprime, & eſſentiam, per chartam filtratam, ſerva.

Alexi-

Alexipharmaca, stomachica, sudorifera & diuretica est; in febribus tam malignis, quam intermittentibus atque catarrhalibus feliciter adhibetur.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA SPICÆ INDICÆ.

REC. Spicæ Indicæ unciam unam semis,
Spiritus Vini rectificati uncias sex vel septem.

Stent in digestione ad sufficientem extractionem, exprimatur & filtretur Essentia.

Alexiterica, carminativa, diuretica & uterina est.

Dosis guttæ quadraginta & sexaginta.

ESSENTIA SPLENETICA STAHLII.

REC. Herbarum Verbenæ,
Rutæ hortensis,
murariæ,
Salviæ,
Plantaginis acutæ ana unciam semis,
Florum Hyperici unciam unam.

Incisa infundantur in
Spiritus Vini libra una,

Post sufficientem extractionem exprimantur & filtrentur.

Vires ex nomine cognoscuntur; prodest hypochondriacis, resolvit, urinam movet.

Dosis guttæ sexaginta ad octoginta.

ESSENTIA STOMACHICA POLYCHRESTA GUNDELSHEIMERI.

REC. Piperis longi,
nigri,
albi ana drachmas duas,
hispanici, sive Capsici unciam unam,
Cardamomi minoris drachmas decem,

Tritis affundatur
Liquoris terræ foliatæ Tartari,
Spiritus Salis Armoniaci vinosi ana libra semis.

Digerantur, exprimantur & filtrentur.

Potenter resolvit, atque cachecticis, hydropicis & phlegmaticis convenit; cholerici & sanguinei vero ab ejus usu caveant.

Dosis guttæ tringinta ad quadraginta.

ESSENTIA SUCCINI ALCALISATA.

REC. Succini flavi, probe triti, uncias quatuor,
Salis, ex duplo Nitri & una parte Tartari crudi per detonationem parati, uncias sex;

Tere invicem, affunde
Spiritus Vini non rectificati uncias sedecim.

Stent in digestione per aliquot dies, postea e cucurbita vitrea destilla, & spiritus circiter uncias octo prolice; residuum lento igne ad siccitatem evapora, & spiritum per destillationem prolectum denuo affunde, post digestionem, clarum a spisso separatum filtra & serva.

Saturatior est succedenti, sed, propter sal alcali, in vulneribus minus convenit.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA SUCCINI, G.

REC. Succini citrini optime triti uncias duas.
Spiritus vitrioli dulcis, sive Liquoris anodini uncias septem.

Digerantur in vase optime clauso lenissimo calore, atque post sufficientem extractionem, clarum a spisso, per inclinationem vasis, separetur, & in vitro epistomio clauso servetur.

Optimam ac balsamicam partem succini hæc essentia continet, saporis est amaricantis, odoris grati, & paucæ guttæ, aliquot uncias

cias aquæ, ſapore & odore inficiunt.

Vires ſunt nervinæ, anticatarrhales, uterinæ &c.

Doſis guttæ quindecim ad viginti, vel ſacchari fruſtulo exceptæ, vel vehiculo aquoſo.

ESSENTIA SUCCINI ORDINARIA.

REC. Succini flavi ſubtiliſſime triti unciam unam & ſemis.
Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias ſex.

Leni calore in phiala optime clauſa per aliquot dies digerantur, & aliquoties moveantur, tandem liquor tinctus filtretur.

Anticatarrhalem, balſamicum & nervinum edit effectum, ac in vulneribus etiam locum habet.

Doſis guttæ quadraginta ad ſexaginta.

ESSENTIA TERRÆ CATECHU.

REC. Terræ Catechu, ſive Japonicæ unciam unam,
Spiritus Cydoniorum uncias quatuor.

Solutione per digeſtionem peracta filtretur.

In hæmoptyſi atque nimiis hæmorrhagiis, diarrhœa, vel, ubi adſtrictione opus eſt, utiliter adhibetur.

Doſis a guttis triginta ad quinquaginta.

ESSENTIA THERIACALIS.

REC. Radicum Angelicæ,
Calami,
Serpentariæ Virg.
Spicæ Indicæ,
Herbarum Scordii,
Dictamni Cretici ana drachmas tres,
Cinnamomi acuti,
Cardamomi minoris,
Cubebarum,
Caryophyllorum ana drachmam unam ſemis,
Opii Thebaici,
Croci Orientalis ana drachmam unam,
Spiritus Vini rectificati libram unam.

Digerantur ad ſufficientem extractionem, exprimantur, & Eſſentia per chartam bibulam filtrata, ſervetur.

Vires ex titulo patent, ſcil. theriacales, i. e. bezoardicæ ſtomachales.

Uncia una hujus Eſſentiæ fere grana quinque opii habet.

Doſis guttæ quadraginta ad ſexaginta usque.

ESSENTIA TRAVMATICA.

REC. Radicum Tormentillæ,
Herbæ Saniculæ ana unciam ſemis,
Rorellæ,
Florum Hyperici,
Roſarum rubrarum ana drachmas duas,
Sanguinis Draconis puriſſimi,
Mumiæ,
Terræ Catechu,
Myrrhæ electæ ana drachmas tres,
Sandali rubri drachmas duas,
Nucis Moſchatæ drachmam unam.

In pulverem redacta miſce, & affuſis

Spiritus Vini unciis ſedecim,

triduana leni digeſtione, vaſe optime clauſo, elice eſſentiam, quam, poſt modicam expreſſionem, per chartam emporeticam filtra ac ſerva.

Vulneraria eſt, in Hæmoptyſi, Hæmorrhagia, uteri profluviis, & Diarrhoea adhibetur.

Doſis guttæ quinquaginta vel ſexaginta.

ES-

ESSENTIA TRIFOLII FIBRINI.

Ad normam Eſſentiæ Abſinthii, ſpiritu proprio abſtractitio paratur.

Antiſcorbutica, ſtomachica & antifebrilis eſt.

Doſis guttæ quinquaginta ad ſexaginta.

ESSENTIA VALERIANÆ COMPOSITA.

REC. Rad. Valerianæ,
Serpentariæ Virginianæ
ana unciam unam,
Camphoræ drachmam unam,
infundantur in Spiritus Vini rectificati unciis octo;
poſt ſufficientem extractionem exprimatur & filtretur eſſentia.

Vires ſunt alexitericæ, uterinæ &c. commendatur etiam ab Hermanno epilepticis.

Doſis guttæ quadraginta ad ſexaginta.

ESSENTIA VINCETOXICI.

Paratur, ut Eſſentia Angelicæ.

Viribus cum Eſſentia Pimpinellæ convenit, & in eadem doſi exhibetur.

EUPHORBII CORRECTIO.

REC. Euphorbii triti uncias quatuor;
affunde
Succi Citri depurati libram.
Digere, ut Euphorbium ſolvatur, cola per linteum, & ad extracti conſiſtentiam evapora.

Acrimonia cauſtica eſt in Euphorbio, quam per acidum Citri infringere voluerunt auctores; violenter purgat alvum, & non niſi hydropicis præſcribi debet. Veteres etiam philoniis ad correctionem Opii addebant.

Doſis grana octo ad quindecim.

EXTRACTUM ABSINTHII.

REC. Summitatum Abſinthii, in umbra ſiccatarum, libram unam.
Conciſæ macerentur in
Aquæ fontanæ libris ſex.
Per quatriduum, in loco calido, poſtea leniter ebulliant, exprimantur, liquor inde expreſſus & colatus coquatur igne lento ad juſtam extracti conſiſtentiam.

Vires habet Abſinthii ſtomachicas, tonicas, anthelminticas.

Pilulis hoc & alia extracta ſunt deſtinata, quibus pro neceſſitate pulveres adduntur.

Doſis a ſcrupulo dimidio, ad unum.

Eadem methodo parari debent:

EXTRACTUM ARTEMISIÆ,
CARDUI BENEDICTI,
CENTAURII MINORIS,
COCHLEARIÆ,
FUMARIÆ,
HEDERÆ TERRESTRIS,
PLANTAGINIS,
RUTÆ,
SCORDII,
TANACETI,
TRIFOLII FIBRINI,
VERONICÆ,
omnia ex plantis floreſcentibus;
EXTRACTUM PAPAVERIS ERRATICI,
ex floribus;
EXTRACTUM PINI & SABINÆ,
ex ſummitatibus.

Vires habent ſimplicium, ex quibus parata ſunt, & pro pilulis conficiendis inſerviunt.

EXTRACTUM AGARICI.

REC. Raſuræ Agarici albi & levis libram unam;
Affundatur ſpiritus vini ſufficiens quantitas, digerantur, in vaſe vitreo arctiſſime clauſo, in loco calido per dies tres; poſtea exprimantur, expreſſum filtretur, & in Balneo Mariæ, lenta deſtillatione, Vini ſpiritus evocetur,

ac residuum extractum servetur.

Libra una Agarici, ut plurimum uncias quatuor extracti resinosi largitur.

Agaricus, pectoris affectibus, tussi & asthmati convenire censetur, ita etiam extractum ejus, pilulis laxantibus additur, ubi ejusmodi affectibus correptis succurrendum est. Resinosum est extractum, & vi purgante admodum debili praeditum, hanc ob causam nunquam solum, sed vel trochiscis Alhandal, vel alio acri purgante atque extracto quodam commixtum in forma pilulari, vel amygdalis tritum, in pulvere dari solet.

Datur vero a scrupulo dimidio, ad grana quindecim.

EXTRACTUM ALOES GUMMOSUM.

REC. Aloës Succotrinae optimae uncias sex.

Redige in pulverem, ac in cucurbita vitrea affunde

Aquae fontanae libras duas,

In vase tecto, loco calido, duos vel tres dies digere, ut solvatur; solutionem a fecibus separatam, leni igne, ad extracti consistentiam evapora.

Alvum laxat, & pro basi pilularum inservit purgantium.

Dosis scrupulus semis.

EXTRACTUM ANGELICAE.

REC. Radicum siccarum Angelicae libram unam;

Incisis superfundantur

Spiritus Vini rectificati librae quinque vel sex.

Digerantur ad sufficientem extractionem, exprimantur, atque spiritus tinctus, per filtrum colatus servetur;

Radices vero

Aquae fontanae libris tribus denuo infundantur, digerantur, & post unam aut alteram ebullitionem exprimantur.

Expressum albumine ovi clarificetur, & cum spirituoso commisceatur, lentoque igne, spiritu per alembicum abstracto, ad consistentiam extracti inspissetur.

Carminativas, anodinas, alexipharmacas & pectorales habet virtutes; additur pilulis catarrhalibus, vel Laudano mixtum in colica exhibetur.

Dosis grana duodecim, ad viginti.

Praescripto modo etiam parantur:

EXTRACTUM ARISTOLOCHIAE CLEMATITIDIS,
ARISTOLOCHIAE LONGAE,
ARISTOLOCHIAE ROTUNDAE,
ASARI,
CALAMI AROMATICI.
CORTICUM CHACARILLAE,
CORTICUM CHINAE CHINAE,
HYPERICI ex FLORIBUS,
MECHOACANNAE ALBAE,
TURPETHI,
ZEDOARIAE,

EXTRACTUM ANODINUM.

REC. Extracti Angelicae,

Calami aromatici ana unciam unam,

Cardui benedicti drachmas quinque,

Opii, aqua fontana parati, drachmas tres,

Olei Caryophyllorum guttas decem,

Misceantur & serventur.

Vires sunt anodinae, sudoriferae, leniter adstringentes. Quaelibet drachma grana septem semis habet Opii.

A granis octo, quae granum unum habent opii, ad grana duodecim, dari potest.

EX-

EXTRACTUM BEZOARDICUM CAMERARII.

REC. Extracti ſpecierum Elixirii vitæ uncias quatuor,
Ligni Aloës,
Radicum Angelicæ ana unciam unam,
Meliſſæ,
Salviæ,
Tormentillæ,
Opii ana unciam ſemis,
Papaveris erratici,
Caſtorei ana drachmas duas,
Lapidum quinque pretioſorum præparatorum,
Succini albi præparati aña ſcrupulos quatuor,
Unicornu marini,
Bezoar Orientalis,
Occidentalis ana ſcrupulos duos,
Confectionis Alkermes completæ,
de Hyacintho ana drachmas duas.

Miſceantur exactiſſime, quod fit, extracta omnia in aqua Menthæ ſolvendo, & denuo in debitam conſiſtentiam reducendo.

Alexipharmacum & ſudoriferum eſt, lene etiam præbet anodinum.

Doſis per ſe grana octo, ad quindecim adultioribus.

Drachma continet circiter grana tria, & ſcrupulus granum unum extracti Opii.

EXTRACTUM BRYONIÆ.

REC. Radicum Bryoniæ inciſarum libram unam,
infunde in
Aquæ fontanæ ferventis libris ſex.

Macerentur per triduum, poſtea leniter ebulliant, exprimantur & colentur, expreſſum, leni igne, ad extracti conſiſtentiam evaporetur.

Pari modo parantur:

EXTRACTUM ENULÆ,
ESULÆ,
GENTIANÆ,
HELLEBORI NIGRI,
IRIDIS FLORENTINÆ,
IRIDIS NOSTRATIS,
PÆONIÆ,
PIMPINELLÆ,
RHABARBARI,
SARSÆBARILLÆ,
SASSAFRAS,
TORMENTILLÆ,

Omnia ex radicibus.

Hæc, & alia ex ſimplicibus parata extracta, vim habent vegetabilium, e quibus parata ſunt.

EXTRACTUM CASTOREI.

REC. Caſtorei libram ſemis;
Per repetitam ſpiritus Vini affuſionem extrahatur eſſentia; reſiduo addantur
Aquæ fontanæ libræ duæ,
& lento igne ad dimidias coquantur, decoctum exprimatur, coletur, ac clarificetur, atque cum ſuperioribus per ſpiritum vini factis extractionibus commiſceatur, & ſpiritu lento igne abſtracto, in extracti conſiſtentiam reducatur.

Specificum creditur eſſe Caſtoreum antihyſtericum & antiſpaſmodicum, quas etiam vires habet ipſum extractum; admiſcetur pilulis nervinis, antiſpasmodicis, narcoticis, atque anticolicis.

Doſis grana tria vel ſex.

EXTRACTUM CATHARCTICUM, PHARMACOP. LONDINENSIS.

REC. Aloës Succotrinæ unciam unam ſemis,

Colocynthidis drachmas sex,
Scammonii electi,
Cardamomi minoris, ana unciam semis.

Infundantur in Spiritus Vini rectificati sufficiente quantitate, & repetitis vicibus liquor a faecibus, mediante filtro, separetur, Spiritus leni igne abstrahendo in extracti formam redigatur.

Cum extracto catholico convenit. Vis drastica scammonii & colocynthidis per additionem Cardamomi corrigitur.

Dosis grana decem ad quindecim in forma pilulari.

EXTRACTUM CATHOLICUM.

REC. Extracti Aloës Succotrinae, aqua fontana parati, unciam unam,
Ellebori nigri drachmas duas,
Colocynthidis scrupulos tres,
Resinae Jalappae,
Scammonii ana drachmam unam semis.

Misce.

Ex inscriptione patet, universale esse alvum ducens.

Dosis scrupulus semis, ad grana quindecim.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

Paratur, fructum Colocynthidis spiritu vini extrahendo, postea aqua fontana coquendo, & ambas extractiones clarificatas, leni calore, in extracti consistentiam evaporando.

Fortiter purgat, & stimuli loco aliis purgantibus additur; hydropicis praesertim conducit.

Dosis grana tria ad octo.

EXTRACTUM CROCI.

REC. Croci Orientalis optimi libram semis, vel quantum libet,
Aquae fontanae purae libras duas.

Digere loco tepido, vase optime clauso per biduum, liquorem tinctum decanta, aliam aquam affunde, digere, idque continua, donec omnis vis & tinctura extracta sit; extractiones omnes commisce, ac in balneo abstrahe ad justam consistentiam.

Easdem vires, quas crocus, possidet; anodinas, alexipharmacas, cordiales & antihystericas.

Dosis grana duo ad quatuor.

EXTRACTUM DIAÇARTHAMI, sive CNICO-PHARMACUM.

REC. Seminis Carthami excorticati uncias quatuor,
Rhabarbari veri unciam unam,
Polypodii querni uncias duas,
Zingiberis albi drachmas duas,
Turbith albi resinosi,
Foliorum Sennae electorum ana uncias duas semis,
Myrobalanorum chebularum uncias tres,
Agarici albi drachmas sex,
Scammonii Aleppensis drachmas decem,
Mannae electae uncias duas semis.

Agaricus, Scammonium & Turbith infundantur in
Spiritus Vini libris duabus,
& repetita affusione extrahantur; reliqua vero interim in
Aquae ferventis libris tribus
macerentur, leni igne coquantur ad tertiae partis consumtionem, & in fine coctionis adjiciatur residuum prioris spirituosae extractionis; exprimantur & colentur, atque in colatura

tura Manna diſſolvatur, ſolutio clarificetur, & cum ſuperiori ſpirituoſo extracto permiſceatur, lentoque igne ſpiritus evocetur; reſiduum vero ad extracti mollioris conſiſtentiam inſpiſſetur.

NB. Pro pilulis etiam absque Manna parari debet.

Ad vitioſos humores evacuandos accommodatiſſimum & multimoda experientia comprobatum celebratur. Cachecticis, ſcorbuticis & hydropicis convenit.

Doſis absque Manna, ſcrupulus unus, ad drachmam ſemis; cum Manna, ad drachmam integram, vel ſcrupulos quatuor exhiberi poteſt.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

Eodem modo, quo Agarici extractum, paratur, in fine reſinam cum extracto diligenter miſcendo, ut gummoſæ partes reſinoſis interponantur.

Vires cum reſina conveniunt, & vix majori doſi dandum eſt extractum hoc; ſufficiunt grana ſex, vel decem, extracto alio laxanti, Aloës ſcilicet, vel pilulis de Succino, pro una doſi, ſcopo laxandi, admixta.

EXTRACTUM LIGNI ALOES.

Paratur extrahendo lignum Aloës rectificatiſſimo Vini ſpiritu, & ſpiritum rurſus in balneo abſtrahendo.

Additur pilulis & pulveribus cephalicis & analepticis.

Sufficit granum unum vel duo pro doſi.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

Lignum Guajacum fortiter coquitur in ſufficiente quantitate aquæ fontanæ; decoctum lento igne in extracti formam redigitur.

Extractum exigua quantitate tali modo & ex libra una ligni vix drachmæ duæ obtinentur; ſpiritu Vini vero rectificatiſſimo ex libra una ad minimum unciæ tres extracti reſinoſi extrahuntur.

Uſus eſt in pilulis arthriticis, catarrhalibus, antivenereis, vel ubicunque ſanguinem & lympham depurare volumus.

Doſis grana octo ad duodecim.

Naribus exceptum ſternutationes inſignes, citra capitis imbecillitatem efficit.

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

REC. Aloës Succotrinæ libram unam,
diſſolve in
Succorum depuratorum
Abſinthii,
Apii,
Fœniculi ana unciis tribus,
Cichorei,
Fumariæ,
Pimpinellæ ana unciis octo,
Roſarum,
Citri ana unciis viginti.

Stent in digeſtione, ut clarum a ſpiſſo ſeparetur, & fæces ſubſideant, ſolutionem claram ſepara, & lento igne evapora ad mellis conſiſtentiam; adde
Extracti Rhabarbari drachmas ſex,
Croci drachmam ſemis,
Myrrhæ unciam ſemis,
Gummi Ammoniaci, in aceti ſcillitici quatuor unciis ſoluti, unciam unam ſemis.

Redigantur in extractum, mollioris conſiſtentiæ, cui adde
Mari veri optime triti unciam ſemis,
Coſti corticoſi drachmas ſex.

Exacte mixta ſerventur.

Nunquam ſolum, vel ſine additione activorum purgantium præſcribitur. Inſervit potius pro baſi pilularum cephalicarum; Aloë enim, per ſolutionem in ſuccis corrigitur, atque, additione

ditione Mari veri & Costi, aromatisatur, hinc pilulæ laxantes inde compositæ nunquam, vel rarissime, tormina excitant.

Dosis est grana duodecim ad viginti & ultra.

EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

REC. Limaturæ Martis, sive ferri, purissimæ libram unam, superfunde
Succi pomorum acidorum recens expressi & depurati libras quatuor.

Stent in digestione loco calido, in cacabo ferreo, per plures dies. Postea coquantur, spatula perpetuo agitata, lento igne, ad dimidiæ partis consumtionem; clarum a spisso colando separetur; & ad extracti consistentiam inspissatum reponatur.

Tonicum excellens est, atque hypochondriacis, cachecticis, ac ubi suspicio vermium est, convenit.

Datur in forma pilulari, cum aliis, a granis quindecim ad viginti.

EXTRACTUM NICOTIANÆ.

Folia Nicotianæ integra exsiccata, per noctem, in aqua fontana (scilicet libra una Nicotianæ in sex libris aquæ) macerentur; mane infundantur cribro, ut aqua effluat; folia ita macerata atque aqua abluta in libris decem aquæ fontanæ, magna ebullitione, ad dimidiæ partis consumtionem, coquantur. Decoctum, albumine ovorum clarificatum, valido igne & celeri ebullitione, ad consistentiam extracti inspissetur.

Maceratio & ablutio Nicotianæ instituitur, ut particulæ salinæ acres maxime in hac prima maceratione extrahantur; Ebullitio fortis & coctio longa, cum copiosa aqua, eandem ob rationem præscribitur, ut volatiles & vomitum creantes particulæ cum vapore evolent.

Commendatur hoc extractum, secundum hanc formulam paratum, in tussi pectorali & phthisica diuturna mitiganda & cohibenda, quod etiam præstare solet, si ejus grana tria, vel quatuor, in aqua quadam vinosa soluta, mane in lecto propinentur; &, si forte nauseam vomibundam excitaret, mox, post vini calidi aromatisati, & parum saccharati haustum, cessabit; in febribus etiam diuturnis, tertianis & quartanis, nec non ictero & hydrope magni effectus est.

Ad grana quinque vel sex exhibitum, per secessum & superiora nonnunquam purgat.

EXTRACTUM OPII.

REC. Opii Thebaici optimi uncias quatuor,
in frustula minutim scissum in cucurbita vitrea,
Aquæ communis, succi Citri libra semis acidulatæ, libris quatuor solve;

Solutum deple, & per emporeticam filtra, ac calore moderato balnei, ad extracti consistentiam inspissa.

Vires Opii depurati narcoticas aliasque notorias possidet.

In dosi, apud adultos, ultra duo, vel tria grana vix ascendere solemus.

EXTRACTUM OPII, seu OPIUM CYDONIATUM PER FERMENTATIONEM.

REC. Opii purissimi libram unam; successive solve in
Succi Cydoniorum &
Aquæ fontanæ frigidæ ana libris quinque.

Stent in loco temperato, semper impuritates liquori supernatantes auferendo, per aliquot dies; postea liquor per linteum coletur, ut a spisso & sordibus resinosis liberetur. Colaturæ adde
Sacchari albi uncias quatuor;

Reponantur in vase satis capaci, leviter saltem operculo tecto, ad fer-

fermentationem, in locum temperate calidum, per multos menses; sed cave, ne hoc fiat in conclavi clauso.

Durante fermentatione moveatur sæpius liquor baculo ligneo, & denuo reponatur, usque dum ne minimum quid de fermentatione, aut motu intestino liquoris, percipiatur; deinde per pannum colatur liquor, ad extracti consistentiam inspissandus.

Opium fermentatione non solum corrigitur, sed etiam in sua virtute exaltatur; parciori igitur dosi præscribendum est, licet saccharum & succus Cydoniorum dimidiam fere partem extracti constituant, ultra granum non offerri adulto debet, in teneris subjectis decima vel duodecima, imo vigesima pars grani sufficit.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

REC. Scammonii Aleppensis unciam unam,
Rhabarbari veri,
Seminis Ebuli ana drachmas sex,
Agarici albi drachmas septem,
Turbith. resinosi,
Hermodactylorum ana drachmas quinque,
Hellebori nigri unciam semis,
Foliorum Sennæ electorum uncias duas,
Colocynthidis drachmas decem.

Rhabarbarum, Hermodactyli, Helleborus & folia Sennæ minutim incisa infundantur in
Aquæ fontanæ bullientis libris duabus,

Macerentur per viginti quatuor horas, atque, post unicam ebullitionem, exprimantur, in expresso dissolvantur
Aloës Succotrinæ unciæ tres, atque seorsum serventur.

Reliqua vero, Scammonium, semen Ebuli, Agaricus, Turbith & Colocynthis per repetitam affusionem spiritus Vini rectificati s. q. extrahantur, extractiones, per chartam emporeticam filtratæ, cum solutione Aloës colata misceantur, atque spiritus in balneo abstrahatur, residuum vero, leni igne, ad extracti consistentiam redigatur.

Purgans creditur esse universale, quod omnes vitiatos humores e corpore educendi vim habeat.

Dosis grana decem ad quindecim.

EXTRACTUM PHLEGMAGOGUM QUERCETANI.

REC. Agarici trochiscati uncias quatuor,
Hermodactylorum,
Turbith,
Foliorum Sennæ,
Seminis Carthami ana uncias tres,
Radicis Esulæ præparatæ unciam unam,
Colocynthidis unciam semis,
Macis,
Salis gemmæ ana drachmam unam semis.

Præparetur ad normam extracti panchymagogi; Hermodactylos, folia Sennæ & Esulam, aqua fontana, sale gemmæ acuata, reliqua vero spiritu vini rectificato extrahendo, & in extracti consistentiam, leni calore, redigendo.

Seram educit, & additis fortioribus purgantibus, præscribitur hydropicis.

Dosis grana duodecim ad scrupulum unum.

EXTRACTUM RHABARBARI SIMPLEX.

Seligitur optimæ notæ Rhabarbarum, & aqua simplici, ad modum aliorum, fit extractum.

Pro basi pilularum, ubi aloëtica locum non inveniunt, adhiberi solet.

Dosis scrupulus semis ad grana quindecim.

EXTRACTUM FOLIORUM SENNÆ.

REC. Foliorum Sennæ mundatorum libram semis;
Macera viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ libris tribus,
loco calido.
Extractum tinctum exprime, ac dein, lenissimo igne, & ebullitione vix conspicua, evapora; alias enim fere omnem perdit vim alvum laxandi.

Inservit pro basi pilularum laxantium, ubi Aloë uti non licet.

Dosis grana duodecim ad scrupulum.

FÆCULA ARI RADICUM.

REC. Radicum Ari succulentarum, a sordibus & externa pellicula liberatarum, libras duas.
Minutim incisæ, & addita
Aquæ fontanæ libra una,
In mortario marmoreo probe contusæ, immittantur sacco cannabino, & sub prelo fortissime exprimantur. Succus expressus in vase vitreo, vel fictili vitreato, in loco frigido reponatur, ut pulvis albissimus subsideat, a quo liquor supernatans per inclinationem separetur, fæcula vero remanens in umbra exsiccetur.

Usus fæcularum obsoletus est: Zwelferus putat, fæculas plane e foro medico esse excludendas, & si quis præcise hujus generis medicamentum requirat, simplicem radicum mitiorum pulverem efficaciorem esse; acriorum vero fæculas facile admitti posse.

Modum præparandi adposuimus, ut, si forsan expetantur, etiam reliquæ fæculæ BRYONIÆ, PÆONIÆ, *&c. secundum hanc præscriptionem, parari possint.*

FLORES ANTIMONII HELMONTII.

REC. Antimonii crudi, bene triti, libram unam,
solvatur in
Aquæ regiæ libra una semis,
quod fit maxima effervescentia; cum summo æstu & fumis densis ruberrimis, qui tamen mox cessant.
Relicta in fundo materia, cineritii flavescentis coloris, humida, pultis instar, leni igne, baculo agitata, exsiccanda est.
Hujus materiæ siccissimæ, &
Salis Armoniaci pariter sicci
partes æquales
conterantur, quo diutius, eo melius, ut permisceantur quam optime; immittantur statim cucurbitæ vitreæ humili, latioris orificii, applicetur alembicus amplus, nitidus, & commissuræ luto ex lini farina optime claudantur, ponantur in furno arenæ; cucurbita vero parum versus alembici rostrum declinet, ut liquidum inter sublimandum ex alembico facile exstillare in excipulum appensum queat. Cucurbita etiam profunde in arenam immittitur, & arena ad marginem usque alembici apponitur; adhibetur ignis gradatim, primo lenis; prodibit aqua limpida acida, citatiore deinde igne elevantur albi flores. Ita æquabilis sustinetur ignis, eo gradu, ut capitelli calor manu ferri queat, ascendet omne fere cognitorum colorum genus in alembicum. Frigescant sponte, lenissime & summa cura eximatur cucurbita, detergatur a pulvere externo, & solvatur alembicus a cucurbita, cavendo a primo vapore. Sublimatum erit omne fere Antimonium cum Sale Armoniaco in materiam variegatam, cito eximendam, & intra vas vitreum calidum & siccum recondendam.

Validissimum, etiam minima dosi, hi flores Antimonii assumti præbent emeticum, edulcorati & ab omni salsedine abluti, pulverem exhibent rubrum, insipidum, de quo ultra grana duo adultioribus, ad vomitus ciendos, vix dare licet.

Chemicis usibus etiam inserviunt.

FLO-

FLORES BENZOES.

REC. Benzoës, quantum lubet; pulverisata immittatur cucurbitæ humili orificio ampliori; superimponatur, loco alembici, charta convoluta ad pyramidis vel coni, formam, in superiore parte perforata; adhibeatur ignis arenæ lenissimus, sic sublimabuntur flores albi, nivei, penetrantissimi saporis & odoris; singulis horis vel dimidiis, alembicus, seu pyramis chartacea mutetur, & flores sublimati colligantur, atque vitro inclusi serventur. Ex libra una Benzoës, non plus, quam uncia una & dimidia, vel duæ florum sublimantur. Signum sublimationis absolutæ est, si chartaceus alembicus oleo imbutus apparet.

NB. Alii methodo faciliori, flores Benzoës, majori in quantitate parare solent, atque hunc in finem retortam vitream, Benzoë vel Asa dulci, cum æquali quantitate arenæ lotæ, commixta, ad dimidias replent, & ex arena igne per gradus aucto destillant. Oleum, quod prodiit butyraceum, in aquæ fontanæ ferventis decuplo solvunt; solutionem adhuc ferventem, per pannum, aqua calida madefactum, ut oleum remaneat, trajiciunt, atque flores ex aqua refrigerata, charta bibula imponendos & nullo vel lenissimo calore siccandos, colligunt.

Laudantur ad asthma, & omnes pulmonum affectus; coagulum lymphæ mucido-serosæ solvunt, & sudores movent.

Dantur grana duo ad quatuor, ex ovo sorbili.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

REC. Salis Armoniaci, quantum vis; solvatur in aqua calida, solutio filtretur; postea in locum frigidum reponatur, & flores in liquore subsidentes exsiccentur; liquor vero remanens, pro ulteriori florum collectione, per exhalationem concentretur.

Sunt Sal Armoniacum depuratum, atque easdem vires obtinent.

Dantur, scopo resolvendi, in viscerum obstructionibus, præcipue ad febres intermittentes, a scrupulo uno ad drachmam dimidiam, imo integram.

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

REC. Limaturæ Martis, vel Lapidis Hæmatitæ, subtilissime triti, uncias quatuor,
Salis Armoniaci purissimi libram semis.

In pulverem redacta & optime mixta, ac aliquandiu loco frigido reposita, pellantur ex retorta vitrea, igne arenæ, gradatim aucto; primo destillabit liquor salinus penetrantissimus, tandem, satis intenso, sublimantur in collum retortæ flores, qui, præter alios usus, ad essentiam martialem parandam adhibentur.

Residuum in fundo retortæ, per deliquium in cella solvendum, liquori martiali externo adstringenti inservit.

Incidendi & dissolvendi, tonicam ac anodinam habent virtutem. Laudantur specifice ad Rhachitidem, in febribus, dolore capitis, suppressione mensium, lumbricis, & ad tonum ventriculi restituendum, nec non appetitum excitandum.

A nonnullis in medicamentorum infidorum classem referuntur, quæ sulphure vaporoso cum sale volatili subacri explicito spirituum animalium facultates & sensationes hebetant, & somnum inducunt, si largius sumantur; caute

caute igitur in præscribendis illis, ob vim tam adstringentem, quam ob narcoticam, versandum esse censent.

In dosi, pro tenera ætate, haud ultra granum dimidium, aut integrum; in adultioribus ad grana quinque, octo, vel decem ascendere licet.

FLORES SULPHURIS.

REC. Sulphuris communis, in frusta diffracti, quantum lubet.

Injice in cucurbitam terream, vitreatam, & imposito alembico amplo vitreo, ex arena sublima igne non nimium intenso, ne flores sublimati fluant, qui, mutatis sæpe alembicis, sunt colligendi, & denuo Sulphuris subinde aliquid cucurbitæ immittendum, quousque sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

Ad pectoris morbos, scabiem retropulsam, ulcera fœdita, interne assumti valent.

Dosis a granis duodecim ad scrupulum unum.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

REC. Florum Sulphuris simplicium uncias duas,
Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Croci scrupulum unum.

Subtilissime trita misceantur.

Loco digestivi purgantibus, præsertim salinis, præmitti possunt; adscribitur etiam vis alexipharmaca.

Dosis scrupulus unus.

GELATINA CORNU CERVI CITRATA.

REC. Rasuræ cornu Cervi purissimæ uncias sex.

Lavetur aqua tepida aliquoties, coquatur in
Aquæ fontanæ libris sex, ut restet libra una, sæpius coletur, ut clarificetur gelatina, cui, adhuc calenti, adde
Syrupi ex toto Citreo unciam unam.

Reponantur in locum frigidum.

Restaurat & humectat, in febribus malignis, ut & colliquativis, tabe &c. præscribitur.

GILLA THEOPHRASTI, sive SAL VOMITORIUM VITRIOLI.

REC. Vitrioli albi uncias sex, solvantur in
Aquæ fontanæ calentis libra una semis.

Solutio per chartam bibulam filtretur, atque rursus, leni igne, ad siccitatem evaporetur & servetur.

Utplurimum saltem vomitus excitat, rarissime per inferiora purgat. Ob magnam dosin nauseosum est remedium; datur enim a scrupulo dimidio ad drachmam in aqua calida. A nonnullis usus hujus Gillæ summe dissuadetur; sunt vero etiam, qui in apoplexia serosa, catarrho suffocativo, febribus, in peste, & ubi suspicio philtri est, magnopere commendant.

GLOBULI CARMINATIVI.

REC. Saponis Veneti uncias duas,
Fellis Tauri,
Seminis Cymini,
Sacchari albi ana unciam unam,
Nitri crudi unciam semis.

Fiant globuli diversæ magnitudinis.

Ad alvum aperiendam & flatus educendos, tanquam suppositoria adhibentur.

GLOBULI BEZOARDICI.

REC. Extremitatum pedum Cancrorum marinorum uncias quatuor,
Lapidum Cancrorum fluviatilium,

Mar-

Margaritarum Orientalium,
Coralliorum rubrorum ana unciam unam,
Succini albi præparati,
Radicum Contrayervæ,
Serpentariæ Virginianæ, ana drachmas sex,
Bezoar Orientalis drachmas tres,
Offium e cordibus cervorum scrupulos quatuor,
Croci optimi scrupulos duos,
Trochiscorum de viperis unciam unam.

Fiat pulvis, qui cum gelatina cornu cervi misceatur; unde formentur globuli, drachmam unam vel duas pendentes, post siccationem deaurandi.

Vires cardiacæ, alexiteriæ, & sudoriferæ sunt; commendantur in variolis & morbillis, febribusque malignis omnibus.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

GLOBULI MARTIALES (Gallis *BOULES MARTIALES* dicti.)

REC. Limaturæ Martis in alcohol tritæ libram semis,
Tartari albi pulverisati libram unam,
Misce, inde cucurbitæ, vel alii vasi vitreo, affunde
Spiritus Vini libram semis vel uncias octo;
Massam vel solis, vel fornacis, vel balnei calori expone, ut digeratur & leniter exsiccetur. Cui deinde denuo tritæ
Spiritus Vini eandem quantitatem affunde;
Digere postea & exsicca, laborem toties repete, donec massa quasi resinosa appareat. Ex qua globulos efforma, ad Ovi columbini magnitudinem.

Usus horum globulorum inprimis est externus ad vulnera; Hæmorrhagias, luxationes, sugillationes &c. Dissolvuntur in aqua & spiritu Vini, usque dum liquor bene saturatus sit, quo tum imbuuntur linteamina & applicantur.

GLOBULI MOSCHATI ALBI.

REC. Sacchari Canariensis uncias duodecim,
Amyli albi unciam semis,
Radicis Ireos Florentinæ drachmas duas,
Moschi optimi grana quatuor,
Zibethi granum unum.

Cum mucilagine gummi Tragacanthæ fiant globuli, diversæ magnitudinis.

Nonnulli Massam laccæ pictoriæ uncia dimidia tingere solent, atque

GLOBULOS MOSCHATOS RUBROS

exinde conficiunt.

Usus in suppositoriis notissimus.

GUMMI GUTTÆ PRÆPARATIO.

REC. Gummi guttæ in pulverem triti uncias tres.

Solvantur in aceti vini albi unciis novem, post sufficientem digestionem, clarum a spisso, per inclinationem vasis, separetur, atque leni calore in vase vitreo ad extracti consistentiam, acetum evaporetur.

Per hanc præparationem acrimoniam & vim emeticam, gummi guttam perdere, atque in securum purgans abire perhibent.

Hydropicis ad scrupulum dimidium exhibetur; serum enim potenter educit.

GUTTÆ ANGLICANÆ CEPHALICÆ.

REC. Spiritus volatilis Serici crudi, ab oleo empyrevmatico liberati, uncias quatuor,
Olei destillati Lavendulæ in spiritus Vini rectificati un-

uncia una soluti, drachmam unam.

Misceantur & digerantur, postea ex retorta destillentur.

Effectus e nomine patet; non solum vero sunt cephalicæ, sed & uterinæ & nervinæ.

Dosis guttæ triginta ad quadraginta.

HEPAR ANGUILLÆ PRÆPARATUM.

Vino abluatur, lentoque igne exsiccetur.

Ad partum difficilem & secundinarum retentionem, in pulvere, a scrupulo uno, ad scrupulum unum semis, non sine fructu exhibetur.

HEPAR CANIS RABIDI PRÆPARATUM.

Vino ablutum in clibano exsiccatur.

Ad Hydrophobiam a nonnullis commendari solet.

Dosis drachma dimidia ad integram.

HEPAR LUPI PRÆPARATUM.

Pari modo, in frusta dissectum, vino abluitur & exsiccatur.

Epatis vitiis conferre creditur, ideoque hydropicis, emaciatis, & tussientibus commendatur.

Dosis drachma una.

HEPAR SULPHURIS.

REC. Florum, vel Sulphuris purissimi flavi, uncias quatuor.

Fluant in vase figulino vitreato, & successive admisceantur

Salis Tartari siccissimi unciæ duæ,

optime spatula agita; & ab igne remota, serva.

Inservit tincturæ & syrupo, nec non lacti Sulphuris parandis.

HYDROMEL SIMPLEX.

REC. Mellis despumati uncias duas,
Aquæ fontanæ libras duas.

Coquantur & despumentur simul ad libræ unius semis remanentiam, colentur.

Ad diversas in Dispensatorio obvias compositiones requiritur.

INFUSUM LAXATIVUM MANNAGETTÆ.

REC. Foliorum Sennæ electorum drachmas tres,
Cremoris Tartari drachmam unam,
Passularum minorum drachmas tres,
Zinziberis albi scrupulum unum.

Infunde in
Aquæ Fontanæ ferventis unciis quatuor;

Post digestionem per viginti quatuor horas, exprime, in colatura dissolve
Mannæ Calabrinæ unciam unam,

albumine ovi clarifica.

Datur pro una dosi, eo effectu, quem inscriptio docet.

INFUSUM LAXATIVUM VIENNENSE.

REC. Foliorum Sennæ electorum uncias tres,
Passularum minorum unciam unam semis,
Radicum Polypodii querni drachmas tres,
Seminis Coriandri drachmas duas,
Cremoris Tartari unciam semis.

Misceantur & infundantur in
Aquæ fontanæ bullientis libris duabus semis,

post digestionem per aliquot horas exprimantur, in expresso dissolvantur
Mannæ electæ unciæ octo,

clarificentur & serventur.

Alvum leniter laxat, & ab unciis duabus, ad tres præscribitur.

Præstat vero recens paratum, quam asservatum diu, facile acescens.

JULAPIUM ROSATUM
sive
JULEPUS ROSARUM.

REC. Sacchari albissimi libras duas & semis;
solve in
Aquæ Rosarum unciis viginti.
Post unicam ebullitionem cola per pannum, & serva.

Utimur hoc & aliis julapiis ad edulcorandas emulsiones, & plerumque scrupuli duo vel tres adduntur unciæ aquæ, vel emulsionis.

JULAPIUM SAMBUCINUM.

Paratur eodem modo, quo julapium rosatum.

JULAPIUM VIOLARUM.

Ex aqua Violarum optima & Saccharo, uti præcedens, conficitur.

KERMES MINERALE, sive SULPHUR ANTIMONII RUBRUM.

REC. Nitri fixi libras duas semis,
solve in
Aquæ fontanæ libris quindecim,
solutionem filtra & seorsim serva.

REC. Antimonii crudi Hungarici, in frustula fracti, vel grossiori modo contusi, libras tres.
Superaffunde
Liquoris alcalini, modo præscripti, libras septem.

Coque in figulino vase, igne per unam vel alteram horam leniter continuato, postea liquorem effunde & filtra;

Eidem Antimonio liquoris iterum affunde libras quinque, & ut antea coque; liquorem effunde & filtra.

Tandem reliquam liquoris portionem Antimonio affunde, coque & filtra, uti dictum.

Liquor, per filtrum ita colatus, requiescat per viginti quatuor vel plures horas, sic pulvis rubicundus fundum petet, qui postea, affusa aqua calida, sæpius edulcoretur, & usui asservetur. Nonnulli spiritum Vini rectificatum super incendunt.

Est sulphur auratum Antimonii mitigatum. Creditur sanguinem per transpirationem mundificare, diuresin aperire. Datur in febribus intermittentibus, hydrope, asthmate, in cruditatibus primarum viarum. Agit leniter per superiora & inferiora.

Dosis est a grano uno ad quatuor vel quinque.

LAC SULPHURIS.

REC. Sulphuris citrini purissimi uncias duas,
Cinerum clavellatorum, vel salis Tartari uncias sex,
Aquæ fontanæ libras tres.

Coque in vase figulino, ad tertiæ partis consumtionem. Residuo per filtrum trajecto insperge aceti vini quantum satis ad præcipitationem; præcipitatum sæpius aqua fontana tepida ablue, & denique lenissimo calore exsicca.

Earundem virium est, ac flores sulphuris, & inprimis ad pectoris morbos adhibetur.

LAC VIRGINIS.

REC. Lithargyrii subtilissime triti libram semis;
Coque in
Aceti Vini destillati libra una semis,
ad consumtionem tertiæ aceti partis, tunc filtra. Colaturæ affunde
Aluminis crudi, in aquæ communis libris duobus soluti, uncias quatuor,
& albescet liquor, qui Lac Virginis vulgo dicitur.

Pro cosmetico habetur, quod tenerioribus; a solis calore quasi ambustis, promte succurrit, si faciem eo illinant.

nant. Etiam lentigines & serpigines delet. Quotidianum aut frequentem usum autem minime suademus.

Lac Virginis vulgo quoque vocatur, aqua quæcunque cosmetica in cujus unciam unam instillantur guttæ circiter decem Tincturæ Benzoës.

LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

REC. Lapidis Calaminaris libram unam,

Candefiat ter vel quater in crucibulo, atque toties in Aqua Plantaginis vel Rosarum extinguatur; postea siccatus in subtilissimum pollinem teratur, atque super marmore lævigetur.

Usus est externus in collyriis, unguentis & emplastris; siccat & adstringit.

LAPIS DIVINUS, sive OPHTHALMICUS.

REC. Vitrioli de Cypro,
Nitri purissimi,
Aluminis crudi ana uncias tres.

Optime contusa & pulverisata liquefiant in vitreo vase, calore arenæ, quibus liquefactis adde
Camphoræ tritæ drachmam unam semis.

Mixta & refrigerata massa servetur.

Adhibetur in collyriis, ad oculorum affectus.

LAPIS DE GOA.

REC. Coralliorum alborum,
rubrorum,
Bezoar Orientalis ana unciam unam,
Margaritarum Orientalium,
Lapidis Hyacinthi præparati,
Topasii,
Sapphiri,
Rubini ana unciam semis,
Smaragdi,
Moschi Orientalis,
Ambræ griseæ ana drachmas duas,
Foliorum Auri Nro. quadraginta.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui mucilagine Tragacanthæ, vel gelatina cornu cervi in pastam redigatur, ex qua formentur globuli ovali forma, qui, post siccationem in umbra, vel concha, vel dente lupino, ut eleganter niteant, poliantur.

Rari vel nullius usus est apud nos medicamentum hoc pretiosum; apponere tamen illud, curiositatis gratia, ex Pharmacopœa Bateana voluimus; vocatur alias Pedra cordial & Bezoar de Goa, *unde apportatur, & a Patribus Soc. Jes. Casparo Antonio & Nicolao Momitio componitur, atque pro arcano habetur. Vires bezoardicæ, antispasmodicæ & antepilepticæ potius Moscho, Ambræ & Bezoar adscribendæ sunt, quam lapidibus pretiosis. Unde præferendi his globulis merito globuli illi bezoardici, quorum descriptionem suo loco exhibuimus.*

Dosis est a scrupulo semis, ad scrupulum unum vel drachmam semis.

LAPIS INFERNALIS.

REC. Argenti purissimi uncias duas; solvantur in
Spiritus Nitri, vel Aquæ fortis unciis sex.

Evaporetur solutio ad quartæ partis consumtionem, atque ad crystallisationem reponatur. Crystalli colligantur, liquor denuo evaporetur, & labor repetatur, donec omnis liquor in crystallos vel salem abierit. Hos crystallos crucibulo satis magno immitte. Adhibe ignem primo lenem, tumebit materia, deinde subsidebit, tandem ignis gradu aucto olei instar fluet, quam effunde in modiolum, seu canalem ferreum cylindricum, prius calefactum & sevo illitum. Massa nigra & com-

compacta esse debet, alias denuo in crucibulo liquanda & effundenda, si successerit, in vitro probe clauso servanda.

Inservit loco cauterii potentialis, ad absumendas carnosas excrescentias.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

REC. Vitrioli albi uncias quatuor,
Salis Armoniaci unciam semis,
Cerussæ,
Boli Armenæ ana unciam unam,
Aceti Vini libram unam.

Coquantur in vase figulino ad siccitatem.

Commendantur ad ulcera omnis generis inveterata, scabiem, tineam, gangrænam, fistulas. Desiccat, mundat, & partes relaxatas roborat. Modus utendi est, ut uncia una in aquæ pluviæ libra solvatur; solutione filtrata laventur partes, atque lintea illa imbuta imponantur, vel ipse liquor, syringæ ope, injiciatur.

LAPIS PRUNELLÆ, sive NITRUM TABULATUM.

REC. Nitri crudi libram unam semis;
fundatur in crucibulo, dum fluit; injiciatur sensim
Sulphuris citrini uncia semis.

Parum una vice inspergendo & expectando, donec deflagrarit; hoc facto in rotulas parvas effundatur.

Propter hanc cum sulphure deflagrationem, multum ad salium neutrorum naturam accedit, ingratius etiam & minus refrigerans, quam Nitrum crudum, deprehenditur. Magis album evadit, si loco sulphuris, sal Ammoniacum adhibetur.

Admiscetur pulveribus temperantibus, & gargarismatibus.

Dosis scrupulus semis ad drachmam semis.

LAUDANUM DIURETICUM, sive URINARIUM, MICHAEL.

REC. Succi Liquiritiæ inspissati unciam unam semis,
Extracti opii, aqua fontana parati, drachmas duas,
Trochiscorum de Alkekengi,
Terebinthinæ Venetæ, ana unciam semis.
Camphoræ drachmam unam,
Croci scrupulos quatuor,
Tragacanthæ,
Mastichis ana drachmam semis.

M. F. Massa.

Laudatur in stranguria, colica nephritica & difficultate urinæ. Grana XIII. granum unum opii continent.

Dosis grana decem ad scrupulum unum.

LAUDANUM HYSTERICUM.

REC. Extracti opii unciam dimidiam,
Castorei drachmam,
Croci scrupulum,
Olei destillati Macis,
Menthæ,
Rutæ ana guttas sex.

M. Fiat massa pilularis.

In colica hysterica, ubi opiata locum inveniunt, ad spasticos dolores mitigandos datur.

Dosis granum unum ad duo.

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAMII.

REC. Opii optimi uncias duas,
Croci Austriaci unciam unam,
Cinnamomi acuti,
Caryophyllorum aromaticorum ana drachmam unam.

Omnia in pulverem trita infundantur in
Vini Hispanici libra una.

Digerantur per aliquot dies, colentur & serventur.

 Præ-

Præfert celeberrimus Author liquidum hoc Laudanum solido, ob formam commodiorem, & majorem dosis certitudinem, cum scilicet vino, aquæ destillatæ, aut alii liquori cuicunque instillari possit.

Viribus cum aliis tincturis & essentiis Opii sic dictis anodinis convenit, & a guttis sex, octo, ad quindecim dari potest.

Quælibet uncia habet Opii scrupulos quatuor, & drachma una, grana decem; Croci vero quælibet drachma continet grana quinque.

LAUDANUM OPIATUM.

REC. Extracti Opii, aqua fontana succo citri acidulata parati, uncias duas,
Croci,
Opobalsami veri ana drachmam semis.

Misce.

Easdem, quas Extractum Opii, vires habet, nisi, quod narcoticum Opii principium per Opobalsamum aliquantum correctum sit.

Dosis a grano dimidio ad tria.

LAUDANUM OPIATUM CYDONIATUM.

Videatur EXTRACTUM OPII CYDONIATUM.

LIQUOR ANODINUS MINERALIS.

REC. Olei Vitrioli, per rectificationem ab omni phlegmate liberati, libram unam,
Spiritus Vini rectificatissimi, qui ne vestigium aquæ continet, libras sex.

Oleum Vitrioli instillatur successive spiritui vini, quod cum strepitu, non secus, ac si ferrum candens in aquam frigidam injiceretur, fit, mixtura incalescit, colorem acquirit rubeum, odorem gratum. Digerantur, in vitro probe clauso, per aliquot dies; postea instituatur destillatio igne arenæ, e cucurbita satis alta; primo prodit spiritus vini fragrantis odoris, quem sequitur fragrantior. Si mixtura in offam nigram in fundo cucurbitæ abire incipit, aliud apponatur receptaculum, lenissimo igne administrato; quæ cautela, si non observetur, omnis massa illa nigra subito & ex improviso totum transcendit alembicum: si vero leni igne institutum pergatur, phlegma exstillat sulphurei odoris, cum oleo, quod fundum petit, æthereo, saporis & odoris gratissimi aromatici; oleum hoc, a phlegmate separatum, solvatur in spiritu priori prolecto. Residuo in cucurbita affunditur
Spiritus Vini rectificatissimi nova libra una semis,
& post digestionem destillatur; qui spiritus prolectus plerumque fragrantior est antecedente, neç viribus illi cedit, ideo cum illo miscendus, & omnes, vitro probe obturato, servandi.

Secuti sumus in hoc processu, beatum F. Hoffmannum, qui eum in Observat. Chymicis dedit. Sunt vero, qui Spiritus Vini rectificatissimi libras saltem quatuor, uni libræ olei vitrioli, probe dephlegmati, addunt, atque non solum Spiritum fragrantiorem, sed & majorem quantitatem olei ætherei producunt.

Liquor hic odore & sapore suo grato, nec non virtute anodina, antispasmodica se commendat; atque sudoriferum, alexipharmacum & diureticum simul præbet medicamentum egregium.

Dosis guttæ triginta ad sexaginta. Diu vero, vel improvide asservatus, acidum vitriolicum sistit evolutum, & quasi reviviscens.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

REC. Spiritus Cornu Cervi, aliquoties, ut ab oleo empyrevmatico liberetur, rectificati, uncias sex.
Salis volatilis Succini unciam unam

unam semis, vel quantum sufficit ad saturationis punctum.

Misceantur & digerantur, per aliquot dies, in vase probe clauso, postea per chartam emporeticam filtrata, serventur.

Virtutes ejus sunt diureticæ, diaphoreticæ, antispasmodicæ; adversus motus convulsivos epilepticos puerorum valet, & hystericis, hemicrania vexatis, convenit.

Dosis pro pueris guttæ tres, quinque, octo; adultis a guttis viginti ad quadraginta.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS ALBUS.

REC. Salis volatilis Cornu Cervi & Succini, depuratorum, portionem anaticam, scil. ana unciam unam. Solve in Aquæ cerasorum nigrorum unciis octo; filtrata serva.

Colore albicat, odore est non adeo empyrevmatico, viribus iisdem.

LIQUOR NITRI FIXI.

REC. Nitri depurati quantum libet. In crucibulo bene ignito ad fluorem perducatur, & successive particula carbonum injiciatur, usque dum flammam amplius non concipiat; tunc massa in mortarium calefactum effundatur, atque in cella per deliquium soluta ac filtrata, usui servetur.

LIQUOR SALINUS LAXATIVUS.

REC. Salis cathartici amari uncias tres,
Tartari solubilis tartarisati unciam unam,
vitriolati drachmas quatuor.

Misce, solve in
Aquæ fontanæ unciis quindecim,

Filtra per chartam.

Aperit, urinam ciet, laxat alvum.

Dosis drachmæ duæ ad tres.

LIQUOR STYPTICUS WEBERI.

REC. Vitrioli Hungarici,
Aluminis crudi ana libram dimidiam,
Phlegmatis Vitrioli, vel, in ejus defectu, Aquæ Plantaginis libras quatuor.

Coquantur, donec vitriolum & alumen soluta sunt. Reponantur in locum frigidum, liquor frigefactus & a crystallis, subinde enatis, separatus filtretur, & singulæ libræ filtrati liquoris, addatur
Olei Vitrioli uncia una.

Misceantur & serventur.

Externe ad vulnerum hæmorrhagiam compescendam adhibetur.

LIQUOR TARTARI, alias OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

REC. Salis Tartari, quantum placet.
Immittatur manicæ Hippocratis, reponatur per aliquot dies in cellam humidam, ut sal liquescat; decantetur liquor, & si opus fuerit, filtretur.

Usus internus rarus est, externe interdum ad cosmetica adhibetur; in chymicis frequentissime.

LIQUOR TARTARI SPLENETICUS.

REC. Tartari albi crudi puri,
Nitri crystallisati ana libram unam,

Detonentur, postquam exacte mixta fuerint, in crucibulo.
Massa salina in
Aquæ calidæ libris tribus
solvatur, coletur.
Lixivium hoc superfundatur
Tartari albi crudi pulverisati libræ uni,
Digerantur per octiduum, postea clarum a spisso per filtrum separetur & servetur.

Liquor est salinus, & cum tartaro solubili convenit, nonnihil tamen de Oleo tartari empyrevmatico participat. Commendatur in morbis ex obstructione viscerum ortis.

Dosis drachma una ad duas usque.

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI.

REC. Arcani, five terræ foliatæ Tartari ficciffimæ uncias duas;
fuperaffunde
Spiritus Vini optimi & rectificatiffimi uncias octo.

Digerantur per aliquot dies, fpiritus lento igne aliquoties cohobetur, tandem liquor tinctus, per chartam filtratus, fervetur.

Egregium eft antihypochondriacum, antarthriticum, atque in febre quartana & omnibus morbis, ab obftructionibus ortis, feliciter adhibetur.

Dofis guttæ triginta ad fexaginta.

Si, loco Spiritus Vini, aquæ fontanæ adhibentur unciæ fex, liquor inde emergens falinus, in iisdem affectibus, a drachma una ad duas dari poteft. Alvum prompte laxat & urinam expedit.

LIQUOR VISCERALIS.

REC. Extracti Chamædryos,
Cichorii,
Trifolii fibrini,
Martis pomati ana drachmas tres,
Spiritus Nitri dulcificati,
Effentiæ corticum Aurantiorum ana uncias duas,
Aquæ corticum Citri uncias fex.

Digerantur mixta, per aliquot dies, & filtrata ferventur.

Commendatur in Cachexia, hypochondriaco malo & flatulentia.

Dofis drachma una ad drachmas duas, in vino.

LIQUOR VULNERARIUS MINERALIS, five BALSAMUM VULNERARIUM MINERALE DIPPELII.

REC. Lapidis Hæmatitæ, in pulverem triti, libram dimidiam,
Tartari crudi libram unam.
Mixtis affundantur
Aceti Vini deftillati libræ tres;

Digerantur in loco calido, poftea acetum per alembicum abftrahatur, bis vel ter cohobetur, atque ultima deftillatione ad ficcitatem evocetur. Refiduo fuperaffundantur
Spiritus Vini rectificati unciæ viginti;

Digerantur per octiduum. Clarum a fpiffo feparetur & fervetur.

Eft Tinctura Martialis adftringens, & tam interne, quam externe, in nimiis hæmorrhagiis & vulneribus, adhiberi poteft.

Dofis interne guttæ quadraginta ad fexaginta.

LIQUOR VULNERARIUS VEGETABILIS, five BALSAMUM VULNERARIUM DIPPELII.

REC. Herbarum Nummulariæ,
Betonicæ,
Chærefolii,
Plantaginis,
Ariftolochiæ clematitidis ana uncias duas,
Saniculæ,
Verbafci,
Sedi majoris,
Craffulæ, five Telephii minoris,
Vincæ-per-vincæ,
Pimpinellæ albæ ana uncias tres,
Foliorum Quercus,
Summitatum Millefolii ana uncias duas.

Contundantur & exprimantur fortiter; fuccum expreffum cum
Aceti Vini æquali parte, &
Salis Gemmæ pulverifati unciis quatuor,
deftilla, ex cucurbita vitrea, ad ficcitatem, liquorem prolectum ferva.

Ad

Ad vulnera recentia partium carnosarum, externe adhibendus, commendatur.

Qui, loco aceti, spiritum vini adhibent, eundem effectum etiam in vulneribus partium tendinosarum sibi promittere, & ad hæmorrhagias sistendas adhibere possunt.

LOCH AD ASTHMA, sive DE SCILLA.

REC. Scillæ præparatæ unciam semis,
Marrubii,
Hyssopi ana drachmam unam,
Iridis Florentinæ drachmas duas,
Myrrhæ,
Croci ana drachmam semis.
In pulverem trita excipiantur
Mellis despumati unciis sex.
Fiat Loch, sive Eclegma.

Pituitam viscosam resolvit, indeque natam tussim & respirationem difficilem levat.

Uncia una hujus eclegmatis continet Scillæ grana triginta sex.

Dosis drachma semis ad drachmam unam semis.

Majori quantitate sumtum vomitum excitat.

LOCH DE FARFARA.

REC. Radicum Farfaræ recentium, quantum lubet;
Coquantur ad mollitiem, contundantur in mortario lapideo, & per cribrum trajiciantur.
Hujus pulpæ libræ uni adde
Mellis despumati libras duas;
Coquantur ad humiditatis superfluæ consumtionem, postea serventur.

Acrimoniam humorum obtundit, simulque abstergit & mundificat, atque phthisicis & tussientibus confert.

Dosis uncia dimidia ad integram.

LOCH DE PULMONE VULPIS.

REC. Pulmonis vulpis præparati,
Succi Glicyrrhizæ,
Capillorum Veneris,
Seminis Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Sacchari clarificati uncias quindecim.
Omnia tenuissime trita saccharo excipiantur, & ad debitam formam redigantur.

Pectori dicatum est, prodest phthisicis & tussientibus, resolvit ac abstergit.

Dosis drachmæ duæ ad tres.

LOCH SANUM ET EXPERTUM.

REC. Aquæ Loch sani destillati libram unam,
Pinearum mundatarum,
Amygdalarum mundatarum,
Seminis Papaveris albi ana unciam semis,
Fiat emulsio; in qua dissolve
Sacchari albi uncias viginti, insperge
Pulveris Liquiritiæ,
Tragacanthæ albæ,
Gummi Arabici,
Amyli ana drachmas tres,
Iridis Florentinæ drachmas duas.
Misceantur, agitentur diu & celeriter, quo albescant; postea reponantur.

Tussi siccæ, ab acri materia ortæ, subvenit, expectorationem adjuvat.

Dosis est drachmæ duæ ad unciam semis.

LOCH SAPONATUM PHARM. EDINB.

REC. Saponis medicati, vel Veneti drachmam unam,
Olei Amygdalarum unciam unam,
Syrupi capillorum Veneris vel Balsamici unciam unam semis.
Misceantur exacte.

Resolvit, & non solum in asthmate, sed etiam in affectibus renum, calculo & nephritide cum fructu dari potest.

Dosis drachmæ duæ ad unciam semis.

LUMBRICORUM TERRESTRIUM PRÆPARATIO.

Lumbrici terrestres vivi in fictili patina satis magna reponantur, ut terram eructent; quo facto aqua pura abluantur, & iterum reponantur, donec omnes sordes deposuerint. Deinde Vinum superfundatur album, & Lumbrici, per quatuor horas macerati, in clibano, ne putrescant, cito exsiccentur.

Vires sunt aperientes, diureticæ, diaphoreticæ & anodinæ; hinc in affectibus arthriticis, convulsivis & epilepticis, bono cum successu adhibentur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

MAGISTERIUM CORALLIORUM.

REC. Coralliorum in pulverem tritorum quantum vis;
his affundatur
Acetum destillatum forte, ad supereminentiam aliquot digitorum, & in
locum calidum reponantur, ut solvantur. Solutio filtretur, & oleum Tartari per deliquium instilletur, atque pulvis inde præcipitatus, aqua fontana probe edulcoratus, siccetur.

Olim valde commendata fuerunt magisteria, & huic coralliorum roborantes, cordiales virtutes attributæ sunt. Hodie a plurimis & experientissimis Medicis simpliciter præparata illis merito præferuntur.

Præscripta methodo etiam reliqua MAGISTERIA MARGARITARUM, MATRIS PERLARUM, & OCULORUM CANCRORUM præparari possunt.

MAGISTERIUM GUMMI GUTTÆ.

videatur
GUMMI GUTTÆ PRÆPARATIO.

MAGISTERIUM MARCASITÆ.

REC. Aquæ fortis libram semis,
Bismuthi, vel Marcasitæ uncias tres.

Marcasitæ grosso modo contusæ affunde primo Aquæ fortis uncias duas; si inde nata effervescentia & solutio cessaverit, alias Aquæ fortis uncias duas affunde, & hoc continua, donec omnem Aquam fortem affuderis, qua methodo Marcasita omnis solvitur; solutionem aqua fontana, magna copia affusa, & sale Tartari parum alcalisata, præcipita, præcipitatum edulcora & serva.

Usus est cosmeticus, & admiscetur drachma una aquæ liliorum alborum, vel Nymphea unciis quatuor; vel si placet Unguentum, sumitur rosatum, & unciæ uni drachma hujus magisterii additur.

Prostant exempla, quod nimis diuturno & frequenti usu faciem misere defœdarit.

MAGISTERIUM SATURNI.

REC. Aceti Lithargyrii quantum lubet, instilletur solutio Cinerum clavellatorum aqua fontana parata, præcipitabitur pulvis albus, qui, affusa aqua tepida copiosa, edulcorandus & servandus.

Usus est ad cosmetica & collyria.

MAGNES ARSENICALIS.

REC. Arsenici crystallini,
Antimonii crudi,
Sulphuris flavi ana uncias duas.

Fiat omnium pulvis subtilis, quem in vitrea retorta arenæ impone, ac in igne, sensim aucto, tam diu detine, a fumo exhalante solicite

te tibi cavendo, donec omne deliquescat, quod stilo ferreo mundo explorari potest; tum refrigescat retorta, qua fracta, materiam, lapidis instar induratam, fusci coloris, exime ac serva.

Est ingrediens emplastri magnetici, & ita vocatur, quia credebant, illud malignitatem bubonis extrahere, non secus, ac magnes ferrum trahit.

A sulphure Arsenicum ita mitigatum est, ut vis caustica ejus timenda non sit.

MAGNESIA ALBA.

REC. Residui lixivii, a crystallisatione Nitri, quod omnem crystallisationem respuit, & a nitrariis, Mater Nitri vocatur, quantum libet.

Evaporetur in vase figulino, vel ferreo, ad dimidiæ partis consumtionem; liquori instilletur solutio salis alcali, vel cinerum clavellatorum, ad singulas libras lixivii, ad dimidias evaporati, salis alcali unciam unam sumendo; præcipitabitur, sub quadam effervescentia, pulvis albicans; liquorem supernatantem, per inclinationem vasis, separa, atque ulteriori coctione ad siccitatem evapora. Materiam griseam crucibulo candenti cochleatim immitte, atque funde, & dum fumare desinit, in laminam vel marmor effunde, aqua tepida dissolve, & pulverem albissimum, qui levissimus esse debet, superfusa copiosa aqua fontana, edulcora atque sicca.

Tanquam polychrestum & universale ad omnes morbos, sub specioso titulo Panaceæ quondam ad nos pervenit, & pro arcano habita est; nunc nitri coctores præparare sciunt. Virtute gaudet absorbente, & minori dosi exhibita, nonnunquam diuretica & diaphoretica; si vero largiori dosi, ad drachmam unam, vel duas datur, & humores acidos in primis viis invenit, alvum laxat & evacuat. Modus exhibendi est, vel drachmas duas cum emulsione amygdalarum mane propinare, vel salis Anglici cathartici drachmis quatuor vel sex, unam drachmam Magnesiæ addere, & simul in aqua dissoluta, exhibere. Qua posteriori methodo effectum satis laudabilem purgantem, absque ulla molestia, edit, & præcipue illis convenit, qui ardore ventriculi, quem Sodam vocant, vexantur.

Prodest etiam teneris infantibus, ad lactis & pulmentorum acrimoniam, in ventriculo subortam, contemperandam. Datur his a granis quinque ad scrupulum semis & ultra, pro ratione ætatis.

MANDIBULÆ LUCII PISCIS PRÆPARATÆ.

A sordibus mundatæ, in subtilissimum pollinem tritæ, & per linteum trajectæ serventur.

Vulgo specificum antipleuriticum habentur.

A drachma semis ad scrupulos dari possunt duos.

MARGARITÆ ORIENTALES ET OCCIDENTALES PRÆPARATÆ.

Antea in pollinem tritæ, super marmore, sicut corallia, lævigantur.

Cordiales illis virtutes adscribuntur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

MASSA LIQUIRITIÆ ALBA, vide PASTA ALTHEÆ.

MASSA LIQUIRITIÆ FUSCA PHARM. PARISIENS.

REC. Extracti vel succi liquiritiæ Hispanici, uncias octo,
Gummi Arabici, libras duas,
Sacchari albi libram unam,

Solvantur in aquæ communis S. Q. coquantur leni igne ad extracti solidi consistentiam, massam calentem, supra tabulam marmoream oleo amygdalarum inun-

ctam effunde, & in bacillos, leni calore ſiccandos, atque calido loco aſſervandos, redige.

Humores acres temperat, atque in tuſſi ſicca & catarrhis commendatur.

MASSA PRO FORNACE, ODORIFERA.

REC. Benzoës uncias ſex,
Storacis calamitæ uncias quinque,
Ladani drachmas ſex,
Terebinthinæ unciam ſemis.

Pulveriſata immittantur ſartagini, atque in vas aquæ bullientis demittantur, quo liqueſcant; liquatis adde
Olei deſtill. Ligni Rhodii,
Caryophyllorum,
Lavendulæ ana ſcrupulum unum,
Balſami Indici nigri drachmam unam ſemis,
Spodii nigri præparati drachmas duas.

Optime miſceantur, & formentur ex maſſa cylindri, ceræ ſic dictæ hiſpanicæ inſtar.

Ad ſuffimenta inſervit, & fornaci calidæ affricta, totum conclave grato odore replet.

MATERIA PERLATA, ſive MAGISTERIUM ANTIMONII DIAPHORETICI.

REC. Antimonii diaphoretici, recens detonati, nondum edulcorati libram unam.

Coquatur in vaſe figulino; additis
Aquæ fontanæ puriſſimæ libris octo,
ad quartæ partis conſumtionem.

Aqua, Nitro antimoniato imbuta, calide per filtrum trajiciatur, & aceto inſtillato præcipitetur; pulvis albus præcipitatus edulcoretur; reſiduum vero Antimonium diaphoreticum ulterius aqua tepida ablui & ſervari poteſt.

Eædem ſunt vires, quæ Antimonii diaphoretici. Commodiſſime additur emulſionibus, quibus ſe, ob ſubtiliſſimas particulas intime commiſcet.

Doſis eſt a granis decem ad ſcrupulum unum.

MEL ANTHOSATUM.

REC. Florum Roriſmarini recentium, vel, ſi deficiant, herbæ uncias octo,
Aquæ fontanæ uncias quatuor,
Mellis deſpumati calentis libras duas.

Infundantur in vitro, & poſt digeſtionem per decem vel duodecim dies, in loco calido inſtitutam, in Mariæ balneo ebulliant, atque mel expreſſum & colatum ſervetur.

Cerebro & ventriculo roborando, flatibus diſcutiendis, colicis & uterinis doloribus leniendis medetur. Clyſmatibus etiam addi poteſt.

MEL DESPUMATUM SIMPLEX.

REC. Mellis libras quatuor,
Aquæ fontanæ uncias octo.

Ebulliant, deſpumentur & per pannum colatum mel ſervetur.

Inſervit ad incorporanda electuaria.

MEL MERCURIALE.

REC. Succi herbæ Mercurialis libras tres,
Mellis optimi libras duas,

Miſceantur, & leni igne ad juſtam conſiſtentiam coquantur, colentur & ſerventur.

Additur enematibus, ad alvum emolliendam & ſollicitandam, ab uncia una ad duas.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

REC. Foliorum Roſarum recentium rubrarum libras ſex, affunde

Aquæ

Aquæ fontanæ ferventis libras totidem.

Macerentur per viginti horas in vaſe figulino, exprimantur & colentur. Colaturæ adde

Mellis optimi & puriſſimi tantundem.

Deſpumentur & coquantur ad conſiſtentiam melle paulo liquidiorem.

Uſus eſt ad oris ulcera, gargariſmata, collutiones, injectiones mundificantes & detergentes. Additur etiam digeſtivis, & quando ulcera, a veſicatoriorum applicatione inducta, purganda & detergenda ſunt.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

REC. Succi roſarum pallidarum libras tres,

Mellis optimi libras duas.

Mixta diſſolvantur, deſpumentur, & ad juſtam conſiſtentiam, lento igne, evaporentur.

Rarus ejus uſus eſt internus, plerumque additur clyſteribus, ab uncia una ſemis ad uncias duas.

MEL SAMBUCI.

REC. Florum Sambuci recentium decerptorum libram unam;

Macerentur in

Mellis deſpumati libris duabus,

in vaſe vitreo, additis

Aquæ florum Sambuci unciis ſex, per aliquot dies.

Ebulliant poſtea lento igne, & exprimantur; expreſſum coletur, & ad juſtam conſiſtentiam evaporetur.

Uſus eſt ad gargariſmata reſolutiva, ubi emolliendo dolores, ex inflammatione ortos, mitigat.

MEL VIOLARUM.

Paratur, ſicut Mel Roſarum ſimplex, pro Infuſione florum roſarum, Infuſionem violarum ſumendo.

Virtute & uſu cum antecedente Roſarum ſolutivo convenit.

Doſis eadem.

MERCURIUS DULCIS.

REC. Mercurii ſublimati corroſivi,

Vivi, optime purgati, ana libram ſemis.

Terantur in mortario vitreo, & ſub tritura aqua fontana parum humectentur, atque ſolicite permiſceantur, donec Mercurii vivi nil quidquam appareat, tum rurſus exſiccata e cucurbita vitrea, igne convenienti arenæ, in cupella terrea ſublima; fæces in fundo relictas, ut & materiam nigricantem, in collo altius ſublimatam, aufer. Mercurium ſic ſublimatum, in pulverem tritum, denuo ſublima, ſublimatumque ſerva, & ſi forte reſtet metallici ſaporis aliquid, præſtabit, illum aqua fontana edulcorare, quam, ſæpius ſublimando, vi ſua laxativa privare.

Egregium eſt, & ex optimis, quæ in Medicina habemus, remedium; accuratam vero & diligentem expoſcit, tam præparationem, quam rationem adhibendi circumſpectam & providam.

Signum rite præparati Mercurii eſt, ſi inſipidus, & omnis metallici ſaporis expers eſt.

Caveant vero pharmacopœi, illum cum ſalibus, cujuſcunque ſint generis, terere, & ſi cum ſalibus ſit a Medicis præſcriptus, illum, ſeorſim pulveriſatum, demum commiſcere meminerint.

Reliquæ cautelæ e practicorum libris petendæ ſunt; nimis longum enim foret, ſi omnes virtutes, adhibendi modos, & cautelas hic inſerere deberemus.

Paucis dicimus: Mercurium dulcem non ſolum vires laxandi, ſed ſanguinem etiam depurandi, & minutiſſimos obſtructos tubulos ac meatus reſerandi poſſidere.

In morbis igitur, ab obſtructione glandularum & viſciditate lymphæ ortis, venerea lue, ſcabie pertinaci ac ulceribus inveteratis remedium eſt, quod par ſibi non habet.

Datur vero vel cum extracto quodam laxante, in forma pilulari, vel cum conserva rosarum, aut alia, in boli forma.

Dosis grana quinque, decem, ad duodecim.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS, SEU COSMETICUS.

REC. Mercurii vivi uncias quatuor.

Dissolve in

Aquæ fortis unciis octo;

Postea solutione Salis communis, aqua fontana facta & probe saturata, in album pulverem præcipita, qui ab omni salsedine & acrimonia aqua communi debite eluatur, & lenissimo calore, ne flavescat, exsiccetur.

Adhibetur a nonnullis interne ad salivationem excitandam; sed securius externe ad lichenes, scabiem & tophos venereos eo utimur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

REC. Mercurii vivi purificati libram semis.

Dissolve in Aquæ fortis sufficiente quantitate, destilla ex retorta in arena ad siccitatem, igne fortissimo in fine administrato, sic ut retorta ubique carbonibus obruatur. Post refrigerationem in fundo hærebit pulvis ruber, qui, si non colore rubro pulche splendet, leniter in patina ulterius calcinetur.

Usu interno, cum corrosivus sit, nunquam adhiberi debet. Externe ad auferendas excrescentias carnosas, carnem luxuriantem, & mundificanda ulcera maligna celebratur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS VIRIDIS.

REC. Mercurii vivi purissimi uncias quatuor,

Cupri unciam semis.

Solvantur singula seorsim in sufficiente quantitate Aquæ fortis, misceantur soluta, & Aqua fortis in vase vitreo, igne arenæ, evaporetur ad siccitatem.

Massæ salinæ Aceti destillati libram unam

affunde, digere & solve, atque acetum abstrahe, residuam massam viridem in pulverem tere atque serva.

Laudatur quidem specificum medicamentum in Gonorrhœa, & aliis morbis venereis, interne exhibitum; nos vero ejus usum internum dissuademus, ob vim emeticam & drasticam. Externe ad ulcera mundanda locum habet.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

REC. Mercurii vivi libras duas.

Solve in sufficiente quantitate

Aquæ fortis; solutionem ad siccitatem evapora.

Massæ albæ admisce

Vitrioli, ad albedinem calcinati, libras tres,

Salis marini decrepitati tantundem.

Imple ea cucurbitæ vitreæ tertiam partem, impone arenæ, ut cucurbita fundum cupellæ attingat. Orificium vasis sublimatorii apertum relinquitur, usque dum omnis humiditas exhalaverit, tum obturatur charta convoluta; ignem primo adhibe lenem, quem per gradus auge, donec omnis Mercurius sublimatus sit, quod circiter post sex vel septem horas continget; refrigeratum sublimatorium frange, & Mercurium sublimatum exemptum serva.

Præstantissimum est ac fortissimum omnium venenum. Operationibus chymicis inservit; in medicina & chirurgia fere nullius usus, nisi, quod aquis phagedænicis addatur.

MERCURIUS VITÆ.

REC. Butyri Antimonii libram semis,

Aquæ fontanæ purissimæ libras sex.

Mi-

Misceantur, albescent & præcipitabitur pulvis subtilissimus albus ad fundum, qui sæpius, aqua tepida affusa, edulcorandus, & leni calore exsiccandus est.

Minime est productum mercuriale, sed antimoniale.

Rarus est ejus in medicina usus. Vires sunt vomitoriæ; ita, ut grana duo vehementes excitare soleant vomitus; præstat, vini unciis duabus grana sex vel octo infundere, & vinum per filtrum trajectum offerre.

Cum triplo Nitri detonatum exhibet BEZOARDICUM MINERALE.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Ab omni immunditie separati imprægnentur vino albo, & leni calore exsiccati serventur.

Egregie resolvunt & aperiunt. Usus eorum est in febre quartana, ictero, asthmate, hydrope, affectibus spasmodicis, urina pellenda.

Dosis scrupulus semis ad drachmam semis.

MIXTURA SIMPLEX ALBA.

REC. Spiritus Tartari, e Tartaro purificato destillati, uncias duodecim,
Spiritus Vitrioli rectificati uncias tres.

Misce & destilla per retortam ad siccitatem; spiritus, qui prodiit volatilis, sulphureus & anodynus, commisceri debet cum spiritus theriacalis camphorati unciis viginti, ac in vitro probe clauso servari.

NB. Spiritum Tartari cum spiritu Vitrioli separatim destillandum suademus, ut empyrevmaticum spiritus Tartari principium ab acido vitriolico absorbeatur, & spiritus limpidior atque gratior, nec non principio vitriolico anodyno imbutus obtineatur.

Vires sunt alexipharmacæ, diaphreticæ, carminativæ, anodynæ; datur in febribus continuis, rhevmaticis, variolis, ubi leniter transpirationem auget.

Dosis a guttis triginta ad quinquaginta, vel sexaginta, vel sola, vel in potionibus cum pulveribus bezoardicis.

MIXTURA SIMPLEX LUDOVICI.

REC. Tincturæ Bezoardicæ L. uncias quinque,
Spiritus Tartari volat. rectific. uncias quatuor,
Vitrioli rectificati, unciam unam,
Camphoræ scrupulos duos.

Misceantur & digerantur.

Intercedit differentia inter mixturam simplicem ordinariam, & hanc Ludovici. Prior cum Spiritu theriacali, hæc vero cum Tinctura bezoardica paratur, cujus singula uncia granum opii continet.

Vires sunt eædem ac mixturæ simplicis ordinariæ; Magis tamen hæc anodina & sudorifera est, propter opium, quod Tincturæ bezoardicæ ingrediens est.

Dosis guttæ quadraginta ad quinquaginta.

MIXTURA SIMPLEX ORDINARIA.

REC. Spiritus theriacalis camphorati uncias quinque,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli boni unciam unam.

Misceantur & digerantur aliquandiu, in vitro bene clauso.

Viribus cum præcedente convenit, atque eadem dosi exhibetur.

MIXTURA TONICO NERVINA STAHLII.

REC. Spiritus cornu cervi rectificati unciam unam,

Tincturæ Antimonii acris uncias duas.

Misceantur & serventur in vitro probe obturato.

Optimi usus esse hanc mixturam ad viscera roboranda, horumque tonum debilitatum restituendum, Clarissimus Author & alii perhibent; unde inprimis in morborum chronicorum declinatione, post graviores quascunque excretiones & viscerum oppletiones, infarctum &c. ea utuntur.

Dosis, bis in die, ad guttas viginti usque quinquaginta.

MORSULI AD ARDOREM VENTRICULI, vel SODAM.

REC. Cretæ præparatæ,
Cornu Cervi usti præparati,
Oculorum cancrorum præparatorum ana drachmas tres,
Boli Armenæ præparatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Nucis moschatæ drachmam unam.

Pulverisata, fiant cum sacchari in Aqua cerasorum soluti, & ad consistentiam tabulati cocti, unciis duodecim, morsuli.

Usus ex titulo cognoscitur; sumuntur quovis tempore ad unciam dimidiam, imo integram.

MORSULI IMPERATORIS.

REC. Cinnamomi acuti drachmas duas,
Specierum Imperatoris pro morsulis grosso modo incisarum, drachmas sex,
Corticum Aurantiorum conditorum,
Citri conditorum,
Carnis Citri conditæ ana unciam unam,
Amygdalarum dulcium unciam unam semis.

Condita & Amygdalæ mundatæ minutim incidantur, & postea cum
Sacchari, in Aqua rosarum soluti & ad consistentiam tabulati cocti, unciis sedecim mixta,

Fiant morsuli.

Est medicamentum stomachicum ori gratum; datur inprimis aquas minerales bibentibus.

MORSULI PURGANTES.

REC. Magisterii, sive resinæ Jalappæ drachmam unam,
Optime teratur cum
Amygdalarum dulcium drachmis tribus,
His adde
Cardamomi minoris scrupulum unum,
Cinnamomi acuti scrupulos duos,
Sacchari, in Aqua rosarum soluti & ad consistentiam tabulati cocti, uncias septem semis.

Fiant morsuli.

Uncia morsulorum horum grana circiter octo continet magisterii.

Datur pueris, qui alia medicamenta respuunt.

Dosis, pro ratione ætatis, drachma una, duæ, ad sex.

MORSULI ANTIMONIALES KUNCKELII.

REC. Amygdalarum dulcium minutim incisarum unciam unam,
Cinnamomi acuti, minutim incisi, drachmas duas,
Cardamomi minoris drachmam semis,
Antimonii crudi purissimi, subtilissime pulverisati, unciam semis,
Sacchari albi, in Aqua rosarum soluti, & ad consistentiam tabulati cocti, uncias septem.

Fiant morsuli.

Magnæ tribuuntur vires his morsulis ad scabiem ulcerosam, reliquias a variolis,

riolis, gonorrhœam male tractatam, affectus convulsivo- & spastico-arthriticos.

Uncia una continet Antimonii drachmam semis.

Dantur a drachmis duabus, ad unciam dimidiam, singulis diebus mane & vesperi ante somnum.

MORSULI CONTRA VERMES.

REC. Seminis Cynæ,
Musci corallini ana unciam semis,
Æthiopis mineralis,
Jalappæ resinosæ ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas duas.

Omnia pulverisata commisceantur cum
Sacchari albi, in aqua Rosarum soluti, & ad consistentiam tabulati cocti, uncias septem.

Fiant morsuli.

Dantur infantibus, medicamenta alia anthelmintica reformidantibus.

Qualibet uncia habet Æthiopis mineralis scrupulum unum & totidem Jalappæ.

Dosis igitur infanti a drachma una ad duas.

MUCHARUM ROSARUM.

REC. Florum Rosarum Damascenarum recentium libras octodecim.

Infundantur & macerentur, horis viginti quatuor, in
Aquæ claræ ferventissimæ totidem libris;

Postea exprimantur, & in vasis angustioribus, oblongis collis præditis, superaffuso Olei olivarum modico, serventur.

Inservit conficiendis, etiam extra florendi tempus, syrupis & melli rosatis.

NITRUM ALKALISATUM vel FIXUM.

Videatur LIQUOR NITRI FIXI.

NITRUM ANTIMONIATUM.

Fit, aquam, in qua Antimonium diaphoreticum, *post detonationem*, solutum fuit, evaporando ad siccitatem, & sal siccum asservando.

Ad naturam salium mediorum accedit, & calcis Antimonii particeps est. Datur ad humorum orgasmum contemperandum, & pulveribus absorbentibus additur.

Dosis ad drachmam semis & ultra.

NITRUM CRYSTALLISATUM ET DEPURATUM.

Solvatur Nitrum in aquæ fontanæ sufficiente quantitate, leni calore; liquor, per pannum colatus, ad crystallisationem reponatur. Crystalli longæ pyramidales colligantur & serventur.

Viribus præcellit hoc nitrum crystallisatum vulgare, & divinum est remedium in exæstuatione sanguinis, febribus ardentibus, fere omnis generis, in variolis etiam, purpura, ubi sedativa & antispasmodica virtute eminet.

Dosis a granis sex ad triginta, in vehiculo aquoso.

NITRUM PERLATUM.

REC. Nitri crystallisati puri uncias quatuor,
Matris Perlarum præparatæ unciam semis.

Misce.

Commendatur in febribus continuis & malignis, ac haud inferior est illi, quod cum Margaritis paratur.

Dosis a granis quinque ad scrupulum unum.

NITRUM ROSATUM.

REC. Infusionis Rosarum rubrarum saturatæ libram unam.

In hac diſſolve,
Nitri crudi cryſtallini libram ſemis;
Evaporet ſolutio lento igne, ad dimidias, poſtea ad cryſtalliſandum repone, cryſtallos ſiccatas ſerva.

Additur gargariſmatibus in faucium & tonſillarum inflammatione, cum abſorbentibus in dyſenteria etiam maligna ſecure adhibetur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

NITRUM SATURNINUM.

REC. Nitri crudi cryſtalliſati uncias tres,
Sacchari Saturni uncias duas.
Solvantur in aquæ Roſarum ſufficiente quantitate, & in vaſe vitreo, ad pultis craſſioris conſiſtentiam evaporentur, poſtea leni calore penitus ſiccentur.

Uſus eſt externus, & in magna faucium inflammatione ac uvulæ laxitate, gargariſmatibus, & in oculorum inflammatione, collyriis additur. Illos autem, quibus uſus internus, ad ſanguinis mictum & gonorrhœam, a laxitate partium ortam, ſupprimendum arridet, ut vel penitus abſtineant, quod tutius eſt, vel nunquam certe ultra grana ſex, pro una doſi, commendent, monemus.

NITRUM TABULATUM.

Videatur LAPIS PRUNELLÆ.

OCULI CANCRORUM CITRATI.

Parantur, ut conchæ citratæ, atque

Effectu diaphoretico, bezoardico & diuretico præcellunt præparatis.

OCULI CANCRORUM PRÆPARATI.

Lapilli Cancrorum crudi aliquoties aqua fontana abluuntur, & rurſus ſiccati, in pollinem ſubtilem teruntur, atque per linteum trajecti, ſervantur.

Abſorbentes ſunt, diuretici, & in febribus omnis generis locum habent.
Commendari a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos ſolent.

OLEUM ABSINTHII PER INFUSIONEM.

REC. Olei Olivarum libras tres,
Comarum Abſinthii recentis contuſarum uncias viginti tres,
Roſarum rubrarum unciam unam.
Macerentur per triduum, in loco calido, deinde leni igne coquantur, ad humiditatis conſumtionem, exprimantur, & oleum colatum ſervetur.

In doloribus ventriculi, diarrhœa, & ad lumbricos necandos, abdomini illitum, prodeſt.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM EXPRESSUM.

Fit eadem ratione, qua ſequens.

Reſolvit & diſcutit. Contra ſuſurros & tinnitus aurium aliquot guttæ auribus inſtillantur; interne rarius, vel nunquam præſcribitur.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Amygdalæ non rancidæ, contuſæ, & ſacco incluſæ, prelo calido exprimuntur ſucceſſive, donec omne oleum fuerit expreſſum.

Datur interne in pleuritide, nephritide calculoſa, colica ſpaſmodica, ad ſtricturas dolorificas relaxandas; partum facilitat, nec non ad dolores poſt partum convenit; conducit etiam recens natis, ad educendum meconium, cum manna; prodeſt in raucedine & tuſſi, &c.
Doſis a drachma una ad unciam dimidiam; clyſteribus ad unciam unam ſemis, vel duas additur.

OLEUM ANAGALLIDIS.

REC. Herbæ recentis Anagallidis conquaſſatæ,

Olei

Olei Olivarum ana partes æquales.

Coquantur lento igne, ad consumtionem humiditatis, exprimantur & colentur.

Pro præsentaneo habetur remedio ad puerorum morbos, colicos inprimis dolores, a flatulentia ortos.

Exterius applicatur illinendo abdomen, vel in clysteribus.

OLEUM ANETHI.

Eodem modo paratur, ut modo descriptum Oleum Anagallidis.

Vires sunt carminativæ & anodynæ; ad clysteres præscribitur, nec non ad tormina infantum, cum unguentis & aliis carminativis.

OLEUM BEZOARDICUM WEDELII.

REC. Olei Amygdalarum dulcium uncias duas,
Camphoræ drachmas duas.

Solvatur camphora in oleo per digestionem, oleum tingatur radicibus Alkannæ, atque cum
Olei de Cedro drachma semis
permisceatur.

Commendatur ab authore in febribus malignis & inflammatoriis, & a nonnullis pro sacra ancora habetur. Unde nomen: Dr. Wedels letzte Tropfen.

Dosis guttæ quinque ad decem.

OLEUM CAPPARUM.

REC. Corticis radicum Capparum unciam unam,
Tamarisci,
Cyperi ana drachmas duas,
Ceterach,
Rutæ ana drachmam unam,
Seminis Agni casti drachmas duas.

Trita &
Vini libra semis infusa, post biduum, cum
Olei Olivarum libra una

Coquantur, ad humiditatis consumtionem, colentur & exprimantur.

Vires sunt attenuantes & resolventes; in affectibus lienis potissimum commendatur.

OLEUM CARMINATIVUM.

REC. Herbarum recent. Anethi,
Menthæ,
Absinthii,
Pulegii,
Florum Chamomillæ vulgaris ana uncias quatuor.

Incisa & contusa coquantur in
Olei Olivarum libris duabus,
ad humiditatis consumtionem, exprimantur & colentur. Oleo adde
Olei laurini expressi uncias tres.

Serventur.

Virtutes nomen indicat, egregium enim est carminativum, quo puerorum tenellorum abdomen inungitur, tormina flatulenta mitigat.

OLEUM CASTOREI.

REC. Castorei drachmas duas,
Cyperi,
Pyrethri,
Sabinæ,
Schœnanthi ana drachmas duas semis,
Spicæ Indicæ,
Cassiæ ligneæ veræ,
Costi,
Cubebarum,
Croci ana drachmas duas,
Piperis longi,
nigri ana drachmas duas semis,
Vini albi generosi libram semis,
Olei Olivarum purissimi libram unam semis,

Omnia in pulverem redacta & vino irrigata, oleo superfuso digerantur, in vase bene clauso, igne arenæ, per plures dies, ad omnis humiditatis consumtionem; exprimantur & reponantur.

Commendatur ad nervorum affectus, prodest membris paralyticis & tabidis, nec non ad uteri affectus.

OLEUM CHAMOMILLÆ.

Paratur ex floribus eodem modo, quo Oleum Anagallidis.

Carminativum eſt & anodynum, ventris torminibus ſuccurrit, nec non in febribus intermittentibus ſpina dorſi illo inungitur; ad colicos dolores clyſteribus additur.

OLEUM CHEIRI.

REC. Florum Cheiri,
Olei Olivarum ana libram unam.

Coquantur, poſt macerationem aliquot dierum, ad conſumtionem humiditatis; expreſſum & colatum oleum ſervetur.

Uſus, uti reliquorum oleorum per infuſionem paratorum, eſt externus; virtute gaudet anodyna & reſolvente, præſertim ad uteri affectus, ubi ad menſes & fœtum mortuum pellendum, ad lochia retenta & dolores poſt partum commendatur.

OLEUM COLOCYNTHIDIS.

REC. Olei Abſinthii, per infuſionem parati,
Rutæ,
Fellis bubuli ana libram ſemis,
Fructus Colocynthidis,
Radicis Hellebori nigri ana drachmam unam.

Colocynthis & Helleborus niger cum
Aquæ fontanæ unciis duabus in mortario ad pultis formam contundantur, atque, oleis & felli additis, ad conſumtionem humiditatis, leni igne, coquantur, exprimantur, & oleum per linteum colatum ſervetur.

Anthelminticum eſt, & alvum ſolvit, abdomini illitum.

OLEUM COSTINUM.

REC. Coſti amari, ſive corticis Winterani uncias duas,
Majoranæ floreſcentis uncias octo.

Contuſis ſuperfunde
Olei Olivarum clari, albi, recentis libram unam ſemis,
Vini albi uncias duas.

Digerantur in vaſe clauſo, ad humiditatis conſumtionem, exprimantur & percolentur.

Nervinum eſt, & ad paralyticam relaxationem emendandam commendatur.

OLEUM EUPHORBII.

REC. Euphorbii triti unciam ſemis,
Olei Cheiri uncias quinque.

Coque, additis
Vini unciis duabus,
ad humiditatis conſumtionem.

Oleum coletur, ac ſervetur.

Commendatur ad affectus nervorum, ſic dictos, frigidos; paralyticis & atrophicis membris conducit.

OLEUM FLORUM SLOTANI.

REC. Olei Olivarum libras ſex,
Catulorum juniorum numero duos,
Ranarum viventium numero duodecim,
Lumbricorum terreſtrium viventium uncias quatuor,
Aquæ fontanæ libras tres.

Coquantur lento igne, donec caro catulorum ab oſſibus ſecedat, & fere omnis humiditas conſumta ſit. Coletur oleum, & addantur
Axungiæ Hominis,
Muris alpini,
Olei Amygdalarum dulcium,
Scorpionum ana unciæ ſex,
Florum recent. Primulæ veris,
Tuſſilaginis,
Betonicæ,
Geniſtæ,
Chamomillæ romanæ,
Violarum,
Liliorum convallium,
Lavendulæ,

Flo-

Florum recent. Sambuci,
Anethi,
Salviæ,
Cheiri,
Rutæ,
Serpilli,
Anthos,
Centaurii minoris,
Veronicæ,
Origani,
Tanaceti,
Liguſtri,
Agrimoniæ,
Pulegii,
Meliloti,
Verbaſci,
Abſinthii vulgaris,
Roſarum ana uncia ſemis,
Hyperici libræ quatuor.

Macerentur & digerantur calore balnei, poſtea oleum exprimatur, coletur & ſervetur.

Habetur pro anodino, nervino, vulnerario, antiſpaſmodico & antinephritico.

Nota: Flores ſeligi, & a calicibus atque foliis, quantum licet, ſeparari debent; alias oleum, quod rubrum eſſe debet, vireſcit.

OLEUM FORMICARUM.

REC. Formicarum uncias quatuor,
Olei libram unam.

Macerentur leni calore diebus viginti, poſtea colatum oleum reponatur.

Laudatur ad partes genitales roborandas, & membra paralytica confortanda.

OLEUM EX FRUCTU CACAO, ſeu BUTYRUM CACAO.

REC. Fructuum Cacao libram unam.

Leviter in ſartagine torrefactos & a cortice mundatos, vel ſuper lapidem calefactum tere, vel in mortario calido contunde; contuſos in Aquæ communis libris octo, bullire permitte, donec oleum ſupernatet, quod concretum ex aqua refrigerata colliges.

Sebi juſto magis cocti colorem & conſiſtentiam habet, qui autem, ablutione ſæpius repetita per aquam calidam, albicans redditur.

Habetur etiam alius parandi modus, per toſtionem nucleorum lenem, & dehinc expreſſionem; quale vero butyrum coloris eſt magis fuſci, ſed virium æqualium, ſi non ſuperiorum.

Recens paratum præbet medicamentum pectorale, antipleuriticum, antinephriticum, & antiſpaſmodicum egregium, guſtu gratiſſimum, & oleo Amygdalarum ſubſtitui, quin præferri poteſt.

A drachma una ad duas, vel tres, cum potu calido lactis, juſculi, Theæ vel Coffee, ſumitur; externe ad fiſſuras labiorum & mammarum, non ſine fructu, adhibetur.

OLEUM HYOSCYAMI.

REC. Seminum Hyoſcyami quantum vis.

Contundantur, torreantur & exprimantur.

Eſt paregoricum, & affluxum nimium cohibet; ad Emplaſtrum de Hyoſcyamo requiritur.

OLEUM HYPERICI.

REC. Florum Hyperici, ad maturitatem ſeminis fere accedentium, contuſorum libras tres,
Vini albi libram ſemis,
Croci ſcrupulos quatuor,
Olei clari libras duas.

Poſt factam trium dierum macerationem, bulliant ad humiditatis conſumtionem, poſtea exprimantur, & expreſſum commiſceatur cum
Terebinthinæ claræ libra una.

Vulnerarium & paregoricum præbet egregium, in affectibus nervorum, a convulſione & luxatione ortis, nulli cedit.

OLEUM LAURINUM.

Raro, vel nunquam apud nos paratur, ſed ex Inſulis Fortunatis nobis adfertur; cui vero volupe erit, oleum hoc parare.

REC. Baccarum Lauri maturarum recentium quantum voluerit;

Tritæ in aqua fontana coquantur, & fortiter exprimantur; refrigeratum oleum, pinguedinis inſtar, aquæ ſupernatans colligatur.

Eſt carminativum, nervinum, & ad affectus uteri, ſpaſmos, colicam flatulentam, tormina & lumbricos infantum, nec non ad roborandos articulos valde proficuum. Laudatur etiam ad aurium dolores & auditus gravitatem, auribus inſtillatum; ubi tamen oleum amygdalarum amararum, vel aliud minus acre admiſceri debet.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

REC. Florum Liliorum alborum, abjecto quod croceum eſt, libras duas,
Olei Olivarum recentis albi libras tres.

Macera & digere per dies octo, poſtea coque & exprime.

Virtute gaudet emolliente, anodina & lubricante.

OLEUM LINI EXPRESSUM.

E Semine Lini contuſo & parum toſto exprimitur, & per digeſtionem in ſole depuratur.

Contra pleuriticos dolores ſpecificum habetur, tam interne a dimidia ad integram unciam, cum juſculo exhibitum, quam externe, cum lana vel panno, calide regioni dolenti applicatum. Conducit etiam in aliis affectibus pectoris; externe ad ambuſta & hæmorrhoidum cœcarum dolores commendatur.

OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIUM.

REC. Lumbricorum terreſtrium libram unam.

Laventur in vino, deinde immittantur in
Olei libras duas;

Coquantur ad humidi aquoſi conſumtionem; oleum coletur.

Sunt, qui interne pro vulnerario præſcribunt; externe eſt paregoricum, nervinum & ad dolores ſpaſticos atque contracturas utiliter adhibetur.

OLEUM MAJORANÆ.

REC. Herbæ Majoranæ,
Olei Olivarum ana libram unam.

Coque, poſt macerationem per aliquot dies, leniſſimo igne, & expreſſum ſerva.

Reſolvit & roborat, & ad Emplaſtrum Meliloti requiritur.

OLEUM MASTICHINUM.

REC. Olei Roſati libram unam,
in quo, leniter coquendo, diſſolve
Maſtiches uncias tres.

Fiat colatura.

Vomitus & alvi fluxum ſedat, parteſque laxas roborat.

OLEUM MENTHÆ.

Ex Mentha criſpa & oleo olivarum, ſicut Anethi oleum, paratur.

Vires ſunt ſtomachicæ & carminativæ.

OLEUM MOMORDICÆ.

REC. Fructuum Momordicæ maturorum, contuſorum libram unam,
Olei Lini libram unam ſemis.

In figulino vitreato vaſe ponantur ſupra cineres calidos, per viginti quatuor horas, dein leni calore per horam ad humiditatis conſumtionem coquantur, colentur & exprimantur;

Oleum

Oleum expressum,
cum
Fructuum Momordicæ æquali quantitate,
Secunda vice coquatur, præscripto modo, & servetur.

Ad fissuras mammillarum, hæmorrhoidum dolores, ambustiones & vulnera commendatur.

OLEUM sive LIQUOR MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

Ova recentia, ad duritiem cocta, per medium dissecantur, vitellis exemtis, cavitas pulvere Myrrhæ electæ repletur, duo hemisphæria ovi iterum conjunguntur, atque filo leviter ligata, super craticulam locantur, atque in cellam reponuntur. Sic dissolvetur Myrrha in liquorem rubrum.

Medicamentum est balsamicum, ad fissuras mammarum, ulcera oris aliaque summe commendabile.

OLEUM NICOTIANÆ.

REC. Foliorum recentium Nicotianæ, concisorum & contusorum, libram unam.
Coquantur lento igne, ad humiditatis consumtionem, in
Olei Olivarum unciis sedecim.
Oleum expressum serva.

Laudatur ad hypochondriorum inflammationes, membra paralytica fovenda, & tumores discutiendos; scabiosis & ambustis etiam convenit.

OLEUM NUCUM JUGLANDIUM.

Conficitur, ut Oleum Amygdalarum.

Easdem vires habet cum Oleo Amygdalarum, modo sit recens & non rancidum. Inveteratum vero a pictoribus expetitur.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ EXPRESSUM.

Nuces Moschatæ contusæ aquæ calidæ vapore irrigantur, & dum adhuc calent, oleum exprimitur. Raro apud nos paratur, ex India enim Orientali copiose advehitur.

Vires sunt roborantes & anodinæ. Datur etiam interne tam pueris, torminibus alvi vexatis, quam adultis adversus vomitus & alvi fluxum; externe ad capitis dolores, somnum conciliandum, ventriculum roborandum, flatus discutiendos, &c. adhibetur. Inservit etiam pro Balsamorum corpore.

Dosis interne pueris teneris a grano uno ad duo, adultis ad scrupulum unum & dimidium.

OLEUM OVORUM EXPRESSUM.

REC. Ova recentia coque, ut indurentur, postea vitellos exime, contritos atque in sartagine, donec rufescant, & pinguedinem quandam emittant, assatos adhuc ferventes, & forti sacco inclusos, exprime.

Laudatur ad hernias, fissuras papillarum & labiorum, ad ambusta, hæmorrhoidum dolores, implendas foveas post variolas, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia.

OLEUM PAPAVERIS EXPRESSUM.

Præparatur, ut Oleum seminis Hyoscyami.

Ad usus culinarios & mechanicos, præcipue a pictoribus, expetitur; in Medicina habetur anodinum, ad somnum invitandum & dolores leniendos.

OLEUM ROSATUM.

REC. Olei communis libras quinque,
Rosarum Damascenarum contusarum libras quatuor.
Macerata & insolata, per dies octo, ad humiditatis consumtionem coque, exprime & cola.

Refrigerat, demulcet & ambuſtis medetur.

OLEUM RUTÆ.

E foliis Rutæ recentibus & oleo Olivarum, ſumendo amborum æquales partes, coctione & expreſſione paratur.

Anticolicum, anthelminticum & nervinum eſt; adhibetur externe, & clyſmatibus additur.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

REC. Scorpionum numero quinquaginta,
Olei Olivarum libram unam.

Macerentur in vaſe vitreo, dies viginti, in loco calido, poſtea ad uſus reponatur oleum.

Ad urinam & calculum pellendos externe, regioni renum & pubis illinitur, & ad ictus venenatorum animalium commendatur.

OLEUM SEPTEM FLORUM.

REC. Florum recent. Violarum,
Sambuci,
Roſarum,
Chamomillæ vulgaris,
Liliorum alborum,
Verbaſci,
Malvæ arboreæ ana libram ſemis.

Colligantur flores ſuo tempore, & in
Olei Olivarum libris ſex
macerentur, coquantur leni igne, ad humiditatis conſumtionem, & expreſſum oleum ſervetur.

Paregoricum eſt, nimias tenſiones relaxat, pleuriticis & tabidis inunctum convenit.

OLEUM SPERMATIS RANARUM.

REC. Spermatis Ranarum,
Olei communis ana partes æquales.

Coquantur ſimul igne lento, ad conſumtionem partis aquoſæ, deinde colentur & ſerventur.

Raro in uſum vocatur, ſed pro emplaſtri confectione paratur; anodinum eſt, refrigerat, & ad ambuſta inſervit.

OLEUM VERBASCI.

E floribus Verbaſci paratur, ſicut Oleum Liliorum alborum ſuperius deſcriptum.

Demulcet, dolores mitigat, ad hæmorrhoides & ambuſta laudatur.

OLEUM VIOLARUM.

REC. Florum Violarum, &
Olei Olivarum anaticas partes;
ad humiditatis conſumtionem coquantur & oleum expreſſum ſervetur.

Refrigerans & anodinum eſt, magnopere laudatur ad dolorem hæmorrhoidum, altius ſedentem, per ſyringam tepide injectum.

OLEUM VULPINUM.

REC. Vulpem integram vegetam, detracta pelle & exemtis interaneis,
Aquæ fontanæ libras ſex,
Olei veteris clari libras quatuor,
Salis uncias ſex.

Coquantur, & inter coquendum adjiciantur
Anethi,
Thymi ana libra una.

Coctionem continuando, donec ab oſſibus recedat caro, & aqua conſumatur; dein coletur oleum.

Ad affectus nervorum frigidos, & articulos rigidos commendatur.

OLEUM ABSINTHII DESTILLATUM.

REC. Summitatum Abſinthii, cum ſemine maturitati proximo,

mo, in umbra ſiccatarum, libras viginti quinque.
Inciſæ & conquaſſatæ macerentur per triduum, in
Aquæ fluviatilis libris ſeptuaginta quinque,
additis
Salis communis libris tribus;
Deſtillentur poſtea e veſica, ad tertiam partem repleta, & oleum aquæ innatans ſeparetur.

Eodem modo parantur olea deſtillata ſequentia.

OLEUM ARTEMISIÆ.
CHAMOMILLÆ,
CHÆREFOLII,
HYSSOPI,
LAVENDULÆ,
MAJORANÆ,
MELISSÆ,
MENTHÆ,
MILLEFOLII,
ORIGANI,
PULEGII,
RORISMARINI,
RUTÆ,
SABINÆ,
SALVIÆ,
SATUREIÆ,
SERPILLI,
TANACETI,
THYMI.

OLEUM ANETHI.

REC. Seminis Anethi contuſi libras quatuor,
Infuſum
Aquæ fluviatilis libris ſedecim, ac per triduum, addita
Salis libra una,
maceratum, deſtilletur e veſica, & oleum, ut moris ab aqua ſeparetur.

Eadem encheireſi deſtillantur reliqua olea ex ſeminibus:

OLEUM ANGELICÆ,
ANISI,
CARVI,
CORIANDRI,
CUMINI,
FOENICULI,
JUNIPERI E BACCIS,
LAURI E BACCIS.

OLEUM CARYOPHYLLORUM AROMATICORUM.

REC. Caryophyllorum libras duas.
Tritis affunde
Aquæ pluviæ libras ſedecim,
adde
Salis communis uncias quatuor;
Stent per quinque vel ſex dies in loco calido, poſtea deſtilla e veſica, ſic prodit una cum aqua oleum Caryophyllorum, omnis coloris expers, quod fundum petit.

Pari modo parantur

OLEUM CARDAMOMI,
CINNAMOMI,
MACIS,
NUCIS MOSCHATÆ,
PIPERIS.

OLEUM LIGNI SASSAFRAS.

REC. Raſuræ ligni Saſſafras libras ſex,
Aquæ fluviatilis libras triginta ſex,
Salis culinaris libram unam.
Macerentur per quatuor vel quinque dies in conclavi calido, poſtea deſtillentur per veſicam, ſic prodit oleum cum aqua, non more aliorum ſupernatans, ſed fundum petens, in ſpiritu Vini diſſolubile. Ex reſiduo parari poteſt extractum, maceratio vero absque ſalis additione inſtituenda eſt.

Eodem modo deſtillantur

OLEUM LIGNI RHODII,
SANTALI CITRINI,
CALAMI AROMATICI,
ZEDOARIÆ,
ZINZIBERIS.

Ut genuina habeantur olea hæc, pharmacopœi illa ipſi deſtillare debent; omnia enim, quæ ex Batavia, vel aliunde advehuntur, adulterata deprehenduntur. Caveant autem, ne, addita Terebinthina in deſtillatione, & ipſi olea, ad augendam eorum copiam, inficiant.

Nimis longum esset, de singulorum viribus hic dicere; æstimandæ videntur e simplicibus, unde destillata sunt. Raro interne sumuntur, sanguinem enim, præsertim in hominibus, temperamento calido præditis, & ad ebullitionem sanguinis pronis, nimium commovent. Guttæ vero aliquot Saccharo instillatæ, & Elæosaccharum, quod pulveribus additur, vel ad gratum saporem conciliandum, vel ad vires augendas, nonnunquam præscribuntur. Externe adhibita sunt cephalica, nervina, antispasmodica, stomachica, carminativa, & virtute sua balsamica roborant.

OLEUM ANIMALE, AD MODUM DIPPELII.

REC. Olei destillati fœtidi cornu Cervi, vel alius animalis, libras quatuor, vel quantum libet;

Affunde

Aquæ tepidæ libras sex.

Conquassa simul, tunc solvatur in hac aqua sal ille, qui oleo acrimoniam conciliavit, & quo separato, mitius evadit. Oleum ab aqua per separatorium & per destillationem e cucurbita vitrea, calore bullientis aquæ, liberetur, donec nihil aquæ inde amplius elici possit. Immittatur deinde retortæ satis capaci, & in excipulum magnum, calore moderato, destilletur, sensim augendo ignem, usque ad supremum gradum, cujus arena capax est, donec nihil amplius ascendat. Rectificatione & destillatione ita, semper ex nova retorta, sæpius, exempli gratia, vicies vel tricies repetita, acquiritur oleum, spiritus instar, tenue, una cum liquore pellucido, quod servetur.

Penetrantissimum est, si rite paratum sit, odore & sapore haud ingratum; anodinum, resolvens, febrifugum, nervis amicissimum, antepilepticum.

Dosis guttæ sex ad quindecim, e vehiculo largiore.

Ipse Dippelius e sanguine cervino, exsiccato, per retortam destillavit, & oleum hinc eductum quadragesies rectificavit.

Breviori & faciliori modo *D. Burghart in arte destillatoria* Oleum hoc animale præparare docet, atque Oleum vel C. C. fœtidum vel sanguinis cervini cum calce viva vel C. C. usto mixtum ex retorta rectificare, & postea addito aquæ fontanæ sextuplo, aliquoties ex cucurbita humili, vitrea, destillare suadet.

OLEUM BENZOES.

REC. Gummi Benzoës probe triti, quantum placet; e retorta vitrea, igne arenæ moderato, destilla in vas recipiens, cui aquæ fontanæ aliquot unciæ sunt immissæ; finita destillatione, flores & oleum ab aqua separa, & seorsim serva.

Additur oleum unguentis & suffimentis, ut odorem illis conciliet.

OLEUM BUXI ET GUAJACI.

E scobe ligni per retortam destillantur; prodit primo phlegma, postea spiritus acidus, & tandem oleum nigrum crassum, quod, ab acido spiritu separatum & rectificatum, reponitur.

Olea empyrevmatica septica sunt, & non, nisi ad guttas quatuor vel quinque, interne ad gonorrhœam virulentam &c. adhiberi possunt; externe ad dentium cariem & inde ortos dolores commendantur.

OLEUM CAMPHORÆ LIQUIDUM ET BUTYRACEUM.

REC. Camphoræ libram semis,
Boli rubræ, vel terræ argillaceæ siccæ libras duas.

Optime permixta e retorta, lenissimo igne, destillentur, sic prodit, cum phlegmate acidulo, Oleum Camphoræ liquidum, subtilissimum,

mum, & in fine, in collum retortæ ſublimatur oleum, butyri inſtar, quæ ſingula ſeorſim ſervanda.

Penetrantiſſimum hoc oleum, quod ſubtiliſſima pars camphoræ eſt, ad defluxiones catarrhales, & dolores dentium, a cauſa frigida ortos, commendatur, atque illos, externe applicatum, quaſi in momento ſedat. Ad condienda inſecta minora etiam adhibetur.

OLEUM CERÆ.

REC. Ceræ flavæ odoratiſſimæ libram unam.

Scindatur in fragmenta tam parva, ut retortæ orificio commode posſint immitti, eaque repleri ad dimidium. Tum infundatur arenæ puriſſimæ tantum, quantum capit venter retortæ; calefiat tum lente retorta, donec cera liqueſcens arenam ſibi permiſcuerit, & imbiberit ſatis; imponatur furno arenæ, inſtituatur, applicato excipulo, deſtillatio: Adhibito primo leni ignis gradu prodire ſolet aqua acidula, fœtens, pauca, una cum ſpiritu; calore deinde aucto, aſcendet ſenſim oleum tenue, dum deſtillat, in excipulo, inſtar butyri, concreſcens; hoc, ubi ultra prodire negat, major adhibendus eſt ignis, & quidem fortis ſuppreſſionis, cujus ope aſcendet mox tota maſſa ceræ in excipulum, ſub forma butyri. Butyrum hoc ceræ, ſine ulla additione, ex retorta, leniſſimo ignis gradu, iterum deſtillari & rectificari debet, oleumque liquidum tenue & butyroſum ſeorſim excipi.

Sunt, qui hoc tenue ceræ oleum etiam interne adhibent; eſt enim diureticum, valde penetrans, ad guttas tres vel ſex datum; propter nimiam vero acrimoniam, cautius eo utendum eſſe cenſemus. Externus vero ejus uſus eo frequentior eſſe ſolet, & remedium præbet vix ulli alteri comparandum, ad mala papillarum nervoſarum, quæ in cute extrema denudata ſunt, ad fiſſuras labiorum & papillarum in lactantibus, digitorum & manuum rhagades, ad tumores atque perniones a frigore inductos, & tendines contractos, quin adſtrictæ alvo lubricitatem conciliare, in infantum morbis, abdomini illitum, quidam volunt.

OLEUM CORNU CERVI.

REC. Cornuum Cervi fruſtillatim conciſorum, quantum placet.

Immitte retortæ lutatæ, aut cucurbitæ ferreæ, alembico terreo vitreato munitæ, ac igne aperto, gradatim, ad ignitionem usque retortæ, aut cucurbitæ, adminiſtrato, omnes, cum phlegmate, ſale volatili ac oleo, ſpiritus evoca, quæ omnia ab invicem ſepara, & ſeorſim ſerva.

Raro interne adhiberi ſolet, ſed oleum animale Dippelii inde parari poteſt.

OLEUM CORTICUM AURANTIORUM.

REC. Corticum recentium Aurantiorum, quantum placet.

Inciſi, cum ſufficienti aqua fontana, absque maceratione, e veſica deſtillentur, ac oleum, ut in reliquis, aquæ innatans, lege artis ſeparetur.

OLEUM CORTICUM CITRI.

Eadem methodo paratur, qua præcedens.

OLEUM GALBANI.

REC. Gummi Galbani electi libram unam,
Arenæ lotæ libram unam ſemis.

Deſtillentur igne arenæ, per retortam vitream, liquor albus, qui cum oleo prodit, ſeparetur, atque oleum rectificetur.

Laudatur præcipue in doloribus colicis, hystericis & spasmodicis, umbilico illitum.

Eodem modo parantur

OLEUM AMMONIACI, MASTICHES, MYRRHÆ, TACAMAHACÆ.

NB. Myrrha etiam oleum suavissimum, sed exigua quantitate, destillatione cum aqua fontana instituta, reddit.

OLEUM CUM LATERIBUS DESTILLATUM, PHILOSOPHORUM DICTUM.

Lateres novi in grossum pulverem contundantur, atque bene calefacti, olei olivarum, quantum imbibere possunt, saturentur, retortæ vitreæ immittantur, & igne arenæ per gradus aucto, oleum proliciatur, quod super cineres rectificetur.

Resolvens ac attenuans est medicamentum; septicam etiam habet virtutem, & ad mundificanda ulcera adhibetur.

OLEUM SAPONIS.

REC. Rasuræ saponis Veneti libram unam,
Arenæ mundæ libras tres.

Mixta e retorta, igne arenæ, destillentur, oleum super cineribus rectificetur.

Sugillationes & tophos resolvit, spasmis & dentium doloribus medetur, septicum præbet ad ulcera mundificanda, atque pannos in oculis brutorum extirpandos; interne, ob vim sanguinem commovendi, raro, vel nunquam datur.

OLEUM SUCCINI.

REC. Succini contusi libras tres.

Ex retorta capaci, igne arenæ gradatim adhibito, destilletur. Vas recipiens cum aqua calida, ut sal volatile in eo solvatur, eluatur, quæ per chartam emporeticam, prius aqua madefactam, ab oleo separetur, & post factam ejus exhalationem, sal colligatur; oleum vero, cum duabus partibus cinerum mixtum, e retorta, lento igne, rectificetur, oleum limpidum primo exstillans album, & alterum subsequens rubrum, singula seorsim serventur.

Oleum Succini multum convenit cum Oleo Petræ, & egregium resolvens, diaphoreticum, diureticum & emmenagogum, calidum tamen & valde acre est; in parva igitur dosi exhibendum; sufficiunt guttæ quinque vel decem. Externe ad cephalalgiam & membra paralytica, nec non ad rheumaticos dolores adhibetur.

OLEUM SULPHURIS.

Est spiritus sulphuris per campanam, concentratus.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

REC. Terebinthinæ pellucidæ, quantum vis,
Aquæ fontanæ sextuplum.

Destillentur lento igne, ex vesica, sicut alia olea destillata; post destillationem oleum ab aqua separetur ac servetur.

Residuum in vesica præbet TEREBINTHINAM COCTAM, vel, ulteriore coctione absque aqua instituta, in COLOPHONIUM reducitur.

Laudatur ejus vis diuretica, & in gonorrhœa frequenter dari solet; calidum est, igitur circumspecte adhibendum.

Dosis a guttis sex, ad vigenti. Usus externus multiplex est, ad vulnera & puncturas membranarum, tendinum & nervorum, si calidum instilletur, præbet anodinum, antispasticum & consolidans. In hœmorrhagiis, ex arteriarum & venarum vulneribus promtissimum est stipticum, modo calidum applicetur, & spleniis appressis ad locum detineatur.

OLEUM VITRIOLI.

Per destillationem spiritus Vitrioli continuatam, ultima tandem

ignis tortura elicitur oleum acerrimum concentratum ponderosum, quod rectificari debet per retortam.

E centenario Vitrioli Goslariensis decem libræ olei prodeunt, & circiter libræ viginti spiritus & phlegmatis.

Ad usus chymicos & pharmacevticos varios adhibetur.

OLEUM PETRÆ album,
rubrum,
nigrum &
TERRÆ.

Videantur in Materiæ Medicæ Regno minerali.

ORVIETANUM.

REC. Radicum Angelicæ,
Aristolochiæ utriusque,
Bistortæ,
Carlinæ,
Contrayervæ,
Fraxinellæ,
Gentianæ,
Imperatoriæ,
Pentaphylli,
Serpentariæ Virgin.
Tormentillæ,
Valerianæ,
Zedoariæ,
Folior. Cardui benedicti,
Pulegii,
Rutæ hortensis,
Sabinæ,
Scordii,
Succisæ,
Florum Hyperici,
Corticum Aurantiorum,
Citri,
Cinnamomi,
Baccarum Juniperi,
Lauri, ana unciam unam,
Viperarum exsiccatarum uncias duas,
Croci Orientalis drachmas duas.
Fiat omnium pulvis, qui excipiatur
Roob Juniperi,
Mellis despumati ana libris tribus,
Optime mixtis addantur
Theriacæ Andromachi,
Mithridatii, ana unciæ duæ,
Olei Rutæ destillati,
Succini albi,
Caryophyllorum,
Juniperi ana scrupulus unus.
Reponantur in vase figulino probe vitreato.

Variæ circumferuntur hujus antidoti descriptiones. Hanc Emanuel König nobis suppeditavit, quam, utpote compendiosiorem & optimam, paucis tamen immutatis, adponere voluimus.

Nomen Orvietanum, ab Inventore circumforaneo, ex urbe *Orvieto*, cui, tradente B. Schulzio nomen fuit *Hieronymus Ferrantes*, & qui fiducia ejus primus ausus fuit, publico foro deglutire ignotum sibi quodlibet toxicum.

Ex simplicibus, alexiteriis virtutibus præditis, paratum est, atque a multis, Theriacæ, si non præfertur, tamen æquiparatur. Viliori etiam pretio constat, & quia Opio caret, secure in morbis contagiosis, dysenteria, febribus malignis &c. Pauperibus, nec non pecudibus, exhiberi potest.

Dosis drachmæ duæ ad unciam semis.

OXYMEL SCILLITICUM.

E mellis despumati libris quatuor,
ac
Aceti scillitici libris duabus,
In vase figulino vitreato, ad justam consistentiam coquitur.

Ad pulmonum & ventriculi affectus pituitosos tollendos, nec non asthmaticis commendatur. Humores crassos, viscidos, indeque ortas obstructiones resolvit.

Dosis drachmæ tres, ad drachmas sex.

OXYMEL SIMPLEX.

REC. Mellis despumati libram unam,

Aceti Vini albi libram ſemis.
Coquantur in vaſe figulino probe vitreato, ad ſyrupi conſiſtentiam, ſerventur in vaſe vitreo.

Uſus eſt in gargariſmis.

PANACEA MERCURIALIS.

Eſt Mercurius dulcis, ſepties vel decies ſublimatus atque optime tritus, ſpiritu vini rectificatiſſimo deflagrandus.

Repetita ſublimatione Mercurius dulcis omnem fere deponit vim laxantem, & ſolum per diaphoreſin operatur. Datur hæc Panacea delicatioribus in morbis lymphæ, & a viſciditate humorum ortis.

Doſis grana octo, ad grana quindecim.

PANIS CYDONIORUM CUM AROMATIBUS.

REC. Pulpæ Cydoniorum coctorum, per cribrum trajectæ, libras octo.
Sacchari albi libras quatuor.
Evaporent ad juſtam conſiſtentiam, adde
Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas,
Cinnamomi acuti, minutim inciſi,
Flavedinis corticum Citri recentium inciſorum, ana drachmas ſex.
Miſceatur & effundatur paſta in ſcatulas.

Leniter corroborat; hinc ad ventriculum & inteſtina relaxata, atque inde ortas diarrhœas delicatulis exhiberi poteſt.

Doſis uncia ſemis, ad integram.

Paratur etiam ſine aromatibus, & calidis bilioſisque ad eosdem uſus commendatur.

PASSULÆ ET PRUNA LAXATIVA.

REC. Foliorum Sennæ electorum uncias quatuor,
Zinziberis albi drachmam unam ſemis,
Cinnamomi drachmas duas.
Infundantur
Aquæ fontanæ ferventis unciis decem.
Digerantur in loco calido per biduum, poſtea exprimantur, expreſſo adde
Sacchari albi libram unam,
Solvatur Saccharum unica ebullitione, & per pannum colatus ſyrupus ſuperfundatur,
Paſſularum minorum, vel
Prunorum Damaſcenorum enucleatorum, in aqua fontana ad mollitiem coctorum, & a ſuperflua humiditate, modica exſiccatione, liberatorum, libræ uni.

Alvum leniter ſubducunt, & pueris atque aliis medicamenta laxantia reformidantibus exhiberi ſolent.

Doſis uncia dimidia ad duas.

PASTA ALTHEÆ, (Gallis *PATE DE GUIMAUVE.*)

REC. Radicis Altheæ recentis, in taleolas diſſectæ, uncias quatuor.
Bulliant in
Aquæ fontanæ libris octo, ad dimidiæ partis conſumtionem; in colatura diſſolvantur
Gummi Arabici albiſſimi & puriſſimi libræ duæ ſemis,
Sacchari albiſſimi totidem.
Colentur, & igne lento, ad ſpiſſitudinem extracti, continuo ſpatula movendo, humor exhalet. Ab igne remota agitentur multum & celeriter, quo albeſcant, & ſubinde inſpergendo
Albuminum, e ſex ovis recentibus, in ſpumam conquaſſatorum,
Aquæ Naphæ odoratiſſimæ unciam ſemis,
lento calore, ſub perpetua agitatione, inſpiſſetur, usque dum manibus non adhæreat.
Formentur paſtæ oblongæ quadratæ, quæ pulvere Sacchari vel Amy-

Amyli, ne chartæ adhæreant, conſpergantur.

Pari modo etiam ex

Liquiritiæ Radicibus

paratur paſta, quæ a Gallis

PATE DE REGLISSE

vocatur.

Humores acres, faucibus inprimis & pectori noxios, demulcent; hinc in tuſſi ſicca, aſthmate, quin ipſa phthiſi commode adhiberi poſſunt.

PHILONIUM ROMANUM.

Videatur ELECTUARIUM.

PILULÆ ÆTHIOPICÆ.

REC. Æthiopis mineralis unciam unam,
Reguli Antimonii medicinalis,
Gummi Guajaci ana unciam ſemis,
Extracti Sarſaparillæ unciam unam.

Fiat maſſa pilularum.

In ſcabie maligna, hydrope, febre quartana, ulceribus fœtidis &c. non ſine fructu commendari ſolent.

Doſis eſt a granis duodecim, ad grana viginti quatuor, ad drachmam ſemis usque. Tertiam partem Æthiops mineralis, & ſextam Regulus Antimonii conſtituit.

PILULÆ ALOEPHANGINÆ.

REC. Specierum aromaticarum caryophyllatarum unciam unam,
Myrrhæ electæ,
Maſtiches ana drachmas tres,
Croci drachmam unam ſemis,
Extracti Aloës uncias duas.

Miſce, fiat maſſa, ex qua formentur pilulæ.

Sunt aromaticæ, ventriculum roborantes, appetitum excitantes, atque concoctionem promoventes.

Doſis eſt ſcrupulus unus. Dimidia pars eſt Extractum Aloës, hinc, præter ſupra laudatas virtutes, etiam alvum ſtimulandi vim habent.

PILULÆ DE AMMONIACO.

REC. Extracti Aloës, aqua fontana præparati, uncias duas,
Gummi Ammoniaci puriſſimi, aceto ſcillitico ſoluti & ad conſiſtentiam extracti inſpiſſati, unciam unam ſemis,
Myrrhæ electæ,
Maſtiches,
Benzoës electæ,
Rhabarbari ana drachmas duas,
Croci ſcrupulos duos,
Salis Abſinthii drachmam unam.

Miſce, fiat maſſa pilularis.

Incidunt lympham viſcidam, & educunt; proſunt hypochondriacis, in affectibus uterinis, aſthmate, tuſſi, cachexia, febribus inveteratis, præcipue quartana.

Doſis grana duodecim ad ſcrupulum unum.

Drachma una habet fere ſcrupulum gummi Ammoniaci.

PILULÆ ANGELICÆ.

REC. Aloës Succotrinæ libram unam,
quam diſſolve in
Succorum depurator. Cichorii, Endiviæ, Fumariæ, Roſarum Damaſcenarum ana libra una.

Solutio clarificetur, poſtea, lento igne, ad juſtam conſiſtentiam percoquatur, & cum ſequentium pulvere,
Rhabarbari electi uncia una,
Agarici trochiſcati uncia ſemis,
Cinnamomi electi drachmis duabus.

Fiat maſſa pilularis.

Leniter ſubducunt alvum.

Doſis grana duodecim ad ſcrupulum unum.

PILULÆ APERIENTES STAHLII.

REC. Aloës rosatæ unciam unam,
Extracti Panchymagogi unciam semis,
Limaturæ Martis, subtilissime pulverisatæ drachmas duas.

Fiant pilulæ.

Alvum liberam servant, & parva dosi, ante somnum, deglutitæ, obstructam aperiunt.

Dosis grana quinque ad decem.

PILULÆ AUREÆ.

REC. Aloës Succotrinæ,
Diacrydii sulphurati ana drachmas decem,
Florum Rosarum,
Seminum Apii,
Fœniculi,
Anisi ana drachmas tres,
Mastiches electæ,
Croci Orientalis,
Trochiscorum Alhandal ana drachmas duas.

Cum sufficiente quantitate spiritus vini, fiat massa.

Virtutes prædicantur cephalicæ, purgant, & humores a capite derivant; hinc etiam oculorum aciem juvare laudantur.

Dosis grana duodecim ad scrupulum unum.

PILULÆ BALSAMICÆ MORTONIANÆ.

REC. Millepedum drachmas tres,
Gummi Ammoniaci electi drachmas duas semis,
Florum Benzoës drachmam unam,
Croci Orientalis,
Balsami Peruviani ana grana quindecim.

Misce, cum sufficiente quantitate Balsami Sulphuris anisati, fiat massa.

Ad tussim chronicam, scrophulosam & phthisicam, pulmonibus phlegmate viscoso infarctis, scirrhosis, atque cum tuberculorum generandorum suspicio est, commendantur.

Dosis scrupulus semis, bis vel ter in die, superbibendo haustum decocti appropriati.

PILULÆ CACHECTICÆ.

REC. Gummi Ammoniaci purissimi drachmas sex,
Extracti Aloës gummosi unciam semis,
Chalybis, in alcohol redacti, drachmas quinque,
Olei destill. caryophyllorum,
Anisi ana scrupulum semis.

Misce cum sufficienti quantitate spiritus vini, fiat massa.

Obstructiones resolvunt, fibris laxatis tonum conciliant, habitum corporis emendant; cachecticis, ictericis, mensium vitio laborantibus atque hypochondriacis prosunt, alvum leniter stimulant.

Dosis grana quindecim ad drachmam semis.

PILULÆ CEPHALICÆ.

REC. Massæ pilularum de Succino,
Cochiarum ana unciam unam,
Specierum Diambræ drachmam unam.

Fiat massa cum essentia Succini.

Sunt leniter purgantes, & conveniunt dolore dentium & aurium tinnitu laborantibus; prosunt etiam in faucium pituitosis tumoribus.

Dosis grana quindecim ad drachmam semis.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

REC. Specierum Hieræ picræ Rhasis drachmas decem,
Trochiscorum Alhandal drachmas tres, scrupulum unum,
Diacrydii drachmas duas semis,
Stœchadis Arabicæ,

Tur-

Turbith ana drachmas quinque,
Syrupi de Stœchade, quantum ſatis.

Fiat maſſa.

In affectibus capitis, ad pituitam evacuandam uti illis ſolent.

Doſis grana quindecim ad viginti. Scrupulus continet Diacrydii grana duo, de Trochiſcis Alhandal grana tria.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO.

REC. Radicum ſiccarum Cynogloſſi,
Seminis Hyoſcyami albi,
Opii depurati ana unciam ſemis,
Myrrhæ drachmas ſex,
Thuris drachmas quinque,
Styracis calamitæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi ana drachmas duas.

Succi de Cynogloſſo & Syrupi Violarum ana quantum ſufficit, fiat pilularum maſſa.

Catarrhos tenues ſiſtunt, tuſſim mitigant, hæmoptoicis & ſtranguria laborantibus proſunt, dolores ſedant.

Drachma una hujus maſſæ grana octo opii complectitur.

Doſis grana tria ad quinque.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CUM CASTOREO.

Adde ſpeciebus modo dictis,
Croci,
Caſtorei ana drachmas duas.

Vires ſunt, uti præcedentium, ac eadem, vel paulo majori doſi poſſunt dari.

PILULÆ EMANUELIS.

REC. Aloës Succotrinæ unciam unam,
Myrrhæ electæ drachmas duas,
Croci Orientalis drachmam unam.

Cum Mithridatio Damocratis fiat maſſa.

Alvum ſolvunt, ventriculum & inteſtina a flatibus & vitioſis humoribus liberant.

Doſis ſcrupulus ſemis ad ſcrupulum unum.

PILULÆ FOETIDÆ MAJORES.

REC. Hermodactylorum,
Eſulæ præparatæ ana drachmas duas,
Turbith drachmas quatuor,
Zinziberis drachmam unam ſemis,
Spicæ Indicæ drachmam unam,
Epithymi,
Colocynthidis,
Seminis Rutæ hortenſis,
Sagapeni,
Ammoniaci,
Opopanacis,
Bdellii,
Aloës ana drachmas quinque,
Euphorbii ſcrupulos duos,
Scammonii præparati drachmas tres,
Cinnamomi,
Croci,
Caſtorei ana drachmam unam,
Succi Porri depurati quantum ſatis.

Fiat maſſa; gummi in Porri ſucco ſolvantur, quibus deinde Euphorbium per ſe tritum, una cum ceteris, addatur, pinſantur, ut in paſtam abeant.

Ad uteri & menſium vitia, nec non arthriticos affectus & febrem quartanam laudantur; pituitam viſcidam reſolvunt & educunt.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad integram.

PILULÆ HIERÆ, CUM AGARICO.

REC. Specierum Hieræ picræ Galeni,
Agarici trochiſcati ana unciam ſemis,
Aloës unciam unam,
Spiritus vini quantum ſatis.

Fiat maſſa.

Ad asthma humorosum, anorexiam, aliosque thoracis & ventriculi affectus commendantur.

Dimidiam partem facit Aloë; dari igitur potest a scrupulo semis ad integrum.

PILULÆ HYDROPICÆ BONTII.

REC. Aloës optimæ drachmas duas semis,
Gummi Guttæ, subtiliter triti & vino dissoluti, drachmam unam semis,
Diacrydii, eodem modo parati drachmam unam,
Gummi Ammoniaci drachmam unam semis,
Tartari vitriolati drachmam semis.

Fiat massa.

Serum potenter educunt, & obstructiones resolvunt.

Dari hydropicis possunt a scrupulo uno ad drachmam semis.

PILULÆ HYSTERICÆ.

REC. Radicum Angelicæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Calami aromatici,
Levistici,
Ostrutii,
Valerianæ,
Zedoariæ ana unciam semis,
Herbarum Menthæ,
Pulegii,
Rutæ,
Florum Chamomillæ Rom.
Baccarum Lauri,
Corticum Aurantiorum ana drachmas sex.

Incisa & contusa infundantur in Spiritus vini libris quatuor. Stent in digestione ad sufficientem extractionem, exprimantur; Expresso per chartam filtrato adde aquæ fontanæ uncias octo, atque spiritus calore balnei abstrahatur. Residuo ad extracti molioris consistentiam evaporato addantur
Myrrhæ electæ,
Succini præparati,
Castorei Orientalis,
Croci ana drachmæ duæ,
Olei Rutæ,
Succini ana guttæ duodecim.

Fiat massa, & pro lubitu pilulæ.

Vires ex titulo patent, nimirum uterinæ, anticolicæ & nervinæ. Massa hæc pilularis, pro intentione Medici, vel Laudano opiato, vel limatura Martis, vel laxantibus commisceri, vel sola exhiberi potest.

Dosis grana decem ad quindecim.

PILULÆ LUCIS MAJORES, sive OPTICÆ.

REC. Valerianæ radicis,
Euphrasiæ ana drachmas duas,
Seminum Fœniculi,
Seseleos,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Cubebarum,
Cardamomi,
Agarici,
Corticum ligni Sassafras ana drachmam unam,
Succini præparati drachmas tres,
Trochiscorum Alhandal scrupulos tres,
Extracti Aloës uncias duas.

Misce, fiat massa.

Attribuuntur vires, excrementa pituitosa e Cerebro & Oculis evacuandi, visum conservandi & obfirmandi.

Dosis scrupulus semis ad scrupulum unum, ante cubitum.

PILULÆ MASTICHINÆ.

REC. Mastiches electæ drachmas quatuor,
Agarici optimi drachmas tres,
Aloës electæ drachmas decem,

Fiat omnium subtilissimus pulvis, & ex hoc, sufficiente quantitate Aquæ Menthæ, massa pilularis.

Ad

Ad ventriculi affectus præcipue commendantur, oculorum aciem, humores subducendo, confortant.

Dosis grana decem ad viginti.

PILULÆ MERCURIALES.

REC. Extracti Panchymagogi,
Catholici,
Resinæ jalappæ,
Mercurii dulcificati,
Diacrydii ana drachmam unam,
Essentiæ ligni Sassafras quantum satis.

Fiat massa.

Non solum in morbis venereis, sed etiam aliis a lymphæ vitiis ortis, & ad lumbricos expellendos dari possunt.

Dosis grana duodecim vel quindecim.

PILULÆ POLYCHRESTÆ BALSAMICÆ.

REC. Extracti Aloës succo citri parati unciam unam semis,
Absinthii,
Centaurii minoris,
Scordii,
Cochleariæ,
Myrrhæ electæ ana drachmas tres,
Gummi Hederæ,
Resinæ Juniperi, sive Gummi Sandaracæ,
Mastiches electæ,
Benzoës ana drachmam unam semis.

Misce, fiat massa, ex qua formentur pilulæ foliis lunæ obducendæ.

Pilulæ hæ, nisi easdem, tamen haud multo inferiores cum illis celeberrimi Stahlii, vires habent; alvum leviter exstimulant, aperiunt, incidunt, & ventriculum, cum reliquis visceribus, roborant.

Dosis scrupulus semis ad grana viginti.

PILULÆ POLYCHRESTÆ STARCKEY.

REC. Extracti Opii Thebaici, aqua fontana parati,

Pharm. Wirt. P. II.

Pulveris radicum Liquiritiæ,
Ellebori nigri,
Ellebori albi ana unciam unam,
Saponis tartarei, vel correctioris, uncias tres.

Misce, fiat massa, ex qua formentur pilulæ.

Prædicantur polychrestæ, diureticæ, diaphoreticæ, anodynæ, quæ felici cum successu in febribus, præcipue tertiana & quartana, catarrhis, doloribus, tussi, diarrhœis, ulceribus & apostematibus dari possint.

Dosis grana duo, tria, ad scrupulum semis.

PILULÆ SCILLITICÆ, PHARM. EDINBURG.

REC. Scillæ recentis,
Gummi ammoniaci electi,
Millepedum ana unciam semis,
Saponis purissimi unciam unam,
Balsami de copaiva drachmam.

Fiat massa pilularis.

Resolvunt, atque ictericis, hydropicis, febre quartana &c. laborantibus conducunt.

Dosis grana decem ad scrupulum unum.

PILULÆ SOLARES WILDEGANSII.

REC. Opii Thebaici optimæ notæ, aqua simplici aut pluvia soluti, colati, ac ad justam consistentiam rursus inspissati & siccati, unciam unam,
Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ rubræ,
Croci optimi,
Antimonii diaphoretici,
Salis cornu cervi volatilis,
Trochiscorum de viperis,
Auri fulminantis ana drachmam unam,

Olei Caryophyllorum guttas quinquaginta.

Misce, fiant pilulæ minores & foliis lunæ obducantur.

Sunt anodynæ & sudoriferæ. Ultra dimidiam partem Opium constituit.

Dosis granum unum ad duo, vel tria.

PILULÆ SPLENETICÆ.

REC. Gummi Ammoniaci electi,
Extracti Aloës gummosi ana unciam unam semis,
Myrrhæ electæ,
Radicis Bryoniæ ana drachmas duas.

Misce, fiat massa pilularis.

In affectibus hypochondriacis, menstruis retentis, commendabiles sunt.

Dosis grana duodecim ad viginti duo.

PILULÆ DE STYRACE SINE AMBRA.

REC. Styracis calamitæ unciam semis,
Succi Liquiritiæ inspissati drachmas tres,
Olibani electi,
Benzoës,
Masticheṣ,
Extracti Opii ana drachmas duas,
Croci Orientalis scrupulos tres.

Misce, fiat, addita Essentia Succini, massa.

Vires sunt anticatarrhales, tussim aliasque molestias, sicut Pilulæ de Cynoglosso, mitigantes.

Grana sedecim hujus massæ grana duo Opii continent; pro dosi itaque grana sex, vel ad duodecim usque, dari possunt. Dantur autem ante somnum, & commode atque utiliter cum massæ pilularum de Succino anatica portione.

PILULÆ DE SUCCINO AUCTÆ.

REC. Massæ pilularum de Succino Cratonis drachmas novem,
Magisterii, vel resinæ Jalappæ drachmas tres.

Misceantur, & ex drachma una formentur pilulæ sexaginta.

A longo tempore, sub titulo: Verstärckte Augstein-Pillen, *in officinis nostris in usu sunt. Eosdem habent effectus, quos sequentes, propter resinam vero Jalappæ magis sunt purgantes.*

Jalappæ magisterium constituit quartam massæ partem.

Raro ultra quindecim grana exhibentur.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

REC. Succini præparati unciam unam semis,
Mastiches unciam unam,
Agarici trochiscati drachmas sex,
Aristolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,
Aloës Succotrinæ uncias duas semis.

Misce, & addita Essentia Succini, sufficiente quantitate, fiat massa.

Ad catarrhales affectus, oculorum, aurium & dentium dolores, pituitam a capite revellendam commendantur.

Dosis grana duodecim ad viginti.

PILULÆ TARTAREÆ BONTII.

REC. Aloës Succotrinæ electæ unciam unam semis,
Gummi Ammoniaci electi drachmas sex,
Tartari vitriolati drachmas quatuor,
Aceti scilliciti, quantum sufficit.

Viscidos humores resolvunt. Conveniunt hypochondriacis, viscerum obstructiones tollunt, alvum leniter subducunt.

Dosis a scrupulo semis, ad scrupulum unum.

PI-

PILULÆ TARTAREÆ SCHROEDERI.

REC. Aloës Succotrinæ, ſucco fragorum nutritæ, unciam unam,
Gummi Ammoniaci in granis drachmas tres,
Vitrioli Martis,
Extracti Croci ana drachmam unam,
Terræ foliatæ tartari drachmas duas,
Extracti Gentianæ drachmam unam ſemis,
Tincturæ tartari Q. S.

Eſt purgans, quod ſecure ad bilioſos humores, & febrium intermittentium fomitem expurgandum exhiberi poteſt.
Dimidiam partem facit Aloë.
Doſis grana viginti ad drachmam ſemis.

PILULÆ DE TEREBINTHINA.

REC. Terebinthinæ coctæ unciam unam ſemis,
Succini præparati,
Maſtiches,
Olibani,
Succi Liquiritiæ,
Rhabarbari veri,
Oſſis Sepiæ,
Boli Armenæ ana drachmas duas.

Fiat maſſa.
Virtutes ſunt balſamicæ, conſolidant, urinam cient, in gonorrhœa & fluore albo utiliter adhibentur.

PLUMBUM USTUM.

Liquetur plumbum in patina terrea plana, atque ſpatula ferrea agitetur, & ſine alterius rei additione, in calcem griſeam abibit, quæ pulveriſata ſervanda eſt.
Siccat, & ad Emplaſtrum Saturninum requiritur.

PULMONES VULPIS PRÆPARATI.

Coquuntur parum in vino, cum Abſinthii portione, poſtea exſiccantur.
Paratur ex his Looch, quod habetur ſpecificum antaſthmaticum, & in tuſſi & phthiſi laudatur.

PULPA CASSIÆ.

REC. Fiſtularum Caſſiæ ponderoſarum, quantum libet.

Aperiantur, & pulpa ſeu medulla, cum ſeminibus, diligenter eximatur, in aquæ calidæ ſufficiente quantitate diſſolvatur, & per cribrum trajiciatur; lento igne ad mellis conſiſtentiam redactæ libræ uni tantundem ſacchari albi addatur, & ad juſtam conſiſtentiam coquantur.
Bilem & pituitam blande educit, & calculoſis convenit; pueris recens natis ad educendum meconium datur a drachma ſemis, ad ſcrupulos duos, adultioribus autem ab uncia una, ad unciam unam ſemis.

PULPA TAMARINDORUM.

Eodem modo, quo Caſſiæ pulpa, paratur.
Humectat, ſanguinem depurat, bilem temperat, & blande educit.
Doſis drachmæ ſex ad unciam unam.
Pari modo etiam e paſſulis & prunis, in aqua fontana ad mollitiem coctis, paratur:

PULPA PASSULARUM ET PRUNORUM.

PULVIS CONTRA ABORTUM CUM SACCHARO.

REC. Granorum Chermes unciam ſemis,
Ligni Sandali rubri,
Florum Roſarum rubrarum,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Raſuræ Eboris ana drachmas tres,
Maſtiches,
Nucis Moſchatæ ana drachmam unam,
Sacchari albiſſimi ad pondus omnium.

Gravidis abortum timentibus, inter trageas, vel ſolus datur, ad drachmam pro doſi.

PULVIS ABSORBENS WEDELII.

REC. Vitrioli Martis drachmas ſex,
Concharum præparatarum,
Lapidum Cancrorum præparatorum,
Coralliorum,
Antimonii diaphoretici,
Cinnabaris nativæ ana drachmas decem,
Laudani opiati drachmam unam,
Olei Caryophyllorum guttas ſexaginta.

Miſce, fiat pulvis.

Eſt abſorbens, ſudoriferus & anodinus; ſubvenit hypochondriacis & hyſtericis, palpitatione cordis & aliis moleſtis ſymptomatibus correptis.

Drachma una hujus pulveris granum unum habet Laudani opiati, & grana ſex Vitrioli martis.

Doſis a granis octo ad duodecim.

PULVIS ALEXIPHARMACUS RUBER.

REC. Nitri crudi cryſtallini unciam unam ſemis,
Oculorum Cancrorum, acido Citri ſaturatorum, unciam unam,
Boli Armenæ unciam ſemis,
Camphoræ drachmam unam.

Miſce, fiat pulvis in vitro ſervandus.

Vires e titulo patent.

Doſis ſcrupulus unus ad ſcrupulos duos.

PULVIS ALEXIPHARMACUS CAMERARII.

REC. Boli Armenæ,
Terræ ſigillatæ,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillæ ana unciam ſemis,
Angelicæ,
Gentianæ,
Petaſitidis,
Zedoariæ ana drachmas duas,
Cornu cervi uſti præparati,
Raſuræ Eboris,
Coralliorum rubrorum,
Corticum citri ana ſcrupulos duos.

Miſce, fiat pulvis.

Virtutes ſunt, uti ex titulo cognoſcitur, alexipharmacæ, & præſertim in dyſenteria epidemica adhibetur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

PULVIS ALEXIPHARMACUS ſive BEZOARDICUS ROLLWAGII.

REC. Reguli Antimonii medicinalis,
Radicis Contrayervæ ana drachmas ſex,
Boli Armenæ,
Terræ ſigillatæ rubræ,
Cornu Alcis ſine igne præparati ana unciam ſemis,
Cryſtalli montanæ præparatæ,
Coralliorum præparatorum,
Matris perlarum præparatæ,
Oculorum cancrorum ana drachmam unam,
Sacchari tabulati citrati unciam ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Laudatur hic pulvis in diverſi generis febribus continuis, morbillis, variolis & aliis exanthematibus.

Drachma una continet Reguli Antimonii medicinalis grana duodecim.

Doſis ad ſcrupulum unum vel drachmam ſemis.

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS MINDERERI INCOMPLETUS.

REC. Specierum cordialium temperatarum, incompletarum, drachmas quatuor,
Specierum de Gemmis frigidarum drachmas duas,
Foliorum Auri numero duodecim,

Fo-

Foliorum Argenti numero tria,
Sacchari perlati uncias tres.
Miſce, fiat pulvis.
Confortans eſt, & tam ad virium conſervationem, quam reſtaurationem utilis.
Doſis drachma dimidia ad integram.

Idem redditur COMPLETUS addendo Ambræ griſeæ ſcrupulos duos, in ſpiritu Roſarum ſolutæ.
Doſis ſcrupulus unus ad duos.

PULVIS ANODINUS CAMERARII.

REC. Extracti Opii,
Sandali rubri ana ſcrupulum unum,
Coralliorum rubrorum præparatorum ſcrupulos quatuor.
Miſce, fiat pulvis.
Effectus e titulo cognoſcitur. Sextam partem Opium conſtituit.
Doſis grana ſex ad decem.

PULVIS ANODINUS LUDOVICI.

REC. Extracti Opii, aqua fontana parati, drachmam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum drachmas duas.
Miſce.
Easdem vires, quas Laudanum opiatum, habet, & commode pulveribus aliis, ubi anodinum deſideramus, additur.
Doſis grana tria ad ſex. Tertiam partem facit opium.

PULVIS ANONYMUS.

REC. Seminum Papaveris albi drachmas duas,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Malvæ,
Bombacis ana drachmam unam ſemis,
Cicerum rubrorum drachmam ſemis,
Cinnamomi,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Amyli ana drachmas duas,
Succi Hypociſtidis,
Boli Armenæ,
Cornu cervi uſti,
Raſuræ eboris ana drachmam ſemis,
Sacchari penidii unciam unam ſemis,
albi candi uncias ſex.
Miſce, fiat pulvis.
Tabidis & phthiſicis præſcribitur; tenues & ſalſos catarrhos ſiſtit, ac defluxiones acres, fauciumque aſperitates & ardorem urinæ mitigat.
Sumitur a drachma una ad drachmas duas.
Ob ſemina oleoſa facile ranceſcit, ideo nunquam, niſi a Medico præſcribatur, parandus.

PULVIS ANTARTHRITICUS WEPFERI.

REC. Lumbricorum terreſtrium exſiccatorum unciam unam ſemis,
Cornu cervi philoſophice præparati,
Raſuræ eboris,
Oculorum cancrorum,
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Antimonii diaphoretici ſimplicis unciam ſemis,
Nitri cryſtalliſati drachmas ſex,
Sacchari albi unciam unam ſemis,
Olei nuciſtæ ſcrupulum ſemis.
Miſce, fiat pulvis.
Ad arthriticorum dolores, ſpaſmos, quin motus convulſivos leniendos adhibetur.
Doſis ſcrupulus unus ad ſcrupulos duos, & drachmam unam.

PULVIS ANTILYSSUS LOND.

REC. Lichenis cinerei terreſtris uncias duas,

Piperis nigri unciam unam.
Fiat pulvis.
Commendatur in Transactionibus philosophicis Anglicis ad canis rabiosi morsus, multisque experimentis probatur.
Dosis scrupuli duo ad quatuor.

PULVIS ANTISPASMODICUS NITROSUS.

REC. Nitri purissimi crystallisati,
Tartari vitriolati ana uncias duas,
Cinnabaris purissimæ drachmam unam semis.
Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.
Commendatur ad motus spasticos & convulsivos præcavendos & sedandos; nec non æstum nimium sanguinis temperandum.
Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis, vel scrupulos duos.

PULVIS CONTRA ACREDINEM.

REC. Antimonii diaphoretici simplicis uncias duas,
Lapidum cancrorum,
Concharum præparatarum ana unciam unam.
Misce, fiat pulvis.
Acidum absorbet; commendatur ad ardorem stomachi, & acrimoniam in primis viis hærentem.
Dosis scrupulus unus, vel drachma semis.

PULVIS BEZOARDICUS ALBUS LUDOVICI.

REC. Cornu cervi, sine igne præparati, uncias tres,
Terræ sigillatæ albæ,
Unicornu fossilis ana unciam unam semis.
Misce, subtilissime trita.
Præfertur ab Auctore aliis pretiosis pulveribus in variolis, morbillis, convulsionibus ab acido, in primis viis infantum, in diarrhœa aliisque ejusmodi morbis.
Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum, vel drachmam semis.

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS COMPLETUS sive KENTIANUS.

REC. Apicum nigrorum chelarum cancrorum, subtilissime pulverisatorum,
Radicis Contrayervæ ana uncias duas,
Margaritarum præparatarum,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
alborum,
Lapidum cancrorum,
Cornu cervi usti ana unciam unam,
Bezoar Orientalis,
Terræ Lemniæ ana unciam semis,
Antimonii diaphoretici uncias duas.
Fiat omnium pulvis subtilissimus.
NB. Cornu cervi ustum & oculi cancrorum, corallia & margaritæ antea succo citri saturanda & exsiccanda sunt.

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS INCOMPLETUS.

REC. Apicum nigrorum chelarum cancrorum, subtilissime pulverisatorum,
Radicis Contrayervæ ana uncias duas,
Matris Perlarum,
Coralliorum rubrorum,
alborum,
Lapidum cancrorum,
Cornu cervi usti ana drachmas novem,
Terræ Lemniæ unciam semis,
Antimonii diaphoretici simplicis uncias duas.
Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.
NB. Mater Perlarum, corallia, lapides cancrorum, & cornu cervi ustum, antea succo citri

citri ſunt imbibenda & exſiccanda.

Commendatur uterque in febribus malignis, epidemicis, petechizantibus, variolis, morbillis.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam dimidiam.

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

REC. Cornu Cervi philoſophice calcinati drachmas ſex,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Lapidis Bezoar Orientalis,
Margaritarum præparatarum,
Oculorum cancrorum præparatorum,
Succini præparati,
Terræ ſigillatæ albæ ana ſcrupulos quatuor,
Oſſium de cordibus cervorum,
Hyacinthi præparati,
Sapphiri præparati,
Rubini præparati,
Smaragdi præparati ana ſcrupulos duos,
Foliorum auri numero duodecim.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui etiam ſine Bezoar præparandus, & ſub titulo:

PULVERIS BEZOARDICI INCOMPLETI

reponendus.

In febribus malignis epidemicis, variolis & morbillis non ſine fructu datur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI INCOMPLETUS.

REC. Limaturæ chalybis ſulphure præparatæ unciam unam,
Radicum Ari præparatarum,
Coralliorum præparatorum,
Matris perlarum præparatæ ana drachmas duas,
Cornu cervi philoſophice præparati,
Succini præparati,
Cinnamomi ana ſcrupulos quatuor,
Sacchari ad pondus omnium, ſive uncias duas, drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

In Cachexia, levcophlegmatia, febre alba virginum, ictero & reliquis morbis, ex atonia viſcerum ortis, bonam præſtat opem.

Doſis ſcrupulus unus, vel ſcrupuli duo.

Grana triginta ſex continent grana octo limaturæ chalybis.

Si COMPLETUS expetatur, addatur Ambræ griſeæ drachma una ſemis, & loco Matris perlarum ſumantur Margaritæ præparatæ.

PULVIS AD CALCULUM.

REC. Radicum Pareiræ bravæ unciam unam,
Altheæ,
Liquiritiæ,
Seminis Lycopodii,
Lapidum cancrorum, acido citri ſaturatorum,
Percarum,
Operculorum cochlearum,
Succini præparati,
Millepedum præparatorum ana drachmas duas,
Florum cardui ſtellati unciam unam.

Miſce, fiat pulvis.

In calculo renum, nephritico dolore, tam curative, quam præſervative commendatur.

Doſis in junioribus a ſcrupulo ſemis ad grana quindecim, adultioribus ſecure drachma ſemis, vel ſcrupuli duo propinari poſſunt.

PULVIS CONTRA CASUM.

REC. Terræ ſigillatæ,
Sanguinis Draconis,
Mumiæ ana unciam unam,

 Rha-

Rhabarbari drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

Spermatis ceti uncia semis ordinario hanc compositionem quoque ingreditur; cum vero brevi rancescat, præstat, illud tum demum addere, cum actu pulvis in usum vocatur.

Commendatur lapsis, contusis & ubicunque sanguis resolvendus est.

Dosis drachma dimidia ad scrupulos duos.

PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

REC. Succini præparati,
Matris Perlarum præparatæ,
Smaragdi præparati ana unciam semis,
Ligni Aloës,
Radicis Pæoniæ ana drachmas duas,
Unicornu marini,
Visci querni ana drachmam unam semis,
Sacchari perlati uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Commendatur ad morbos capitis; nervos confortat, & epilepticis ac convulsivis motibus resistit.

Dosis drachma semis ad scrupulos duos.

PULVIS CEPHALICUS CAMERARII, CUM SACCHARO.

REC. Cornu Alcis, sine igne præparati,
Cervi, sine igne præparati, ana drachmas tres,
Cranii humani præparati drachmas sex,
Crystalli montanæ,
Succini præparati,
Ungulæ Alcis ana drachmam unam,
Cinnabaris nativæ drachmam semis,
Sacchari albi unciam unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Ad spasmodicos dolores capitis, hemicraniam & epilepsiam, tam adultis, quam pueris, datur.

Dosis scrupulus semis ad scrupulos tres.

PULVIS CEPHALICUS WINTERI.

REC. Radicis Pæoniæ drachmas sex,
Seminis ejusdem excorticati drachmam unam semis,
Visci querni drachmas duas,
Ungulæ Alcis scrupulos duos,
Cornu cervi philosophice præparati drachmam unam semis,
Unicornu fossilis,
Dentium Hippopotami ana drachmam semis,
Cranii humani drachmam unam,
Cinnabaris nativæ,
Succini albi ana drachmam semis,
Coralliorum rubrorum scrupulos duos,
Chrysolythi,
Smaragdi,
Margaritarum præparatarum ana scrupulos duos,
Foliorum auri numero duo.

Fiat pulvis.

Cum pulvere epileptico rubro convenit, & easdem habet virtutes.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS CERVINUS CAMERARII.

REC. Ossium cervi uncias quinque drachmas tres,
Cornu cervi, philosophice præparati uncias duas drachmam unam,
Cornu cervi usti unciam unam drachmas duas semis.

Misce, fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires adscribuntur bezoardicæ & cordiales, atque in febribus malignis & dysenteria commendatur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam dimidiam.

PUL-

PULVIS E CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS MINUS PRETIOSUS.

REC. Matris Perlarum præparatæ,
Oculorum Cancrorum,
Coralliorum rubrorum,
Succini albiſſimi,
Cornu cervi, philoſophice præparati, ana unciam ſemis,
Chelarum cancrorum uncias duas ſemis,
Miſce, fiat pulvis.

Vires ſunt alexipharmacæ & diaphoreticæ, in febribus continuis, ſic dictis malignis, utilis eſt.

Doſis drachma ſemis.

PULVIS E CHELIS CANCRORUM PRETIOSUS.

REC. Lapidis Bezoar Orientalis,
Margaritarum Orientalium,
Coralliorum rubrorum,
Succini albi,
Cornu cervi, ſine igne præparati,
Lapidum cancrorum ana unciam ſemis,
Chelarum cancrorum uncias tres,
Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Laudatur in morbis acutis, febribus malignis, variolis & morbillis.

Doſis ſcrupulus ad drachmam dimidiam.

PULVIS ANTI-COLICUS CAMERARII.

REC. Raſuræ eboris uncias duas,
Cornu cervi uſti præparati drachmas ſex,
Cryſtalli montanæ præparatæ unciam ſemis,
Salis Chamomillæ,
Abſinthii ana drachmas tres,
Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

In colica, ab acrimonia biliosa, & acido in primis viis, orta, nec non ad infantum diarrhœam biliosam, commendabilis eſt.

Doſis in adultis a ſcrupulo uno ad duos; infantibus ſcrupulus ſemis.

PULVIS CONFORTANS CAMERARII.

REC. Boli Armenæ præparatæ drachmam unam,
Terræ ſigillatæ Sileſiacæ,
Turcicæ rubræ ana drachmam ſemis,
Lapidum Carneoli præparati,
Granati,
Hyacinthi,
Sapphiri,
Smaragdi ana ſcrupulos duos, grana quinque,
Succini præparati,
Coralliorum alborum,
rubrorum,
Margaritarum Orientalium,
Lapidis Bezoar Occidentalis,
Orientalis ana drachmam unam,
Cornu cervi philoſophice calcinati drachmas quatuor ſemis,
Ungularum Alcis,
Dentium apri,
Cornu cervi aurati,
Pulveris Solaris ana drachmam ſemis,
Cinnabaris nativæ drachmam unam.
Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Vires præſumtivæ e titulo patent.

Doſis ſcrupulus unus, vel drachma ſemis.

PULVIS CONTRAYERVÆ COMPOSITUS.

REC. Cornu cervi uſti præparati,
Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
Lapidum cancrorum,
Succini albi ana drachmas duas,
Croci drachmam ſemis,

Cochinellæ drachmam unam,
Serpentariæ Virginianæ drachmam unam ſemis,
Chelarum cancrorum drachmas tres,
Radic. contrayervæ unciam dimidiam.

Miſce, fiat pulvis.

Viribus cum Pulvere bezoardico Anglico convenit, viliori tamen pretio conſtat.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam dimidiam.

PULVIS CORDIALIS CELLENSIS.

REC. Sacchari candi albi uncias duas,
Cinnabaris nativæ Hungaricæ drachmas ſex,
Olei Cinnamomi ſcrupulos duos,

Fiat pulvis.

Eximias poſſidet virtutes analepticas, cordiales & ſtomachicas.

Adhibetur cuſpidatim.

PULVIS CORNACHINUS, ſive COMITIS DE WARWICK.

REC. Diacrydii ſulphurati uncias duas,
Antimonii diaphoretici unciam unam ſemis,
Cremoris Tartari cryſtallini unciam ſemis.

Fiat pulvis.

Eſt univerſale quaſi purgans, & utiliter in febribus, aliiſque morbis, ad primas vias a vitioſis humoribus purgandas, exhibetur.

Doſis a ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos.

PULVIS COSMETICUS AD MANUS.

REC. Amygdalarum dulcium excorticatarum libras duas,
Oryzæ,
Iridis Florentinæ ana uncias quatuor,
Benzoës,
Salis Tartari,
Spermatis ceti ana unciam unam,
Olei deſtill. ligni Rhodii,
Lavendulæ,
Caryophyllorum ana guttas triginta.

Fiat omnium pulvis.

Uſus patet ex nomine.

PULVIS DENTIFRICIUS.

REC. Laccæ pictoriæ in globulis,
Oſſium Sepiæ,
Radicis Iridis Florentinæ ana unciam unam,
Cremoris Tartari drachmas ſex,
Caryophyllorum aromaticorum,
Myrrhæ,
Maſtiches ana drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Mundat & firmat dentes, quotidie fricandos.

PULVIS DYSENTERICUS.

REC. Radicum Contrayervæ unciam ſemis,
Tormentillæ,
Cornu cervi uſti præparati,
Terræ Lemniæ ana drachmas tres,
Gummi Arabici,
Maſtiches ana drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Adſtringens quidem eſt hic pulvis, in dyſenteria tamen epidemica circumſpectus ejus uſus non infelicem edere poteſt effectum. Dari etiam poteſt in diarrhœis, & ubi adſtrictione opus eſt.

Doſis drachma ſemis.

PULVIS AD DYSURIAM, ſive MITIGANS WEPFERI.

REC. Radicum Altheæ unciam unam,
Liquiritiæ unciam ſemis,
Se-

Seminum Bombacis,
Papaveris albi,
Portulacæ ana drachmas duas,
Hordei,
Boli Armenæ præparatæ ana unciam ſemis,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ albæ ana drachmam unam,
Sacchari albi unciam dimidiam.

Miſce, fiat pulvis.

Demulcet, & non ſolum dyſuria vexatis, ſed & tuſſi ſicca, a materia acri, laborantibus prodeſt.

Doſis drachma dimidia ad integram.

PULVIS EPILEPTICUS CELLARII CUM CASTOREO.

REC. Radicis Pæoniæ,
Seminis ejusdem ana unciam ſemis,
Unicornu marini,
Margaritarum ana drachmas duas,
Lapidum quinque pretioſorum ana grana quadraginta quinque,
Caſtorei,
Viſci querni,
Ungulæ alcis,
Coralliorum rubrorum ana drachmas duas,
Cranii humani præparati drachmam unam ſemis,
Pulveris viperarum drachmam unam.

Miſce, fiat pulvis.

Commendatur ad epilepſiam, aliosque motus convulſivos, præcipue hyſtericos.

Datur a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

PULVIS EPILEPTICUS AD GUTTETAM RIVERII.

REC. Radicum Pæoniæ,
Dictamni albi,
Viſci querni ana unciam ſemis,
Seminum Atriplicis drachmas duas,
Pæoniæ,
Ungulæ alcis unciam ſemis,
Cranii humani præparati unciam unam,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Hyacinthi ana drachmam unam ſemis,
Omnibus optime tritis adde
Foliorum auri numero quinquaginta.

Ad convulſiones & epilepticos motus puerorum multum laudatur.

Doſis ſcrupulus ſemis ad drachmam ſemis.

PULVIS EPILEPTICUS HOLSATICUS.

REC. Radicum Pæoniæ,
Gentianæ ana uncias duas,
Herbæ Betonicæ,
Chamædryos,
Pentaphylli,
Florum Pæoniæ,
Liliorum convallium,
Violarum,
Tiliæ, ana unciam unam,
Seminum Coriandri,
Pæoniæ excorticator.
Viſci querni ana unciam ſemis,
Raſuræ ungulæ Alcis uncias duas,
Aſini drachmas quinque,
Cornu cervi,
Cornu cervi, ſine igne præparati, ana unciam unam,
Cranii humani præparati drachmas ſex,
Coralliorum rubror. præpar.
albor.
Margaritar. Oriental. præpar. ana unciam ſemis,
Foliorum auri Nro. viginti quatuor.

Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Cum antecedente convenit; commendatur nimirum ad convulsivos & epilepticos motus, atque merito aliis hujus generis pulveribus, ex lapidibus pretiosis compositis, præfertur.

Dosis scrupulus semis ad drachmam dimidiam.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

REC. Radicum Pæoniæ uncias tres,
Visci querni,
Rasuræ eboris,
Ungulæ alcis,
Cornu cervi,
Spodii,
Coralliorum rubrorum,
alborum,
Margaritarum præparatarum ana drachmas sex,
Foliorum auri puri numero viginti.

Fiat pulvis subtilissimus.

Pulvis hic longo usu probatissimus non solum pueris, ab epilepticis, convulsivis motibus & pavoribus divexatis, datur, sed etiam adultis porrigitur; lene præbet anodinum & antispasmodicum, in doloribus rheumaticis, arthriticis, & cephalalgia commode ac utiliter, cum pulvere nitroso temperante, exhibetur.

Dosis grana decem ad drachmam semis.

PULVIS EPILEPTICUS MIRABILIS MYNSICHTI.

REC. Cranii humani, sine igne præparati, unciam semis,
Visci querni,
Cinnabaris factitiæ,
Ungulæ alcis ana drachmas duas.

Fiat pulvis.

Pulvis ob efficaciam mirabilem antepilepticam ab Authore ita dicitur.

Pueris statim post paroxysmum scrupulus semis, adultis scrupulus unus, ad drachmam semis exhibetur.

PULVIS EPILEPTICUS NIGER VIENNENSIS.

REC. Radicum Pæoniæ drachmas decem,
Dictamni albi,
Visci querni ana drachmas quinque,
Ligni Aloës,
Seminis Pæoniæ ana drachmas tres,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Matris perlarum ana unciam semis,
Ungulæ alcis drachmas tres,
Succini albi præparati,
Unicornu marini ana drachmas duas,
Carbonum Tiliæ unciam unam semis.

Fiat omnium pulvis subtilissimus; addantur
Foliorum auri numero viginti.

Virtutes ex nomine cognoscuntur; adhiberi vero etiam solet ad tormina infantum convulsiva, in terrore repentino &c.

Dosis in tenellis grana quinque, ad scrupulum semis, in adultioribus drachma semis.

PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

REC. Radicum Pæoniæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias duas,
Unicornu marini,
Cinnabaris nativæ,
Succini præparati ana unciam unam.

Fiat pulvis subtilissimus.

Ad epilepsiam, motus convulsivos & spasticos commendatur.

Drachma semis hujus pulveris fere grana quatuor Cinnabaris habet.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

PULVIS ERYSIPELATODES MYNSICHTI.

REC. Farinæ volatilis e molendinis uncias sex,

Plumbi

Plumbi usti,
Boli rubræ ana uncias duas,
Mastiches electæ,
Olibani,
Cerussæ ana unciam unam,
Misce, fiat pulvis omnium subtilissimus.

Usus est externus, inspergitur, & cum charta cærulea imponitur; quod tamen, propter adstringentia & repellentia, cum cautione fieri debet.

PULVIS AD FLATUS.

REC. Seminum Coriandri,
Carvi,
Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Corticum aurantiorum,
Zinziberis ana drachmas sex,
Lapidum cancrorum præparatorum unciam semis,
Macis drachmam unam,
Sacchari albi uncias sex.
Misce, fiat pulvis.

Vires ex nomine patent.

Dosis scrupulus unus ad drachmam usque.

PULVIS FUMALIS ODORATUS.

REC. Florum Lavendulæ,
Rosarum rubrarum ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum unciam unam,
Benzoës uncias duas,
Styracis uncias quatuor,
Succini uncias sex,
Olibani, sive Thuris uncias octo,
Mastiches uncias viginti.
Misce, fiat pulvis grossus.

Ad suffimenta inservit, & odore suavi grato se commendat.

PULVIS FUMALIS HAUGII.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinæ,
Herbæ Rorismarini ana uncias quatuor,
Florum Rosarum rubrarum uncias sex,
Lavendulæ uncias duas,
Seminis coriandri drachmas sex,
Baccarum Juniperi libras duas,
Ligni Aloës unciam unam semis,
Sandali citrini uncias quatuor,
Juniperi libras duas,
Corticis Thymiamatis uncias quatuor,
Nucis Moschatæ,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi ana unciam unam,
Benzoës,
Styracis ana uncias quatuor,
Olibani libram dimidiam,
Mastiches libram unam,
Rasuræ Succini libras duas,
Elemi,
Sandaracæ,
Ladani ana uncias tres.
Misce, & grosso modo incisa serventur.

A longo tempore usus est apud nos, & in affectibus catarrhalibus & rhevmaticis, humida tempestate contractis, hoc pulvere suffumigata lintea parti dolenti imponunt.

PULVIS GALACTOPOEUS.

REC. Seminum Anisi,
Fœniculi ana unciam unam,
Nigellæ,
Lactis Lunæ,
Oculorum cancrorum præparatorum,
Matris perlarum præparatæ ana drachmas tres,
Lumbricorum terrestrium præparatorum drachmas duas,
Sacchari albi uncias duas.
Misce, fiat pulvis.

Datur lactantibus, ad augendum lac; aci-

acidum abſorbet in primis viis, & chylificationem adjuvat, ac diſcutit flatus.

Doſis ad drachmam unam, quotidie bis ſumendus.

PULVIS HALY, CONTRA PHTHISIN.

REC. Seminum Papaveris albi drachmas duas,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Malvæ,
Bombacis ana drachmam unam ſemis,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Amyli ana drachmas duas,
Cornu cervi uſti,
Raſuræ eboris,
Cicerum rubrorum ana drachmam ſemis,
Liquiritiæ drachmas duas,
Sacchari penidii uncias duas.

Miſce, fiat pulvis.

Cum pulvere anonymo convenit, & eadem doſi exhibetur.

PULVIS HEPATICUS RUBER.

REC. Cremoris Tartari uncias quatuor,
Sandali rubri,
Roſarum rubrarum ana unciam ſemis,
Spiritus Vitrioli drachmas duas.

Flores roſarum, ſubtiliſſime triti, irrorantur ſpiritu vitrioli; probe mixtis additur Pulvis Sandali & Cremoris Tartari; pulvis ruber in vitro aſſervatur.

Fervorem nimium ſanguinis temperat, & appetitum excitat.

Doſis ſcrupuli duo ad drachmam unam.

PULVIS HYSTERICUS.

REC. Radicum Fraxinellæ,
Pæoniæ ana unciam ſemis,
Radicum Zedoariæ,
Corticum citri,
Succini,
Matris perlarum ana drachmas duas,
Caſtorei drachmam unam,
Anthophyllorum,
Croci ana ſcrupulum unum ſemis.

Miſce, fiat omnium pulvis.

Ad hyſtericam paſſionem, menſes & ſecundinas pellendas, atque dolores demulcendos inſervit.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

PULVIS INCIDENS STAHLII.

REC. Lapidum cancrorum, acido citri ſaturatorum, uncias quatuor,
Radicum Ari præparatarum uncias duas.

Miſce, fiat pulvis.

Reſolvit, pituitoſos & mucoſos humores, atque digeſtionem promovet; præmitti poteſt, loco digeſtivi, laxantibus.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

PULVIS LENITIVUS TARTARISATUS.

REC. Cremoris Tartari,
Foliorum Sennæ electorum ana uncias duas,
Cinnamomi acuti,
Seminum aniſi,
Fœniculi ana drachmas quinque.

Miſce, fiat pulvis, qui pro lubitu ſaccharo edulcorari poteſt.

Leniter alvum ſiccam & tardiorem ſolvit, flatus pellit; hypochondriacis & alvi obſtructione laborantibus commendatur.

Ante prandium, vel cœnam, ad drachmam unam ſumendus.

PULVIS MANTUANUS.

REC. Radicum Contrayervæ,
Radi-

Radicum Scorzoneræ ana drachmas duas,
Terræ sigillatæ griseæ,
Boli Armenæ,
Lapidum quinque pretiosorum,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Margaritarum præparatarum,
Cornu Rhinocerotis ana drachmam unam,
Lapidis Bezoar Orientalis,
Occidentalis ana drachmas duas.

Misce, fiat pulvis.

Cum Pulvere Anglico multum convenit, & ejusdem est usus.

PULVIS MARTIALIS ANGLICUS.

REC. Limaturæ Martis in alcohol redactæ drachmas sex,
Cassiæ ligneæ,
Nucum moschatarum, ana unciam semis,
Caryophyllorum,
Macis ana drachmas duas,
Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Cum Pulvere cachectico Quercetani multum convenit, atque in cachexia & febri alba, ex obstructione mensium, laudatur.

Dosis drachma una, quæ circiter sextam partem martis habet.

PULVIS AD MORSUM CANIS RABIDI.

REC. Foliorum Rutæ,
Verbenæ,
Salviæ,
Plantaginis,
Polypodii,
Absinthii vulgaris,
Menthæ,
Melissophylli,
Betonicæ,
Hyperici,
Centaurii minoris ana unciam semis.

Legantur singula eo tempore, quo viribus pollent maximis, papyro seorsim inclusa, in umbra siccentur, & in pulverem terantur.

Author est Julius Palmarius, Medicus Parisiensis, atque de illo perhibet, quod insigni virtute, & nulli secunda, rabiem arceat, vulnera a cane rabioso inflicta sanet, & terrificum illud symptoma, quo miselli reformidant aquas, impediat.

Dosis drachma semis ad drachmas duas.

PULVIS NEPHRITICUS PRETIOSUS.

REC. Lapidum cancrorum, acido citri saturatorum,
Lapidis Judaici præparati ana unciam unam,
Lyncis præparati,
Margaritarum Orientalium præparatarum,
Operculorum cochlearum ana drachmam unam.

Misceantur, fiat pulvis subtilissimus.

Commendatur nephritide & calculo vesicæ laborantibus, atque non sine fructu adhibetur.

Dosis scrupulus unus.

PULVIS PANNONICUS, MINUS PRETIOSUS.

REC. Boli Armenæ præparatæ,
Terræ Lemniæ ana unciam unam,
Corallii utriusque,
Spodii,
Cornu cervi, philosophice præparati,
Rasuræ eboris ana drachmas sex,
Matris perlarum, acido citri saturatæ, uncias duas,
Radicis Contrayervæ unciam unam,
Croci Orientalis drachmam unam.

Misce, fiat pulvis.

Vires, quæ sequentis.

PVLVIS PANNONICVS RUBER ORDINARIUS.

REC. Boli Armenæ præparatæ uncias tres,
Terræ Lemniæ uncias duas,
Coralliorum alborum præparatorum drachmas ſex,
rubrorum præparatorum drachmas quatuor,
Margaritarum præparatarum drachmas quinque,
Lapidum Hyacinthi,
Smaragdi,
Rubini,
Sapphiri,
Cornu cervi, philoſophice præparati, ana unciam ſemis,
Raſuræ eboris drachmas tres,
Spodii drachmas quinque,
Cinnamomi drachmas duas,
Caryophyllorum,
Croci ana drachmam unam,
Seminis Acetoſæ,
Sandali rubri ana drachmas duas,
albi,
Corticum citri ana drachmam unam ſemis,
Folia auri numero viginti quatuor.

Miſce, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

A longo tempore pulveris hujus uſus receptus eſt. Videtur autem Author incognitus eum præcipue febribus caſtrenſibus, quæ in Hungaria frequenter, cum dyſenteria, graſſantur, accommodare voluiſſe.

Apud nos frequens ejus uſus eſt in variolis & morbillis, febribus continuis & dyſenteriis malignis. Pueris ac infantibus mulierculæ vulgo contra convulſiones & in febribus, e dentitione ortis, propinare ſolent, non diſtinguentes vocabulum germanicum Gifft *a* Gicht, *quo priori venenum, poſteriori autem convulſionem & epilepſiam ſignificamus.*

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

Proſtat in officinis noſtris etiam INCOMPLETUS, demptis ſcilicet *Margaritis*, *Lapidibus pretioſis* atque *Foliis auri.*

PULVIS AD PARTUM.

REC. Boracis unciam ſemis,
Caſtorei veri,
Croci ana drachmam unam ſemis,
Olei cinnamomi guttas octo,
Succini guttas ſex.

Miſce, fiat pulvis.

Ad partum facilitandum, fœtum vivum & mortuum expellendum, datur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

PULVIS PLEURITICUS.

REC. Mandibularum lucii piſcis,
Dentium apri, ſine igne præparatorum,
Lapidum percarum,
Talorum leporum ana unciam ſemis,
Oculorum cancrorum præparatorum unciam unam,
Seminis Cardui benedicti drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

PULVIS PLEURITICUS ALIUS, SECUNDUM MYNSICHTUM.

REC. Florum Sulphuris unciam ſemis,
Dentium Apri,
Mandibularum lucii piſcis ana unciam unam,
Florum papaveris unciam ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Pleuriticis offeruntur ex aqua Cardui benedicti, vel alia diapnoica, & ad miraculum poſteriorem nonnunquam, brevi tempore, dolores mitigaſſe, compertum eſt. Dari etiam in aliis affectibus inflammatoriis poſſunt.

Doſis utriusque ſcrupulus unus vel drachma ſemis.

PUL-

PULVIS PRÆCIPITANS STAHLII.

REC. Concharum marinarum præparatarum,
Matris perlarum præparatæ,
Cornu cervi usti præparati,
Oculorum cancrorum præparatorum ana unciam semis,
Antimonii diaphoretici drachmam unam,
Cinnabaris nativæ præparatæ drachmam semis.

Misce, fiat pulvis subtilissimus.

Est absorbens, & conducit illis, quibus ventriculus acido oneratus est; loco temperantis pulveris, etiam præscribitur illis, qui salia & nitrum ferre nequeunt.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS PURPUREUS ANGLICUS.

REC. Cornu cervi sine igne præparati,
Succini albi,
Coralliorum rubrorum,
Matris perlarum ana unciam unam,
Oculorum cancrorum,
Chelarum cancrorum ana uncias duas,
Croci scrupulum semis,
Coccionellæ scrupulos duos.

Coccionella & crocus, aceto vel succo citri trita, reliquis præparatis, vel in pulverem subtilissimum tritis, admisceatur.

Laudatur in variolis & morbillis.

Dosis scrupulus unus vel drachma semis.

PULVIS RESOLVENS STAHLII.

REC. Concharum sine igne præparatarum,
Antimonii diaphoretici,
Nitri crudi purissimi ana uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Conducit ad humores lentescentes resolvendos, in ipsis febribus.

PULVIS RESOLVENS COMPOSITUS.

REC. Pulveris præcedentis resolventis uncias tres,
Extracti chacarillæ unciam unam.

Misce.

In morbis pectoris, peripnevmonia, pleuritide, egregias resolvendi vires possidet; sic etiam in diarrhœis febrium acutarum, & dysenteria omnibus aliis palmam præripit.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis & ultra.

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS STAHLII.

REC. Radicis Scillæ recentis libram unam,
Vincetoxici, sive Hirundinariæ pulverisatæ uncias quatuor.

Scilla recens in mortario marmoreo, pistillo ligneo, in pultem contundenda, cui additur Vincetoxici radix siccata & recens pulverisata, impastentur; postea leni calore exsiccata rursus pulverisentur.

Est hic pulvis resolvens præstantissimum in asthmate humido, catarrho suffocativo, œdematibus & cachexia.

Dantur pauca grana, tria, vel quatuor, ad summum quinque. Potest pilulis laxantibus commode misceri. Celeberrimum Stahlium clysteribus etiam indidisse, clarissimus Schulzius perhibet.

PULVIS STERNUTATORIUS.

REC. Radicis Liquiritiæ drachmas tres,
Ellebori albi drachmas duas,
Herbarum Majoranæ,
Basilici,
Foliorum Nicotianæ,
Florum Lavendulæ,
Liliorum convallium ana unciam semis,

Cinnamomi drachmas tres,
Styracis drachmas duas.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde
Olei destill. Lavendulæ,
Ligni Rhodii ana guttas duodecim,
Caryophyllorum guttas octo,
Sacchari albi unciam unam,
Coloris cœrulei Indici drachmam semis,
Moschi, in aqua Rosarum soluti, grana quinque.

Usus omnibus notissimus.

PULVIS STERNUTATORIUS ALBUS, sive ELÆOSACCHARUM CEPHALICUM CAMERARII.

REC. Olei destill. Majoranæ,
Caryophyllorum,
Ligni Rhodii ana guttas tres,
Cinnamomi,
Citri,
Fœniculi,
Lavendulæ ana guttas duas,
Moschi grana tria,
Sacchari albissimi uncias tres semis.

Misceantur exactissime, & in vitro serventur.

Usus est sequentis.

PULVIS STERNUTATORIUS ALBUS, vel ELÆOSACCHARUM CEPHALICUM GMELINI.

REC. Sacchari albissimi uncias duodecim,
Ambræ griseæ,
Moschi ana scrupulum semis,
Olei destill. Cinnamomi,
Caryophyllorum ana guttas quindecim,
Anisi,
Olei destill. Anthos,
Lavendulæ,
Majoranæ ana drachmam semis,
Ligni Rhodii,
Succini ana scrupulum unum.

Ambra dissolvitur in oleis; Moschus vero in parva quantitate aquæ rosarum, quæ postea saccharo commiscentur.

Non solum naribus, loco pulveris sternutatorii, attrahi potest, sed etiam in affectibus spasmodicis ac paralyticis linguæ adhiberi.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

PULVIS STERNUTATORIUS NOPSII.

REC. Radicum Caryophyllatæ,
Iridis Florentinæ ana scrupulos duos,
Ellebori nigri scrupulum unum,
Herbæ Basilici scrupulos octo,
Betonicæ,
Rorismarini ana drachmam unam,
Salviæ hortensis drachmas duas,
Florum Anthos,
Betonicæ,
Salviæ ana scrupulum unum,
Lavendulæ scrupulos quatuor,
Liliorum convallium drachmas tres,
Rosarum rubrarum scrupulos septem,
Seminis Anisi,
Erucæ ana scrupulos quinque,
Pæoniæ scrupulos duos,
Caryophyllorum aromaticorum drachmas sex,
Cubebarum drachmas tres,
Cardamomi minoris drachmam unam.

Mi-

Miſceantur, & fiat omnium pulvis tenerrimus, addantur
Succini albi præparati ſcrupuli quatuor,
Olei deſtill. Caryophyllorum,
Majoranæ,
Aniſi ana guttæ decem,
Moſchi grana ſedecim.

A longo tempore in noſtris officinis in uſu eſt. Vires ex nomine patent.

PULVIS STERNUTATORIUS VARIEGATUS.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinæ ana drachmas tres,
Foliorum Nicotianæ drachmas ſex,
Herbæ Majoranæ,
Florum Calendulæ,
Cyani ana drachmas duas,
Liliorum convallium,
Roſarum rubrarum ana drachmas tres.
Minutiſſime inciſis adde
Olei Caryophyllorum,
Lavendulæ,
Ligni Rhodii ana guttas triginta.
Miſce, atque pro lubitu addantur
Moſchi in aqua roſarum ſoluti grana tria.

Tam oculis ob colorem varium, quam naribus ob odoris ſuavitatem, gratus eſt.

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANNI.

REC. Radicum Ari præparatarum uncias duas,
Acori vulgaris,
Pimpinellæ ana unciam unam,
Oculorum cancri unciam ſemis,
Cinnamomi drachmas tres,
Salis Abſinthii,
Juniperi ana drachmam unam,
Sacchari roſati ad pondus omnium.
Miſceantur, & in pulverem redigantur.

Magnis encomiis pulverem hunc laudat Quercetanus: Exhibetur, inquit, „non tantum ad ventriculum roborandum, cui proprie convenit, ſed „etiam ad capitis affectus, ad hemicranias acutiſſimas, vertiginem, „melancholiam hypochondriacam, cachexiam & ſimiles affectus; ad calculum etiam & febrem quartanam „porrigitur, habet enim facultatem „deoppilandi hepar, lienem & meſenterium, & diſſolvendi & liquefaciendi tartarum glutinoſum, qui „plurimorum morborum cauſa exiſtit.„

Doſis drachma una ad drachmas duas, & ultra.

PULVIS AD STRUMAS CUM SACCHARO.

REC. Spongiarum combuſtarum,
Pilularum marinarum toſtarum ana uncias duas,
Oſſium Sepiæ,
Piperis longi,
nigri,
Zinziberis,
Cinnamomi,
Salis gemmæ,
Pyrethri,
Gallarum,
Lapidum ſpongiarum ana unciam unam,
Sacchari albiſſimi uncias quatuor.
Pulveriſentur & miſceantur.

Ad ſtrumas & ſcrophulas abigendas, luna decreſcente, in uſum vocatur, matutino tempore & ante ſomnum.

Doſis ſcrupuli duo, vel drachma una, ſi fieri poteſt, ſicca deglutienda.

PULVIS TEMPERANS.

REC. Lapidum cancrorum, ſubtiliſſime pulveriſatorum,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias duas,
Matris Perlarum præparatæ,

Tartari vitriolati ana uncias quatuor,
Nitri puriſſimi cryſtalliſati uncias octo,
Cinnabaris factitiæ puriſſimæ, in alcohol redactæ, unciam unam & drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Variæ circumferuntur deſcriptiones hujus pulveris; omnes vero, vel plurimæ, cum hac noſtra conveniunt, tam reſpectu quantitatis nitri, quam abſorbentium & cinnabaris. Nonnullæ tamen loco Tartari vitriolati, Arcanum duplicatum præſcribunt, atque coralliis & matri perlarum, antimonium diaphoreticum & conchas ſubſtituunt. Cinnabaris in his facit partem decimam quartam, in aliis decimam quintam.

Vix tamen notabilis intercedit, intuitu virium, differentia; igitur hanc, quam in priori editione hujus libri dedimus deſcriptionem, utpote in plurimis noſtris officinis jam uſitatam, ſervare maluimus, quam præter neceſſitatem immutare.

Ad ſanguinis æſtum temperandum & vitioſos humores, in primis viis, corrigendos, utiliter datur.

Doſis ſcrupulus unus ad ſcrupulos duos.

PULVIS AD TORMINA INFANTUM.

REC. Pulveris epileptici Marchionis,
Radicum Iridis Florentinæ,
Liquiritiæ ana drachmas ſex,
Seminum Aniſi,
Lycopodii,
Fœniculi ana drachmas duas,
Croci Auſtriaci ſcrupulum unum.

In pulverem trita ſerventur.

Ad infantum morbos ab acido in primis viis, flatibus, torminibus, & urinæ retentione atque ardore commendatur.

Doſis ſcrupulus ſemis ad ſcrupulum unum.

PULVIS CONTRA VERMES.

REC. Radicum filicis fœminæ ramoſæ,
Rhabarbari veri,
Seminis cynæ,
Muſci corallini ana unciam unam.

Miſce, fiat pulvis.

Lumbricos expellit.

Doſis eſt ſcrupulus unus ad drachmam ſemis; repetitis vicibus dari debet, & pro lubitu, atque neceſſitate, vel Mercurio dulci, vel Æthiope minerali, nec non Diacrydio acui poteſt.

PULVIS VIENNENSIS ALBUS VIRGINEUS, DIAPHORETICUS.

REC. Glaciei Mariæ libram unam,
Lapidis ſpecularis libras duas.

A ſordibus optime purgata in crucibulo calcinentur, poſtea ſuper Porphyritem terantur, denique, affuſa copioſa aqua, pars ſubtilior, per inclinationem, ſeparetur, quæ ſiccata uſui ſervetur.

Uſus eſt in nimio æſtu febrili, ad bilem infringendam, calorem minuendum, & ſitim levandam.

Doſis ſcrupulus unus.

PULVIS VITÆ IMPERATORIS.

REC. Radicum Zedoariæ,
Enulæ,
Calami aromatici,
Pimpinellæ,
Galangæ,
Caryophyllatæ,
Liquiritiæ ana drachmas duas,
Herbarum Scolopendrii,
Veronicæ,
Cardui benedicti,
Florum Centaurii minoris ana drachmam unam,
Foliorum Sennæ electorum unciam unam ſemis,
Seminum Aniſi,
Fœniculi,

Se-

Seminum Carvi,
Petroſelini ana drachmam unam ſemis,
Baccarum Juniperi drachmas tres,
Cinnamomi ana drachmam unam,
Cubebarum,
Cardamomi ana ſcrupulos quatuor,
Macis,
Cornu cervi uſti ana drachmas duas,
Rhapontici veri unciam ſemis,
Rhabarbari electi drachmam unam ſemis,
Cremoris Tartari drachmas tres,
Sacchari candi albi uncias quatuor ſemis.

Miſce, fiat pulvis.

Ad ventriculum roborandum, flatus pellendos, nec non ad tuſſim ſenum, ab indigeſtione ortam, commode adhibetur.

Datur a drachma una ad drachmas duas.

RADICIS ARI PRÆPARATIO.

Colligenda eſt radix primo vere, dum germinare incipit, mnndata, & cultello eburneo in orbiculos diſſecta, infundatur vino albo, & maceretur in loco frigido, per viginti quatuor horas, quibus elapſis, vinum per inclinationem ſeparetur, & radix, in furno vel clibano ſiccata, in pulverem teratur, & uſui aſſervetur.

Incidit & reſolvit; ad pulverem ſtomachicum Birckmanni requiritur, & fæculis longe præferenda eſt.

Doſis grana decem ad ſcrupulum unum.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

REC. Clavorum ferreorum purgatorum uncias octo,

Candefactis in crucibulo injice ſucceſſive
Antimonii Hungarici uncias ſedecim,

optime fuſis adde
Nitri uncias tres.

Hæc probe, per horæ quadrantem & ultra, igne ſat forti, ad inſtar aquæ, fuſa, fluentia cono fuſorio, ſevo illito, infundantur, conum in ipſa fuſione continuo percutiendo, & promovendo reguli ſubſidentiam & ſeparationem. Refrigeratis omnibus, eximatur tota maſſa, cui in fundo adhærebit regulus, ſuperiore ſui parte jamdum ſtellam obſcure ferens, qui, a ſcoriis ſeparatus, denuo ſecunda & tertia vice, additis ſemper
Nitri duabus, vel tribus unciis,
fundi, & calici fuſorio immitti poteſt; poſt ſingulas adminiſtrationes, ſcorias ſeparando; ſic mox, ſecunda aut tertia fuſione peracta, in parte ſuperiore reguli, ſtella accurate conformata, & quaſi ad normam exacta, deprehendetur.

Uſibus chymicis potius, quam medicis, inſervit, & ad ſcyphos vomitorios, addito duplo ſtanni pondere, in quibus vinum infuſum emeticum evadit.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

REC. Antimonii crudi optimi uncias quinque,
Salis communis uncias quatuor,
Tartari unciam unam.

Trita in pulverem tenuem exacte miſce, ac in crucibulo candenti detona; poſt detonationem auge ignem, ut fluant per horæ quadrantem, inſtar aquæ; exemtum poſtea igne crucibulum quieſcat & refrigeretur, ſic ſcoriæ cum ſalibus in ſuperficie, regulus picei coloris ſplendens, fracto crucibulo, in fundo reperietur, quem, a fragmentis & ſcoriis ſeparatum, & ſubtiliſſime ſupra Porphyritem tritum,

atque pulverem coloris punicei jam referentem, vase optime clauso, in loco sicco serva.

Laudatur ad febres intermittentes, & febrifugum Croanii vocatur. Ingreditur porro Pulverem alexipharmacum Rollwagii dictum. In lymphæ vitiis, scabie, hydrope, præsertim anasarca, cum Mercurio dulci administratus, optime evenisse visus est.

Notandum autem venit, regulum hunc semper in loco calido sicco asservandum esse, alias facile vomitum in sensibilioribus, illius usu, excitari, deprehensum est.

Dosis grana decem, quindecim, ad grana viginti quinque.

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

REC. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam semis,
Nitri uncias sedecim.

Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur, postea, igne vehementiore adhibito, fundantur, fusa in conum fusorium, calefactum & sebo illitum, effundantur, conum, ut in fundum abeat regulus, concutiendo; tandem scoriæ ab eo separentur, & regulus aqua abluatur.

E scoriis, aqua solutis, per præcipitationem, SULPHUR AURATUM parari potest.

Variis laboribus chemicis inservit hic regulus.

RESINA GIALAPPÆ.

REC. Radicum Gialappæ, quantum libet.

Crassiuscule contusis affundatur Spiritus vini optime rectificatus, ut tres vel quatuor digitos superemineat. Stent infusæ in loco calido, per aliquot dies, postea colentur, cum forti expressione, extractionem hanc toties repetendo, quousque Spiritus vini non amplius tingatur; tandem conjunctis & filtratis extractionibus affundatur aqua fontana, & spiritus vini destillando separetur. Resinosa substantia Gialappæ, in fundo cucurbitæ hærens, aqua clara aliquoties lavetur, & in vase, in aquam ferventem immisso, ad piceam consistentiam redigatur, atque, in cylindros contortos efformata, servetur.

Est purgans universale & præcipue pilulis laxantibus pro stimulo additur. Nunquam sola dari debet, intestinis enim adhæret, & non solum tormina & hypercatharses, verum etiam funestas inflammationes excitare potest. Optima methodus exhibendi est in pilulis, ubi extractis jungitur, & particulæ resinosæ disgregantur. Amygdalis vel Pineis trita, ab oleosa earum substantia quidem dissolvitur, verum ita vehiculo frigido assumi debet, ne resina rursus coaguletur. Pessimus modus est, illam exhibendi, si in spiritu soluta, absque syrupi additione, datur; mox enim, e spiritu præcipitata, pristinam piceam substantiam induit.

Dosis in pilulis grana quatuor, sex, vel septem; in forma pulveris, cum Amygdalis triti, usque ad scrupulum semis, in robustioribus, ad grana duodecim ascendere licet.

RESINA SCAMMONII.

Pari opera & methodo, qua Gialappæ resina sive magisterium, conficitur.

Easdem habet vires, & eadem exhibetur dosi & modo.

ROOB BERBERUM.

REC. Succi berberum depurati libras quatuor,
Sacchari albi libram unam.

Coquantur in vase figulino, ad mellis consistentiam.

Additur julapiis & electuariis. Refrigerat, sitim sedat, & bilem refrænat.

ROOB

ROOB CERASORUM, MORORUM, RIBIUM, RUBI IDÆI.

Pari modo parantur, atque easdem habent virtutes.

ROOB CYDONIORUM.

REC. Succi Cydoniorum depurati libras ſex,
Sacchari albi libram unam.

Coque ad mellis ſpiſſitudinem.

Leniter adſtringit, ventriculum roborat, ſitim ſedat, atque præprimis biliofis convenit.

Doſis uncia ſemis ad drachmas ſex.

ROOB CYNOSBATI.

REC. Pulpæ fructuum Cynosbati maturorum libras tres,
Sacchari albi libras duas.

Evaporentur, ad juſtam conſiſtentiam, igne lento.

Leniter adſtringit, & ad nephritidem calculoſam commendatur.

ROOB CORNORUM.

Eodem modo, quo proxime præcedens, paratur.

ROOB EBULI.

Fit, Succi granorum Ebuli depurati libram unam, cum
Sacchari unciis duabus,
ad mellis conſiſtentiam, igne moderato, inſpiſſando.

Eſt alexipharmacum atque diureticum; datur hydropicis, ubi per alvum & urinam vires exſerit.

Doſis uncia ſemis ad integram.

ROOB JUNIPERI.

REC. Baccarum Juniperi maturarum, recentium, conquaſſatarum, libras octo.

Coquantur in aqua communi, decoctum per ſetaceum coletur, & ad conſiſtentiam mellis, cum
Sacchari libra una,
lento igne redigatur.

In ventriculi morbis, flatibus pellendis, ad urinam & ſudorem movendum, commendatur; hydropicis etiam conducit, & a nonnullis ruſticorum panacea & theriaca vocatur.

ROOB NUCUM.

REC. Succi, e nucibus viridibus, circa feſtum Baptiſtæ extracti,
Mellis deſpumati ana libram unam.

Coquantur ad juſtam conſiſtentiam.

Commendatur ad ulcera oris & linguæ, item in angina & tonſillis tumefactis, gargariſmis additur.

ROOB SAMBUCI.

REC. Succi baccarum Sambuci maturarum partes ſex,
Sacchari albi partem unam.

Coque igne moderato, cavendo empyrevma, ad conſuetam conſiſtentiam.

Gratius eſt, virtute vero cum ebulino convenit.

ROTULÆ BERBERUM.

REC. Sacchari albiſſimi libram unam.

In pulverem redactum, leni admodum igne, incaleſcat, cui tum adde
Succi berberum, per ſubſidentiam optime depurati, uncias duas.

Sicque, absque omni coctione, in conſiſtentiam tabulati reduc, ac in rotulas, ut artis eſt, effunde.

Cum ſyrupo conveniunt, ad ſitim & ſiccitatem oris, in febribus inprimis, commendantur.

ROTULÆ DIAIREOS.

REC. Specierum Diaireos ſimplicium unciam unam,
Sacchari albiſſimi, in ſufficienti quantitate Aquæ Violarum ſoluti, & ad conſiſten-

ſtentiam tabulati coƐti, uncias duodecim.

Miſce, fiant lege artis rotulæ.

Sunt pectorales; materiam acrem tenuem incraſſant, & expectorationem adjuvant.

ROTULÆ MANUS CHRISTI, ſive SACCHARUM PERLATUM.

REC. Sacchari albiſſimi libram unam,

Aquæ roſarum, quantum ſatis, pro ſacchari ſolutione.

Coquantur ad tabulati conſiſtentiam, & addatur

Matris perlarum præparatæ uncia ſemis.

Effundatur in rotulas.

Pulveribus analepticis & emulſionibus addi ſolet.

ROTULÆ CONTRA VERMES.

REC. Seminis Cynæ,

Corallini muſci,

Cinnamomi,

*Æthiopis mineralis ana ſcrupulos duos,

Sacchari albi, in aqua roſarum ſoluti & ad conſiſtentiam tabulati coƐti, uncias quatuor.

Fiant lege artis rotulæ.

Uncia continet Æthiopis mineralis ſcrupulum ſemis.

Dari poſſunt a drachmis duabus ad drachmas ſex.

SACCHARUM CLARIFICATUM.

Fit, libras duas ſacchari albi in libra una aquæ puræ fontanæ ſolvendo, atque percolando.

Adhibetur electuariis, conditis, &c.

SACCHARUM LACTIS.

REC. LaƐtis recentis vaccini libras decem.

Reponantur per viginti quatuor horas, auferatur cremor, & reſiduum lac lento igni exponatur, ut caſeoſum præcipitetur. Serum, per colatorium ſeparatum, & per chartam bibulam filtratum, in vaſe figulino vitreato, lento igne, ad ſextæ partis remanentiam, evaporetur, atque ad cryſtalliſationem reponatur. Cryſtalli colleƐtæ aqua frigida abluantur, & in loco tepido, inter chartas, ſiccentur, atque loco ſicco, temperato, in vitro aſſerventur.

Antiſpaſmodicum, demulcens, anodynum & antarthriticum eſt; ſcorbuticis, hecticis & nephriticis convenit. Cavendum vero eſt, ne ſit rancidum, ſed recens paratum.

Doſis drachma una ad drachmas duas.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

REC. Pulveris florum Roſarum rubrarum drachmas duas,

Sacchari albi, in aqua Roſarum diſſoluti, & ad conſiſtentiam tabulati coƐti, uncias quatuor.

Fiat confeƐtio in tabulis.

Pulveribus, ſaporis gratia, additur.

SACCHARUM SATURNI CRYSTALLISATUM.

REC. Minii, aut Lithargyrii, quantum vis.

Affunde, in vaſe vitreo, aceti deſtillati acerrimi, quantum ſufficit, ad eminentiam quatuor, ad minimum digitorum, digere in loco moderate calido, ſæpius, ab initio præſertim, bacillo aut ſpatula lignea, ne nimium in fundo concreſcat, per unum alterumve diem, agitando, donec acetum a Saturno ſaturatum, flaveſcat, & ſapore dulceſcat. Deinde ſolutionem decanta, ac novum acetum deſtillatum affunde, ut denuo aliquot digitos ſupereemineat, idque toties reitera, novum acetum deſtillatum affundendo, donec dulceſcat. ExtraƐtiones omnes conjunge, atque in vaſe figulino, leni igne, evapora ad cuti-

cuticulam, & ad cryſtalliſandum repone. Cryſtallos leni calore exſicca.

Lithargyrium ſemper cupro inquinatum eſt; hinc præſtat ſaccharum ſaturni, vel ex plumbo puro crudo, vel minio præparare; breviori etiam manu, ac citius, leni decoctione, quam digeſtione, ſal extrahitur, & plumbum ſolvitur; decoctio vero, uti ſupra diximus, in vaſe figulino, vitreato, inſtituenda. Reſiduum, quod in cryſtallos abire recuſat, leni igne evaporatur, atque ſiccatum, in pulverem tritum, ſervatur.

Externi tantum uſus eſt; refrigerat, mundificat, adſtringit & ſiccat; in collyriis, ad oculorum inflammationem, adhibetur. Sunt, qui interne, ad epilepſiam, gonorrhœam & venerem extinguendam, dant, quod tamen ſumma circumſpectione fieri debet.

SAL ABSINTHII.

REC. Abſinthii ſicci, quantum vis.

Comburatur in cineres albos, ſal extrahatur aqua communi calida, aliquandiu digerendo, poſtea aqua per inclinationem ſeparetur, idque novam affundendo aquam, eousque repetatur, donec aqua lixivioſo ſapore non amplius imbuatur. Tandem exhalando coaguletur, & denuo ſolutum, filtratum, atque, donec pellicula in ſummitate concreſcere incipiat, evaporationi commiſſum reponatur, ut in cryſtallos concreſcat, quæ exſiccentur, & remanens liquor ulteriori cryſtalliſationi, evaporando & reponendo, accommodetur.

Hæc eſt methodus vulgaris, ſalia herbarum parandi, ſecundum quam reliquarum herbarum ſalia parari poſſunt. Verum

Non adeo acre ſal, & major quantitas ejus acquiritur, ſi methodo Tacheniana plantæ non penitus ſiccæ, ſed admodum marceſcentes, vel plane recentes, in ſartagine magna, ferrea lamina tecta, incinerantur. Lamina autem adhibetur, ut violentia ignis & flamma aliquo modo arceantur, & lentiore gradu combuſtio fiat; in fine, dum flamma ceſſat, ſemper virga ferrea movendi ſunt cineres, ut æqualiter calcinentur, atque omnes carbones in albos cineres redigantur, qui cinis aqua frigida extrahendus. Lixivium per filtrum, vel pannum, colatum, lento igne, ſine magna ebullitione, evaporandum, & cum cuticula apparet, ad cryſtalliſandum reponendum.

Salia hæc fixa plantarum, ſine ſulphure vel alio artificio parata, (caveant vero pharmacopœi, pro more, cineres, vel ſal ipſum cum ſulphure calcinare, vel acidum quoddam addere,) magis ad naturam alcalinorum, quam mediorum ſalium, accedunt; nec etiam plantæ ſpecificas virtutes, e qua extracta ſunt, retinent. Vix ulla quoque inter illa deprehenditur differentia; omnia acidum infringunt, humores craſſos reſolvunt, attenuant, incidunt, urinam & alvum cient. Raro per ſe ſolum herbarum ſal, ſed plerumque cum aliis mixtum, præſcribitur. Illuſtris Bœrhave ad drachmam unam & ultra, in copioſa aqua diſſoluta, ad febres intermittentes pertinaces expugnandas, adhibere juſſit.

SAL VOLATILE ANGLICUM SICCUM.

REC. Salis Tartari uncias duas,
Ammoniaci uncias ſex.

Terantur ſeorſim, atque immittantur cucurbitæ vitreæ, addantur

Olei deſtillati Lavendulæ drachmæ tres,
Spiritus vini rectificatiſſimi uncia una.

Superimponatur ſtatim alembicus, atque leniſſimo igne ſublimetur ſal, quod vitris parvis incluſum, atque operculis vitreis obturatis, ſervetur.

Ex tempore parari poteſt, ſi

Salis Ammoniaci partes duæ,
Salis Tartari pars una, additis,
Olei Lavendulæ, vel alius odorati, guttis aliquot, miſceantur.

Ad olfaciendum offertur hyſtericis, & a cephalalgia vexatis.

SAL CORALLIORUM.

Solutio Coralliorum, aceto deſtillato facta, in vaſe figulino evaporatur, materiæ reſiduæ ſalinæ, ut odore aceti privetur, aquæ fontanæ portio ſuperfunditur, atque denuo, leni coctione, ad ſiccitatem perducitur. Pari modo etiam parantur

SAL MARGARITARUM, MATRIS PERLARUM, OCULORUM CANCRORUM.

Salia hæc ſunt ſolutiones, & virtute omnia gaudent reſolvente, diuretica & ſudorifera.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam dimidiam.

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

E cervi cornibus, in ſegmenta mediocria diſſectis, igne aperto, e retorta capaci, recipiente amplo adaptato, & juncturis optime clauſis, una cum ſpiritu & oleo, elicitur, atque agitatione a lateribus recipientis elotum, ab olei parte potiori ſegregatur, rectificatione poſtmodum, e cucurbita vitrea, arenæ igne admodum leni, a ſpiritu quoque ac phlegmate ſeparatur, & oſſium calcinatorum, vel cretæ albæ quadruplo mixtum, ſublimatur, itaque ad puritatem deſideratam & candorem gratum deducitur.

Salia volatilia animalia ſunt alcalinæ naturæ, & ab oleo empyrevmatico volatiliſationem acquirunt; reſolvunt igitur, & ab oleo, intime innexo, expanſivam virtutem habent, adeoque profundius in organa colatoria penetrant, ſicque ſecretiones omnis generis promovent, atque opem adferre poſſunt, ubi motus excitandi ſunt; e contra ab uſu eorum abſtinendum, ubi jam per ſe nimis intenſi.

Dantur a granis tribus ad grana duodecim; largiori vero doſi dari poſſunt, ſi ab oleo empyrevmatico liberata ſunt; facilius etiam ſenes, quam juvenes, phlegmaticos, quam ſanguineos & plethoricos perferre, expertum eſt.

SAL ESSENTIALE ACETOSÆ ET ACETOSELLÆ.

Herbarum Acetoſæ, vel Acetoſellæ copiam ingentem conciſam, & in mortario lapideo contuſam, inter lintea pura, prelo fortiter exprime. Succum expreſſum ſæpius per manicam Hippocratis cola, donec limpidus, purus & tenuis tranſeat. Liquorem ita depuratum e vitreis vaſis, vel figulinis probe vitreatis, leni ebullitione inſpiſſa, ad conſiſtentiam fere Cremoris lactis recentiſſimi; inſpiſſatum hoc liquidum infunde vitro cylindrico, vel, quod præſtat, urinali, ut usque intra collum plenum ſit; ſuperaffunde parum Olei olivarum, & in cellam, per ſeptem, octo, vel plures menſes repone. Ita ſub oleo, quod fermentationem & mucilaginis generationem prohibet, præcipitatur ſal, ſpeciem Tartari referens, qui, per inclinationem, a liquore ſeparatus, & ſubita aquæ frigidæ affuſione, paulum ablutus quam ocyſſime a fæce, leniterque exſiccatus, verum exhibet ſal plantarum nativum.

Citius etiam hoc ſal parari poteſt, ſuccum acetoſellæ, vel per ſubſidentiam, vel addito albumine ovi, per ebullitionem clarificando,

do, in vitro vel olla vitreata, ad tertiæ vel quartæ partis remanentiam, leniſſimo igne evaporando, atque in locum frigidum reponendo: ſic plerumque ſpatio viginti quatuor horarum, ſal concreſcit, & ad fundum vaſis deſcendit, quod vel ſiccari, vel in aqua fontana rurſus diſſolvi, coagulari, & tali modo depurari poteſt.

Acidum gratum eſt; hinc julapiis refrigerantibus additur, maxime vero apud nos in uſu ad maculas atramentoſas linteorum delendas.

SAL FEBRIFUGUM SYLVII.

REC. Reſiduum a deſtillatione ſpiritus ſalis Ammoniaci, qui cum ſale alcalino præparatus eſt, ſolvitur in aquæ communis puræ ferventis ſufficiente quantitate. Solutio filtratur per chartam, & evaporatur in olla terrea vitreata, ad ſiccitatem usque, agitando ſpatula, donec ſal relictum fuerit ſiccum & albiſſimum.

Vires ſunt attenuantes, incidentes & reſolventes. Prodeſt in febribus quartanis, nec non tertianis, diaphoreſin & urinam movet, refrigerat, & ad ſcrupulum unum dari poteſt.

SAL MINERALE. GLAUBERI.

Reſiduum ſal, quod, in paratione ſpiritus Salis Glauberiani, in fundo retortæ vel cucurbitæ reperitur, eximitur, aqua fontana fervida diſſolvitur, ſolutio filtratur atque evaporatur, donec pelliculam formare incipit. Tum quietum in loco frigido reponitur, ubi in maſſam glacialem coire ſolet. Si vero ſal ille in aquæ fervidæ ſextuplo ſolvitur, ſolutio parum inſpiſſatur, & in vitro magno reponitur, tum concreſcit in pulcherrimas cryſtallos, ſingularis formæ, ſatis magnas, in aëre non deliqueſcentes.

Sal rite paratus & in pollinem redactus, triplo aceti, cerevisiæ, vini, vel aquæ mixtus & repoſitus, ea conglaciat. Addito carbonum pulvere & in crucibulo fuſus, ſine ſulphuris additione, maſſam exhibet, Hepar ſulphuris dictam, ex qua verum ſulphur minerale præcipitari poteſt. Interne leniter ſtimulando, urinam pellendo, alvum movendo, reſolvendo, laudem meretur.

SAL LUMBRICORUM VOLATILE.

Ad normam Salis cornu cervi paratur.

Viribus etiam cum illo convenit.

Datur & eadem doſi.

Sunt, qui vim magis antiſpaſmodicam adſcribunt, quam cæteris ſalibus volatilibus.

SAL POLYCHRESTUM DE SEIGNETTE.

REC. Sodæ Hiſpanicæ, quæ eſt ſal e planta Kali paratum, libram unam,

Diſſolvatur in
Aquæ fontanæ ferventis libris tribus.

Solutio per chartam filtretur, & in vaſe figulino ebulliat, inter bulliendum inſpergatur
Cryſtallorum Tartari, in pulverem tritarum, quantum lixivium Sodæ capere poteſt; ſufficiunt plerumque unciæ ſex, vel ſeptem.

Mox, poſt additionem cryſtallorum Tartari, oritur efferveſcentia, quæ per intervalla ceſſat & renaſcitur. Tandem præcipitatur pulvis levis, cineritii coloris. Liquor ſupernatans, per chartam filtratus, ad tertias lento igne evaporatur, atque ad cryſtalliſationem reponitur.

Vix determinari poteſt pondus certum cryſtallorum tartari. Soda enim non eadem ſemper eſt, & vel majorem, vel minorem quantitatem Salis Alkali continet. Cry-

ftallorum Tartari igitur tantum addere neceſſe eſt, usque dum effervefcentia ceſſet, quod ſignum eſt ſaturationis.

Cum tartaro ſolubili, vel tartariſato convenit, & easdem vires habet. Loco Salis Anglici cathartici, a drachmis duabus ad ſex, in aqua ſolutus, dari poteſt. Urinam ciet, & alvum movet, absque ulla moleſtia.

SAL SUCCINI VOLATILE.

REC. Raſuræ ſuccini libras ſex,
Arenæ lotæ libras tres.

Miſceantur & deſtillentur e retorta, arenæ impoſita, primo lento, poſtea aucto ignis gradu. Primo prodit phlegma acidulum, quod ſequitur oleum flavum, deinde rubrum, & cum illo & ſubſequente oleo nigro, ſal volatile, oleum flavum & phlegma, mutato recipiente ſeorſim ſervanda. Oleis vero, rubro & nigro, una cum ſale volatili, affunduntur,
Aquæ fontanæ calidæ libræ tres,
& invicem agitantur, ut ſal in oleo hærens ſolvatur & elutrietur. Liquor ſalinus per chartam emporeticam, antea, ne ſimul oleum penetret, madefactam, filtratus, lento igne, in vitreo vel terreo vaſe, ad quartæ partis remanentiam evaporatur, & ad cryſtalliſationem reponitur. Cryſtalli ſalinæ ſquamoſæ a liquore ſupernatante ſeparantur, & leni calore exſiccantur; liquor vero, vel ad ſiccitatem, vel ad dimidias evaporatus, denuo ad cryſtalliſandum reponatur.

Non ſolum ad Liquoris cornu cervi ſuccinati præparationem inſervit; ſed & per ſe in affectibus hyſtericis, catarrhalibus & nervinis utiliter adhibetur; egregium etiam eſt diureticum, & penetrans aperitivum; ob oleum vero, quod illi adhæret, motus excitat.

Datur a granis tribus ad ſcrupulum ſemis, &, ſi probe ab oleo depuratum, ad ſcrupulum integrum aſcendere licet.

SAL TARTARI FIXUM.

Tartarus in vaſe terreo non vitreato reverberatur, ad albedinem usque; tum, aqua communi ſolutus, filtratur, & in ſal coagulatur, quod, repetita ſolutione & coagulatione, purius redditur.

Eſt ſalium alcalinorum omnium optimum ac puriſſimum. In Medicina ejus uſus eſt rarus, ad chymicos labores præcipue inſervit.

Purgantium debiliorum, utpote rhabarbari, & foliorum ſennæ, vires excitat.

SAL TARTARI VOLATILE.

Fæces vini in umbra, ſuper aſſeres effuſæ, ſiccantur, ex retorta vitrea per gradus, ſicut ſpiritus Tartari, deſtillantur, ſic prodit, una cum oleo & ſpiritu, ſal volatile, quod, ſicut in ſalis ſuccini deſtillatione dictum, aqua fontana calida diſſolvitur, atque ab oleo extrahitur & ſeparatur, e cucurbita ſublimatur & depuratur.

Eſt ſal alcali cum oleo empyrevmatico intime mixtum.

Vires diaphoreticæ & diureticæ oleo huic empyrevmatico ſunt adſcribendæ; igitur cum eadem cautela adhibendum, qua ſalia volatilia animalium propinare juſſimus.

SAL TARTARI VOLATILE TACKENII.

REC. Salis volatilis urinæ uncias duas,
Aceti deſtillati fortiſſimi uncias octo.

Digerantur leni calore, per aliquot dies; poſtea leni igne acetum, per deſtillationem, evocetur, atque
Aceti nova quantitas ſuperfundatur, & poſt digeſtionem, abſtrahatur. Sali relicto

Salis tartari quartam partem
successive adde;

Misceantur exacte, tum cucurbitæ, immissa sublimentur; sublimato residuum in cucurbita adde, tere, & denuo sublima, atque hanc cohobationem aliquoties repete, donec omnem salis tartari quantitatem sublimatam esse observes.

Vires sunt resolventes, aperientes & diureticæ.

Dosis grana decem ad scrupulum unum.

SAL VIPERARUM VOLATILE.

Eadem, qua cornu cervi, encheiresi, e viperis exenteratis & siccatis, conficiendum est.

Cum reliquis salibus volatilibus animalium convenit, & eadem dosi exhibetur.

SAL VOLATILE OLEOSUM.

REC. Cinnamomi electi unciam unam,
Macis,
Nucis moschatæ ana drachmas sex,
Caryophyllorum aromaticorum drachmas duas semis,
Corticum recent. Aurantiorum,
Citri ana uncias duas,
Cardamomi minoris,
Cubebarum ana drachmas duas,
Spiritus vini rectificati libras tres.

Stent per triduum, postea adde, seorsim in pulverem redactorum,
Salis ammoniaci uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum uncias sex,
Aquæ fontanæ libram unam.

Destillentur, lento igne, ad remanentiam libræ unius semis.

Ventriculi & intestinorum atoniam corrigit, flatus dissipat, & hyemali ac pluvioso tempore sumtum, transpirationem insensibilem promovet, atque a morbis præservat.

Dosis guttæ viginti quinque ad quadraginta.

SAL VOLATILE OLEOSUM ANGELICÆ BOERHAVE.

REC. Radicum angelicæ recentium tenuium, mense februario effossarum, & minutim incisarum uncias duas,
Salis ammoniaci, in pulverem triti, unciam unam,
Tartari drachmas tres,
Spiritus vini bonæ notæ, libras duas.

Fiat statim, arcte agglutinato excipulo, destillatio leni igne.

Spiritui prolecto denuo
Radicis angelicæ unciam
adde, atque rursus destilla, & in vase arctissime clauso repone.

Celebratur ab auctore, cardiacum, stomachicum, sudoriferum, diureticum, antiparalyticum, antispasmodicum, &c.

Dosis guttæ viginti quatuor, triginta, ad quadraginta in vehiculo aquoso.

SAL VOLATILE OLEOSUM, sive LIQUOR OLEOSUS SYLVII.

REC. Olei destill. Anisi,
Caryophyllorum,
Cinnamomi ana drachmam semis,
Macis scrupulum unum,
Zedoariæ,
Succini ana scrupulum semis,
Spiritus salis ammoniaci volatilis, vinosi, uncias novem.

Digerantur in vase optime clauso, & serventur.

Vires ſunt carminativæ, ſtomachicæ & aperitivæ.

Doſis guttæ triginta ad quadraginta quinque.

SAL VOLATILE URINÆ.

Urinæ juvenum, vel puerorum magna quantitas, in vaſe terreo, ad mellis conſiſtentiam, evaporetur. Magma hoc vel e cucurbita, vel retorta leni igne deſtilletur, ſic prodit, una cum ſpiritu & oleo fœtido, ſal urinæ, quod, uti in ſalis cornu cervi præparatione docuimus, ab oleo & ſpiritu ſeparandum atque depurandum eſt.

Cum ſale cornu cervi per omnia convenit, igitur, quæ ibi diximus, repetere ſupervacaneum foret.

SANGUIS HIRCI PRÆPARATUS.

Sanguis excipitur, atque, in clibano ſiccatus, ſervatur.

Ab Helmontio ad pleuritidem tanquam ſpecificum, commendatur, apud plebejos uſus eſt, quoties lapſi, aut aliam contuſionem, vel ſubluxationem, paſſi ſunt.

Doſis drachma ſemis ad integram.

SAPO MEDICATUS.

REC. Calcis vivæ recentis ſolidæ libras duas,

committantur ollæ magnæ, atque ſuperponantur

Cinerum clavellatorum libræ quatuor;

ita, ut calx cineribus clavellatis undique tecta ſit, reponantur, linteo leviter tecta, tam diu, donec calx incipit fiſſa dehiſcere, tum demum permiſceantur, atque addantur

Aquæ fontanæ calidæ libræ viginti quatuor.

Coquantur in ferreo vaſe, ad tertiæ vel quartæ partis conſumtionem, transcolentur per linteum denſum. Lixivium ita paratum ovum recens injectum ſuſtinere debet, & a ſaponariis Magiſtra, Meiſter-Lauge appellatur; aqua magis dilutum, ſic, quod in illo ovum recens ad fundum ſubmergatur, ſecundarium vocatur.

REC. Hujus lixivii ſecundarii,

Olei olivarum puri & recentis ana libras tres;

Miſceantur accuratiſſime atque leni igne, ſub perpetua agitatione coquantur, donec, evaporata maxima parte humiditatis, quam optime inter ſe coire inceperunt; tum affundantur

Lixivii prioris, ſive Magiſtræ, circiter libræ novem.

Coquantur leniſſimo igne, continuata agitatione, usque dum mixtura pellucida, & quaſi mucilaginoſa ſit, atque gelatinæ inſtar, frigefacta, concreſcat. Tum aliquot uncias ſalis communis adjice, atque coctio continuetur, donec portiuncula hujus mixturæ ſaponaceæ, diſco inſtillata, lixivium a ſapore coagulato, prompte ſecedat. Removeatur ignis, & ſapo, lixivium ſuper natans, mediante cochleari in formas ligneas perforatas, quibus linteum ut lixivium tranſtillare poſſit, immitti debet, effundatur; Refrigeratus ſapo eximatur, atque in partes diſſectus exſiccetur. Signa laboris bene peracti & ſaponis perfecti ſunt, ſi in frigore ſciſſili duritie conſtet, in aqua perfecte ſolvatur, ad linguam non alcalinoacris ſit, & in aëre non liqueſcat.

Acrem alcalinum ſaporem ſi exhibet, ſignum eſt, alcali abundare, & tum olei parum addi & coctio continuari debet; ſi, ſapone in aqua ſoluto, olei nota apparet, tunc lixivii fortis portio addatur, & ulterius coquantur, donec æquabiliter diſſolvatur in aqua ſapo ita confectus.

A celeberrimis hujus ſeculi Medicis, & in-

inprimis Bœrhavio, in usum medicum internum vocari cœpit sapo, & quidem optimo cum successu. Ut igitur purus prostet, præparationis methodum adponere lubuit. Fastidiosum quidem atque nauseosum est medicamentum, at virtute egregie aperiente, attenuante, resolvente & dissolvente nulli cedit. Aqua solutus, calore, motu & contritu tam gummosa, quam resinosa, oleosa & pinguia dissolvit, redditque saponacea, atque in aqua dissolubilia. Obstat acido, coagulationem chyli & lactis impedit, imo coagulata resolvit; inveteratas obstructiones reserat, vias permeabiles reddit, calculosis convenit, & vires novi medicamenti lithontriptici Anglicani inprimis saponi sunt adscribendæ. In partu difficili bono cum successu etiam adhiberi posse compertum est.

Usus est, in aqua solutus & probe dilutus.

Dosis drachma una, vel duæ; largiorem quidem alii commendant, præstat vero minori dosi & repetitis vicibus exhibere, simulque motum corporis subjungere sufficientem.

In morbis vero putredinosis ejus usus exulet.

SAPO TARTAREUS, sive CORRECTOR STARCKEY.

REC. Salis Tartari purissimi libram semis.

Fluat in crucibulo, forti igne, per horam unam aut alteram, sicut pro paranda tinctura tartari fieri solet, ut igneus quasi ac acerrimus fiat. Hunc salem effunde in mortarium ferreum, probe calefactum, & pistillo pari modo calente in pulverem tenuem tere, quem, ab igne adhuc ferventem & tantum non candentem, immitte in purum, siccum, calidissimum vitrum, urinale vulgo dictum, in loco calido & sicco, die sereno; ipso momento, quo sal fervidus in vitri fundo collectus hæret, instillatur oleum Terebinthinæ destillatum, purissimum ac æthereum, nullo modo adulteratum, pariter calefactum, guttatim, ita, ut gutta guttam trudat, in mediam partem salis ferventis, tum, ingenti cum fumo & sibilo strepente, trahetur illapsum oleum illico in salem siticulosum, ad intima usque, & diffundet se per totam massam salinam. Instillatio continuatur ocyssime, donec tantum olei in salem attractum sit, ut purum supernatet, sicque omnem accessum aëris a superficie salis arceat, impediatque. Reponitur vitrum in locum subterraneum, charta tectum, brevi oleum disparebit, unitum sali alcalino; affunditur tum iterum aliquid olei calidi ejusdem, & baculo ligneo miscetur priori massæ. Reponitur, ut prius, sicque pergitur, donec triplum fere olei sali sic adunatum sit; eritque massa saponacea, æquabilis, mire penetrabilis. Quæ, quo magis conteritur & movetur, eo citius & felicius perficietur.

Cognoscimus bene absolutum esse opus, quando hic sapo aquæ miscetur, sine olei nota.

Corrector vocatur, quod si opio, vel alii vegetabili, ob vehementiam alias nocuo, exempli gratia Elleboro additur, eum corrigat & salutarem reddat.

Additur hic sapo pilulis polychrestis Starckeyanis, suo loco descriptis.

Abstergit, aperit, diureticus & balsamicus est, atque in gonorrhœa & hydrope feliciter adhibetur.

Dosis grana octo, ad undecim, in vehiculo aquoso.

SCILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla integra pastæ e farina & aqua, ex qua panis pinsi solet, involvitur, postea in clibano cocta, eburneo vel ligneo cultello squamæ a se invicem separantur, & filo trajectæ, in umbra siccantur.

Attenuat, incidit & resolvit potenter, in affectibus pectoris, a viscida, crassa, ma-

materia ortis, hydrope & cachexia commendatur.

Dosis in infuso scrupulus, vel drachma semis; in substantia vel pulvere grana tria, vel quinque.

SECUNDINARUM HUMANARUM PRÆPARATIO.

REC. Placentam uterinam humanam, demptis membranis & funiculo, mundetur & lavetur in vini sufficiente quantitate, atque, in frusta discissa, leniterque siccata, loco tepido asservetur.

Usus est in pulveribus, ad partum difficilem.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

SERICUM TOSTUM.

Eadem methodo, qua Spongiæ, torretur.

Species cordiales ingreditur, & pro antepileptico habetur.

Dosis scrupulus unus.

SIEF ALBUM.

REC. Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Amyli ana unciam semis,
Cerussæ drachmas sex,
Sarcocollæ drachmas tres.

Misce, fiat pulvis, servetur.

Additur collyriis, adversus ophthalmiam, a sero acri ortam.

Si SIEF CUM OPIO expetitur, addatur scrupulo granum dimidium Opii.

SOLUTIO CORALLIORUM.

Coralliorum rubrorum pulveri subtilissimo aceti destillati quantitatem sufficientem affunde, eoque soluto, acetum per chartam emporeticam colatum, leni igne, evapora, & siccatam solutionem serva.

Eodem recidit cum sale coralliorum prætensio.

SOLUTIO MATRIS PERLARUM, OCULORUM CANCRORUM,

eodem parantur modo, quo Coralliorum.

Sunt quasi sal medius, ex alcali terreorum & acido aceti. Aperiunt, urinam movent, & cum aqua commode dilui possunt; in febribus, vulnerariis præsertim, feliciter adhibentur.

SPARADRAP sive TELA GUALTH.

REC. Emplastri Diapalmæ,
Diachyl. s. ana libram unam,
Albi cocti libram dimidiam.

Liquatis admisce
Pulveris radic. iridis Flor. unciam unam semis.

Immitte lintea, sive telas vetustate detritas. F. Sparadrap.

Commendatur ad ulcera inveterata, excoriationes a longo decubitu ortas, nec non ad fonticulos.

SPECIES DIAMBRÆ.

REC. Doronici,
Galangæ ana drachmas tres,
Zinziberis drachmam unam semis,
Spicæ Indicæ drachmam unam,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Piperis longi ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Macis ana drachmas tres,
Cardamomi majoris,
minoris ana drachmam unam,
Cinnamomi drachmas tres.

Fiat pulvis, quem completum reddimus addendo
Ambræ drachmam unam,
Moschi drachmam semis,

Calefaciunt, caput & ventriculum roborant, concoctionem adjuvant, & in

in affectibus a causa frigida ortis inserviunt.

Dantur in trageis & morsulis.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

SPECIES DIANISI.

REC. Pyrethri drachmas duas,
Zinziberis,
Galangæ ana drachmas quinque,
Spicæ Indicæ drachmam unam semis,
Glycyrrhizæ rasæ unciam unam,
Calaminthæ drachmas duas,
Seminum Anisi uncias duas semis,
Carvi,
Fœniculi ana drachmas quinque,
Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Cubebarum ana drachmam unam semis,
Piperum trium ana drachmas duas,
Cinnamomi drachmas quinque,
Cassiæ ligneæ veræ drachmas duas,
Macis drachmas quinque,
Croci drachmam unam semis,
Masticheѕ unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Roborant ventriculum, flatus dissipant, atque tussi stomachicæ subveniunt.

Dantur in trageis, a scrupulis duobus ad drachmam unam.

SPECIES DIANTHOS.

REC. Radicum Liquiritiæ drachmas sex,
Zinziberis,
Zedoariæ,
Galangæ,
Ligni Aloës,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Spicæ Indicæ ana scrupulos quatuor,
Florum Rorismarini unciam unam,
Rosarum,
Violarum ana drachmas sex,
Seminum Anethi,
Fœniculi ana scrupulos quatuor.

Misce, fiat pulvis.

Sunt cephalicæ, stomachicæ, carminativæ; dantur melancholicis & animo languentibus.

Dosis drachma semis ad scrupulos tres.

SPECIES CONTRA APOPLEXIAM.

REC. Succini præparati,
Cornu cervi sine igne præparati,
Ligni Aloës,
Radicis Pæoniæ ana unciam semis,
Corticum citri drachmam unam,
Sacchari perlati uncias tres,
Olei destillati cinnamomi guttas sedecim.

Redigantur in pulverem, in vitro asservandum.

Completus efficitur, si
Ambræ scrupulus semis,
Moschi grana quinque adduntur.

Ad dolores capitis etiam chronicos laudantur; Vertigini, atque apoplecticis & epilepticis insultibus præcavendis destinantur.

Dosis drachma dimidia ad scrupulos duos.

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

REC. Glycyrrhizæ drachmas duas,
Zedoariæ,
Galangæ,
Ligni Aloës,
Sandali citrini,
Cinnamomi,

Macis,
Piperis longi,
Cardamomi ana drachmam unam,
Cubebarum ſcrupulos duos,
Florum roſarum unciam ſemis,
Caryophyllorum aromaticorum unciam unam.

Fiat pulvis.

Completæ redduntur, ſi unciæ harum ſpecierum adduntur

Ambræ griſeæ grana octo,
Moſchi granum ſemis.

Vires ſunt ventriculum roborandi, flatus diſcutiendi; phlegmaticis præcipue conveniunt, quibus etiam in cephalalgia & affectibus catarrhalibus, a copioſo ſero, conducunt.

Dantur in trageis, a ſcrupulo uno ad duos.

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ.

REC. Glycyrrhizæ drachmas ſeptem,
Galangæ drachmam unam,
Ligni Aloës,
Sandali citrini ana drachmas duas,
Cinnamomi acuti drachmas ſex,
Caryophyllorum aromaticorum,
Macis ana drachmas duas ſemis,
Nucis moſchatæ,
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Florum Roſarum uncias duas.

Fiat pulvis.

Completæ redduntur, ſi unciis duabus adduntur

Ambræ griſeæ grana octo,
Moſchi grana tria.

Sunt roborantes, leniter adſtringentes, cephalicæ & carminativæ. In trageis vel confectionibus exhibentur.

Doſis ſcrupulus unus ad duos.

SPECIES DIABORACIS.

REC. Boracis Venetæ unciam ſemis,
Caſſiæ ligneæ,
Croci Orientalis ana drachmam unam,
Raſuræ ligni Sabinæ,
Succini albi præparati ana drachmam ſemis,
Oſſium de cordibus cervi,
Viſci querni,
Florum Cheiri ana ſcrupulum unum.

Miſceantur, fiat pulvis.

Commendantur ab auctore Mynſichto ad partum difficilem, fœtum mortuum & ſecundinas pellendas.

Doſis ſcrupulus unus, vel drachma ſemis.

SPECIES DIACINNAMOMI.

REC. Radicum Enulæ unciam ſemis,
Galangæ unciam unam,
Zinziberis,
Caryophyllorum,
Cardamomi utriusque,
Piperis longi,
Macis,
Nucis moſchatæ,
Ligni Aloës ana drachmas tres,
Croci drachmam unam,
Caſſiæ ligneæ unciam ſemis,
Cinnamomi acuti uncias duas.

Miſce, fiat pulvis.

Digeſtionem promovet, & cum Saccharo, inſtar trageæ, ſumitur.

Doſis drachma ſemis.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

REC. Serici crudi toſti,
Spodii ex ebore,
Coralliorum alborum,
rubrorum ana unciam ſemis,
Margaritarum præparatarum unciam unam ſemis,
Radicum Doronici,

Radi-

Radicum Been albi &
rubri ana drachmas tres,
Ligni Aloës unciam ſemis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Oſſium e cordibus cervi ana drachmas tres,
Hyacynthi,
Smaragdi,
Sapphiri ana drachmam unam,
Croci ſcrupulos duos.

Fiat omnium pulvis tenerrimus, cui addantur

Foliorum Auri &
Argenti pro lubitu.

Vires ſunt roborantes, & ad febres malignas, ad palpitationem cordis, lipothymias, a terrore excitatas, commendantur.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.

SPECIES DIACRETÆ MYNSICHTI.

REC. Cretæ albæ, aqua Roſarum præparatæ, unciam unam ſemis,
Nucum moſchatarum drachmas ſex,
Glycyrrhizæ,
Seminis cydoniorum ana unciam ſemis,
Boli rubræ Orientalis præparatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Lapidum carpionum,
Macis,
Maſtiches electæ,
Croci Orientalis ana ſcrupulos quatuor,
Sacchari albiſſimi libram unam.

Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus.

Acidum in primis viis abſorbent, ad ardorem ſtomachi, quem Sodam vocant, fluxiones & diarrhœam commendantur.

Doſis drachma una ad duas.

SPECIES DIACRETÆ CAMERARII.

REC. Cretæ præparatæ Anglicæ,
Nucum moſchatarum,
Lapidum cancrorum ana unciam unam ſemis,
Liquiritiæ,
Seminis cydoniorum ana unciam unam,
Boli Armenæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana unciam ſemis,
Lapidum carpionum,
Macis,
Maſtiches electæ ana ſcrupulos octo,
Sacchari albi uncias viginti quatuor.

Miſce, fiat pulvis.

Cum præcedentibus conveniunt.

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

REC. Eboris ſpagyrice præparati unciam unam,
Margaritarum Occidentalium præparatarum drachmas ſex,
Corallii utriusque ana unciam ſemis,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Sapphiri,
Sardæ,
Granati,
Sandali albi,
citrini,
rubri ana drachmas tres,
Florum Borraginis,
Bugloſſæ,
Nympheæ ana drachmas duas,
Roſarum drachmas tres.

Miſce, fiat pulvis, addantur
Foliorum Auri nro. viginti.

Creduntur analepticæ, & tabe conſumtis,

tis, nec non sudoribus nocturnis vexatis præscribuntur.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

REC. Radicum Asari,
Spicæ Indicæ,
Cinnamomi,
Cubebarum,
Mastichis,
Croci ana drachmas sex,
Aloës Succotrinæ libram unam.

Fiat pulvis.

Sunt alvum laxantes, & ob addita aromata, ventriculum roborant.

Paratur ex his speciebus, addito mellis triplo, electuarium, quod clysteribus admiscetur. Raro interne in forma pulveris, sed in pilulari exhibentur.

Dosis grana quindecim ad scrupulum unum.

SPECIES DE HYACINTHO.

REC. Hyacinthorum præparatorum,
Boli Armenæ,
Terræ Lemniæ veræ, aut Strigensis sigillatæ,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmam unam semis,
Margaritarum occidentalium præparatarum,
Smaragdorum præparatorum ana drachmam unam,
Cornu cervi præparati,
Eboris rasuræ præparatæ,
Ossium de cordibus cervorum præparatorum,
Radicum Dictamni albi,
Tormentillæ,
Sandalorum omnium,
Rosarum rubrarum,
Granorum Kermes,
Seminum Acetosæ,
Citri decorticati,
Portulacæ,
Croci optimi,
Myrrhæ electæ ana scrupulos quatuor.

Misce, fiat pulvis.

Leniter adstringunt, ad fluxiones & hæmorrhagias nimias moderandas, pulveribus temperantibus nitrosis utiliter admiscentur.

Ex illis, cum syrupo citri, paratur confectio.

Dosis a scrupulo semis ad unum.

SPECIES DIAJALAPPÆ MYNSICHTI.

REC. Radicis Jalappæ resinosæ uncias duas semis,
Cremoris tartari scrupulos undecim,
Olei cinnamomi scrupulum unum.

Misce.

Sine molestia per inferiora purgant.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

SPECIES IMPERATORIS.

REC. Cinnamomi optimi drachmas decem,
Zinziberis,
Caryophyllorum ana unciam semis,
Galangæ,
Macis,
Nucis moschatæ ana drachmas duas.

Misce.

Ventriculum roborant, & morsulis ac trageis stomachicis adduntur; pro morsulis conficiendis incidendæ, pro trageis pulverisandæ sunt.

SPECIES DIAIREOS SIMPLICES.

REC. Ireos Florentinæ,
Sacchari candi albi,
Specierum Diatragacanthæ frigidarum ana drachmas sex.

Misce, fiat pulvis.

Serum acre ad fauces destillans demulcent, atque in tussi sicca commendantur.

Dosis drachma semis ad scrupulos duos.

SPE-

SPECIES LÆTIFICANTES RHASIS.

REC. Radicum Been albi,
rubri,
Zedoariæ,
Doronici,
Herbæ Meliſſæ,
Seminum Ocymi caryophyllati,
Pæoniæ,
Croci,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cardamomi minoris,
Cinnamomi,
Corticum citri,
Maſtiches ana unciam ſemis.

Miſce, fiat pulvis, qui completus redditur additione
Galliæ moſchatæ unciæ ſemis,
Moſchi ſcrupuli unius.

Attribuuntur vires cordiales, cephalicæ, ſtomachicæ & lætificantes.

Dantur incompletæ a drachma ſemis ad unam; completæ a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

SPECIES DIAMARGARITÆ CALIDÆ.

REC. Zinziberis drachmas quatuor,
Doronici,
Zedoariæ,
Been utriusque ana drachmas tres,
Pyrethri drachmam unam,
Seminis Apii,
Cardamomi utriusque,
Nucum moſchatarum,
Macis,
Piperis longi,
nigri ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas quinque,
Maſtiches,
Margaritarum Orientalium ana drachmas quatuor.

Miſce, fiat pulvis.

Ad ventriculi inflationes, morbos nervorum, a cauſa frigida ortos, in trageis dantur.

Doſis ſcrupulus unus ad drachmam ſemis.

SPECIES DIAMARGARITÆ FRIGIDÆ.

REC. Margaritarum Orientalium drachmas ſex,
Corallii albi,
rubri,
Florum Borraginis,
Nymphææ albæ,
Roſarum rubrarum,
Granorum Kermes,
Ligni Aloës,
Sandali albi,
citrini ana drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Sunt analepticæ, tabidis & a morbis malignis reconvaleſcentibus dantur.

Doſis ſcrupulus unus ad duos.

SPECIES DIARRHODON ABBATIS.

REC. Florum Roſarum rubrarum uncias duas,
Radicis Liquiritiæ drachmas duas,
Spicæ Indicæ,
Rhabarbari ana drachmam unam,
Sandali albi,
rubri ana unciam ſemis,
Seminum Aniſi drachmas duas,
Baſilici,
Cinnamomi,
Croci Auſtriaci,
Maſtiches,
Matris perlarum præparatæ,
Raſuræ eboris,
Cornu cervi philoſophice præparati ana drachmam unam.

Miſce, fiat pulvis.

Roborantes ſunt, concoctionem & chylificationem adjuvant; in ictero, cardialgia, & cœliaca paſſione proſunt.

Dantur a drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

SPECIES TABACI, PRO FUMO, CAMERARII.

REC. Styracis,
Mafticheſ,
Benzoës,
Succini ana unciam femis,
Olibani,
Seminis Fœniculi,
Anifi ana drachmas duas,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum ana drachmas tres,
Foliorum Tabaci uncias octo,
Majoranæ unciam unam,
Florum Calendulæ,
Cyani,
Rofarum rubrarum Damafcenarum,
Lavendulæ ana unciam femis,
Liliorum convallium drachmas duas.

Incidantur groffo modo.

Commendantur ad dentium dolores & defluxiones rhevmaticas.

Hauritur fumus fiftula.

SPECIES TABACI, PRO FUMO, OFFICINALES.

REC. Foliorum Tabaci uncias fedecim,
Majoranæ,
Bafilici ana unciam femis,
Florum Rofarum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium ana drachmas duas,
Seminis Anifi uncias quatuor,
Fœniculi unciam unam,
Styracis,
Afæ dulcis ana drachmas quinque,
Ligni Rhodii,
Sandali citrini,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cubebarum ana drachmas tres.

Incidantur & contundantur groffo modo.

Commendantur, cum præcedentibus, ad eosdem affectus.

SPECIES DIATRION SANDALON.

REC. Trium Sandalorum ana drachmas duas & fcrupulos duos,
Florum Rofarum uncias tres, drachmas tres,
Violarum unciam femis,
Rhabarbari,
Seminis Portulacæ,
Spodii ex ebore,
Succi Glycyrrhizæ ana drachmas duas,
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ ana fcrupulos quatuor.

Mifce. Cui camphora arridet, illius fcrupulum unum admifcere poterit.

Veteres perfuafi, fandala calorem hepatis præternaturalem corrigere, exhibuerunt has fpecies, febribus lentis, ictero & hydrope laborantibus, a drachma dimidia ad integram.

SPECIES DIATRAGACANTHÆ FRIGIDÆ.

REC. Gummi Tragacanthæ albæ uncias duas,
Arabici drachmas decem,
Amyli unciam femis,
Glycyrrhizæ drachmas duas.

Mifce, fiat pulvis.

Serum acre demulcent; falutariter exhibentur tuffientibus, cum calore lento exficcativo, & in diarrhœa, a fero acri orta, bonum effectum præftant.

Dofis drachma femis & ultra.

NB.

NB. Semina frigida ſunt omiſſa, quoniam brevi tempore rancore inficiunt ſpecies. Hinc conſultius eſt, ſi opus ſit ſeminibus hiſce, illa demum ſub quolibet uſu addere.

SPECIES DIATURBITH, CUM RHABARBARO.

REC. Rhabarbari,
Turbith ana unciam unam,
Hermodactylorum unciam ſemis,
Diacrydii,
Cremoris Tartari,
Seminis Violarum ana drachmas duas,
Olei Cinnamomi guttas quinque.

Miſce, fiat pulvis.

Serum & bilem educunt, arthriticis & hydropicis conveniunt, lumbricos expellunt.

Doſis ſcrupulus unus ad ſcrupulos duos.

SPECIES DECOCTI ANTI-NEPHRITICI, ſive NEPHROCATHARCTICUM FORESTI.

REC. Radicum Liquiritiæ unciam unam ſemis,
Petroſelini,
Fœniculi ana uncias duas,
Ireos Florentinæ unciam unam ſemis,
Florum Malvæ,
Altheæ ana drachmas ſex,
Seminum Fœniculi,
Saxifragiæ ana drachmas ſex,
Cicerum rubrorum confractorum uncias ſex.
Jujubarum,
Caricarum ana numero triginta,
Hordei mundati & prius loti uncias tres.

Inciſa & contuſa craſſiuſcule ſerventur ad uſum.

In nephritide, ad urinæ ardorem mitigandum & calculum pellendum, utiliter decoctum adhibetur.

Ad libram unam aquæ, ſpecierum uncia una ſemis requiritur.

SPECIES PRO DECOCTO AVENÆ, ſive BROMIO.

REC. Avenæ albæ electæ, ſæpius lotæ & iterum ſiccatæ, uncias ſex,
Ligni Sandali rubri unciam unam,
Radicum Cichorii ſylveſtris unciam ſemis,

Miſce.

Paratur ex his ſpeciebus celeberrimum illud decoctum Lowerianum: præſcriptam quantitatem in
Aquæ fontanæ libris duodecim,
ad tertiæ partis conſumtionem coquendo, & poſt repetitam colaturam,
Nitri antimoniati unciam dimidiam,
Sacchari uncias duas
addendo.

Commendatur ad defluxiones acres, ſalinas, ſcorbutum, arthritidem, hypochondriacum malum, nephritidem, hecticam; humorum acrimoniam demulcet, humectat, & partes nimium conſtrictas relaxat.

Doſis unciæ ſex, vel octo, quotidie, frigide vel calide, mane & veſperi hauſtæ, uſu per aliquot ſeptimanas continuato.

SPECIES DECOCTI CARMINATIVI.

REC. Seminum Aniſi,
Dauci,
Cumini,
Carvi,
Fœniculi ana uncias duas,
Gly-

Glycyrrhizæ,
Florum Chamæmeli vulgaris ana drachmas ſex,
Paſſularum uncias ſex.

Inciſa miſceantur.

Decocti uſus eſt in clyſteribus, tormina a flatibus orta mitigat, alvum aperit, & flatus educit; prodeſt etiam, cum decocto ſpecierum emollientium, nephriticis.

Pro adulto ſpecierum unciæ duæ, in aquæ unciis quindecim coquuntur, ad libræ remanentiam, pro clyſmate.

SPECIES CEPHALICÆ, PRO CUCUPHIS.

REC. Radicum Cyperi rotundi,
Iridis Florentinæ ana unciam ſemis,
Florum Lavendulæ,
Roriſmarini,
Roſarum ana drachmas ſex,
Ligni Rhodii,
Sandali citrini,
Aloës ana unciam ſemis,
Caryophyllorum aromaticorum,
Cinnamomi,
Nucis moſchatæ,
Succini citrini,
Styracis ana drachmas tres.

Miſce.

Inciſa & contuſa groſſo modo ſerventur, quibus pro lubitu addi poteſt una aut altera gutta
Olei ligni Rhodii,
Lavendulæ,
Majoranæ.

Uſum docet titulus. Vires ſunt cephalicæ, nervinæ, roborantes.

SPECIES CEPHALICÆ, PRO EPITHEMATE.

REC. Herbar. & ſummitat. Betonicæ,
Hyſſopi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Origani,
Herbar. & ſummitat. Roriſmarini,
Rutæ,
Salviæ,
Serpilli,
Florum Chamomillæ,
Meliloti,
Roſarum,
Sambuci,
Foliorum Lauri ana unciam unam,
Salis Ammoniaci unciam ſemis.

Inciſa reponuntur.

A chirurgis pro fomentatione, in capitis & aliarum partium contuſione, expetuntur.

Applicantur in ſacculis vel epithematibus, cum vino calido.

SPECIES EMOLLIENTES.

REC. Radicum Altheæ uncias quatuor,
Herbarum quinque emollientium ana uncias duas,
Florum Chamomillæ vulgaris uncias tres.

Inciſa & contuſa miſceantur.

Inſerviunt pro clyſteribus, emolliunt alvum, & leniunt dolores, a materia acri in inteſtinis hærente profectos.

Coquitur uncia una & dimidia in aquæ libra una ſemis, ut reſtet libra una, pro clyſmate, adulto una vice injiciendo.

In pulverem tritæ, etiam cataplaſmati conficiendo aptæ ſunt.

SPECIES PRO EPITHEMATE CORDIS ET PULSUUM.

REC. Herbarum Roriſmarini,
Majoranæ,
Meliſſæ,
Florum Cheiri,
Tunicæ ana unciam ſemis,
Lavendulæ,
Roſarum ana drachmas ſex,
Macis,
Nucis moſchatæ,
Ligni Aloës,

Ligni Rhodii ana drachmas ſex,
Cinnamomi drachmas ſex,
Corticum Citri,
Aurantiorum ana drachmas tres.

Inciſa & contuſa groſſo modo miſce.

Uſus ex nomine patet; applicantur in ſacculis, aqua carbunculi vel aceto madefactæ.

SPECIES DECOCTI FLORUM ET FRUCTUUM.

REC. Radicum Liquiritiæ uncias duas,
Herbarum Capillorum Veneris,
Endiviæ ana drachmas duas,
Florum Borraginis,
Bugloſſi,
Violarum,
Roſarum ana drachmam unam,
Lupuli drachmas duas,
Jujubarum,
Siliquarum dulcium,
Prunorum Damaſcenorum ana uncias duas,
Tamarindorum unciam unam.

Incidantur groſſo modo & miſceantur.

Sunt pectorales, & pro decocto ordinario inſervire poſſunt.

Sumitur ſpecierum uncia una, pro decocti libra una. Pro decocto dilutiore vero requiruntur ad libras quatuor aquæ, ſpecierum unciæ duæ, ad conſumtionem quartæ partis.

SPECIES PRO DECOCTO AD GANGRÆNAM.

REC. Herbæ Millefolii,
Abſinthii ana drachmas ſex,
Scordii,
Salviæ,
Hyſſopi,
Rutæ,
Florum Sambuci,
Hyperici ana unciam ſemis,
Roſarum unciam unam,
Myrrhæ drachmas ſex,
Aloës,
Aſæ fœtidæ ana unciam ſemis,
Lithargyrii uncias ſex.

Inciſa & contuſa ſerventur.

Non ſolum in gangræna & ſphacelo nondum confirmato, ſed etiam in inflammationibus, a contuſionibus vel alia violenta cauſa ortis, & gangrænam minantibus, bono cum ſucceſſu adhibetur decoctum harum ſpecierum, cum
Aquæ calcis vivæ libris quinque, &
Aceti vini libris duabus
paratum, atque linteis quadruplicatis, ſingulis duabus vel tribus horis, calide applicatum. Addi poſſunt, ante applicationem,
Spiritus vini camphorati unciæ quatuor, vel ſex.

SPECIES DECOCTI PRO GARGARISMATE ADSTRINGENTE.

REC. Herbarum Plantaginis,
Prunellæ ana uncias quatuor,
Salviæ nobilis uncias duas,
Florum Roſarum rubrarum,
Liguſtri,
Balauſtiorum ana unciam unam.

Inciſa miſceantur.

Virtutes ex nomine patent.

SPECIES DECOCTI PRO GARGARISMATE EMOLLIENTE.

REC. Radicum Altheæ,
Herbæ Malvæ,
Florum Papaveris erratici,
Malvæ arboreæ,
Sambuci ana unciam unam ſemis,
Seminis Pſyllii unciam ſemis,

Caricarum pinguium uncias duas.

Incisa & contusa grosso modo serventur.

Usum titulus docet.

SPECIES DECOCTI LIGNORUM.

REC. Ligni Guajaci libram unam semis,
Sassafras uncias sex,
Juniperini,
Radicum Sarsaparillæ uncias quatuor,
Chinæ ana uncias duas,
Liquiritiæ unciam unam semis,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana unciam semis.

Incisa & contusa serventur.

Ad luem veneream, scabiem, aliosque lymphæ morbos conducit.

Dosis est diversa, pro diversitate morborum.

SPECIES DECOCTI NIGRI.

REC. Radicum Tormentillæ unciam unam semis,
Herbarum Sabinæ,
Rutæ hortensis,
Scordii,
Salviæ,
Absinthii,
Foliorum Quercus ana drachmas sex,
Corticum Granatorum,
Gallarum Turcicarum ana uncias duas semis,
Aluminis crudi uncias quatuor,
Vitrioli viridis uncias duas,
Viridis æris,
Tartari rubri crudi ana unciam unam.

Misce, incisa & contusa serventur.

Sumuntur harum specierum, ad libram unam aquæ fontanæ & libram vini, unciæ sex; decocto, pro intentione chirurgi & circumstantia morbi, spiritus vini additur.

Usus externus ad ulcera desiccanda inveterata, utplurimum autem ad profundas inflammationes, & gangrænam.

SPECIES DECOCTI PECTORALIS.

REC. Passularum minorum mundatarum unciam unam,
Siliquæ dulcis,
Jujubarum ana drachmas sex,
Dactylorum uncias duas,
Caricarum pinguium,
Hordei mundi ana unciam unam,
Glycyrrhizæ,
Capillorum Veneris ana unciam semis,
Hyssopi drachmas duas.

Incidantur & misceantur.

Decoctum pectorale, lenta, molli, blandaque dulcedine dotatum, partim serum incrassando, acre corrigendo, partim phlegma pulmonibus impactum maturando, bronchia & tracheam demulcendo, humectando, & lubricando, egregie tussientibus convenit; sic etiam in pleuritide, nephritide & variolis, cum fructu adhibetur.

Ad libras duas aquæ fontanæ, specierum uncia una semis additur, & ad quartæ partis consumtionem coquitur.

SPECIES DECOCTI PRO POTU INFANTUM.

REC. Rasuræ Cornu cervi libras duas,
Eboris libram semis,
Radicum Liquiritiæ libram semis,
Polypodii libram semis,
Caricarum pinguium,
Siliquæ dulcis ana libram unam,
Seminum Fœniculi,
Anisi ana libram semis,

Florum

Florum Tiliæ uncias quatuor,
Cornu cervi uſti libram unam.

Miſce, incidantur.

Uſus cognoſcitur e titulo. Inſervit ſcilicet decoctum harum ſpecierum pro potu ordinario infantum.

Sumitur uncia una ad libras quatuor vel quinque aquæ fontanæ, & poſt unam aut alteram ebullitionem, colatur.

SPECIES PRO DECOCTO VULNERARIO.

REC. Radicum Enulæ,
Symphyti majoris,
Tormentillæ,
Hirundinariæ ana unciam ſemis,
Liquiritiæ drachmas ſex,
Herbarum Alchimillæ,
Saniculæ,
Plantaginis,
Auriculæ muris,
Hyperici,
Agrimoniæ,
Pimpinellæ,
Bugulæ,
Virgæ aureæ,
Florum Bellidis ana unciam ſemis,
Seminis Fœniculi drachmas ſex.

Inciſa ſerventur.

Sumuntur loco infuſi Theæ, in vulneribus tam internis, quam externis.

SPECIFICUM ANTATROPHUM WEPFERI.

REC. Sacchari candi albi uncias quatuor,
Fuliginis e camino ſplendentis unciam unam,
Radicum Ireos Florentinæ unciam ſemis,
Radicum Ari præparatarum,
Diaphoretici Jovialis,
Martialis,
Lapidum cancrorum præparatorum ana drachmas duas.

Miſce, fiat pulvis.

Commendatur ad atrophiam & rhachitidem, tam puerorum, quam adultorum; acidum inprimis abſorbet, obſtructiones reſerat, atque alvum apertam ſervat.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam unam.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE CROLLII.

REC. Teſtarum concharum oblongarum acuminatarum, quæ in ſtagnis aut lacubus repeřiuntur, quantum placet.

Macerentur in aceto forti, ut ab impuritatibus mundari queant, quas, aqua fontana lotas & rurſus exſiccatas, in pulverem ſubtiliſſimum redige.

Crollius conchas calcinare & ita in veram calcem redigere jubet.

Acidum in primis viis potenter abſorbet, ſudorem & urinam movet; calcinatas vero conchas, in majori doſi exhibitas, cardialgiam nonnunquam excitaſſe compertum eſt.

Datur a ſcrupulo uno ad drachmam dimidiam, ante febrium intermittentium paroxyſmum.

SPECIFICUM CEPHALICUM MICHAELIS.

REC. Cinnabaris nativæ ſublimatæ uncias tres,
Radicis Pæoniæ unciam unam ſemis,
Cranii humani,
Ungularum Alcis,
Cornu Cervi ſine igne præparati,
Smaragdi præparati,
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Margaritarum Occidentalium præparatarum,
Unicornu marini,

Succini præparati ana drachmam ſemis.

Miſce, fiat longa trituratione pulvis ſubtiliſſimus.

Eſt medicamentum longo uſu comprobatum, antiſpaſmodicum & antepilepticum. Commendatur in cephalalgia, hemicrania, epilepſia, aliisque nervorum affectibus.

Doſis a granis decem ad viginti quatuor. Dimidiam partem cinnabaris conſtituit.

SPECIFICUM FEBRIFUGUM CRAANII.

Videatur REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

SPECIFICUM JALAPPINUM.

REC. Magiſterii Jalappæ,
Scammonii ana drachmas tres,
Pulveris Jalappæ unciam unam ſemis,
Cremoris Tartari,
Tartari vitriolati ana unciam unam,
Olei Cinnamomi ſcrupulum unum.

Magiſteria optime cum
Amygdalarum dulcium drachmis duabus,
terantur, quibus additur pulvis jalappæ, ſalia, & tandem oleum Cinnamomi.

Purgat ſatis commode.

Doſis a ſcrupulo ſemis ad ſcrupulum unum, usque ad drachmam ſemis. Drachma una continet grana quinque Magiſterii Jalappæ & totidem Scammonii.

SPECIFICUM TARTARI PHARYNGICUM ZOBELII.

REC. Acidi ſive cryſtallorum Tartari uncias quatuor,
Aluminis crudi,
Nitri cryſtalliſati ana uncias tres,
Aceti vini deſtillati libras quatuor.

Solvantur & rurſus coagulentur.

Magnis laudibus ab Auctore pro more ſuo evehitur, præſertim vero ad affectus pharyngis, anginam, uvulæ & gingivarum laxitatem commendatur.

Præſcribit unciam ſemis, in Aquæ Plantaginis vel Brunellæ unciis octo ſolutam, pro gargarizatione, & collutione faucium & oris.

SPERNIOLA CROLLII.

REC. Myrrhæ electæ,
Olibani electi ana uncias duas,
Croci optimi unciam ſemis.

Miſceantur, fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui in patina vitrea aqua ſpermatis ranarum, per ſaccum deſtillata, vicies & tricies irroretur & exſiccetur, tandem addantur
Camphoræ drachmæ tres,
& exacte mixta aſſerventur.

Uſus eſt externus, ad hæmorrhagias & inflammationes compeſcendas.

Commendatur etiam ad vulnera a morſu canis rabidi.

SPIRITUS ÆRUGINIS
ſive
VIRIDIS ÆRIS ET VENERIS.

REC. Æruginis, ſive viridis æris libram unam.

In pulverem trita immittatur retortæ vitreæ, inſtituatur deſtillatio ex arena, per gradus, in fine ad incandeſcentiam retortæ usque ignem augendo. Prodit liquor acidus, haud ingrati ſaporis; rectificetur per retortam, & ſervetur.

A venere nihil participat, ſed eſt acetum deſtillatum concentratum; interne ad excitandum appetitum & bilem frænandam, ſitimque mitigandam, a guttis octo ad quindecim, in vehiculo aquoſo datur.

Uſibus autem plurimum chemicis inſervit, & idoneum præbet menſtruum, ad ſolvenda corpora terrea, & extrahendas tincturas.

Nota: Majorem quantitatem purioris ſpiritus, Ærugo in aceto deſtillato ſoluta, & rurſus leni igne coagulata largitur.

SPIRITUS ANGELICÆ.

REC. Radicum Angelicæ uncias quatuor,
Spiritus vini rectificati libras duas,
Aquæ fontanæ libram unam.
Deſtillentur.

Alexipharmacus eſt, & carminativus habetur, & ad drachmam unam, quin duas commendatur.

SPIRITUS ANISI.

REC. Seminis Aniſi contuſi libram ſemis,
Spiritus vini libras quatuor & ſemis.
Macerentur per octiduum, & lege artis ſpiritus eliciatur.

Eſt pectoralis & carminativus; aqua & ſaccharo temperatus bibitur.

SPIRITUS ANTHOS.

REC. Florum Rorismarini recens collectorum uncias ſex.
Macerentur & deſtillentur cum Spiritus vini rectificati libris duabus.

Eſt cephalicus & nervinus; interne raro, externe ſæpius ad odoratum exhibetur.

SPIRITUS APERITIVUS PENOTI.

REC. Vitrioli Hungarici, ad albedinem calcinati, libras quatuor,
Tartari albi, ſolutione ex cryſtalliſatione depurati, libram unam ſemis.
Pulveriſata & mixta cellæ humidæ exponantur, ut paululum deliqueſcant, tum igne arenæ e retorta deſtillentur, & ſpiritus ſervetur.

Eſt Spiritus Tartari vitriolatus; laudatur ad obſtructiones hepatis, lienis, & meſenterii reſerendas. Sudoriferum & diureticum præbet.

Doſis eſt ſcrupulus unus ad drachmam ſemis, in vehiculo aquoſo.

SPIRITUS BALSAMICUS vel BALSAMUM VITÆ ALBUM.

REC. Olibani,
Myrrhæ,
Galbani ana uncias tres,
Ligni Aloës,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Nucum moſchatarum,
Galangæ,
Zedoariæ,
Zinziberis ana unciam unam,
Baccarum lauri uncias quatuor,
Terebinthinæ Venetæ uncias duodecim,
Spiritus vini rectificati libras duodecim.
M. deſtillentur poſt ſufficientem digeſtionem ex Balneo.

Æquiparatur balſamo illi celebri Auguſtanorum. Vires ſunt ſtomachicæ, diureticæ, carminativæ, nervinæ. Tam externe quam interne adhibetur.

Doſis guttæ quadraginta ad ſexaginta.

SPIRITUS BALSAMI PERUVIANI.

REC. Balſami Peruviani nigri uncias tres,
Salis Tartari ſicciſſimi unciam unam.
Terantur ſimul, & probe mixtis ſuperaffundantur
Spiritus vini rectificatiſſimi unciæ quindecim;
Poſt digeſtionem per triduum, deſtillentur lento igne, e balneo, & ſpiritus prolectus fragrantiſſimus ſervetur.

Virtute gaudet analeptica & roborante; ſudorem & urinam movet.

Tranſit, cum Julepo roſato mixtus, in ſyrupum balſamicum, ſi nimirum ſcrupulus unus ſpiritus hujus addatur unciæ uni julepi.

SPIRITUS BEZOARDICUS BUSSII.

REC. Spiritus cornu cervi volatilis, vel eboris uncias duas,
Salis Ammoniaci uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum uncias duodecim,
Succini flavi pulverisati uncias sex,
Olei de Cedro drachmas duas.

Misceatur Sal Ammoniacum cum succino & oleo, quibus adde Cineres clavellatos, in libra una aquæ fontanæ solutos,
Spiritus vini rectificati libras tres,
his adjunge Spiritum cornu cervi, & per ignem arenæ, e cucurbita luto probe munita, destilla.

Potenter sudorem atque urinam movet, antispasmodica virtute pollet, & sicut reliqua alcalina, acidum infringit.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

REC. Radicum Angelicæ drachmam unam,
Imperatoriæ,
Galangæ ana drachmam unam semis,
Foliorum Rorismarini,
Majoranæ,
Rutæ hortensis,
Basilici,
Summitatum Centaurii minoris ana drachmas duas,
Baccarum Lauri drachmas tres,
Seminum Angelicæ,
Levistici,
Anisi ana unciam semis,
Zinziberis,
Nucum moschatarum,
Macis ana drachmam unam semis,
Cinnamomi drachmas sex,
Caryophyllorum,
Corticum Aurantiorum ana drachmam unam.

Concisis & contusis affunde
Vini albi generosi libras quatuor,
Spiritus vini rectificati libram unam.

Digerantur per biduum in Mariæ balneo, hinc destillentur ad dimidias, & spiritus egressus servetur.

Commendatur ab auctore ad nauseam, vomitus & ructationes, cum Aqua Menthæ, vel Fœniculi & Sacchari mixtus, cachecticis adhibetur.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

REC. Nitri crudi crystallini,
Tartari albi puri ana libras duas.

Misce, & per retortam tubulatam in adaptatum magnum recipientem, cui spiritus vini rectificati libræ duæ antea infusæ fuerunt, destilla; hac tamen cautione: ut nunquam ultra drachmæ duæ, vel tres, una vice injiciantur per tubulum, hocque non nisi finita detonatione, repetatur. Peracta destillatione, spiritum in recipiente collectum, & ex cucurbita vitrea humili rectificatum, serva.

Sunt, qui spiritum residuo in retorta affundere & rursus abstrahere jubent; cum vero hoc modo nihil præter spiritum vini, oleo tartari imprægnatum, producant, præstat sine ulla additione ex cucurbita humili rectificationem instituere.

Vires titulus indicat. Sunt vero non solum carminativæ, sed & antispasmodicæ, diaphoreticæ & diureticæ, atque hypochondriacis & hystericis commendari meretur.

Dosis guttæ triginta ad sexaginta usque.

SPI-

SPIRITUS CASTOREI COMPOSITUS LONDIN.

REC. Castorei unciam unam,
Florum Lavendulæ drachmas sex,
Salviæ,
Rorismarini ana drachmas tres,
Cinnamomi drachmas duas,
Macis,
Caryophyllorum ana drachmam unam,
Spiritus vini rectificati libram unam semis,
Aquæ Lavendulæ libram semis,
Salis Ammoniaci uncias duas,
Tartari, vel Cinerum clavellatorum uncias tres.

Misce, & post digestionem per triduum, destillentur, & spiritus unciæ quindecim proliciantur, quibus adde
Camphoræ drachmas duas,
Olei destillati Rutæ,
Succini ana guttas viginti.

Usus est tam internus, quam externus; naribus admovetur in affectibus hystericis.

Datur interne in motibus convulsivis, colica hysterica & torminibus, a scrupulo uno ad drachmam semis, ex Aqua melissæ, vel alio vehiculo.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

REC. Cerasorum nigrorum, maturorum, quantum vis.

Contundantur una cum nucleis, & doliolo querno, ad id accommodato satisque capaci, indita, loco tepido, pauxillo fæcum cerevisiæ addito, stent, donec fermentando acidiusculum, aut vinosum spirare cœperint odorem; tum e vesica destillentur, & spiritus inde natus rectificetur.

A nucleis vim quandam diureticam, de reliquo vix alias, quam spiritus vini, virtutes habet.

Simili modo parantur, etiam per fermentationem,

SPIRITUS CYDONIORUM, EBULI, SAMBUCI,

& aliorum fructuum.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

REC. Herbæ Cochleariæ florentis libras sex,
Contunde, ac vesicæ immissæ, affunde
Spiritus vini non rectificati libras quatuor,
Aquæ fontanæ libram unam.

Juncturis probe clausis ac munitis, destilla igne moderato spiritum, quem, recenti herbæ rursus affusum, iterum destilla, rectifica, ac in vitro probe obturato serva.

Magnæ efficaciæ est adversus scorbutum; pollet etiam virtute carminativa & diuretica, atque ad ulcera oris & gingivas exulceratas, melle rosato mixtus convenit.

Datur interne a drachma semis ad unam, aqua dilutus.

Per fermentationem quoque paratur, minoris vero efficaciæ ac gratiæ.

SPIRITUS CORNU CERVI.

Uno eodemque labore, quo sal volatile cornu cervi, obtinetur, & ab oleo empyrevmatico separari & rectificari debet.

Est antispasmodicum longo usu probatum, aperitivum, diaphoreticum ac diureticum.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis usque.

SPIRITUS CORNU CERVI AD USUS EXTERNOS.

REC. Olei cornu cervi fœtidi unciam unam,
Cinerum clavellatorum uncias duas.

Misceantur & affundantur.

Spiritus vini non rectificati libræ octo,

destilletur spiritus ex cucurbita vitrea ad dimidias, & servetur in vase probe clauso.

Usus, uti ex titulo patet, est externus ad membra paralytica. Interne sumtus, sudorem & urinam movet; verum, ob oleum empyrevmaticum sanguinem exæstuat: hinc parciori dosi, i. e. ad guttas triginta vel quadraginta exhibendus.

Qui ex sale volatili C. C. mediante spiritu vini rectificato, oleum extrahunt, ut salem puriorem habeant, eodem labore spiritum, oleo cornu cervi impraegnatum, nanciscuntur, qui addita salis alcali portione rectificari potest.

SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.

REC. Corticum Aurantiorum recentium libram unam semis,

Spiritus vini rectificati libras octo,

Aquæ fontanæ libras duas.

Destillentur e vesica, lento igne, & spiritus vini libræ octo prolicientur, qui, aqua fontana dilutus & saccharo edulcoratus, servetur.

Ad ventriculum confortandum, & flatus pellendos, sumitur. Non dilutus nec edulcoratus inservit pro menstruo Tincturæ corticum aurantiorum.

SPIRITUS CORTICUM CITRI.

Ad normam spiritus corticum Aurantiorum, superius modo descripti, conficitur.

Easdem virtutes habet, & menstruum præbet, pro essentia carminativa.

SPIRITUS CROCI.

REC. Croci Orientalis uncias duas,

Spiritus vini rectificati libras duas,

Aquæ fontanæ libram semis.

Misceantur & stent per aliquot dies in digestione, postea destillentur, leni igne, e cucurbita vitrea, atque spiritus unciæ viginti eliciantur.

Raro in usum venit, nisi ad Elixir croci anticolicum parandnm. Externe, cum aliis spirituosis applicatus, virtute paregorica se commendat.

SPIRITUS FORMICARUM.

REC. Formicarum, mensibus Junio vel Julio captarum, libram unam,

Spiritus vini rectificati libras duas.

Misce. Destillentur ex Mariæ balneo ad siccitatem.

Adscribuntur virtutes aphrodisiacæ, antapoplecticæ, analepticæ & diureticæ. Interne ad drachmam unam, usque ad duas exhibetur. Externe commendatur ad rhevmaticos & arthriticos dolores; paralyticis membris conducit.

Sunt, qui ex formicis, sine additione spiritus vini, per retortam spiritum destillant volatilem, qui tamen, præ aliis ejusmodi spiritibus empyrevmaticis, ex animalibus destillatis, vix ullam prærogativam habet. Ad externos usus ejusmodi spiritus cum spiritu vini maritantur, uti de spiritu C. C. suo loco diximus.

SPIRITUS FULIGINIS.

REC. Fuliginis nigerrimæ, compactæ & splendentis, quantum vis.

Destilletur e retorta, juncturis optime clausis, igne arenæ, initio leni, postea gradatim aucto, spiritum prolectum ab oleo separa ac rectifica.

Egregium est sudoriferum & diureticum. Laudatur etiam ab Hartmanno ad epilepsiam, morbos soporosos & hystericos.

Dosis guttæ triginta ad quinquaginta.

SPIRITUS JUNIPERI.

REC. Baccarum Juniperi conquassatarum libras quatuor,

Spiritus

Spiritus vini non dephlegmati libras octo.

Destillentur ad dimidias.

Remedium est carminativum, diureticum & sudoriferum; usus est tam internus, quam externus, in affectibus colicis & rhevmaticis.

SPIRITUS LAVENDULÆ.

REC. Florum Lavendulæ libram unam,
Spiritus vini non rectificati libras quatuor.

Digestione per triduum facta, destillentur ad dimidias.

Raro interne eo utimur; externe ad membra paralytica confortanda, sugillationes resolvendas, & ad odoratum adhibetur.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Impleatur retorta scobe ligni sancti vel Guajaci, & igne arenæ destilletur, sic prodit primo phlegma, quod sequitur spiritus, & tandem oleum nigrum empyrevmaticum.

Viribus cum spiritu fuliginis convenit, & eadem dosi datur.

SPIRITUS LILIORUM CONVALLIUM.

REC. Florum Liliorum convallium libram unam,
affunde
Vini generosi albi libras decem,
Spiritus vini rectificati libram unam semis,

Ad dimidias e cucurbita destilla, prolectam aquam spirituosam novis affunde floribus, & destilla iterum ad dimidias atque spiritum serva.

Aquarum antapoplecticarum & epilepticarum ingrediens sunt lilia convallium. Adscribitur illis vis specifica, cordialis & nervina, ac memoriam confortans. Raro tamen spiritus interne datur; externe ad convulsiones, luxationes & dolores rhevmaticos utiliter adhibetur; naribus attractus, adversus odontalgiam laudatur.

SPIRITUS LUMBRICORUM VINOSUS.

REC. Lumbricorum terrestrium vivorum libras duas;
Superfunde
Spiritus vini phlegmatici libras quinque semis.

Post digestionem per biduum, destillentur, leni igne, ad dimidias, e vesica.

Usus est externus, & ad rhevmaticos & arthriticos dolores laudatur.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

REC. Lumbricorum terrestrium exsiccatorum libras tres, vel quantum placet.

Committantur retortæ vitreæ, & ex arena, per successivos ignis gradus, destillentur; sic prodeunt spiritus, sal volatile & oleum empyrevmaticum fœtidum, quæ refrigerata separentur, & sal, ut ab oleo fœtido liberetur, ossium calcinatorum triplo vel quadruplo misceatur, & sublimetur; quæ sublimatio bis vel ter repetenda, donec satis albus & ab oleo liberatus existat; spiritus vero, ab oleo empyrevmatico, ope chartæ bibulæ madefactæ, separatus, rectificetur.

Vires habet sal volatilis & spiritus, cum spiritu & sale volatili cornu cervi communes; a nonnullis magis diuretici & antarthritici deprædicantur. Spiritus adhiberi etiam solet externe in rhevmatismis, contusionibus, luxationibus & paralysi.

Rectificatus datur interne ad guttas triginta, & sal volatile ad grana sex vel octo.

SPIRITUS MASTICHINUS.

REC. Mastiches uncias quatuor,
Cinnamomi unciam semis,
Caryophyllorum,
Nucis moschatæ ana drachmas tres,
Zinziberis,

Galangæ,
Cardamomi minoris,
Corticis Winterani ana drachmas duas.

Pulverisata infundantur in
Spiritus Vini rectificati libris decem.

Stent per aliquot dies in digestione, postea, additis
Aquæ fontanæ libris duabus,
e vesica destillentur.

Quod si
Spiritus hujus prolecti libris duabus,
Aquæ fontanæ, in qua Sacchari unciæ decem solutæ sunt, libra una
additur, nominatur

ELIXIR MASTICHINUM,
quod loco aquæ vitæ haurire solent.

In morbis ventriculi, a causa frigida ortis, colica flatulenta & ructibus, cum insigni fructu datur.

Dosis aqua diluti & edulcorati, est uncia semis ad integram.

SPIRITUS MATRICALIS.

REC. Mastiches,
Myrrhæ,
Thuris,
Succini ana unciam unam semis,
Spiritus vini rectificati libras quatuor.

Destillentur e balneo, ad siccitatem.

Ad luxationes, sugillationes, & ubi paregorica, spirituosa locum inveniunt, adhiberi potest.

SPIRITUS MELISSÆ.

Paratur, ut spiritus Lavendulæ.

Nervinus, carminativus, stomachicus & uterinus est, & pro menstruo, ad Tincturam Castorei extrahendam, inservit.

SPIRITUS MELLIS.

REC. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ libras tres.

Misceantur, & e retorta, arenæ igne, per gradus fiat destillatio. Liquor prolectus ab oleo separetur, atque rectificetur, phlegmate prius prodeunte, & dein spiritu subsequente.

Est acidus, & empyrevma olet.

Specifica huic spiritui attribuitur vis diuretica; aperitivus & diaphoreticus etiam est, quod oleo, quo imbutus, empyrevmatico tribuendum.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

SPIRITUS MENTHÆ.

Cum spiritu vini, ad normam Lavendulæ spiritus, conficitur.

Vires sunt stomachicæ, nervinæ & carminativæ.

SPIRITUS NITRI ACIDUS.

REC. Nitri purissimi libram unam,
Terræ argillaceæ, vel Boli rubræ libras sex.

Pulverisata misceantur exacte, humectentur sufficiente quantitate aquæ fontanæ, atque e massa formentur globuli parvi, qui rursus exsiccati immittantur retortæ lapideæ, aut vitreæ, probe loricatæ, & igne gradatim administrato, in receptaculum valde capax, cui libra semis aquæ simplicis antea immissa sit, destillentur, donec rubri vapores cessent. Spiritus prolectus rectificetur, atque a phlegmate separetur.

Spiritus Nitri plurimum expetitur ad chemicos usus; externe ad verrucas aliasque excrescentias præternaturales auferendas chirurgi eo utuntur.

SPIRITUS NITRI ANTICOLICUS.

REC. Spiritus Nitri acidi ordinarii libram semis,
Carminativi Sylvii libram unam,
Essentiæ carminativæ Wedelii uncias duas.

Misceantur, & post digestionem per triduum, filtrentur.

In

In colica, a flatibus orta, bonam præstat opem; vim habet carminativam & diureticam.

Dosis scrupulus unus vel drachma semis.

SPIRITUS NITRI CONCENTRATUS, sive FUMANS.

REC. Nitri cryſtallini ſicciſſimi,
Olei Vitrioli ana quantum lubet.

Immittatur Nitrum pulveriſatum, & optime exſiccatum retortæ ſatis capaci, ſiccæ, antea calefactæ; ſuperfunde Oleum vitrioli, & ſtatim igne arenæ deſtillationem inſtitue, vaſorum juncturis probe clauſis, leni igne: ita ſpiritus, ſub fumorum rubicundorum forma prodit, qui in vitro, epiſtomio vitreo clauſo, ſervandus.

Eſt acidum concentratum puriſſimum nitri; & ad ſpiritus nitri dulcis præparationem inſervit.

Curioſum eſt experimentum, quod cum oleo caryophyllorum genuino, terebinthinæ, aliisve inſtituitur; quando ſcilicet ſpiritui huic fumanti nitroſo inſtillantur guttæ aliquot prædictorum oleorum, flamma erumpit, citra acceſſum ignis elementaris, luculentiſſima.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

REC. Spiritus Nitri fumantis unciam unam ſemis,
Vini rectificatiſſimi libram unam.

Spiritus Nitri ſucceſſive inſtilletur ſpiritui vini, & poſt digeſtionem aliquot dierum, in loco frigido, lento igne e cucurbita deſtillentur.

Cum vehiculo aquoſo in colica flatulenta egregium effectum anodinum & carminativum exſerit.

Scopo diuretico etiam a guttis quadraginta ad ſexaginta, ſufficienti aqua dilutus, dari poteſt.

SPIRITUS PANIS.

REC. Panis tritici bis cocti, optime ſiccati, quantum placet.

Immittatur in fruſta confractus retortæ vitreæ, atque ex arena, leni igne per gradus aucto, deſtilletur. Spiritus, poſt deſtillationem ab oleo ſeparatus, rectificetur.

Adſcribuntur vires ſtomachicæ, & appetitum confortantes.

Inprimis vero ad Coralliorum Tincturam extrahendam adhibetur.

Doſis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.

SPIRITUS ROSARUM.

Pari ratione, ut Spiritus Liliorum convallium, deſtillatio peragitur.

SPIRITUS ROSARUM, PER FFRMENTATIONEM.

REC. Florum Roſarum, in mortario contuſorum, libras duodecim,
Sacchari libras duas,
Fermenti panis libram ſemis,
Aquæ fontanæ tepidæ libras triginta.

Stent in vaſe ligneo, donec fermentata odorem vinoſum ſpirent; deſtillentur poſtea e veſica, & ſpiritus rectificetur.

Laudantur eædem virtutes, quæ Spiritus Liliorum convallium.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

REC. Salis Ammoniaci in pulverem triti libram ſemis,
Cinerum clavellatorum libram unam,
Seminis Aniſi uncias tres,
Spiritus vini non dephlegmati libras quatuor.

Miſceantur & deſtillentur ex cucurbita vitrea, atque proliciantur liquoris oleoſi volatilis libræ duæ ſemis.

Serventur in vitro probe clauſo.

Pectoris infarctu pituitoso resolvendo, tonum pulmonum roborando, decubitum humorum prohibendo, & flatibus discutiendis, egregium est remedium.

Dosis guttæ decem ad quadraginta.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI AROMATICUS, PHARMACOP. EDINBURG.

REC. Radicum Angelicæ,
Galangæ,
Summitatum Majoranæ,
Rorismarini,
Corticum Aurantiorum,
Citri,
Cinnamomi ana drachmas sex,
Caryophyllorum,
Nucum moschatarum,
Macis ana drachmas tres,
Incisis & contusis affunde
Spiritus vini non dephlegmati libras tres.

Digerantur per triduum, postea addantur cinerum clavellatorum,
Salis Ammoniaci ana unciæ quatuor.

Destillentur leni igne ex cucurbita vitrea ad dimidias.

Vires celebrantur cephalicæ, stomachicæ, carminativæ, nervinæ. Externe etiam odoratui inservit, & spiritibus nervinis, pro frictione membrorum paralyticorum, additur.

Dosis a guttis quindecim ad quadraginta in vehiculo aquoso.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS, sive ESSENTIA SUCCINI, SPIRITU SALIS AMMONIACI EXTRACTA.

REC. Succini flavi odorati uncias duas.

Pulverisato affunde
Spiritus salis Ammoniaci vinosi uncias sex.

Digerantur in vitro probe clauso, in loco tepido, per aliquod tempus; postea clarum a spisso, per inclinationem separetur & servetur.

Nobile ac egregium est cephalicum, anticatarrhale, stomachicum, anthystericum & diureticum.

Dosis guttæ quindecim ad quadraginta.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VOLATILIS VINOSUS.

REC. Salis Ammoniaci in pulverem triti libram semis,
Cinerum clavellatorum libram unam.

Immittantur cucurbitæ vitreæ atque affundatur
Aquæ fontanæ libra semis,
Spiritus vini rectificati libra una.

Alembico superimposito, & juncturis probe lutatis, destillentur lento igne, ex arena, & spiritus volatilis prodeuntis circiter unciæ decem vel undecim colligantur.

Est sal volatile liquidum, urinosum, purissimum, & in morbis partium solidarum, ab atonia ortis, scopo tonico, bonam præstat opem, egregium est diureticum & resolvens.

Datur interne a guttis viginti ad triginta; externe ad resolvendum, cum aliis nervinis spiritibus mixtus, dolentibus partibus illinitur.

Additis oleis destillatis, varia salia volatilia, sic dicta oleosa, ex tempore parari possunt.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VOLATILIS URINOSUS.

REC. Calcis vivæ recens calcinatæ uncias duodecim,
Salis ammoniaci uncias quatuor,
Aquæ fontanæ libras duas.

Calci vivæ & sali ammoniaco, singulis seorsim in pulverem redactis, & cucurbitæ vitreæ immissis, superfundatur aqua fontana, & juncturis, imposito alembico, probe lutatis, statim leni igne instituatur destillatio, & spiritus unciæ octo proliciantur, qui in vase optime clauso servandus.

Penetrantior est illo, cum spiritu vini destillato,

stillato, & conservari vix potest. Praecellit virtute diuretica praecedentem vinosum.

Usus utplurimum est externus, ad excitandos sopore profundo sepultos; naribus epilepticorum etiam admovetur, sub ipso paroxysmo; additur spiritibus nervinis, ad membra paralytica fricanda.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

REC. Salis Absinthii uncias duas,
Spiritus Salis unciam unam.

Evaporentur mixta in vitro ad siccitatem.

Ad salium neutrorum naturam accedit, & virtutes habet diureticas resolventes.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.

REC. Salis communis decrepitati libras duas,
Terrae figulinae libras sex.

Misceantur, addita aquae sufficiente quantitate, ut globuli exinde formari possint, qui exsiccati retortae loricatae indantur, & igne gradatim adhibito, in vas recipiens amplum, destillatio instituatur, quousque nulli amplius spiritus, sub nebularum forma comparentes, egrediantur. Liquor destillatus rectificetur.

Quae de concentrato mox dicentur, hic etiam locum habent.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS CONCENTRATUS, sive GLAUBERIANUS.

REC. Salis communis libram unam; humectetur
Aquae fontanae unciis octo.

Immittatur cucurbitae vitreae, atque successive superaffundantur
Olei vitrioli unciae quatuor.

Superimposito alembico & juncturis optime clausis, leni igne arenae instituatur destillatio. Spiritus prolectus fumans, volatilis, e cucurbita rectificari potest, & in vitro, epistomio vitreo clauso, asservari.

Residuum sal, est sic dictum

SAL MIRABILE GLAUBERI.

Genuinus hic spiritus salis est, & brevi compendio paratur, acidissimi saporis est, & subtilissimus, cum ex vitro aperto omnis exhalet, & conclave vapore albo repleat.

Virtute gaudet refrigerante & diuretica; additur julapiis, appetitum excitat, cruditates biliosas praecipitat, alvum & urinam movet. Pectori inimicus est, nec etiam, ubi suspicio ulceris renum adest, adhiberi debet.

Dari potest a guttis tribus ad octo, in vehiculo aquoso copioso.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

REC. Spiritus Salis concentrati unciam unam & semis,
Vini rectificatissimi uncias duodecim.

Digerantur, postquam spiritus salis vini spiritui successive instillatus est, per aliquot dies, in vase probe clauso, & postea destillentur e cucurbita, atque aliquoties cohobentur.

Spiritus nitri & vitrioli, cum spiritu vini alembicum transcendunt, atque sic dulcificantur; spiritus salis vero cum spiritu vini quidem non evehitur, veruntamen illum notabili acido sapore inficit.

Aperitivus, stomachicus & diureticus est.

Datur a guttis triginta ad quadraginta.

SPIRITUS SAMBUCI FLORUM.

Ad normam spiritus lavendulae destillatur.

Est bezoardicae & anodynae virtutis.

Datur a drachma una ad unciam semis.

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS DRAWIZII.

REC. Vitrioli ad rubedinem calcinati libras duas,

ſuperfunde

Spiritus Tartari libram unam,
Cochleariæ uncias quatuor.

Digerantur per aliquot dies, poſtea deſtillentur e retorta, donec & ſpiritus vitrioli tranſierit. Spiritus prolectus, ſulphurei odoris & acidiuſculi ſaporis, ſervetur.

Cum Spiritu aperitivo Penoti convenit. Laudatur ab Auctore in ſcorbuto; conducit etiam in hypochondriaco malo, calculo & arthritide.

Doſis guttæ triginta ad quadraginta.

SPIRITUS SERPILLI.

Paratur ad modum ſpiritus Meliſſæ, Menthæ, &c.

Virtute gaudet diſcutiente, anodyna, & utplurimum externe in affectibus rhevmaticis & arthriticis commendatur.

SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

Funditur ſulphur citrinum, vel, ſi haberi poteſt, griſeum in olla figulina, tres pollices alta & quatuor lata; vaſculum hoc, ſulphure fuſo, ponatur ſub camino, qui fumum perfecte ſurſum dirigit, emittit. Incendatur ſulphur, atque ſtatim ſuperponatur campana magna vitrea, quæ antea ſupra vaporem aquæ calidæ fuit detenta, ut ſuperficies ejus interna ſubhumida ſit; campana vitrea formam habeat alembici, ut per ejus roſtrum ſpiritus in vas recipiens adpoſitum deſtillare poſſit, ita etiam diſponatur, ut lateribus in triangulum poſitis innitatur, & aëris tantum admittat, ut flamma non extinguatur. Tali modo, multiplicatis campanis, & novi ſulphuris repetita accenſione, colligitur liquor acidus flaveſcens. Melius ſuccedit operatio noctu & diebus frigidis, pluvioſis, quam ſereno tempore.

Nulla quidem inter ſpiritum ſulphuris & ſpiritum vitrioli eſt differentia, & plerumque ſpiritus vitrioli a deſtillatoribus pro ſulphuris ſpiritu venditur; deſtillatio per campanam etiam non ſolum tædioſa, ſed & pretioſa eſt, & magno cum ſulphuris diſpendio fit, libra integra enim vix ultra drachmas duas acidi concentrati exhibet; attamen, quia nonnulli vim quandam ſpecificam in ſpiritu ſulphuris quærunt, in eorum gratiam celeberrimus Stahlius aliam methodum faciliorem, & quæ copioſiorem ſpiritus quantitatem elargitur, tradit: jubet, eum in finem, lintea ſolutione ſaturata ſalis alcali madefieri, atque ſulphure incenſo, in vaſe ad hunc laborem adaptato, perfumare; ſic alcali acidum ſulphuris avide attrahit, & cum illo in ſal abit neutrum. Cui, mediante aqua fontana, e linteis extracto, & ad ſiccitatem fere inſpiſſato, ſuperfunditur oleum vitrioli, & per retortam, leni igne, ſpiritus volatilis ſulphuris expellitur; e reſiduo vero Tartarus vitriolatus parari poteſt.

Inſervit ſpiritus ſulphuris uſibus chemicis; additur julapiis & potionibus, ut acido imbuantur ſapore, ad ſitim & calorem nimium temperandum.

Doſis guttæ tres vel plures, pro aciditate ſpiritus.

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

REC. Tartari depurati, quantum vis.

Imple illo duas tertias retortæ, ac ex arena in recipientem ſatis capacem, probe adaptatum ac lutatum, primo moderato, poſtea gradatim aucto igne, ſpiritus omnes, una cum oleo fœtido, deſtilla; ſpiritum ab oleo, mediante charta emporetica duplicata, humectata, ſepara, ac utrumque per ſe, e cucurbita, rectifica.

Sal Tartari in reſiduo calcinato quære, &, ut artis eſt, ſolvendo elue, coagula & depura.

Multi

Multi rectificationem ſpiritus Tartari diſſuadent; quod vi ſua ex parte privetur; ſi vero oleum charta emporetica ab illo ſeparatur, & ſpiritus e retorta ad ſiccitatem abſtrahitur, fœtorem non ſolum deponit, absque ulla virium ſuarum jactura, ſed & penetrantior evadit.

Incidit, attenuat, reſolvit, ſudorem atque urinam movet, in colica, menſibus retentis, paralyſi, ictero, & hydrope conducit.

Doſis a ſcrupulo uno ad duos.

OLEUM TARTARI FOETIDUM, *quod ſimul acquiritur, raro, ob fœtorem, in uſum vocatur; potens tamen eſt reſolvens, unguentis ad ſcabiem addi poteſt, mulieribus hyſtericis pro odoratu convenit.*

SPIRITUS TARTARI VOLATILIS.

Videatur SAL VOLATILE TARTARI.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

REC. Terebinthinæ claræ libras duodecim.

Affuſis, in veſica cuprea,
Aquæ fontanæ libris quadraginta octo,
deſtillentur; ſic prodit, una cum aqua, oleum æthereum Terebinthinæ clarum, quod ab aqua ſeparandum, & propter ſubtilitatem, Spiritus Terebinthinæ vocatur.

Reſiduum in veſicam exhibet
TEREBINTHINAM COCTAM:
Vel ulteriori coctione, absque aqua, lento igne inſtituta, brunnum colorem induit, & tunc
COLOPHONIUM
nuncupari ſolet.

Interne in gonorrhœa & ſcopo diuretico, ad paucas guttas, quinque vel duodecim, datur; externe ad puncturas nervorum, tendinum, vulnera, & hæmorrhagias ſiſtendas, calide applicatur.

SPIRITUS THERIACALIS.

REC. Radicum Angelicæ,
Imperatoriæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Zedoariæ ana unciam unam,
Herbæ Scordii uncias duas,
Corticum Citri,
Baccarum juniperi,
Myrrhæ rubræ ana unciam unam,
Croci Orientalis unciam ſemis,
Theriacæ Andromachi libram ſemis,
Spiritus vini ſimplicis libras ſeptem.

Radices, herba & reliqua, pulveriſata ſpiritu vini infuſa, digerantur Theriaca, & lento igne libræ quatuor ſpiritus abſtrahantur.

Cui, pro lubitu, ad unciam unam, camphoræ ſcrupulus unus additur, & tunc vocatur

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

Eſt alexipharmacus, ſudorifer & anodinus.

Datur a guttis triginta ad ſeptuaginta quinque.

Ingreditur mixturam ſimplicem. Externe, ob pretium, raro adhibetur, cum ſpiritus vini camphoratus eadem præſtet.

SPIRITUS TRIFOLII FIBRINI.

Eodem modo parari poteſt, quo ſpiritus cochleariæ evocatus fuit.

Eſt antiſcorbuticus, & pro conficienda eſſentia ſervatur.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

REC. Spiritus vini optime rectificati libram unam,
Camphoræ drachmas ſex.

Stent in digeſtione, paucarum horarum ſpatio, atque ſic a ſoluta camphora ſpiritum vini imprægnatum habebis.

Usus est externus, roborat, congestiones dolorificas dissipat, & in affectibus spasticis bonum edit effectum. Quibus cautionibus vero in ambustione, erysipelate & lymphæ congestionibus adhiberi debeat, nimis longum foret, hic commemorare; igitur lectorem ad practicos ablegamus.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

E vesica cuprea, per alembicum stanneum, destillatur, & a phlegmate fœtido separatur; & si delicatior, atque ab omni fœtore liber expetitur, denuo bis vel ter, addita tertia parte aquæ fontanæ, destillatio repetenda.

Spiritus vini rectificatus ad ambusta, sugillationes, luxationes, & ad hæmorrhagias externe adhibetur; inprimis inservit ad essentias & tincturas parandas.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

REC. Spiritus vini optime rectificati libras duas,
Salis Tartari probe depurati & siccati uncias quatuor.

Misce, & e cucurbita vitrea, junцturis exacte munitis, igne arenæ moderato destilla.

Inservit extrahendis resinosis, Succini & Ambræ essentiis, nec non aliis usibus chemicis & pharmacevticis.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Eadem methodo, qua spiritus salis coagulatus, paratur; loco spiritus salis, spiritum Vitrioli sumendo.

Cum tartaro vitriolato convenit, & virtutes habet aperientes, resolventes, incidentes atque diureticas.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Videatur LIQUOR ANODINUS.

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

REC. Aquam a præcipitatione & edulcoratione Mercurii vitæ, bibula colatam; infunde retortæ vitreæ, ac calore lenissimo, primum phlegma omne superfluum evapora, donec gustu perceperis spiritum satis acrem, linguam tentantem; tunc admoto ac adaptato recipiente, & lutatis juncturis, igne pedetentim aucto, omnem spiritum, ad siccitatem usque, evoca.

Nihil minus, quam vitrioli spiritus est; potius spiritus salis communis vocandus esset: omnes enim ejus qualitates habet, & a sale communi, quod in Mercurii sublimati præparatione adhibitum fuit, ortum habet.

SPIRITUS VITRIOLI SIMPLEX.

Destillatur e vitriolo, ad albedinem calcinato, per retortam vitream loricatam, recipiente capacissimo munitam, cui aquæ quarta pars, respectu ponderis vitrioli, ad hoc opus assumti, insit, igne aperto primum leni, tum aucto gradatim ac successive igne ad candescentiam usque retortæ, donec omnes nebulæ simulque spiritus cessant. Tum recipientem caute separa, ocyssime obtura; spiritus prolectos, e retorta vitrea, arenæ igne rectifica.

Cum spiritu sulphuris convenit, & iisdem usibus destinatur.

SPIRITUS URINÆ.

Videatur SAL VOLATILE URINÆ, ubi simul modus, spiritum destillandi, docetur.

Usibus nonnullis chemicis inservit; in medicina easdem virtutes, quas Spiritus cornu cervi, habet.

Dosis guttæ viginti quinque ad quinquaginta.

SPONGIARUM TOSTIO.

Fragmenta spongiarum in figulino vase, operculo tecto, igne aperto

to torrentur, atque tosta in pulverem teruntur.

Expetuntur inprimis ad pulveres strumales; solæ raro vel nunquam dantur, nisi forsan ad urinam ciendam adhibere velimus.

SUCCINUM PRÆPARATUM.

Succinum in subtilissimum teratur pulverem, atque, addita aqua fontana, super marmore, sicut reliqua præparata, lævigetur.

Leniter adstringit & calefacit; ad capitis & uteri affectus, catarrhos, & mensium vitia commendatur.

Dosis scrupulus unus ad duos.

SUCCUS ACETOSELLÆ,
BERBERUM,
CITRI,
CYDONIORUM,
MORORUM,
RUBI IDÆI, &

alii defæcati, in vitro, collo angustiori prædito, superaffuso oleo, in loco frigido asservantur.

Pro syrupis parandis asservari solent.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

Scoriæ Reguli Antimonii simplicis, vel residuum a tinctura Antimonii, affusa aquæ simplicis fontanæ aut pluviæ ea quantitate, quæ sufficere videtur, solvantur, & solutio per chartam emporeticam percoletur. Filtratæ huic solutioni seu lixivio in vitro, aut olla munda debite vitreata, inspergatur acetum vini, unde præcipitabitur ingens sulphuris quantitas, quæ, ope chartæ bibulæ, a lixivio separetur. Huic liquori vel lixivio denuo acetum inspergatur, & demittetur inde alius pulvis, aurantii coloris, quem, a lixivio separatum, seorsim serva. Denique eidem lixivio iterum novum & multum acetum adde, & præcipitabitur pulvis levissimus, aurantio - pallidi coloris, qui edulcorandus, & sub inscriptione SULPHURIS ANTIMONII TERTIÆ PRÆCIPITATIONIS, servandus.

Primæ præcipitationis sulphur vim plerumque habet emeticam, & hinc rarus ejus usus est.

Secundæ præcipitationis autem adultioribus.

Tertiæ vero etiam teneræ ætati præberi potest.

Insignes sunt vires hujus sulphuris aurati, bene præparati, ad contumaces & chronicas affectiones, præsertim quæ ex stagnatione & corruptione lymphæ proveniunt; ad pertinaces nimirum glandularum rebelles tumores, ulcera inveterata, aliosque cutaneos morbos, interposito decocto diluente & sanguinem depurante; ad asthma porro convulsivum, catarrhos suffocativos, hemicraniam, febres intermittentes pertinaces, scabiem malignam, quin & prava ex lue venerea incommoda hoc pharmaco profligata esse, celeberrimus Hoffmannus perhibet.

Augentur vires, si cum Mercurio dulci administratur; requiritur vero continuatus usus, etiam si primis diebus nauseam excitasse observatum sit, tamen diebus subsequis nullam amplius stomacho molestiam facessit.

Dosis in tenera ætate, sulphuris tertiæ præcipitationis, granum unum, duo, ad tria, in adultioribus ad grana sex, vel scrupulum semis evehi potest.

SUPPOSITORIUM COMPOSITUM.

REC. Specierum Hieræ picræ unciam semis,
Salis Gemmæ scrupulum unum,
Mellis ad spissitudinem cocti uncias duas.

Misce, & fiant suppositoria, variæ magnitudinis.

SYRUPUS DE ABSINTHIO COMPOSITUS.

REC. Absinthii pontici sicci libram semis,

Florum Rosarum rubrarum uncias duas,
Nardi Indicæ drachmas tres.
Infundantur incisa in
Vini albi &
Succi cydoniorum ana unciis octo;
Digerantur in loco calido per biduum, postea exprimantur;
Colaturæ unciis decem adde
Sacchari albi uncias sedecim.
Fiat syrupus, per pannum colandus.
Ventriculi & aliorum viscerum, a causa frigida ortis vitiis auxiliatur; cachecticis prodest, appetitum restaurat, flatus discutit, ictericis convenit.
Datur in potionibus & electuariis.

SYRUPUS ACACIARUM FLORUM.

REC. Florum Acaciarum recentium libras duas.
Infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis libris duabus;
Stent in digestione per noctem, in vase figulino vitreato, probe tecto, mane leviter exprimantur & colentur.
Colaturæ unciis novendecim adde
Sacchari albi uncias triginta duas.
Fiat unica ebullitione syrupus, qui, per linteum colatus servetur.
Vires habent alvum laxandi; laudatur anthelminticus & antinephriticus; datur etiam in epilepsia & tussi.
Teneris a drachma una ad drachmas tres; adultioribus ad drachmas sex, vel unciam unam exhibetur.

SYRUPUS ACETOSELLÆ ET ACETOSÆ.

E succi depurati unciis decem, & sacchari unciis sedecim,
semel ebulliendo, fiat syrupus.
Commendatur biliosis, atque ad sitim caloremque restinguendos.

SYRUPUS ACETOSITATIS CITRI.

REC. Succi Citri uncias decem,
Sacchari albi uncias sedecim.
Fiat unica ebullitione syrupus, in vase vitreo servandus.
Julapiis & potionibus additur, sitim & æstum mitigat.

SYRUPUS DE AGRESTA.

REC. Agrestæ, sive succi uvarum, paulo antequam maturuerint, expressi, libram unam semis,
Sacchari albi libras duas.
Coquantur, in vase figulino vitreato, ad justam syrupi consistentiam.
Usus est in febribus malignis, & virtute cum syrupo citri convenit. Additur mixturis & julapiis.

SYRUPUS DE ALTHEA FERNELII.

REC. Radicum Altheæ,
Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Herbar. Altheæ,
Parietariæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Adianthi albi & nigri ana drachmas tres,
Uvarum passarum mundatarum ana unciam semis,
Cicerum rubrorum unciam unam.
Incisa coquantur ex
Aquæ libris quatuor,
usque dum unciæ viginti octo supersint, deinde cum
Sacchari albi libris quatuor
fiat ex arte syrupus.
Commendatur ad urinæ ardorem in nephritide & tussi, a materia acri & salsa orta.
Additur vel decoctis, vel cochleatim sumitur, ad unciam unam & ultra.

SYRUPUS DE AMMONIACO.

REC. Gummi ammoniaci electi uncias duas;

Solve

Solve in
Vini albi unciis decem.
Solutioni admiſce
Sacchari albi, ad conſiſtentiam tabulati coĉti, uncias ſedecim;
Agitentur, usque dum refrigeſcant. Syrupus aſſervetur.

Validiſſime incidit, detergit & purgat pulmones; eleganter confert inveteratis affectibus, a craſſa & lenta pituita ortis; in aſthmate ſpecifice conferre perhibetur.

Doſis per ſe uncia ſemis, drachmæ ſex, ad unciam unam.

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

REC. Radicum Rubiæ tinĉtorum,
Ruſci ana uncias duas,
Herbarum Artemiſiæ unciam unam,
Pulegii,
Meliſſæ,
Diĉtamni Cretici,
Sabinæ ana drachmas tres,
Florum Hyperici drachmas duas,
Seminis Nigellæ unciam ſemis,
Caſſiæ ligneæ unciam unam.

Radices inciſas infunde in
Aquæ fontanæ libris tribus;
macerentur per noĉtem, mane leniter ebulliant, ad colaturæ remanentiam librarum duarum, in qua infunde herbas & reliqua ingredientia, minutim inciſa; faĉta digeſtione per viginti quatuor horas, exprimantur; in
Colaturæ unciis novem
diſſolve
Sacchari albi uncias ſedecim,
& per pannum colatus
Syrupus ſervetur.

Potionibus additur, ac in menſium ſuppreſſione, & lochiorum imminuto vel plane ſuppreſſo fluxu utimur.

Doſis drachmæ ſex ad unciam unam.

SYRUPUS BALSAMICUS.

REC. Julapii roſati libram unam, vel uncias duodecim,
addantur
Eſſentiæ Balſami Peruviani drachmæ quatuor.
Mixta ſerventur.

Eſt ſtomachicus & vere balſamicus; prodeſt vulneratis, & ubicunque ſuſpicio ulceris interni eſt, ſine notabili tamen calore febrili; tuſſientibus & aſthmaticis conducit.

Doſis drachmæ tres.

SYRUPUS BELLIDIS E SUCCO.

REC. Succi e tota planta Bellidis minoris depurati, & ad dimidias evaporati, uncias novem,
Sacchari albi uncias ſedecim.
Fiat, ſaccharum unica ebullitione ſolvendo, ſyrupus, qui, per pannum colatus, ſervetur.

Prodeſt tuſſientibus, vulneratis, ad ſanguinem coagulatum reſolvendum ab alto lapſis, &c.

SYRUPUS BERBERUM.

REC. Succi Berberum depurati uncias decem,
Sacchari albiſſimi uncias ſedecim.
Fiat ſyrupus.

Refrigerans eſt, ſitim & æſtum mitigat, & calidis in febribus inprimis convenit.

SYRUPUS BETONICÆ.

REC. Herbæ Betonicæ recens ſiccatæ uncias quatuor.
Inciſa macerentur in
Aquæ Betonicæ deſtillatæ libra una;
Poſt ſufficientem extraĉtionem exprimantur, & in expreſſi unciis novem, diſſolve unica ebullitione
Sacchari albi uncias ſedecim.
Syrupus, colatus per pannum, ſervetur.

 Capiti

Capiti dicata est betonica, vulneraria est & diuretica; leniter adstringit, in calculo renum & vesicæ commendatur; ob vim adstrictoriam & vulnerariam, etiam in lochiorum nimio, post partum, fluxu, adhibetur. Easdem virtutes etiam syrupus habet, & commode potionibus medicis additur.

SYRUPUS BORRAGINIS.

REC. Florum Borraginis recentium libram semis.
Infunde in
Aquæ fontanæ ferventis libra una;
Digerantur per noctem, exprimantur, & infusi clarificati unciis novem, adde
Sacchari albi uncias sedecim.
Fiat syrupus.

Adscribuntur vires cor roborantes, antimelancholicæ & antimaniacæ.

Pari modo paratur:

SYRUPUS BUGLOSSI.

Cui tribuuntur vires eædem.

SYRUPUS BRUNELLÆ.

REC. Succi herbæ Brunellæ depurati, & ad dimidias lento igne evaporati uncias novem,
Sacchari albi uncias sedecim.
Fiat syrupus.

Commendatur ad oris & faucium ulcera & inflammationes, aphthis medetur.

Pari modo paratur:

SYRUPUS PLANTAGINIS MAJORIS.

SYRUPUS BRYONIÆ.

REC. Succi radicum Bryoniæ defæcati libram unam semis,
Sacchari uncias triginta duas.
Fiat, unica ebullitione, post sacchari despumationem, syrupus.

Serum expurgat, potenter resolvit; hinc hydropicis & asthmaticis commendandus; ob insignem amaritiem etiam vermibus & aliis insectis, atque bestiolis, in corpore humano natis, adversatur, menstruum educit, & ad virginum morbos laudatur.

Dosis uncia semis ad unciam unam.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS SIMPLEX, MONSPELIENSIS.

REC. Capillorum Veneris, parum incisorum, uncias tres.
Infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis libris tribus semis;
Stent in digestione per noctem, mane leniter coquantur ad septimæ partis consumtionem, colatura albumine ovorum clarificetur, & cum
Sacchari albi libris tribus,
fiat syrupus, cui pro lubitu addantur, vel
Aquæ Rosarum, vel
Naphæ uncia una aut duæ.

Humores incidit, attenuat & resolvit; loco sacchari, pro edulcoratione infusi Theæ utuntur, ad tussim & ad pectoris morbos, a materia viscida ortos.

SYRUPUS CAPILLORVM VENERIS COMPOSITUS.

REC. Capillorum Veneris uncias quinque,
Linguæ Cervinæ unciam semis,
Malvæ drachmas duas,
Radicum Asparagi unciam unam,
Glycyrrhizæ uncias duas.
Macerentur in
Aquæ fontanæ simplicis libris duabus,
& digerantur loco calido per noctem. Mane coquantur ad consumtionem circiter unciarum sex. Residuo expresso, & albumine ovi clarificato, adde
Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat

Fiat, unica ebullitione, ſyrupus.
Vires non differunt a præcedentis.

SYRUPUS CARDIACUS.

REC. Vini generoſi uncias octo,
Aquæ Roſarum uncias duas ſemis,
Cinnamomi drachmas tres,
Caryophyllorum drachmam unam,
Zinziberis drachmam ſemis.
Infuſa digerantur, ac ſufficienti facta extractione exprimantur; in expreſſo ſolvantur
Sacchari unciæ ſex & decem.
Fiat ſyrupus.
Eſt gratus, aromaticus, ventriculum roborans; additur electuariis.

SYRUPUS CARDUI BENEDICTI.

REC. Succi defecati, & ad dimidias evaporati, Cardui Benedicti, uncias octodecim,
Sacchari albi uncias triginta duas.
Fiat ſyrupus.
Tribuuntur illi vires ſtomachicæ, alexipharmacæ, antifebriles; potionibus & electuariis additur.

SYRUPUS CENTAURII MINORIS.

REC. Florum Centaurii minoris recentium libram unam.
Inciſi infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis libra una;
Stent per noctem, mane exprimantur, & in expreſſo
Florum recentium libra una infundatur; poſt macerationem per noctem exprimantur,
Colaturæ, albumine ovi clarificatæ, unciis novem adde
Sacchari albi uncias ſedecim.
Fiat ſyrupus.
Auctor, qui commendat, Quercetanus, ait: hoc ſyrupo nunquam carere debent officinæ, ob ſummam ejus neceſſitatem ac utilitatem; febrium ex bile ortarum ferociam compeſcit, bilioſum illum ſuccum benigne educit, ictericis conducit; proprium in ſe continet Rhabarbarum Centaurium minus, fel terræ & febrifuga appellatur, electuariis additur.

SYRUPUS CERASORUM ACIDORUM.

REC. Succi Ceraſorum acidorum, per ſubſidentiam defecati, uncias viginti,
Sacchari albiſſimi uncias triginta duas.
Fiat ſyrupus.
Convenit cum reliquis ſyrupis acidiuſculis, inprimis berberum.

SYRUPUS CHAMOMILLÆ.

REC. Florum Chamomillæ vulgaris recentium libram unam,
infunde in
Aquæ fontanæ ferventis libra una.
Stent in vaſe probe clauſo, per duodecim horas, poſtea exprimantur; infuſio repetatur,
Chamæmeli novam ſumendo libram,
poſt extractionem exprimatur & clarificetur infuſum, atque ex ejusdem unciis novem,
cum
Sacchari albi unciis ſedecim.
Fiat ſyrupus.
Multum valet hic ſyrupus ad colicam, tam flatulentam, quam ſpaſmodicam, in febribus, quartana & tertiana, cum aliis permixtus, bonum edit effectum; adhibetur in potionibus, vel electuariis, additur etiam clyſteribus.

SYRUPUS CHENOPODII ſive ATRIPLICIS MEXICANÆ.

REC. Herbar. Chenopodii ſive Atriplicis ſuaveolentis Mexicanæ, manipulos quatuor,
Eryſimi,

Urticæ ana manipulos duos,
Farfaræ manipulum.

Infundantur in aquæ fontanæ bullientis libra una, & ſucci Raparum albarum libra ſemis, poſt ſufficientem extractionem exprimantur, expreſſo addantur
Sacchari albi libræ duæ.

Fiat ſyrupus.

Pectoralis & diureticus eſt, atque in aſthmate & nephritide, laudatur.

Doſis uncia dimidia vel drachmæ ſex.

SYRUPUS DE CICHORIO, CUM RHABARBARO.

REC. Radicum Cichorii uncias duas ſemis.

Coque in
Aquæ fontanæ libra una ſemis,
ad remanentiam libræ unius, huic adde
Rhabarbari minutim inciſi unciam unam,
Salis Tartari grana viginti.

Ebulliant lento igne, exprimantur, in expreſſo diſſolve
Sacchari albi uncias ſedecim;
clarificato & colato ſyrupo adde
Aquæ Cinnamomi ſpirituoſæ unciam unam.

Servetur.

Bilem leniter ſubducit; pueris recens natis & infantibus a drachma una, ad drachmam unam ſemis, usque ad unciam ſemis, ad educendum meconium, & in torminibus, indeque ortis motibus convulſivis, commode datur.

SYRUPUS CINNAMOMI.

REC. Cinnamomi optimi, craſſiuscule contuſi, uncias quinque;

Reponantur in cucurbitam vitream, addanturque
Aquæ Cinnamomi optimæ, cum vino deſtillatæ, libræ duæ,
Aquæ roſarum odoratiſſimæ unciæ duæ.

Stent in loco calido, bene obturato vaſe, ne quid exſpiret, horis viginti quatuor, atque, cum
Sacchari albiſſimi clarificati, ad conſiſtentiam tabularum cocti, libris tribus, unciis quatuor.

Fiat ſyrupus.

Virtute gaudet analeptica, & ventriculum, nec non nervos roborante. Datur vel per ſe, vel cum aquis cordialibus.

SYRUPUS CITRI E TOTO.

REC. Corticum Citri exteriorum recentium uncias duas ſemis,

inciſos infunde in
Succi Citri recentis unciis viginti duabus.

Poſt digeſtionem exprimantur, in expreſſo diſſolve
Sacchari albi uncias triginta.

Servetur uſui ſyrupus.

In febribus malignis, exanthematicis, potionibus additur, malignitatem non ſolum arcere, ſed & vires reſtaurare compertus eſt.

SYRUPUS COCHLEARIÆ.

REC. Succi Cochleariæ recenter expreſſi libram unam ſemis.

Abſtrahantur lento igne, in cucurbita vitrea, unciæ ſex; reſiduum clarificetur & evaporetur ad remanentiam unciarum ſex, in quo diſſolve
Sacchari albi uncias octodecim,
atque per pannum colato ſyrupo adde
Aquam abſtractitiam,
& ſerva.

Cochlearia eſt antiſcorbutica planta; hinc ſyrupus inde confectus ſcorbuticis convenit.

SYRUPUS CONTRAYERVA.

REC. Radicum contrayerva minutim inciſarum uncias quatuor.

Infundantur per noctem in
Aquæ

Aquæ fontanæ ferventis libris duabus,
mane leniter ebulliant, ad colaturæ, expressione forti factæ remanentiam libræ unius, adde
Succi Citri uncias octo,
Sacchari albi uncias triginta duas.
Fiat, saccharum unica ebullitione solvendo, syrupus, in vitreo vase reponendus.

Laudatur in febribus malignis, variolis, morbillis & aliis exanthematicis, atque, ob vim blandam alexipharmacam, non adeo calidam, commendari meretur, potionibus & mixturis admiscendus.

SYRUPUS CONTRAYERVA COMPOSITUS.

REC. Pomorum Citri integrorum numero sex,
concisis & cucurbitæ vitreæ injectis adde
Radicum Contrayerva unciam unam semis,
Serpentariæ Virginianæ unciam unam,
Seminum Cardui benedicti,
Mariæ ana unciam semis,
Granorum Chermes drachmas duas,
Succi Granatorum dulcium libras duas.
Digerantur per viginti quatuor horas, tum, facta expressione ac additis
Sacchari albi libris tribus,
Fiat, in vase probe vitreato clauso, syrupus, qui colatus servetur.

Est alexipharmacus, malignitati & putredini resistit, virtute analeptica vires restaurat, diuretica & diaphoretica vi materiam noxiam, tam per sudorem, quam urinam, expellit.

SYRUPUS CORALLIORUM.

REC. Coralliorum rubrorum pulverisatorum uncias duas,
Succi Berberum, perfectæ maturitatis, depurati libram unam.
Digerantur, calore moderato, per triduum, vel quousque corallia bullulas emittere cessant: dein succus affusus, per inclinationem, separetur.
REC. Succi hujus, coralliorum solutione impragnati, uncias decem, &
Sacchari uncias sedecim,
lenta ebullitione, redigantur in formam syrupi.

Virtutes sunt refrigerantes, leniter adstringentes, in fluxionibus quibuscunque cohibendis, ad abortum & hæmorrhagias uteri præcavendas mulierculæ utuntur.

Potionibus & electuariis additur, vel solus, ab uncia semis ad integram, sumitur.

SYRUPUS CORTICUM AURANTIORUM.

REC. Corticum Aurantiorum recentium & extimorum uncias quatuor,
Vini albi generosi libram unam.
Macerentur per viginti quatuor horas, in loco calido, bene obturato vase; postea vinum decantetur, filtretur, & cum
Sacchari clarificati, atque ad consistentiam tabellarum cocti, unciis octodecim permiscendo.
Fiat syrupus.

Ventriculum roborat, flatus dissipat, & virtute gaudet analeptica & carminativa.

Exhibetur in potionibus.

SYRUPUS CORTICUM CITRI.

REC. Corticum Citri recentium & extimorum uncias quatuor,
Granorum Chermes drachmas duas,
Vini albi generosi libram unam.
Macerentur loco calido, vase bene

 ne

ne tecto, per viginti quatuor horas; postea vinum decantetur, filtretur, atque, cum

Sacchari clarificati, & ultra consistentiam tabellarum cocti, unciis octodecim.

Fiat syrupus.

Est cordialis, alexipharmacus & carminativus, ad febres epidemicas catarrhales, malignas laudatur. Addi etiam potest potionibus.

SYRUPUS CROCI.

REC. Croci Orientalis drachmas sex,

infunde in

Aquæ ferventis fontanæ unciis decem.

Stent, vase clauso, in digestione per triduum, postea exprimantur. In colatura dissolve

Sacchari albi uncias sedecim, &

post unicam ebullitionem, coletur syrupus per pannum.

Lene & securum præbet anodynum pueris; pectorale & alexipharmacum, in catarrhis utiliter adhibetur.

Uncia una hujus syrupi, Croci fere habet grana quindecim.

Pueris teneris, pro una dosi, ultra drachmam unam non dandus.

SYRUPUS DE CUCURBITA, MESUES.

REC. Cucurbitam sativam magnam, pasta pro pane involutam, coque cum pane in clibano; e calente adhuc succum exprime, & ex unciis duodecim, ad novem usque, & sacchari evaporati & clarificati unciis sedecim syrupum confice.

Vires laudantur ad febres biliosas & ardentes, ardorem urinæ, & sitim mitigandam; ad pectoris affectus, pleuritidem & faucium asperitatem.

SYRUPUS CYDONIORUM.

REC. Succi Cydoniorum, ad tertiæ partis consumtionem evaporati, libram unam semis,

Sacchari albi libras duas semis.

Fiat dissolutione & despumatione, unica ebullitione facta, syrupus.

Gratus est stomacho, leniter adstringit, & in nausea, vomitu & fluxionibus alvi, & ad abortum præcavendum adhiberi potest. Electuariis & potionibus additur.

Dosis ad unciam unam & ultra.

SYRUPUS DIACODION, five DE CAPITIBUS PAPAVERIS, seu DIACODIUM LIQUIDUM MONTANI.

REC. Capitum Papaveris, cum seminibus, uncias duas,

Siliquarum dulcium uncias duas semis;

incisis affunde

Aquæ fontanæ libram unam semis.

Coquantur lento igne, ad colaturæ remanentiam unciarum decem, in fine coctionis addendo

Liquiritiæ recentis minutim incisæ unciam unam semis;

in colatura dissolve

Sacchari candi rubri uncias sedecim.

Despumatus & colatus syrupus servetur.

In tussi acri, ad materiam incrassandam, a veteribus valde laudatur.

Dari potest infantibus lingendus, ad drachmam unam; adultis, ad unciam unam.

SYRUPUS, DIACODIUM CROCATUM.

Fit, syrupo antecedenti, sive Diacodio simplici addendo

Croci optimi drachmam unam.

Vires sunt eædem, propter crocum tamen, magis anodynæ & resolventes.

SY-

SYRUPUS DOMESTICUS, ſive DE SPINA CERVINA.

REC. Baccarum fruticis, quem Spinam cervinam vocant, circa finem Septembris, aut Octobris initio collectarum, quantitatem ſufficientem;

Conquaſſatæ & calefactæ exprimantur.

Succi hujus colati unciis viginti addantur

Sacchari albi unciæ triginta duæ, ſolvantur & colentur, addendo, in petia ligata,

Aniſi,
Maſtiches ana drachmas tres,
Zinziberis,
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana drachmam unam ſemis.

Fiat ſyrupus.

Commendatur ad hydropem, cachexiam, arthritidem, nec non luem veneream. Sunt, qui etiam recens natis, ad expurgandum meconium, dare ſolent.

Datur drachma una ad unciam & ultra.

SYRUPUS EMETICUS.

REC. Vitri Antimonii hyacinthini, ſubtiliſſime pulveriſati, drachmas duas,

affunde

Vini albi Rhenani uncias duodecim.

Stent per triduum, leni calore in digeſtione; poſt per chartam bibulam filtratis, adde

Sacchari albi uncias triginta duas.

Sola diſſolutione & unica ebullitione, fiat ſyrupus, in vaſe vitreo reponendus.

Delicatulis propinatur, ad vomitum ciendum.

Doſis eſt a drachma una ad drachmas quinque vel ſex.

In apoplexia & catarrho ſuffocativo etiam clyſteribus, ab uncia una ad unciam unam ſemis addi poteſt.

SYRUPUS EMETICUS ANGELI SALÆ.

REC. Vitri Antimonii optime triti unciam unam,

Cinnamomi electi,
Zedoariæ,
Seminis Angelicæ ana drachmas duas,
Sandali rubri unciam ſemis,
Croci Orientalis drachmam ſemis.

Infundantur in

Aceti roſati unciis viginti;

Macerentur per viginti quatuor horas, colentur & filtrentur, in filtrato liquore diſſolvantur

Sacchari albi unciæ viginti.

Fiat ſyrupus.

Vires ſunt eædem, quæ præcedentis.

Doſis drachma una ad unciam dimidiam.

SYRUPUS ENULÆ.

REC. Succi radicis Enulæ defæcati libram unam ſemis,

Sacchari albi libras duas ſemis.

Solvantur & fiat ſyrupus, per pannum colandus.

Reſolvit, & ad pectoris vitia adhibetur.

SYRUPUS DE ERYSIMO LOBELII.

REC. Eryſimi totius recentis uncias tres,

Radicum Helenii,
Tuſſilaginis ana uncias duas,
Herbarum Borraginis,
Cichorii,
Capillorum Veneris ana unciam ſemis,
Florum quatuor cordialium,
Anthos,

Florum Stœchadis Arabicæ ana drachmas duas,
Seminis Anisi drachmas sex,
Passularum mundatarum uncias duas.

Incisa & contusa coquantur in
Aquæ fontanæ libris duabus & semis,
Succi Erysimi unciis sex,
ad remanentiam unciarum octodecim, in expresso liquore dissolvantur
Sacchari albi unciæ triginta duæ.

Fiat syrupus.

NB. Erysimum vel Irio illa est planta, quæ Verbena fœmina vulgo vocatur.

Ad raucedinem præcipue commendatur, & multis jam amissam vocem restituisse, exempla prostant.

Datur ab uncia dimidia ad integram, ex infusis, decoctis, sero lactis, aliisque vehiculis.

SYRUPUS FARFARÆ E FLORIBUS.

REC. Florum Farfaræ, sive Tussilaginis recentium libram unam semis,
affunde
Aquæ fontanæ ferventis libras duas.

Macerentur per viginti quatuor horas, exprimantur, & in
Colaturæ unciis novem
dissolve
Sacchari albi uncias sedecim.

Fiat syrupus.

Ad pectoris vitia inservit, materiam acrem salsam incrassat, & expectorationem adjuvat.

Datur in decoctis pectoralibus.

SYRUPUS FRAGORUM.

REC. Succi Fragorum depurati uncias decem,
Sacchari uncias sedecim.

Fiat lege artis syrupus, ad normam syrupi Berberum.

Est analepticus & diureticus.

SYRUPUS DE FUMARIA.

Paratur e
Succi defæcati, & ad tertiæ partis consumtionem inspissati, unciis novem, &
Sacchari unciis sedecim.

Ad sanguinem & lympham corrigendam, scabiem & alia cutis vitia commendatur.

Addi potest electuariis & decoctis.

SYRUPUS GLYCYRRHIZÆ.

REC. Glycyrrhizæ uncias duas,
Capillorum Veneris unciam unam,
Hyssopi unciam semis,
Aquæ libras duas.

Species prædictæ in aqua, prius fervefacta, horis viginti quatuor macerentur, deinde decoquantur ad dimidias, colaturæ addendo
Mellis despumati uncias octo,
Sacchari albi uncias sedecim,
Aquæ rosarum uncias quatuor.

Fiat syrupus, secundum artem.

Cum Syrupo Capillorum Veneris convenit; pectoralis est, & pro edulcoratione decoctorum pectoralium inservire potest.

SYRUPUS GRANATORUM.

REC. Succi Granatorum acido-dulcium depurati uncias decem,
Sacchari albissimi uncias sedecim.

Solvantur & colentur; syrupus in vase vitreo servetur.

Est analepticus & leniter adstringens; refrigerat, sitim sedat, bilem refrænat.

Datur in potionibus, mixturis & julapiis.

SYRUPUS GRANATORUM KERMES.

REC. Coccinellæ unciam semis.

Optime trita in
Aquæ Rosarum &
Cinnamomi, sine vino, ana unciis duodecim,

Salis

Salis Tartari fixi granis duodecim.

Infundantur per noctem, addantur

Sacchari albi unciæ triginta duæ,

Succi granorum Kermes unciæ duodecim.

Unica ebullitione fiat syrupus liquidus, qui, per linteum colatus, reponatur.

Analepticus est, diureticus & alexipharmacus; datur in variolis & morbillis, nec non febribus catarrhalibus. Cum Confectione Alkermes convenit.

SYRUPUS HEDERÆ TERRESTRIS.

Sicut Syrupus Betonicæ ex aqua destillata & herba sicca paratur.

Hedera terrestris vulneraria est, & nephritica; Syrupus ad abscessus internos, sputum cruentum saniosum phthisicorum commendatur; consolidat & mundificat, urinam & menses promovet, ut & hydropicis utilis est.

In potionibus & electuariis propinari potest.

SYRUPUS HYPERICI.

REC. Florum Hyperici recentium libram unam semis,

Aquæ fontanæ ferventis libram unam.

Macerentur per diem integrum in loco calido; postea exprimantur, & ex

Infusi clarificati unciis novem, cum

Sacchari albi unciis sedecim.

Fiat syrupus.

Easdem vires, quas flores, habet; vulneratis, calculosis, ac renum doloribus vexatis auxiliatur.

Docente Quercetano, instar balsami omnibus resistit corruptionibus ventriculi; specificum est contra vermes.

SYRUPUS HYSSOPI.

REC. Hyssopi siccatæ uncias duas,

Capillorum Veneris unciam semis,

Radicum Helenii unciam unam,

Apii unciam semis.

Coque radices & Capillum Veneris in

Aquæ libris duabus semis, ad colaturæ remanentiam unciarum sedecim, in qua infundatur Hyssopus, & post digestionem in loco calido, infuso expresso & clarificato adde

Sacchari albi libras duas, uncias octo.

Fiat syrupus.

Viscidos humores resolvit, pulmones roborat, tussientibus & asthmaticis commendatur, in potionibus & electuariis.

SYRUPUS DE JUJUBIS.

REC. Jujubarum recentium uncias tres,

Liquiritiæ drachmas sex,

Capillorum Veneris,

Florum Violarum ana drachmas quinque,

Seminum Malvæ,

Cydoniorum,

Papaveris albi ana drachmas tres.

Incisa coquantur, in

Aquæ fontanæ libris duabus semis, ad colaturæ remanentiam unciarum octodecim, in qua dissolve

Tragacanthæ albæ electæ drachmam unam,

Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat syrupus, qui, per colatorium trajectus, servetur.

Commendatur ad tussim siccam, sputum tenue suo lentore maturat, incrassat, glutinat & expectorationem adjuvat, idemque ad urinæ vitia confert.

Propter mucilaginosa semina & tragacantham, est consistentiæ spissioris, & potius linctus, quam Syrupus, vocari deberet; præstat etiam, illum per linctus, quam haustus, assumi, aut aquis dilutum hauriri.

SYRUPUS KINÆ KINÆ.

REC. Corticum Kinæ Kinæ pulverisatorum uncias quatuor,
Cinnamomi electi unciam unam,
Vini rubri generosi libras duas.

Macerentur, in vitro probe clauso, sæpius vitrum movendo, per biduum; postea exprimantur ac colentur, in colatura, unica ebullitione, dissolve
Sacchari albi uncias triginta duas.

Fiat syrupus, qui per pannum colatus, servetur.

Pueris medicamenta reformidantibus dari potest; præter vim antifebrilem, etiam tonicam & stomachicam habet.

Dosis uncia semis ad integram.

SYRUPUS CASCARILLÆ, E CORTICIBUS LIGNI SASSAFRAS,

eodem modo, quo præcedens, parari possunt, scilicet
Cascarillæ, vel
Corticum ligni sassafras uncias tres,
in
Vini albi unciis viginti duabus,
infundendo, & cum
Sacchari unciis triginta duabus,
in syrupum redigendo.

Vires habent easdem, quas cortices, ex quibus parati sunt.

SYRUPUS DE MANNA LAXATIVUS.

REC. Radicis Polypodii unciam unam semis,
Specierum florum & fructuum,
Passularum minorum ana uncias duas.

Macerentur, per noctem, in
Aquæ fontanæ ferventis libris duabus semis,
mane coquantur ad tertiæ partis consumtionem, colentur, in colatura infunde
Foliorum Sennæ electæ uncias quatuor,
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Galangæ,
Macis,
Zinziberis ana drachmam unam.

Digerantur per viginti quatuor horas, in loco calido, exprimantur, expressum albumine ovi clarificetur, atque cum clarificato dissolvantur
Mannæ Calabrinæ unciæ sex,
Sacchari albi unciæ viginti duæ.

Fiat syrupus.

Datur pueris, scopo laxativo, ad humores a pectore derivandos, & recens natis, ad meconium educendum.

Dosis scrupuli duo ad unciam semis.

SYRUPUS MASTICHINUS.

REC. Masticbes electæ, parum contusæ, uncias duas,
infunde in
Aquæ Mastichinæ unciis duodecim.

Stent in vase probe clauso, in digestione, per triduum; postea colentur; in colatura dissolve
Sacchari albi uncias sedecim.

Syrupus in vase probe munito servetur.

Ad ventriculi vitia, a causa frigida orta, catarrhos, & ad cerebrum roborandum convenit.

Potionibus & electuariis additur; vel etiam, pro lubitu, ab uncia dimidia ad integram exhibetur.

SYRUPUS MENTHÆ.

REC. Herbæ Menthæ siccæ uncias quatuor,
Aquæ Menthæ libram unam.

Digerantur in vase clauso, per biduum, exprimantur, & in colatura, unica ebullitione, dissolvantur
Sacchari albi unciæ sedecim.

Ven-

Ventriculum roborat, vomitus & nauseam tollit; carminativus & hystericus est.

SYRUPUS MELISSÆ.

Eodem modo paratur.

Adscribuntur vires cordiales, nervinæ & uterinæ.

SYRUPUS MERCURIALIS, sive PROPHYLACTICUS, *SYROP DE LONGUE VIE DICTUS.*

REC. Succorum Mercurialis libras quatuor,
Borraginis,
Buglossi ana libram unam,
Mellis optimi albi libras sex.

Coquantur & despumentur; postea

REC. Radicum Gentianæ uncias duas,
Iridis nostratis uncias tres,
Vini albi libram unam semis.

Radices incisæ macerentur in vino, per viginti quatuor horas; postea exprimantur; cum succis & melle permisceantur, lenique igne ad syrupi consistentiam coquantur, atque per pannum colatus syrupus servetur.

Adscribitur huic Syrupo virtus singularis prophylactica, ad vitam prolongandam, podagræ, hydropis, calculi, aliorumque morborum insultus arcendos & mitigandos.

Dosis, jejuno stomacho, quotidie uncia dimidia, vel integra.

SYRUPUS MORORUM.

REC. Succi Mororum maturorum uncias viginti,
Sacchari albissimi uncias triginta duas.

Fiat syrupus.

Cum syrupo cerasorum convenit; præcipue autem ad oris & linguæ asperitatem & inflammationem, aphthas & anginam laudatur.

SYRUPUS DE MUSCO QUERNO, *ad Tussim convulsivam.*

REC. Musci querni barbati, Bryon dicti, uncias tres,
Herbæ Botryos, sive Atriplicis Mexicanæ suaveolentis,
Passularum minorum ana unciam unam semis,
Radicum Symphyti majoris unciam unam,
Liquiritiæ unciam semis.

Infundantur in
Aquæ fontanæ ferventis libra una semis;

digerantur per noctem, coquantur lento igne, ad colaturæ remanentiam unciarum decem, in qua clarificata dissolve
Sacchari uncias sedecim.

Fiat syrupus, cui refrigerato adde
Balsami Tolutani drachmam unam semis,
cum
Sacchari albi uncia una semis triti.

Misce exacte, & serva.

Celebris in Anglia & efficax est contra tusses clangosas & convulsivas puerorum, si cochlear unum vel duo propinentur, sæpe, in die, ante & post singulos tussiendi conatus

Dari etiam potest in aqua hyssopi, vel decocto pectorali, per aliquot dies.

SYRUPUS MYRTILLORUM.

E succo, sicut Syrupus Mororum, paratur.

Refrigerat & leniter adstringit, in fluxionibus alvi & sanguinis commendatur.

SYRUPUS DE NICOTIANA.

REC. Succi Nicotianæ libras duas,
Hydromellis simplicis libram unam semis,
Oxymellis simplicis uncias quatuor.

Digere in balneo, aut alio loco temperato, per duos vel tres dies,

dies, ut defæcetur; clarum, per declinationem vaſis, a fæcibus ſeparatum denuo, per viginti quatuor horas, digere, donec ab omni fæculentia ſuccus depuratus ſit, adde
Sacchari albi libras tres.
Permiſce, & in ſyrupi conſiſtentiam redige.

Nota: Ad vehementiam Nicotianæ corrigendam, opus eſt, ut digeratur & quaſi fermentetur ſuccus, quæ vehementia poſtea per longiorem coctionem magis diminuitur; ſecundum deſcriptionem igitur præparanda eſt.

Ad aſthmaticos affectus, ubi pulmones pituita craſſa ac viſcoſa infarcti, tuſſim humidam, ubi expectoratio difficulter ſuccedit, commendatur; cerebrum a catarrhis & fluxionibus feroſis & frigidis liberare, imo epilepſiam tollere perhibent; præter quod pectus mirifice per ſuperiora evacuet, per inferiora etiam potenter educit.

Pectorali ſcopo, modica quantitate, quæ vomitum excitare nequeat, ſed potius reſolvendo & anodino effectu juvet, Syrupus hic exhiberi debet; quodſi vero vomitus vel nauſea excitetur, hauſto vino calido aromatiſato mox conquieſcet.

Doſis drachma una ad duas, tres, vel quatuor.

SYRUPUS NUCISTÆ.

REC. Nucis moſchatæ uncias duas,
Pulveriſatis affunde
Vini generoſi Burgundiaci libram unam.
Digerantur in vaſe clauſo, per tres dies; poſtea exprimantur, & in colatura diſſolvantur
Sacchari albi unciæ ſedecim.
Servetur ſyrupus.

Eſt carminativus & ſtomachicus, alvi fluxiones & vomitus ſedat.

Datur in mixturis & electuariis.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

REC. Capitum Papaveris albi, cum ſeminibus, uncias octo,
Aquæ libras quatuor.
Decoquantur ad dimidium, clarificato decocto addantur
Sacchari albi libræ tres,
Fiat ſyrupus.

Adhiberi ſolet in tuſſi acri, a materie tenui, humores inſpiſſat, demulcet, anodinus eſt, & ſomnum conciliat; datur etiam in ardore urinæ; exhibetur in emulſionibus, vel ſolus.

Doſis a drachmis duabus ad ſex.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

REC. Florum Papaveris erratici libras duas,
infundantur in
Aquæ ferventis puræ libris tribus.
Macerentur per viginti quatuor horas, exprimantur, & cum
Sacchari albiſſimi libris quinque, & unciis quatuor,
Fiat ſyrupus.

Specificum habetur in pleuritide: blandiſſimum eſt anodinum & demulcens; additur julepis & electuariis, nec non decoctis.

SYRUPUS FLORUM PARALYSEOS, ſive PRIMULÆ VERIS.

REC. Florum Paralyſeos mundatorum recentium libram unam,
affunde
Aquæ ferventis fontanæ uncias decem.
Poſt ſufficientem macerationem exprimantur, in colatura, unica ebullitione, diſſolve
Sacchari albi uncias ſedecim.
Servetur ſyrupus per pannum colatus.

Speciales floribus Paralyſeos adſcribuntur vires nervinæ; datur igitur etiam Syrupus convulſis tremulis, & para-

ralyticis; ulcera oris persanare & tussientibus auxiliari creditur.

SYRUPUS PERSICORUM FLORUM.

REC. Florum Persicorum recentium libram unam.
Macerentur horis duodecim in
Aquæ calentis libra una;
postea exprimantur, & in
Colaturæ depuratæ unciis novem,
solvendo
Sacchari albi uncias sedecim,
fiat syrupus.

Infantibus teneris vomitum movet; provectioris ætatis laxat alvum, bilem & lumbricos educit.

Datur a drachma una ad unciam dimidiam & integram.

SYRUPUS PÆONIÆ FLORUM.

REC. Florum Pæoniæ recentium libras tres semis,
Aquæ fontanæ ferventis libras quatuor.
Fiat infusio per horas viginti quatuor, postea exprimantur.
REC. Expressi hujus uncias octodecim,
Sacchari albi uncias triginta duas.
Fiat syrupus.

Epilepticis dicatus est, & vi sua anodina motus restinguere valet.

Datur in mixturis infantibus ad drachmas duas vel tres.

SYRUPUS DE RHABARBARO DEODATI.

REC. Rhabarbari veri,
Foliorum Sennæ ana unciam unam semis,
Cinnamomi drachmam unam semis,
Salis Tartari scrupulos duos,
Zinziberis drachmam semis.
Infunde incisa in
Aquæ Cichorii unciis decem,
Rosarum unciis quatuor;
stent in digestione, per triduum, in loco calido, donec, unica ebullitione facta, exprimantur; in
Colaturæ, albumine ovi clarificatæ, unciis novem
dissolve
Sacchari albi uncias sedecim.
Fiat syrupus.

Alvum leniter subducit, bilem evacuat, & præcipue recens natis, ad educendum meconium utiliter datur.

Dosis tenerrimis drachma semis, scrupuli duo ad drachmam unam; in adultioribus ad unciam unam ascendere licet.

SYRUPUS RIBIUM.

REC. Succi Ribium depurati uncias decem,
Sacchari albissimi uncias sedecim.

Acidus est, & mitior Syrupo Berberum; sitim & æstum mitigat, & biliosis convenit.

SYRUPUS RORELLÆ.

REC. Herbæ Rorellæ uncias duas,
Erysimi drachmas sex,
Pulmonariæ quercinæ unciam semis,
Florum Farfaræ,
Radicum Curcumæ ana drachmas duas,
Liquiritiæ unciam unam,
Passularum minorum uncias duas,
Croci Orientalis drachmam unam.
Incisa perfundantur
Aquæ fontanæ bullientis libris tribus.
Coquantur parum, exprimantur; in expresso dissolvantur
Sacchari albi libræ duæ,
Coquantur ad justam syrupi consistentiam.

Commendatur ad raucedinem inveteratam, asthmaticis, & tussim ferinam.

Dosis uncia semis ad integram.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS.

REC. Florum Rosarum pallidarum libras quatuor.
Infundantur in
Aquæ fontanæ calidæ libris octo,
stent per viginti quatuor horas in digestione, postea colentur & exprimantur. In colatura denuo
Rosarum eadem quantitas infundatur, idque tertium repetatur; tandem, in
Infusi unciis novem,
solvendo
Sacchari albi uncias sedecim.
Fiat syrupus.

Alvum blande subducit, & neonatis atque tenerrimis ad drachmam unam datur; adultioribus ab uncia semis ad drachmas sex porrigi potest.

SYRUPUS E ROSIS SICCIS.

REC. Florum Rosarum rubrarum siccorum, finissimorum libram semis,
Aquæ fontanæ ferventis libram unam semis.
Macerentur per viginti quatuor horas, exprimantur, & in
Colaturæ unciis novem
dissolvantur
Sacchari albi unciæ sedecim,
fiatque syrupus.

Leniter adstringit, atque in alvi fluxionibus utiliter adhibetur.

SYRUPUS ROSATUS SIMPLEX.

REC. Muchari Rosarum libram unam semis,
Sacchari albi uncias triginta duas.
Solvantur unica ebullitione, & per pannum colatus syrupus servetur.

Alvum laxat leniter; Aphthis medetur, ac non sine fructu decoctis pectoralibus additur.

SYRUPUS RUBI IDÆI.

REC. Succi baccarum rubi idæi depurati uncias viginti,
Sacchari albi uncias triginta duas.
Fiat syrupus.

Sapore & odore delectat, analepticus & refrigerans est; admiscetur julapiis & mixturis cordialibus, & in febribus tam intermittentibus, quam continuis malignis, non sine effectu exhibetur.

SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

REC. Succi Nasturtii aquatici,
Beccabungæ ana libram semis,
Fumariæ,
Lupuli ana uncias tres.
Misceantur & coquantur cum
Sacchari albi unciis sedecim,
ad syrupi spissioris consistentiam; qui, per pannum colatus,
Aquæ nasturtii,
vel
Cochleariæ uncia una, vel duabus
diluendus.

Commendatur scorbuticis, & præsertim ejus usus externus, ad oris & gingivarum exulcerationes.

SYRUPUS SCORDII.

REC. Herbæ Scordii, in umbra siccatæ, uncias quatuor,
infunde in
Aquæ fontanæ ferventis libra una.
Digerantur per noctem, postea exprimantur, & in
expressi clarificati unciis novem
dissolve
Sacchari albi uncias sedecim.
Fiat syrupus.

Alexipharmacus & anthelminticus est.

SYRUPUS DE SCILLA, sive OXYSACCHARUM SCILLITICUM LONDINENS.

REC. Aceti scillitici libram unam semis,
Cinnamomi acuti,
Zinziberis ana unciam unam.
Post

Poſt digeſtionem per triduum colentur, addantur
Sacchari albi unciæ triginta, & fiat unica ebullitione, in vaſe figulino probe vitreato, ſyrupus, qui colatus, in vitro, vel vaſe porcellano, ſervandus.

Prodeſt aſthmaticis, reſolvit atque easdem, quas oxymel ſcilliticum, vires habet; gratior tamen eſt, & pro illis, qui mel tolerare nequeunt, parandus.

Doſis drachmæ duæ, uncia dimidia ad drachmas quinque.

SYRUPUS SEDI MAJORIS, ſive SEMPERVIVI.

REC. Succi Sempervivi majoris, ad dimidiæ partis conſumtionem, in vaſe terreo vitreato, evaporati, uncias decem,
Sacchari albi uncias ſedecim.
Miſce, fiat ſolvendo, ebulliendo & colando ſyrupus.

Febrium æſtus potenter extinguit, præcipue vero ad linguæ & faucium ariditatem, aphthas, & inflammationem valet.

Datur cum mucilagine cydoniorum.

SYRUPUS DE STOECHADE.

REC. Florum Stœchadis Arabicæ uncias duas,
Rorismarini drachmas duas,
Calaminthæ montanæ,
Origani,
Thymi ana drachmas tres,
Betonicæ,
Salviæ ana drachmas duas,
Seminum Aniſi,
Pæoniæ ana drachmas duas ſemis,
Calami aromatici,
Cinnamomi,
Zinziberis ana drachmam unam.
Inciſa infundantur in
Aquæ ferventis libra una;
Macerentur per biduum in loco calido, poſtea exprimantur, & in expreſſi unciis novem, diſſolve, unica ebullitione,
Sacchari albi uncias ſedecim.
Per pannum colatus ſyrupus ſervetur.

Cerebri atque nervorum morbis, a cauſa frigida, medetur, ventriculum corroborat, & concoctionem adjuvat.

Additur electuariis & potionibus.

SYRUPUS SULPHURIS, ſive ARCANUM BECHICUM WILLISII.

REC. Epatis ſulphuris unciam ſemis.
Solve in
Aquæ fontanæ &
Fœniculi ana unciis quatuor ſemis,
adde
Sacchari albi uncias ſedecim.
Unica ebullitione coquantur in ſyrupum, qui, per pannum colatus, ſervetur.

Laudatur a celeberrimo Auctore ad aſthma, tuſſim, phthiſin.

Doſis uncia ſemis ad integram.

SYRUPUS E SYMPHYTO FERNELII.

REC. Radicum & foliorum Symphyti majoris manipulos ſex,
Roſarum rubrarum,
Betonicæ,
Plantaginis,
Pimpinellæ,
Polygoni,
Scabioſæ,
Tuſſilaginis ana manipulos duos.
E contuſis omnibus recentibus exprimatur ſuccus, cujus, deſpumati vel defæcati, unciis novem adde
Sacchari uncias ſedecim.
Fiat ſyrupus.

Auctor de hoc ſyrupo promittit, quod tabidorum & ulceratorum pulmonum

num saniem & pus blande expurget, sine metu hæmorrhagiæ; subadstringens est, & non minus ad omnis generis fluxus, tam alvinos, quam sanguineos, utiliter adhiberi potest. Additur electuariis, potionibus & decoctis.

SYRUPUS TUNICÆ FLORUM.

REC. Infusi florum Tunicæ saturati uncias novem,
Sacchari uncias sedecim.

Fiat, lege artis, syrupus.

Analepticus, ventriculo & nervis gratus est, leniterque adstringit.

SYRUPUS VERONICÆ.

REC. Herbæ Veronicæ recentis siccatæ uncias sex.

Macerentur in
Aquæ Veronicæ, cum vino destillatæ, libra una;

post sufficientem extractionem, in loco calido, fortiter exprimantur, in expresso dissolvantur
Sacchari albi unciæ sedecim.

Fiat syrupus.

Abstergit & consolidat, pulmonibus & renibus præcipue convenit.

Datur cum decoctis & electuariis; in tussi pulmonali etiam solus, vel per se, ad unciam dimidiam, vel integram, sumi potest.

SYRUPUS VIOLARUM.

REC. Florum Violarum recentium, mundatorum, libram unam.

Contundantur in mortario lapideo, & superaffundantur, in vase figulino, optime vitreato,
Aquæ fontanæ ferventis purissimæ unciæ octodecim;

post digestionem, per aliquot horas, exprimantur & colentur.

REC. Infusi hujus colati uncias viginti,

adde
Sacchari albissimi Canariensis uncias triginta duas.

Leni ac unica ebullitione, in stanneo vel figulino vase facta, fiat syrupus, qui, per pannum colatus, servetur.

Teneræ ætati potissimum dicatus est, & ad aphthas, tussim, pectoris infarctus, ardorem urinæ, & calorem præter naturam temperandum, commendatur.

Cum aqua cerasorum plerumque adhibetur, vel cum oleo amygdalarum dulcium lingendus propinatur.

SYRUPUS VIOLARUM SOLUTIVUS.

REC. Florum violarum mundatorum uncias quatuor,
Foliorum sennæ electæ uncias duas,

infunde in
Aquæ fontanæ ferventis libra una.

Digerantur per noctem, in loco calido, mane exprimantur; ad expressi uncias novem,

adde
Sacchari albi uncias sedecim.

Colata serventur.

Leniter alvum subducit, & pueris delicatioribus, qui alia medicamenta reformidant, datur.

Dosis a drachmis duabus ad sex, vel unciam unam.

TARTARI OLEUM PER DELIQUIUM.

Fit, sal Tartari, in manica, aëri humido in cella exponendo, ut sensim in vitrum suppositum destillet; liquor salinus, per chartam filtratus, servetur.

Citius autem parari potest:
Salis tartari libram unam in
Aquæ calidæ fontanæ unciis quatuor, vel quinque,
solvendo & filtrando.

Usibus pharmaceuticis & chemicis inservit.

TAR-

TARTARI TERRA FOLIATA.

Videatur ARCANUM TARTARI.

TARTARUS CHALYBEATUS.

REC. Tartari albi crudi, pulverisati, libram unam,
Limaturæ ferri uncias quatuor.
Coque cum
Aquæ fontanæ libris duodecim, ad remanentiam quartæ partis; liquorem colatum per chartam emporeticam filtra, atque ad cryſtalliſandum, in cellam vel locum frigidum repone.

Cryſtallos a liquore ſalino, rurſus evaporando, & ad cryſtalliſationem reponendo, ſepara ac ſicca.

Ictericis, cachecticis & hypochondriacis, febre quartana laborantibus convenit.

Doſis a granis decem ad quindecim.

In majori quantitate exhibitus, nauſeam & vomitus excitare ſolet.

TARTARUS EMETICUS.

REC. Croci metallorum,
Cryſtallorum tartari ana uncias ſex.
Affundantur
Aquæ fontanæ libræ duæ ſemis;
ſtent per unum alterumque diem, pro lubitu.

Hinc leni igne, in vaſe figulino, probe vitreato, coquantur, ad ſufficientem ſolutionem & imprægnationem tartari. Liquor fervens filtretur, filtratus evaporetur leniſſimo igne, ſub perpetua agitatione, fere ad ſiccitatem; & poſtquam leni calore tartarus penitus exſiccatus fuerit, in pulverem teratur, non ita quidem albidum futurum, ac ille cryſtalliſatus, ſed efficaciorem.

Eſt emeticum univerſale, & datur tenerioribus a grano dimidio ad unum & ſemis; robuſtiores grana duo, tria, vel quatuor perferre poſſunt. Optimus modus, tartarum hunc exhibendi eſt, cum grana tria in unciis tribus aquæ ſolvuntur, hujusque ſolutionis hauriat æger dimidiam partem, vel duas tertias; ſi effectus voto non reſpondeat, reliqua portio dari poteſt. Ita hyperemeſis periculoſa evitatur.

TARTARUS TARTARISATUS, *SAL VEGETABILE* dictus.

REC. Cryſtallorum tartari uncias ſedecim.
Diſſolvantur in
Aquæ fontanæ bullientis, puriſſimæ, libris decem vel duodecim;
inſtilletur, inter bulliendum,
Solutionis ſalis tartari, quantum ad ſaturationem acidi tartari ſufficit,
donec ab illapſo alcali, inter bulliendum, nulla efferveſcentia amplius excitetur.

Liquor ſaturatus per chartam bibulam filtretur, atque ad ſiccitatem evaporetur.

Ex hac combinatione acidi & alcalini tartari reſurgit novum ſalis medii genus, quod virtute gaudet leniter purgante, reſolvente & diuretica.

Dari poteſt ſcopo laxandi, a drachmis duabus ad quatuor, in ſufficiente quantitate aquæ dilutus; ſcopo digeſtivo & diuretico ſufficit drachma dimidia vel integra. Externe ulceribus ſordeſcentibus mundificandis prodeſt.

TARTARUS VITRIOLATUS.

REC. Salis Tartari, per deliquium, vel in aqua fontana ſoluti & purificati, uncias quatuor.

Huic ſpiritus Vitrioli guttatim inſtilletur tantum, donec efferveſcentia ceſſet, poſtea humiditate lento calore evocata, exſiccentur.

TARTARUS VITRIOLATUS TACKENII.

REC. Cinerum clavellatorum,
Vitrioli Hungarici ana libras duas.

Utrumque ſeparatim in aqua calida ſolvendum eſt; deinde ſolutiones

nes ſucceſſive confundantur, & quidem tam diu, donec non amplius effervefcant, vel ſibilent. Præſtat autem, plus ſalis alcali, ut omne vitriolum ſaturetur, addere. Reponantur commixti liquores ad ſubſidentiam, a qua limpidus humor decantetur; maſſæ vero ſubſidenti ſuperfunditur denuo aqua calida, & ſpatula agitatur; poſt ſubſidentiam rurſus limpidior humor decantandus, atque hoc modo omnis ſalſedo extrahenda eſt.

Poſtea in vaſe vitreo humor, ad tertiam partem, evaporandus, & in locum frigidum ad cryſtalliſationem reponendus. Cryſtallis ſupernatans humor, decantatus, rurſus evaporetur, & ad cryſtalliſandum reponatur; cryſtalli collectæ probe exſiccandæ ſunt.

Eſt ſal medium, ex acido vitrioli & alcali enatum, & revera digeſtivum univerſale, ad ſolvendos & emendandos ſpiſſos lentosque humores. Conducit hypochondriacis, lienoſis, cachecticis, ictero & hydrope laborantibus; in febribus maximi eſt uſus.

Dari poteſt a ſcrupulo uno ad quatuor, imo, ſcopo laxativo & diuretico, ad drachmas duas, in aqua dilutus.

Præmiſſa tam de tartaro vitriolato e ſpiritu vitrioli, & e tartaro parato, quam de Tacheniano, intelligi volumus; qui poſterior, præter dictos effectus, etiam excellit in ulceribus repurgandis, atque in carne gingivarum luxuriante, & quæ in vulneribus capitis e meningibus pullulat, inſperſus, præſtantiſſimam fert opem.

TEREBINTHINA COCTA.

Coquitur Terebinthina Veneta, in ſufficienti quantitate aquæ fontanæ, ad ſpiſſitudinem, quæ cum refrigeſcit, duritiem acquirit.

Inſervit pro conficiendis pilulis de Terebinthina. Oleo æthereo ſuo ex parte orbata, ſecure interne datur, in Gonorrhœa, ulceribus internis; &c. Datur drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

TESTES EQUI PRÆPARATI.

E vivo equo exemti, vino albo abluendi, atque in Clibano exſiccati, in pulverem terantur.

In epilepſia, calculo, colica, fœtu mortuo pellendo, partu difficili & lochiis ſuppreſſis commendantur.

Doſis a ſcrupulo uno ad duos.

THERIACA.

Videantur ELECTUARIA.

THERIACA COELESTIS WIRTENBERGICA.

Compoſitionem jam olim magnis ſumtibus conciliavit ſibi Sereniſſima Domus Wirtenbergica, inter arcana hactenus ſervatam, ſeniori Archiatrorum & Pharmacopœo aulico ſolis cognitam.

Uſu apud nos dudum invaluit, ſeque laudatiſſimis viribus anodinis, ſedativis, antiſpaſmodicis, bezoardicis & analepticis ita commendavit, ut in vulgus innotuerit, ceu polychreſtum, medicisque etiam non conſultis expetatur frequentiſſime.

Doſis eſt infanti a grano dimidio ad unum, adulto a granis duobus ad quatuor.

TINCTURA ALOES.

REC. Aloës Succotrinæ uncias duas,
Spiritus vini rectificati uncias decem,

Stent in leni digeſtione, ad ſufficientem extractionem; poſtea filtrata tinctura ſervetur.

Excellens eſt vulnerarium & mundificans, ac a Chirurgis expetitur. Uſus internus rarus.

TINCTURA AMARA LONDINENS.

REC. Radicum Gentianæ uncias duas,
Flavedinis Aurantiorum unciam unam,

Carda-

Cardamomi minoris unciam dimidiam,
Spiritus Vini libram unam semis.

Digerantur, & post extractionem sufficientem exprimantur & filtrentur.

Stomachica & tonica est.

Dosis guttæ quinquaginta & ultra.

TINCTURA ANODINA.

Videatur ESSENTIA ANODINA.

TINCTURA ANTIMONII ACRIS HOFFMANNI.

REC. Reguli Antimonii martialis,
Nitri purissimi ana libram unam.

Pulverisata & mixta detonentur in crucibulo, & operculo tecta, fortiter per horam calcinentur, atque, dum adhuc calet materia, in mortario calefacto illico contundatur, vitroque digestorio, itidem calefacto, immittatur;
Spiritusque Vini rectificati libra una semis
affundatur, atque, ope caloris, tinctura rubicunda extrahatur.

Est potentissimum resolvens, & in affectibus lymphæ rebellibus, tumoribus hydropicis, suppressione urinæ & venerea lue, non sine insigni fructu, datur.

Dosis, propter acrimoniam, non temere larga nimis sit; in vehiculo etiam aquoso exhibenda; sufficiunt guttæ triginta ad quadraginta quinque.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

REC. Salis Tartari libram unam,
Antimonii electi libram semis.

Pulverisata & mixta fluant in crucibulo, valido igne, per horam; postea massa in mortarium calidum effunditur citissime, & ignita adhuc, in pulverem contunditur. Pulveri, in phiola,
Spiritus Vini rectificatissimi libra una
affunditur, & ad digestionem reponitur. Liquor, rubineo colore tinctus, a fæcibus separatur, atque residuo
Spiritus Vini rectificati libra semis
denuo affunditur, qui tinctus, uti prior, decantetur.

E residuo sulphur Antimonii parari potest.

Resolvit, sanguinem purificat, attenuat, urinam movet, ictericis, hypochondriacis & lienosis prodest.

Dosis guttæ quadraginta ad septuaginta.

TINCTURA ANTIPHTHISICA GARMANNI.

REC. Sacchari Saturni unciam semis,
Vitrioli Martis drachmas tres,
Aceti vini boni non destillati,
Spiritus vini rectificati ana uncias duas,
Aquæ Rosarum drachmas sex.

Solvatur Saccharum Saturni aceto, in vase ferreo, leni igne, admisceatur Vitriolum Martis tritum, invicem solutis addatur spiritus vini rectificatus, Aqua Rosarum permixtus; reponantur in locum temperatum.

Aqua Rosarum additur, ut phlegma spiritui vini, alias huc non rectificato expetito, restituatur, præcipitatio evitetur, tinctura saturatior atque ideo gratior obtineatur, simulque fœtor empyrevmaticus, qui spiritui vini non rectificato inhæret, evitetur.

Est mixtura saturnino-martialis, valde adstringens; hinc vix in phthisi, nisi symptomatibus urgentibus, sudoribus scilicet colliquativis, suadenda est; laudatur etiam ad sistendam go-

gonorrhœam, & pollutiones nocturnas; caute tamen ubique adhibendam esse, censemus.

Dosis guttæ viginti ad triginta.

TINCTURA AROMATICA LONDINENS.

REC. Cinnamomi acuti drachmas sex,
Cardamomi minoris drachmas tres,
Piperis longi,
Zinziberis ana drachmas duas,
Spiritus Vini libram unam.

Misceantur, atque post digestionem exprimantur & filtrentur.

Datur ad ventriculum roborandum, atque phlegmaticis convenit.

Dosis guttæ quinquaginta ad sexaginta usque.

TINCTURA BELLIDIS FLORUM.

REC. Florum Bellidis hortensis, colore rubro, a capitulis suis decerptorum & exsiccatorum, unciam semis,
Spiritus Vitrioli drachmam unam,
Aquæ florum Bellidis uncias quatuor.

Stent in digestione per diem & noctem; postea exprimantur & filtrentur.

Pari modo parantur:

TINCTURA FLORUM AQUILEGIÆ, PAPAVERIS, ROSARUM.

Ad fervorem & æstum sanguinis temperandum commendatur.

Dosis a dimidia uncia ad integram. Julapiis & potionibus admisceri possunt.

TINCTURA BEZOARDICA LUDOVICI.

REC. Radicum Angelicæ,
Carlinæ,
Enulæ,
Fraxinellæ ana unciam unam,
Myrrhæ electæ drachmas sex,
Croci Orientalis drachmas duas,
Castorei drachmam unam semis,
Spiritus Vini rectificati uncias quadraginta.

Stent in digestione ad sufficientem extractionem, exprimantur, & in expresso dissolvatur
Opii thebaici drachma una semis.

Filtretur tinctura & servetur.

Vires sunt eædem, ac tincturæ bezoardicæ officinalis; magis tamen propter opium, cujus uncia una ultra duo grana continet: anodina & sudorifera est.

Dosis guttæ quadraginta ad quinquaginta.

NB. Aliam etiam descriptionem hujus tincturæ circumferunt, quæ largiorem opii dosin continet; cum vero hæc, quam dedimus, jam a longo tempore in officina nostra aulica in usu est, illam merito præferre voluimus.

TINCTURA BEZOARDICA MICHAELIS.

REC. Radicum Zedoariæ uncias duas,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Valerianæ veræ,
Vincetoxici,
Calami aromatici ana unciam unam,
Costi electi,
Corticum Citri exteriorum recentium,
Baccarum Juniperi ana uncias duas,
Myrrhæ uncias tres,
Herbarum Scordii unciam unam semis,
Melissæ,
Millefolii,
Rutæ ana unciam semis,
Camphoræ unciam unam,
Theriacæ optimæ libram unam,

Spi-

Spiritus vini rectificati libras sex.

Post octiduanam digestionem adde

Aquæ fontanæ libras duas; abstrahatur spiritus; cujus

REC. libras duas,

Spiritus Tartari genuini libram semis,

Spiritus Vitrioli uncias tres.

Misceantur & tingantur cum fructu Solani quadrifolii, quod vulgo Herba Paris dicitur, ac filtrentur.

Propter exteros libuit, tam Tincturam bezoardicam Michaëlis, quæ ob longum usum in officinis plurimis prostat, & nil nisi Mixtura simplex tincta est, quam Wedelii apponere, quibus ambabus officinalem nostram virtute nullo modo cedere, sed palmam simplicitate præripere, censemus.

TINCTURA BEZOARDICA OFFICINALIS ORDINARIA.

REC. Radicum Zedoariæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Angelicæ,
Pimpinellæ,
Herbarum Scordii,
Dictamni Cretici,
Baccarum juniperi,
Corticum citri,
Myrrhæ ana drachmas sex,
Sandali rubri unciam unam.

Incisis & contusis affunde

Spiritus florum sambuci rectificati libram unam.

Post sufficientem extractionem exprimantur; expresso adde

Spiritus Tartari uncias sex,
Vitrioli uncias duas,
Camphoræ unciam semis.

Misce, post digestionem filtrentur, & ad usum reponantur.

Vires sunt alexiteriæ, sudoriferæ; hinc in erysipelate, febribus, quas vocant, malignis & continuis, bono cum effectu adhibetur; flatus etiam dissipat, & urinam movet.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

TINCTURA BEZOARDICA WEDELII.

REC. Radicum Zedoariæ,
Gentianæ veræ,
Angelicæ,
Anthoræ,
Contrayervæ,
Carlinæ,
Bistortæ,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Scorzoneræ Italicæ montanæ,
Vincetoxici,
Olsnitii ana unciam unam,
Florum Galegæ,
Ulmariæ,
Calendulæ,
Scabiosæ,
Rutæ ana unciam semis,
Seminum Fraxini,
Cardui benedicti,
Aquilegiæ,
Rutæ ana drachmas duas,
Baccarum paridis unciam unam semis,
Cubebarum,
Granorum chermes,
Opobalsami ana unciam semis,
Corticum citri drachmas sex,
Camphoræ,
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Croci drachmam unam.

Concisis & contusis, grosso modo, affundantur

Spiritus sambuci citrati rectificati libræ tres;

Cum per aliquot dies steterint, in leni digestione, addantur

Spiritus salis volatilis unciæ duæ,
Sandali rubri uncia una semis.

Tinctura saturata exprimatur, & filtrata servetur.

Vires, quæ ordinariæ officinalis.
Dosis eadem.

TINCTURA CANTHARIDUM PHARM. EDINBURG.

REC. Cantharidum drachmas duas,
Coccinellæ drachmam semis.
In pulverem tritis superaffundantur
Spiritus vini rectificatissimi unciæ octodecim.
Digerantur lenissimo calore per biduum, addantur
Resinæ Guajaci drachmæ quatuor,
Balsami de Copaiva uncia una,
Camphoræ drachmæ duæ,
Olei juniperi drachma una.
Post sufficientem digestionem ad solutionem resinæ & balsami, clarum a spisso per inclinationem vasis separetur.

Commendari solet ad gonorrhœam pertinacem; circumspectionem tamen adhibendam esse censemus.

Dosis guttæ viginti ad viginti quinque.

TINCTURA CORALLIORUM.

REC. Coralliorum rubrorum, pulverisatorum, uncias duas,
affunde
Aceti destillati libram unam.
Stent in digestione, per triduum, ebulliant aliquoties, ad coralliorum sufficientem solutionem; refrigerata solutio per chartam bibulam filtretur, atque in vase figulino, vel vitreo, ad siccitatem evaporetur.

REC. Solutionis hujus siccæ unciam unam,
solve in
Aquæ cinnamomi cydoniatæ unciis tribus,
solutioni adde
Spiritus vini rectificati unciam unam semis,
Tincturæ sacchari unciam semis.
Digerantur per aliquot dies; postea, per chartam bibulam, filtrata tinctura servetur.

Leniter adstringit, roborat, sudorem & urinam movet.

Dosis scrupulus unus ad drachmam semis.

TINCTURA CROCI.

REC. Croci Austriaci drachmas decem.
In spiritus vini rectificati libra semis
macerentur, & post digestionem exprimantur, atque Tinctura, per chartam bibulam filtrata, servetur.

Anodinæ, cordialis & antispasmodicæ est virtutis; menstrua movet, atque ad icterum laudatur.

Dosis guttæ triginta ad quadraginta.

TINCTURA CROCI VINOSA.

REC. Croci Austriaci unciam unam,
Micæ panis similaginei uncias duas.
Contundantur simul in mortario lapideo, sensim affundendo vini boni Canariensis quantitatem sufficientem, ut fiat puls mollis, omniaque stamina croci sint comminuta. Pulti huic porro affunde vini ejusdem uncias sex, & in vitro probe clauso aliquandiu relinque ac digere.
Tinctura sanguinis instar rubicunda a fecibus separetur, & loco frigido servetur.

Roborare, excretiones sine violentia stimulare, animam exhilarare, lithiasin cohibere, & ad vitam longam ac sanam procurandam, utilissime adhiberi, B. Schulzius censet.

Dosis guttæ decem, viginti, triginta, usque quinquaginta.

NB. Essentiæ & Tincturæ, menstruo vinoso paratæ, vel acescunt, vel mox situ corrumpuntur. Igitur vel parva in quantitate parandæ, vel parum spiritus vini rectificati addi debet.

TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

REC. Terræ Japonicæ,
Myrrhæ

Myrrhæ electæ ana unciam unam.

In pulverem trita irrorentur Balſami Peruviani drachma una.

Superfundantur
Spiritus Cochleariæ,
Vini rectificati ana unciæ tres.

Digerantur, & per chartam filtrata tinctura ſervetur.

Commendatur ad ſtomacacem, ſeu ſcorbutum oris, laxitatem & purulentam affectionem gingivarum, atque, cum melle roſato mixta, applicari ſolet.

TINCTURA HELLEBORI COMPOSITA.

REC. Fibrarum Hellebori nigri unciam unam ſemis,
Squinanthi unciam unam,
Galangæ minoris unciam ſemis,
Cardamomi minoris drachmas tres,
Croci drachmam unam ſemis,
Vini Canarienſis,
Spiritus vini ana libram unam.

Stent in digeſtione, poſt ſufficientem extractionem, exprimantur atque filtrentur.

Commendatur in affectibus hypochondriacis, obſtructione menſium. Datur maniacis & melancholicis.

Doſis drachma una vel una ſemis.

TINCTURA LACCÆ.

REC. Gummi Laccæ, quod baculis adhæret, & cui tinctura nondum extracta, unciam unam,
Aluminis crudi drachmam unam ſemis,
Aquæ Salviæ,
Roſarum,
Cochleariæ ana unciam unam ſemis.

Lento igne, in vaſe fictili, ebulliant, & colata uſui aſſerventur.

Ad laxitatem & cruentationem, a ſcorbutica ulceratione gingivarum adhibetur; locum etiam invenit in tonſillarum & uvulæ relaxatione, quæ ſub ſalivatione, a mercurio excitata, exoriri ſolet.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

REC. Limaturæ Martis puriſſimæ uncias quatuor,
Aceti vini albi uncias novem.

Stent in digeſtione, ad ſufficientem extractionem; poſtea in vaſe ferreo acetum, ad quartæ partis remanentiam, ſub continua agitatione, ſpatula ferrea, evaporetur, & reſiduo magmati, in vitro,
Spiritus cydoniorum unciæ quatuor
affundantur, & per digeſtionem probe unitis, clarum a ſpiſſo, per chartam bibulam colando, ſeparetur.

Omnes quidem tincturæ martiales ſunt adſtringentes, pro ratione vero menſtrui, quo extractæ ſunt, plus aut minus. Hæc tinctura, aceto parata, magis adſtringit, reliquis, & in fluxionibus quibuscunque inhibendis, & ubi adſtrictione opus eſt, adhibetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA,
ſive
AROPH PARACELSI.

REC. Florum Salis Ammoniaci Martialium unciam unam,
Spiritus Vini rectificatiſſimi uncias quatuor.

Miſce exacte, & lentiſſimo igne tincturam, aurei coloris, extrahe, quæ filtrata reponatur.

Hæc tinctura præ aliis ſe commendat, quod, ſine alteratione pelluciditatis cum aliis eſſentiis ac tincturis ſpirituoſis commiſceri poſſit. Suavitate odoris, & virtute leniter adſtringente ac anodina alias præcellit; in atonia viſcerum, & ex illa natis morbis, cachexia, hypochondriaco malo, ictero,

ictero, & post febres intermittentes, ea, bono cum successu, uti licet.

Dosis guttæ triginta quinque ad quadraginta.

TINCTURA MARTIS APERITIVA, TARTARISATA LUDOVICI.

REC. Vitrioli Martis,
Cremoris Tartari ana uncias quatuor.
Coque, in vase ferreo, cum
Aquæ fontanæ libris sex,
sub continua agitatione, fere ad siccitatem. Massa grisea solvatur denuo in
Aquæ cinnamomi, sine vino, unciis quatuor,
& diluatur
Spiritus Vini rectificati unciis octo.

Stent in digestione; liquorem tinctum, per filtrum, a fecibus separa & serva.

Tonica est, roborat, & appetitum excitandi gratia, post diuturnos morbos, in refracta dosi exhibetur.

Dosis guttæ quinquaginta ad octoginta.

TINCTURA MARTIS COERULEA ETTNERI.

REC. Limaturæ Martis purissimæ,
Salis Ammoniaci ana quantum vis.
Probe mixta destillentur, & si flores ascendere incipiunt, desistatur a destillatione. Massa vero relicta stet adhuc, per tempus, supra fornacem hypocausti calidi, ut hoc fotu magis magisque aperiatur limatura Martis. Tunc adde
Salis Tartari,
vel
Cinerum clavellatorum ana,
&
Aquæ fontanæ tantundem,
inde destilletur spiritus.

E residuo vero sal elixivietur, & ad siccitatem iterum evaporetur, cui sali affundatur spiritus prolectus, qui, colore cœruleo inde tinctus, servetur.

Magis curiosa, quam utilis est hæc tinctura, & colorem a particulis venereis, marti adhærentibus, habet.

Commendatur ab auctore hypochondriacis & melancholicis; quæ virtus potius spiritui salis ammoniaci adscribenda videtur.

Dosis guttæ viginti ad triginta.

TINCTURA MARTIS CYDONIATA.

REC. Limaturæ Martis purissimæ libram unam,
affunde
Succi cydoniorum, recens expressi, libras tres.
Stent per aliquot dies in digestione, postea lento igne, in cacabo ferreo, ad dimidiæ partis consumtionem, coquitur; ab igne remotis adde
Aquæ cinnamomi spirituosæ uncias tres.

Probe mixta filtrentur & serventur.

NB. Aquam cinnamomi addimus, ut gratior stomacho existat, & ne situ corrumpatur tinctura.

Vires habet, cum aliis martialibus, adstringentes, tonum viscerum roborat, atque in cachexia, hypochondriaco affectu, anomaliis mensium, utiliter dari potest.

Dosis est scrupulus unus ad scrupulum unum semis, in convenienti vehiculo.

TINCTURA MARTIS ELLEBORATA.

REC. Tincturæ Martis Ludovici uncias quatuor,
Extracti Ellebori nigri drachmas duas.

Mixta digerantur & filtrentur.

Commendatur in affectibus hypochondriacis & melancholicis, & febre quartana inveterata, expugnandis.

Dosis guttæ quadraginta & sexaginta; majori alvum laxat.

TINCTURA MARTIS POMATA.

Eodem modo paratur, quo Tinctura Martis

Martis cydoniata, atque easdem cum illa virtutes habet, eademque dosi exhibetur.

TINCTURA MARTIS, CUM VINO MALVATICO ET POMIS AURANTIIS.

REC. Limaturæ Martis purissimæ uncias quatuor,
Pomorum Aurantiorum amarorum, ſucculentorum, numero quatuor.

Excorticentur poma Aurantia, & a fungoſa albedine & ſeminibus liberentur; poſtea cortices & ſucculenta caro, in mortario lapideo, cum limatura Martis impaſtentur; paſta reponatur in vitro, ampliore collo, ad digerendum per biduum; donec affundantur
Vini Malvatici unciæ decem,
Spiritus corticum Aurantiorum unciæ duæ.

Digeſta & expreſſa filtrentur.

Cum reliquis tincturis martialibus, virtute leniter adſtrictoria, tonica convenit; præter hanc etiam gaudet viribus balſamicis, ſtomachicis & carminativis, atque hypochondriacis, flatibus & ructibus vexatis, & poſt febres diuturnas, exhibetur.

Doſis drachma ſemis ad ſcrupulos duos.

TINCTURA MARTIS, E VITRIOLO, ZWOELFFERI.

REC. Vitrioli Martis,
Arcani, ſive Terræ foliatæ Tartari ana unciam unam.

Vitriolum Martis pulveriſatum immittatur patinæ terreæ, calefiat leniſſimo igne, ſpatula agitando, usque dum fundi incipit, immiſceatur Terra foliata Tartari, & ab igne remota repone in locum temperatum, usque dum floreſcere cœperint; deinde diſſolve in
Aquæ Cinnamomi, ſine vino, unciis tribus,
Spiritus Vini rectificati unciis quinque.

Serva ad uſum in loco frigido.

Cum reliquis martialibus tincturis, uſu & viribus convenit.

Doſis guttæ triginta ad quinquaginta.

TINCTURA METALLORUM.

REC. Reguli Antimonii martialis uncias duas,
Cupri,
Stanni Anglici ana unciam unam;

fundantur violento igne, fuſa effundantur
Reguli hujus, in pulverem redacti, recipe uncias duas,
Nitri optimi cryſtalliſati, ſicciſſimi, pulveriſati, uncias duodecim.

Commiſceantur exacte, & paulatim in crucibulum probe candens injiciantur; detonatione peracta, tegatur crucibulum tegula, ignisque adhibeatur vehemens, in quo detineatur, donec maſſa in ſcorias cœruleas, virideſcentes redacta ſit. Tum in mortarium effundatur calefactum, pulveriſetur ſtatim, & vitro immiſſæ, ſuperaffundatur
Spiritus vini rectificatiſſimi libra una ſemis.

Digerantur, donec tinctura ſit extracta pulcherrime rubens.

Cum Tinctura Antimonii acri convenit, & ad viſcidos & lentos humores reſolvendos utilis; adeoque in humorum impuritatibus, obſtructionibus, & infarctibus viſcerum & glandularum adhibetur.

Doſis, propter acrimoniam, parca ſit, & in vehiculo adhibeatur aquoſo; ſufficiunt guttæ triginta ad quadraginta.

TINCTURA ODONTALGICA MAURIT. HOFFMANNI.

REC. Raſuræ ligni ſancti uncias duas,

Corticum ligni Saſſafras unciam ſemis,
Seminis hyoſcyami,
Radicis pyrethri ana drachmas duas,
Caryophyllorum,
Piperis longi ana drachmam unam,
Camphoræ,
Opii ana drachmam ſemis,
Sandali rubri drachmas duas,
Spiritus vini rectificati uncias quindecim.

Digerantur, & poſt ſufficientem extractionem filtrentur.

Efficaciſſimum remedium contra dolores dentium, vel goſſypio denti dolenti ſuperimpoſitum, vel parum calefactum in ore detentum.

TINCTURA PROPRIETATIS MYNSICHTI.

REC. Spiritus aniſi uncias ſedecim,
Elixirii proprietatis unciam unam,
Confectionis Alkermes unciam ſemis,
Florum Tunicæ rubrorum drachmam unam.

Stent in digeſtione, donec perfecte tingantur, poſtea ſpiritum tinctum & filtratum ad uſum ſerva.

Auctor eam laudat, pro more ſuo, in melancholia, hemicrania, vertigine, paralyſi, catarrho, aſthmate, tuſſi, cardialgia & cæteris morbis.

Nobis eſt ſtomachicum, carminativum & pectorale remedium non contemnendum.

Doſis drachma una ad unam ſemis.

TINCTURA RHABARBARI, ſive ANIMA RHABARBARI.

REC. Pulveris Rhabarbari optimi unciam unam,
Salis tartari drachmas duas,
Aquæ Cichorii,
Cinnamomi bugloſſatæ ana uncias ſex.

Infuſa ſtent loco calido, per horas viginti quatuor; poſtea per bibulam colentur.

NB. Situi valde obnoxia eſt hæc tinctura; nunquam igitur, niſi in caſu neceſſitatis, parari debet, quod ex tempore, in vaſe figulino, igne leni fieri poteſt.

Hypochondriacis & ictericis conducit, reſolvit, & majori doſi exhibita, alvum laxat, quo ſcopo ad unciam integram, imo duas, dari poteſt; ſcopo alterante ſufficiunt drachmæ duæ.

TINCTURA RHABARBARI COMPOSITA.

REC. Rhabarbari unciam unam,
Gentianæ drachmam unam ſemis,
Serpentariæ Virginianæ drachmam unam,
Spiritus vini,
Vini generoſi ana libram ſemis.

Miſceantur, & extrahatur Tinctura.

Laudatur in affectibus bilioſis, febribus, & ipſa dyſenteria.

Doſis guttæ quinquaginta ad octoginta.

TINCTURA STOMACHICA AROMATICA.

REC. Cinnamomi acuti unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucum moſchatarum,
Croci Orientalis ana unciam ſemis,
Calami aromatici drachmas ſex,
Macis drachmas duas,
Corticum Citri recentium, ex duobus pomis, aurantiorum recent. unius pomi.

Inciſa & contuſa infundantur
Spiritus vini rectificati libra una ſemis.

Poſt digeſtionem exprimantur, & per chartam filtrentur.

Ori & ſtomacho grata eſt, atque vel ſola, vel cum aliis Eſſentiis amaris mixta,

ad

ad guttas quinquaginta vel octoginta exhiberi potest.

TINCTURA STOMACHICA MARTIALIS EDINBURGENS.

REC. Radicum Calami aromatici,
Galangæ,
Gentianæ,
Zedoariæ,
Corticum Aurantiorum,
Peruvianor. ana unciam semis,
Herbarum Absinthii,
Centaurii minoris,
Florum Chamomillæ Romanæ ana drachmas duas,
Limaturæ ferri unciam unam semis,
Vini albi generosi uncias sedecim,
Spiritus vini rectificati uncias duas.

Digerantur, & post extractionem sufficientem exprimantur, atque filtrentur.

Ad tonum ventriculi & viscerum restaurandum post febres diuturnas, imo in febribus intermittentibus, cachexia, ictero, mensium vitiis, commendabilis est.

TINCTURA STOMACHICA LIPSIENSIS.

REC. Spiritus Salis armoniaci vinosi uncias duas,
Vini rectificatissimi unciam unam,
Olei destillati veri absinthii drachmas tres,
Caryophyllorum aromaticorum drachmam semis.

Misceantur & digerantur, addatur Tincturæ sandali rubri uncia una.

Efficacissima est in affectibus ventriculi, sic dictis frigidis, tonum restaurat, digestionem promovet, flatus discutit, & anthelmintica censetur.

Dosis guttæ viginti ad triginta.

TINCTURA SULPHURIS.

REC. Sulphuris citrini unciam unam semis.

Fluat lento igne, in patina terrea, admisce successive
Salis Tartari,
vel
Cinerum clavellatorum siccorum uncias tres;
Auge ignem, ut materia fluat, cui, in mortarium calidum effusæ atque pulverisatæ, in vitro,
Spiritus Vini rectificatissimi uncias decem
affunde, & extrahe tincturam.

Ad pectoris affectus, scabiem, ulcera scorbutica, commendatur.

Dosis guttæ quadraginta ad sexaginta, in vehiculo idoneo.

TINCTURA TARTARI ACRIS.

REC. Salis Tartari uncias sex,
Pulveris carbonum unciam unam semis.

Misceantur, & calcinentur fortissimo igne, per horam integram. Massæ salinæ superaffunde
Spiritus Vini rectificati libram unam.

Digerantur leni calore, & tinctura, per inclinationem vasis a fecibus separata, servetur.

Magis ignea est tinctura ordinaria tartari, atque cum Tinctura Antimonii acri convenit, & eadem dosi exhibetur.

TINCTURA TARTARI.

REC. Salis Tartari depurati libram semis.

Fundatur in valido crucibulo, igne intenso, atque in fluore tam diu conservetur, donec in colorem e rubro cœruleum transierit; effusum in mortarium cale-

calefactum, cito pulverisetur, & calens, ne aërem attrahat, in phialam siccam, itidem prius calefactam, immittatur, superfundatur

Spiritus vini rectificatissimi libra una;

digerantur, per aliquot dies, in arena, interdum agitando, donec spiritus vini rubicundo colore tingatur, qui decantatus, pro tinctura Tartari, servetur.

Est tinctura alcalina, ideo, quæ de tinctura antimonii & metallorum diximus, huc referenda. Resolvens est & egregium diureticum, illis etiam utiliter adhibetur, in quibus acidum in primis viis peccat.

Dosis guttæ triginta ad septuaginta.

TRAGEA AROMATICA GABELKOVERI.

REC. Cinnamomi drachmam unam,
Zinziberis drachmam semis,
Caryophyllorum aromaticorum,
Galangæ minoris,
Granorum Paradisi,
Macis,
Nucis Moschatæ ana grana quindecim,
Sandali albi,
rubri ana drachmam semis,
Sacchari albi uncias octo.

Misce, fiat pulvis.

Concoctionem adjuvat, & tam grato sapore, quam virtute roborante, stomachica & carminativa se commendat.

Sumitur cum pane tosto & vino, vel per se, ad drachmas sex.

TRAGEA AROMATICA OFFICINALIS.

REC. Cinnamomi acuti unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucis moschatæ ana drachmas tres,
Macis drachmas duas,
Zinziberis drachmas tres,
Sandali rubri unciam semis,
Sacchari albi uncias triginta duas.

Misce, fiat pulvis.

Vires sunt eædem, quæ præcedentis.

TRAGEA GRANORUM ACTES.

REC. Succi baccarum Sambuci, quantum placet,
Farinæ secalinæ, quantum sufficit.

Misceantur, fiat pasta, ex qua formentur panes parvi, in clibano ad duritiem coquendi. Cocti denuo in pulverem terantur, & succo sambuci imprægnati, rursus exsiccentur, laborque tertia vice repetatur.

Tandem

Massæ hujus, in pulverem tritæ, singulis unciis

addatur

Nucis moschatæ drachma una.

Egregium celebratur antidysentericum, & a drachma una ad drachmas duas exhibetur.

TRAGEA OPHTHALMICA.

REC. Euphrasiæ drachmas decem,
Millepedum præparatorum unciam semis,
Macis,
Cubebarum ana drachmam unam,
Fœniculi drachmas tres,
Cinnamomi acuti drachmam unam semis,
Sacchari albi uncias tres.

Trita serventur.

Præter usum ad visus debilitatem, etiam confert ad capitis dolores, urinam movet, & chylificationem adjuvat, emendat.

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis, bis de die sumenda.

TROCHISCI ALHANDAL.

Fructus Colocynthidis, a corticibus exterioribus & seminibus mun-

mundatus, cum mucilaginis tragacanthæ & gummi arabici sufficiente quantitate, in mortario contunditur; postea massa, leni calore exsiccata, in pulverem teritur, & vel in forma pulveris servatur, vel in trochiscos, ope mucilaginis tragacanthæ, formatur, sic enim melius vires integræ conservari creduntur, quam, si aër omnes pulveris atomos subire & vires auferre, vel alterare potest.

Sunt vehementer purgantes, & pilulis, pro stimulo, adduntur.

Dosis grana duo ad quinque.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

REC. Styracis calamitæ uncias quatuor,
Ladani,
Benzoës ana unciam unam,
Ligni Aloës, subtilissime pulverisati, drachmas sex,
Sacchari albissimi unciam unam semis,
Moschi Orientalis scrupulum unum,
Ambræ griseæ drachmam unam.

Omnibus subtilissime pulverisatis, fiat, sufficiente quantitate mucilaginis tragacanthæ, aqua rosarum paratæ, massa, ex qua formentur trochisci minores.

Trochiscorum horum usus plerumque est ad suffitus, vel suffimigia pretiosa, cucuphas, aliasque res odore imbuendas.

Interne commendatur pueris, asthmate & constrictione pectoris laborantibus, & lac revomentibus, quibus pauca grana, unum, duo, vel tria sufficiunt.

TROCHISCI ALKEKENGI.

REC. Baccarum Alkekengi drachmas octo,
Seminum Papaveris albi unciam unam,
Apii,
Hyoscyami ana drachmas duas,
Gummi Arabici,
Amyli,
Tragacanthæ,
Radicis Altheæ,
Succi Liquiritiæ inspissati ana unciam unam semis,
Boli Armenæ,
Thuris,
Sanguinis draconis ana drachmas undecim,
Succini præparati,
Terræ sigillatæ ana drachmas duas.

Pulverisata aqua rosarum, vel alkekengi humectentur, & in massam cogantur, ex qua formentur trochisci.

Si præcedentibus opii drachmæ duæ adduntur, fiunt:

TROCHISCI ALKEKENGI, CUM OPIO.

Commendantur ad renum & vesicæ ulcera, ac natam inde dysuriam; acrimoniam urinæ temperant, & ardorem mitigant.

Quælibet drachma habet opii granum unum.

Dosis est a scrupulis duobus ad drachmam unam; sed, cum continuari debeant, præstat sine opio sumere.

Sumuntur autem in Syrupo dialtheæ, aqua alkekengi, vel alia diluto, quibus, pro lubitu, oleum amygdalarum dulcium addi potest.

TROCHISCI ALKERMES COMPLETI.

REC. Confectionis Alkermes completæ unciam unam semis,
Laccæ Florentinæ drachmas tres,
Ambræ,
Moschi ana scrupulum semis,
Sacchari albi uncias sedecim,
Mucilaginis Tragacanthæ, aqua rosarum factæ, quantum satis.

Fiant trochisci minores.

Ad bonum halitum conciliandum, & caput confortandum, sumuntur.

TROCHISCI DE AMBRA.

REC. Ambræ griſeæ ſcrupulum ſemis,
Olei Cinnamomi deſtillati guttas ſex,
Moſchi grana quatuor,
Sacchari albiſſimi uncias ſedecim,
Mucilaginis Tragacanthæ, quantum ſatis.

Fiant trochiſci minores.

Sunt cephalici, & bonum halitum conciliant.

TROCHISCI ANTHELMINTICI, ſive HERMETICI SCRETÆ.

REC. Mercurii dulcis unciam ſemis,
Cornu cervi, philoſophice præparati, ſcrupulos duos,
Cinnamomi acuti ſcrupulum unum,
Diacrydii ſulphurati drachmam unam,
Sacchari albi unciam unam,
Conſervæ Roſarum rubrarum drachmas duas.

Cum mucilagine Tragacanthæ, in aqua roſarum ſolutæ, fiant trochiſci, numero ſexaginta quatuor.

Adverſus vermes, & inde ortos morbos, utiliter adhibentur.

Pendet trochiſcus grana quindecim, & continet mercurii dulcis grana quatuor, diacrydii granum unum.

Doſis, pro ratione ætatis, unus vel duo.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

REC. Sacchari albiſſimi libram unam, uncias octo,
Radicum Ireos Florentinæ unciam unam ſemis,
Amyli uncias duas ſemis,
Mucilaginis Tragacanthæ albiſſimæ, aqua roſarum factæ, quantum ſatis.

Fiat maſſa, ex qua formentur trochiſci parvi.

TROCHISCI BECHICI CITRINI.

REC. Sacchari albi libram unam,
Radicis Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ ana unciam unam,
Croci ſcrupulos duos,
Mucilaginis Tragacanthæ, quantum ſufficit.

Fiant maſſa & trochiſci.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

REC. Pulveris Radicum Ireos Florentinæ,
Liquiritiæ,
Seminum Aniſi,
Fœniculi ana unciam unam,
Succi Liquiritiæ, in Aqua Hyſſopi ſoluti, uncias quatuor,
Sacchari albi uncias ſedecim,
Mucilaginis Tragacanthæ, Aqua Roſarum ſolutæ, quantum ſufficit.

Miſce, fiant ex arte trochiſci.

TROCHISCI BECHICI RUBRI.

REC. Specierum Diatragacanthæ,
Boli Armenæ ana unciam unam,
Sacchari albi libram unam.

Fiat, cum mucilagine Tragacanthæ, maſſa, ex qua formentur trochiſci minores.

Trochiſci bechici tam albi, quam nigri & reliqui, ad tuſſim acrem, raucedinem & defluxiones acres, catarrhales inſerviunt, & tam reſolvendo, quam demulcendo opem ferunt.

TROCHISCI DE CARABE.

REC. Carabe, id eſt, Succini drachmas ſex,
Cornu cervi uſti,
Corallii rubri,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Maſtiches,
Gummi Laccæ,

Suc-

Succi Acaciæ,
Hypociſtidis,
Balauſtiorum,
Seminis Papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris,
Croci,
Opii ana drachmam unam, grana quindecim,
Mucilaginis Pſyllii quantum ſatis.

Formentur trochiſci.

Sunt adſtringentes & opiati. Commendantur ab auctore Meſua *ad hæmorrhagias, & in ſpecie ad ſputum cruentum & uteri fluxum; diarrhœas & hæmorrhoides nimium fluentes ſiſtunt.*

Drachma continet grana tria opii; hinc in doſi, niſi urgente neceſſitate, non ultra ſcrupulum excedendum.

TROCHISCI CATECHU, ſive MUSCERDÆ.

REC. Terræ Catechu unciam unam,
Sacchari candi albi uncias duas,
Ambræ gryſeæ,
Moſci Orientalis ana ſcrupulum ſemis,
Mucilaginis Tragacanthæ quantum ſatis.

Fiant trochiſci, inſtar muſcerdarum.

Ad laxitatem gingivarum corrigendam, & bonum halitum conciliandum, in ore detinentur.

TROCHISCI DE TERRA CATECHU, AD SPUTUM CRUENTUM.

REC. Terræ Catechu pulveriſatæ unciam unam,
Succi Liquiritiæ uncias tres,
Specierum diatragacanthæ unciam ſemis.

Miſce, fiant trochiſci minores; qui, in ore liquefacti, acrimoniam ſalſam mitigant, & hæmoptoicis mire proſunt.

TROCHISCI DE CREMORE TARTARI.

REC. Cremoris Tartari unciam unam ſemis,
Sacchari albiſſimi uncias ſex,
Mucilaginis tragacanthæ quantum ſatis.

Fiat maſſa, ex qua formentur trochiſci.

Ad æſtum febrilem temperandum, & ſitim mitigandam commendantur.

TROCHISCI ESCHAROTICI.

REC. Mercurii ſublimati corroſivi unciam ſemis,
Amyli albi,
Panis triticei ana unciam unam,
Minii rubri unciam ſemis,
Mucilaginis Tragacanthæ quantum ſufficit.

Fiant trochiſci.

Inſerviunt chirurgis, ad mundificanda ulcera, & carnem luxuriantem extirpandam.

TROCHISCI GALLIÆ MOSCHATÆ.

REC. Ambræ gryſeæ drachmas tres,
Ligni Aloës drachmas quinque,
Moſchi drachmam unam,
Sacchari albi unciam unam,
Mucilaginis gummi tragacanthæ, quantum ſufficit.

Miſce, fiant trochiſci.

Adduntur ſpeciebus & pulveribus, atque aliis medicamentis, ut odorem gratum ipſis tribuant.

TROCHISCI DE MYRRHA.

REC. Myrrhæ electæ drachmas tres,
Aſæ fœtidæ,
Sagapeni,
Opoponacis,
Rubiæ tinctorum,
Foliorum Rutæ,
Menthaſtri,
Seminis Cymini,

Seminis Lupinorum ana drachmas duas.

Myrrha, Asa fœtida, Sagapenum & Opoponax vino humectantur, quibus reliqua pulverisata adjiciuntur, ut fiat massa, ex qua formentur tochisci.

Menstrua suppressa, fœtum mortuum, & secundinas retentas promovent.

Dantur a drachma semis ad integram.

TROCHISCI DE SCILLA.

REC. Scillam albam ponderosam. Cortice exteriori detracta, & parte inferiori duriore, cui fibrosæ radices adhærent, adjecta, massæ panis, e farina & aqua, involve, atque in clibano, donec massa panis in crustam abierit, coque, quam separabis, atque medullosam vel carnosam scillæ partem, in mortario marmoreo, pistillo ligneo, quam optime in pultem contunde; ad

Scillæ libram unam, vel uncias duodecim,

adde

Farinæ Orobi, vel lupinorum uncias octo,

atque contundendo in massam redige, ex qua formentur trochisci, pondere drachmarum duarum, qui leni calore siccandi.

Sunt ingrediens Theriacæ; vim habent resolvendi, alexipharmacam, diureticam, & in majori dosi exhibiti, emeticam.

Dosis grana quinque ad octo.

TROCHISCI DE VIPERA.

REC. Viperas, detractis exuviis, capitibus & caudis, truncatas, atque exenteratas, quantum voles.

Coquantur in sufficiente quantitate aquæ fontanæ, sale & anetho conditæ, donec caro a spinis secedat.

REC. Carnis hujus, aliquantum a nimia humiditate siccatæ, unciæ octo,

Panis triticei albissimi, bis cocti & in pollinem redacti, unciæ duæ,

contundantur in mortario marmoreo, in massam, ex qua trochisci formentur tenues, in umbra siccandi, & ne situm contrahant, sæpius vertendi, postea in vitro, in loco temperato sicco servandi.

Quamvis trochisci de viperis plerumque ex Italia petantur, tamen descriptionem præparationis apponere libuit; nam dubium non est, quin viperæ nostræ indigenæ, eandem fere virtutem habeant, & cum ad Theriacæ confectionem expetantur, præstaret, istos recentes confectos adhibere, quam inveteratos ex Italia conquirere. Raro præscribuntur, sed potius pulvere viperarum ex Italia allato, vel nostrarum viperarum utimur.

TURPETHUM MINERALE.

REC. Argenti vivi, puri, uncias quatuor,

Olei Vitrioli rectificati duplum, i. e. uncias octo.

Ponantur in vase vitreo supra prunas, ut ebulliant, atque mercurius dissolvatur. Continuetur ignis, donec ad siccitatem perveniat, & non amplius fumet materies, sed in massam albam salinam abeat. Quæ aqua calida solvenda, & pulvis citrini coloris residuus, qui est turpethum, multa aqua tepida edulcorandus.

Apud veteranos nonnullos chirurgos in usu est, ad salivationem excitandam; exhibent grana tria ad quinque, pro dosi. Non raro sursum ac deorsum purgat; præstat igitur, ab ejus usu abstinere, cum alia minus violenta & securiora mercurialia prostent. Noviter tanquam specificum contra Hydrophobiam, vel rabiem caninam, ab Anglis commendatur.

Dosis grana tria. Videant. Collect. Lipsiens. Tom. IV.

TU-

TUTIA PRÆPARATA.

Aliquoties, vel ad minimum ter, in crucibulo candefiat, ſingulis vicibus in aqua extinguatur, tum demum trita in marmore lævigetur.

Uſus eſt in collyriis, unguentis & emplaſtris exſiccantibus.

VENTRICULORUM GALLINARUM PRÆPARATIO.

Mundatæ pelliculæ vino laventur, & leni calore exſiccatæ ſerventur.

Commendantur ob vim leniter adſtringentem, ad ventriculum roborandum, alvi fluxum, & vomitus compeſcendos.

Dantur in trageis a drachma dimidia ad integram.

VINUM CYDONIORUM. GRANATORUM. RUBI IDÆI.

Adæquata proportio eſt, ut in libra una ſucci diſſolvantur unciæ tres ſacchari. Colentur, ſerventur.

Julapiis & mixturis adduntur.

VITRIOLI GILLA THEOPHRASTI.

Videatur GILLA.

VITRIOLI ROS, ſive PHLEGMA.

Eſt phlegma acidulum, primo in deſtillatione vitrioli deſtillans.

Adſcribitur illi vis roborans ventriculum, & expellendi lumbricos.

Doſis guttæ viginti ad triginta.

VITRIOLI TERRA DULCIS.

Eſt edulcoratum caput mortuum, ab olei vitrioli deſtillatione, in retorta relictum.

Vires ſunt exſiccantes, uſus in emplaſtris.

VITRIOLUM MARTIS.

REC. Limaturæ Martis libram unam.

Superfundatur
Spiritus vitrioli, tripla aquæ fontanæ quantitate diluti, libra una;

digerantur in loco calido, usque dum efferveſcere deſinant, liquor filtratus ultra dimidium, vel eo usque, dum in ſummitate pelliculam contrahat, lento igne exhalet, ſic in frigido concreſcent cryſtalli viridiuſculæ, quæ exſiccentur, remanens vero liquor ulterius, pro vitriolo exin colligendo, debite exhalet.

Ad nonnullas præparationes pharmaceuticas requiritur; datur vero etiam in ſubſtantia, aliis pulveribus mixtum, uti in pulvere abſorbente Wedelii. Adſtringit, roborat, lumbricis, præſertim latis, adverſatur; utiliter datur cachecticis, & menſium vitiis laborantibus; ſpecifice laudatur ad vias lymphaticas iterum conſolidandas, in hydropicis, poſt aquarum evacuationem, ubi, pro ſingulis diebus, granum unum vitrioli martis, in pauxillo ſacchari, ex vino vel aqua, hora una ante prandium, præbere jubent, & per triginta vel quadraginta dies continuare ſuadent.

Doſis ſit parcior, ſufficiunt grana duo, vel tria.

VITRUM ANTIMONII HYACINTHINUM.

REC. Antimonii crudi pulveriſati, quantum lubet.

Calcinetur in patina terrea non vitreata, rutabulo vitreo, vel fiſtula tabaci Colonienſi, perpetuo, ne in grumos abeat, agitando, leniſſimo igne, donec fumare ceſſat; ſi forſan in grumos concreſcat, denuo pulveriſandum eſt Antimonium, atque iterum, ſub agitatione perpetua, in calcem gryſei coloris, quæ ſulphur non redolet, redigendum.

Calx hæc Antimonii crucibulo inditur, atque igne forti, in furno anemio, liquatur, &, ubi colorem pellucidum, hyacinthinum acqui-

acquisiverit, pauxillum Antimonii crudi, vel Sulphuris, adjicitur, & in pelvim vel laminam cupream effunditur.

Raro vel nunquam interno usu vitrum hoc præscribitur; consultius est, integra frusta unciæ uni, vel ad summum duabus cum dimidia unciis, vini vel cerevisiæ imponere per noctem, infusum hoc colatum propinare, unde vomitus satis frequens consequetur.

Ex vitro antimonii & tartari crystallis nonnulli parare solent tartarum emeticum, qui efficacior illo, e croco metallorum parato, creditur.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

REC. Æruginis uncias tres,
Mellis puri uncias octo,
Aceti Vini acerrimi uncias quatuor.

Ærugo in pulverem teritur, aceto diluitur, mellique permixta, lento igne, ad mellis consistentiam reducitur.

Vim habet desiccandi & mundificandi, septicam; hinc in ulceribus malignis, sinuosis & Sphacelo utiliter chirurgi adhibent; cum melle rosato mixtum gingivis putridis & ulcerosis conducit.

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

REC. Radicum Bryoniæ libras duas,
Cucumeris asinini libram unam,
Ebuli,
Filicis,
Ireos nostratis ana uncias tres,
Scillæ libram semis.
Tribulorum aquaticorum uncias duas.

Radices omnes recentes, concisæ & contusæ, cum tribulis macerentur, per octiduum, in
Olei olivarum libris sex,
postea lento igne coctis & expressis, addantur
Ceræ flavæ unciæ duodecim.
Colliquata & mixta colentur; fiat unguentum.

Confert lienosis, alvi obstructione & duritie laborantibus, hydropicis & œdematosis, tumoribus duris, scirrhosis.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

REC. Flor. & Herbar. Chamæmeli,
Rutæ ana uncias tres,
Rosarum,
Sambuci,
Betonicæ ana unciam unam semis,
Radicis Altheæ uncias duas,
Olei rosati libram unam semis.

Contundantur, & ad humiditatis exhalationem coquantur, postea colentur, & exprimantur. E colatura, cum
Alabastri puri, optime lævigati, unciis tribus,
&
Ceræ albæ unciis quinque.
Fiat unguentum.

Temporibus, fronti, spinæ dorsi, & plantis pedum illinitur, & lintea, illo imbuta, imponuntur; refrigerat, dolores mitigat, & somnum conciliat.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

REC. Axungiæ porcinæ libram unam,
Cerussæ Venetæ pulverisatæ uncias octo,
Camphoræ drachmas sex.
Misce.

Desiccat, refrigerat, & levioribus inflammationibus medetur. Cave vero, in erysipelate applices.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

REC. Axungiæ porcinæ libram unam,

Cerussæ albæ, subtilissime pulverisatæ, uncias octo.

Misceantur exacte, & agitentur pistillo ligneo.

Desiccat atque refrigerat; ad scabiem & reliqua cutis vitia, a sero acri enata, ut & ambusta conducit.

UNGUENTUM ALTHEÆ.

REC. Mucilaginis Radicum Altheæ libram unam,
Fœni græci,
Lini ana libram semis,
Butyri libras quatuor,
Ceræ libram unam,
Terebinthinæ uncias duas,
Resinæ uncias sex.

Mucilagines coquantur cum butyro, & cum aquosum consumtum fuerit, addatur
Pulveris radicum curcumæ uncia una;
denique cera & resina.

His liquatis & colatis, terebinthina admisceatur, unguentum servetur.

Usitatissimum ac celeberrimum hoc unguentum emollit, calefacit, & resolvit; commendatur in pleuritide, nephritide, retentione urinæ, ad mammarum tumores resolvendos, & membra rigida.

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

REC. Corticum mediorum succulentorum Sambuci,
Tiliæ ana unciam unam semis,
Succi Plantaginis recens expressi uncias duas,
Sempervivi majoris unciam unam,
Olei lini expressi uncias sex,
Sevi cervini unciam unam.

Bulliant leni igne, ad consumtionem humiditatis, oleo colato immisceantur exacte, in mortario plumbeo,
Cerussæ Venetæ, minutissime tritæ, ac Aquæ Rosarum lotæ, uncia una,
Sacchari drachmæ duæ,
Olei ovorum recens parati uncia semis.

Fiat, secundum artem, unguentum.

Ad ambusta, uti titulus docet, adhibetur; paregoricum & refrigerans est.

UNGUENTUM ANODINUM.

REC. Florum recent. Chamomillæ libras duas,
Malvæ,
Meliloti,
Verbasci,
Anethi,
Folior. recent. Hyoscyami ana unciam unam,
Radicum recent. Altheæ uncias duas,
Seminis Fœni græci,
Lini ana drachmas tres.

Flores, herbæ & radices recentes, cum seminibus probe contusis, macerentur in
Olei Olivarum libris duabus,
per diem & noctem, postea leni igne coquantur, ad humiditatis omnis consumtionem, in colatura colliqua
Ceræ flavæ recentis uncias quatuor.

Fiat sic, lege artis, unguentum.

Dolores a rigida fibrarum tensione mitigat, convenit in cephalalgia, & lumborum doloribus ex nephritide & febre.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

REC. Terebinthinæ,
Resinæ,
Ceræ citrinæ ana uncias duas,
Aristolochiæ longæ,
Thuris,
Bdellii,
Myrrhæ,
Galbani ana drachmas quatuor,

Opopanacis præparati,
Æruginis ana drachmas duas,
Lithargyrii unciam unam,
Olei communis libras tres.

Oleum cum Lithargyrio coquatur, lento igne, inter coctionem Aceti vini albi uncias duas addendo;

Postea immisceatur cera, cum resina, liquefacta & colata, atque his, ab igne remotis, & nonnihil refrigeratis, terebinthina ac reliqua in pulverem contrita addantur.

Fiat unguentum.

Mundificat, detergit, maturat & consolidat; utplurimum ad ulcerum curam adhibetur.

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

REC. Succi radicum Cyclaminis, vel, in ejus defectu, Bryoniæ libras tres, Cucumeris agrestis,
Butyri recentis ana libram unam,
Olei Olivarum libras duas,
Polypodii querni uncias sex,
Pulpæ Colocynthidis uncias quatuor.

Polypodium & Colocynthis, minutim incisa, contundantur cum succo; & macerentur per viginti quatuor horas; postea, additis oleo & butyro, coquantur, ad humiditatis consumtionem, exprimantur & colentur, in colatura dissolvantur
Ceræ flavæ unciæ quinque, refrigescant, & sub continua agitatione, pulverem e sequentibus insperge:
Pulveris Aloës epaticæ,
Baccarum Mezerei,
Colocynthidis, vel trochiscorum Alhandal,
Pulveris Scammonei,
Turbethi ana unciam unam,
Euphorbii drachmas septem,
Salis gemmæ,
Florum Chamomillæ,
Myrrhæ,
Piperis longi,
Zinziberis ana drachmas quatuor;
tandem adde
Fellis tauri, ad mellis consistentiam inspissati,
Sagapeni in aceto soluti ana unciam unam.

Exactissime uniantur, reponatur unguentum.

Ob multa, quæ ad hoc unguentum concinnandum accedunt, purgantia fortissima, abdomini illitum, alvum clausam reserandi virtutem accipit, tumores œdematosos discutit, aquas hydropicorum expellit, menses retentos & suppressos provocat, vermes, abdomini applicitum, expellit; sed cave, ne pueris delicatioribus, sub emplastri specie, imponas, euphorbium enim rubefaciendi vim habet, & excoriationem excitat.

Sufficit, inunxisse abdomini unguentum semel in die.

UNGUENTUM AUREUM.

REC. Olei communis libras duas semis,
Ceræ citrinæ libram semis,
Terebinthinæ uncias duas,
Colophonii,
Resinæ pini ana unciam semis.

Lento igne colliquatis, colatis, & nonnihil refrigeratis, inspergantur
Pulveris Mastiches,
Thuris ana uncia una,
Croci drachma una.

Misce, fiat unguentum.

Vulnerarium est, & per excellentiam vocatur aureum, conducit in vulneribus, ubi nulla adest inflammatio, & præsertim membranosarum & nervearum partium vulneribus sanandis inservit.

UNGUENTUM BASILICUM.

REC. Ceræ flavæ,
Sevi arietini,
Resinæ pini,
Picis navalis,
Terebinthinæ ana uncias tres,
Olei communis olivarum libram unam.

Fundantur, lento igne, cera, sevum, resina & pix cum oleo, quibus liquatis additur terebinthina, & per stupam colatis, adde
Pulveris Olibani unciam unam semis.

Misce.

Digerit, maturat, suppurationem promovet.

UNGUENTUM CALENDULÆ FLORUM.

REC. Florum Calendulæ recentium, excerptorum, uncias quatuor,
Butyri recentis, non saliti, libram unam.

Incisi flores coquantur cum butyro, ad humiditatis consumtionem, expressum, & colatum unguentum reponatur.

Emolliente & discutiente vi pollet, tumores mammarum lactantium resolvit, & a mulierculis ad ambusta, aliasve leves inflammationes adhibetur.

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

REC. Florum recent. Chamomillæ uncias tres,
Meliloti,
Herbarum rec. Abrotani,
Hederæ terrestris,
Rutæ,
Herbarum rec. Menthæ crispæ,
Tanaceti ana unciam unam.

Contusis & conquassatis addatur
Olei Olivarum,
Adipis porcini recentis ana libra una.

Macerentur per dies aliquot, dein leniter ebulliant, ad humiditatis consumtionem, exprimantur & colentur, adde
Ceræ citrinæ uncias duas,
Olei destillati Anisi,
Carvi,
Menthæ ana drachmam unam,
Lauri expressi uncias duas.

Misce pro unguento.

In colica, torminibus infantum & flatulentia, distensione abdominis, utiliter abdomini illinitur.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

REC. Radicum Altheæ recentium,
Liliorum alborum ana uncias duas,
Herbarum Parietariæ,
Malvæ,
Mercurialis ana unciam unam semis,
Altheæ,
Violariæ,
Florum Chamæmeli,
Meliloti, omnium recentium, ana unciam unam.

Coquantur in
Butyri recentis, non saliti, libris duabus,
ad humiditatis consumtionem,
exprimantur & colentur.

Abdomini illitum alvum emollit, & clysteribus, eodem scopo, additur ad unciam semis, usque ad uncias tres.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

REC. Corticum mediorum Glandium, Castanearum, Quercus arboris junioris,
Baccarum Myrti,
Gallarum,
Acinorum uvarum,
Calicum glandium,
Sorborum immaturorum ficcorum,
Mespilorum acerborum siccatorum,
Foliorum Plantaginis,
Quercus,
Equiseti,
Pruni silvestris,
Radicis Tormentillæ ana unciam unam semis.

Contundantur aliquantulum, coquantur in
Aquæ fontanæ
&
Vini rubri ana libra una, donec media pars consumta fuerit.

Colatura ulterius coquatur, cum
Olei Myrtillorum libra una semis, ad humiditatis aquosæ consumtionem; postea in ea dissolvantur
Ceræ novæ unciæ octo semis; ab igne repositis addatur
Olei mastichini libra una semis, atque inspergatur sequentium tenuissimus pulvis:

REC. Corticum Quercus arboris unciam unam,
Sanguinis Draconis,
Nucis Moschatæ,
Gallarum,
Succi hypocistidis,
Baccarum myrti,
Acinorum uvarum,
Sorborum immaturorum ana unciam semis,
Trochiscorum de carabe uncias duas.

Misce, fiat unguentum.

Unguentum hoc e meris adstringentibus & siccantibus paratum, laudatur ad abortum prohibendum, uteri, alvi & renum laxitatem, ad hernias, ani & uteri procidentias.

Applicatur lumbis, abdomini & femoribus, vel illinendo, vel linteis illitum imponendo.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

REC. Terebinthinæ Venetæ libram semis,
solve ac misce cum
Vitellis ovorum, numero quatuor,
adde
Olei Hyperici unciam unam semis,
Pulveris Olibani,
Myrrhæ ana drachmas tres.

Misce.

Digerit & suppurationem promovet, in vulneribus ac abscessibus.

UNGUENTUM DIGITALIS.

REC. Florum digitalis purpureæ vulgaris uncias quatuor,
Adipis Suillæ libram unam.

Macerentur per aliquot dies, postea coquantur lento igne ad humiditatis consumtionem, coletur & servetur in vase vitreo unguentum.

Commendatur ad ulcera scrophulosa humida, pure manantia. De digitali, Itali dicere solent: Aralda tutte le piaghe salda. *h. e. Digitalis sanat omnia vulnera.*

UNGUENTUM ENULATUM.

REC. Radicum Enulæ recentium libram unam,
Pinguedinis porcinæ libram semis,

Olei

Olei Olivarum puriſſimi uncias quatuor.

Pinſantur in mortario lapideo, coquantur leni igne, ad humiditatis conſumtionem, éxprimantur & colentur; colaturæ adde

Ceræ flavæ,

Terebinthinæ puræ ana unciam unam.

Optime commixta fiant unguentum.

Laudatur ad ſcabiem & tineam, & bono cum effectu adhibetur, ubi mercurio & metallicis præparatis mixta unguenta locum non habent.

UNGUENTUM FUSCUM.

REC. Olei communis libram unam ſemis,

in quo diſſolve

Ceræ flavæ recentis uncias quatuor,

Colophonii,

Picis navalis ana uncias duas,

Maſtiches electæ,

Terebinthinæ ana unciam unam.

Colentur, atque colaturæ refrigeratæ admiſce

Gummi Galbani,

Sagapeni,

Thuris electi ana unciam unam,

Ariſtolochiæ rotundæ unciam ſemis.

Miſce, fiat unguentum.

Eſt vulnerarium, emolliens, & mundificans; digerit & carnem generat.

UNGUENTUM DE HYOSCYAMO.

REC. Foliorum Hyoſcyami recentium libram unam.

Contundantur cum

Axungiæ porcinæ unciis decem;

coquantur ad humiditatis conſumtionem, exprimantur & expreſſo addantur

Olei Hyoſcyami, e ſemine expreſſi, unciæ duæ.

Mixta ſerventur.

Anodinum eſt, & egregium emolliens; cum unguento linariæ, hæmorrhoidum dolores ſedat.

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

REC. Olei roſati libram unam,

Ceræ albæ uncias tres.

Cera liquetur, & oleo permiſceatur, ut fiat unguentum.

Nephriticis & hecticis, dorſo & renum regioni inunctum commendatur.

UNGUENTUM DE LINARIA.

REC. Herbæ Linariæ, cum floribus,

Pinguedinis porcinæ ana libram unam.

Contundantur, coquantur ad humiditatis conſumtionem, & exprimantur.

Specificum creditur eſſe ad hæmorrhoides dolentes, quibus plumaceolo, vitello ovi mixtum, applicatur.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

REC. Radicum Liquiritiæ recentis & ſucculentæ, inciſarum,

Butyri recentis ana libram unam.

Pinſantur ſimul in mortario, poſtea frigantur in ſartagine, ad humiditatis conſumtionem, & prelo exprimantur, expreſſo adde

Pompholygos drachmas ſex,

Ceruſſæ ſubtiliſſime tritæ uncias tres,

Camphoræ ſcrupulos duos.

Fiat unguentum.

Inflammationes partium leviores, vel potius excoriationes, a ſero ſalſo productas, ut & fiſſuras papillarum in mammis lactantium, ſanat.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO.

REC. Lithargyrii libram ſemis,

Ceruſſæ unciam unam ſemis,

Aceti libram ſemis,
Olei roſati libram unam.

Fiat in mortario plumbeo, optime agitando, unguentum.

Epuloticum & ſarcoticum eſt, adverſus ſcabiem, pruritum & alia cutis vitia, utiliter adhibetur.

UNGUENTUM MALVÆ.

REC. Herbæ Malvæ recentis libram unam ſemis,
Butyri recentis libras duas.

Contundantur inſimul, & coquantur leni igne, ad humiditatis conſumtionem, colentur cum expreſſione, & unguentum ad uſum reponatur.

Cum Unguento Clyſmatico convenit, & eisdem uſibus inſervit.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

REC. Herbæ recentis Majoranæ,
Butyri recentis ana libram unam.

Contuſa & probe mixta coquantur leniſſimo igne, ad humiditatis exhalationem, exprimantur & colentur, colaturæ adde
Olei deſtillati Majoranæ guttas triginta.

In narium infantum obſtructione, a muco viſcido, expetitur; loco unguenti carminativi etiam abdomini illini poteſt.

UNGUENTUM MARTIATUM.

REC. Foliorum Lauri recentium libram unam,
Rutæ hortenſis uncias decem,
Majoranæ uncias octo,
Rorismarini uncias ſex,
Myrti veræ,
Ebuli,
Menthæ,
Baſilici ana uncias duas.

Herbæ & folia recentia, minutim inciſa, macerentur in
Vini albi libra dimidia, &
Olei Olivarum libris duabus, per aliquot dies digeſtis adde
Butyri recentis,
Axungiæ Urſi,
Gallinæ,
Medullæ Cervi ana unciam unam ſemis.

Coquantur leniſſimo igne, ad humiditatis conſumtionem, colentur & exprimantur; in expreſſo diſſolvantur
Ceræ flavæ unciæ quindecim,
refrigerato unguento admiſceantur
Styracis drachmæ decem,
Maſtiches uncia una,
Thuris drachmæ quinque,
omnia in ſubtilem pulverem trita.

Cum unguento nervino convenit, & ad nervorum reſolutionem, tumores a cauſa frigida ortos, infantum tormina & hydropem commendari ſolet.

UNGUENTUM DE MINIO CAMPHORATUM.

REC. Olei roſati libram unam ſemis,
Lithargyrii uncias duas,
Minii uncias tres,
Ceruſſæ unciam unam ſemis,
Tutiæ præparatæ,
Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ albæ uncias duas.

Liquatam lento igne ceram, oleum, & reliqua tenuiſſime trita additis,
Aceti deſtillati unciis tribus,
commiſce, ſub finem addendo camphoram ſpiritu vini ſolutam.

Refrigerantis & exſiccantis virtutis eſt, & ad ulcera, quæ ob humorum acrimoniam ſerpunt, conducit, & ambuſtis medetur.

UNGUENTUM MUNDIFICANS STAHLII.

REC. Mercurii vivi,
Saturni ana unciam unam.

Fluat

Fluat plumbum in tigillo, cui adde mercurium, & ſpatula agita, quo uniantur, & fiat amalgama, quod, cum

Terræ tripolitanæ uncia una,

ſubtiliſſime teratur. Qui pulvis

Unguenti albi camphorati unciis octo

optime permiſceatur.

Ad efflorescentias cutis ſcabioſas, præſertim ſiccas & pruriginoſas, præmiſſis præmittendis, utile eſt, ſi vel immediate loco affecto inducatur, vel articulationibus manuum & brachiorum ſubinde affricetur.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM.

REC. Mercurii crudi uncias quatuor,

Terebinthinæ claræ unciam unam ſemis.

Probe miſceantur, ut Mercurius extinguatur, adde

Axungiæ porcinæ lotæ uncias decem,

Olei Spicæ drachmam unam.

Uſus eſt in lue venerea, ad ſalivationem excitandam; modus applicandi e practicorum libris petendus.

UNGUENTUM NERVINUM.

REC. Herbarum Salviæ,
Chamæpytis,
Majoranæ,
Rorismarini,
Menthæ,
Rutæ,
Lavendulæ,
Hyperici,
Paralyſeos, cum flore,
Florum Chamæmeli,
Meliloti,
Hyperici,
Summitatum Anethi,
Baccarum Lauri,
Juniperi viridium ana drachmts ſex.

Inciſa & contuſa macerentur in Olei Olivarum libra una, per aliquot dies; poſtea lento igne, ad humiditatis conſumtionem, coquantur, exprimantur & colentur. Colaturæ adde

Terebinthinæ Venetæ uncias duas,

Ceræ citrinæ uncias quatuor & ſemis,

Olei Terebinthinæ unciam unam,

Lumbricorum cocti,

Laurini ana uncias duas,

Benzoës, in unciis tribus ſpiritus vini rectificatiſſimi ſoluti, unciam unam.

Fiat unguentum.

Ad frigidos nervorum affectus, paralyſin & ſimiles commendatur.

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

REC. Foliorum Nicotianæ libras duas,

Succi Nicotianæ libram ſemis,

Axungiæ vel pinguedinis porci libram unam.

Herba inciſa & contuſa, cum ſucco & adipe ſuillo, per noctem macerentur; mane lento igne, ad humiditatis conſumtionem, coquantur, exprimantur, & colentur, addantur

Reſinæ unciæ duæ,

Ceræ uncia una,

Ariſtolochiæ rotundæ, ſubtiliſſime tritæ, unciæ duæ.

Fiat unguentum.

Auctor Laurentius Joubertus miram huic unguento, in ſcrophulis diſſipandis, vim adſcribit; laudatur etiam ad ulcera, ad morphæam & tineam capitis; cutim a ſcabie ſanat.

UNGUENTUM NIHILI AD OCULOS.

REC. Tutiæ præparatæ,

Nihili albi ana unciam unam,

Coralliorum rubrorum præparatorum,

Matris perlarum ana unciam ſemis,
Camphoræ drachmam unam,
Pinguedinis porcinæ mundatæ libram unam.

Fiat miſcendo unguentum.

Ad ophthalmiam, a ſero acri ſalſo, & dolores inde natos, conducit.

UNGUENTUM PECTORALE.

REC. Olei Amygdalarum dulcium uncias quatuor,
Chamæmelini,
Violati ana uncias tres,
Butyri recentis uncias ſex,
Pinguedinis Gallinæ,
Anatis ana uncias duas,
Ireos Florentinæ drachmas duas,
Croci drachmam ſemis,
Ceræ albæ uncias tres.

Cera & pinguedine in oleis liquatis, poſtea addito Ireos & croci pulvere, fiat unguentum.

Commendatur in pleuritide, ad tuſſim & difficilem reſpirationem infantum.

UNGUENTUM PEDICULORUM.

REC. Seminis Staphidis agriæ uncias duas,
Hellebori albi unciam unam,
Argenti vivi uncias duas,
Pinguedinis porcinæ libras tres,
Olei laurini uncias ſex,
Saponis Veneti uncias tres.

Sapo in lixivio ſolutus, cum pinguedine coquatur, ad humiditatis aquoſæ conſumtionem, poſtea oleum Laurinum & pulveres, tandem Mercurius cum
Terebinthinæ Venetæ uncia una, extinctus
addatur.

Fiat unguentum.

Uſum titulus indicat.

UNGUENTUM ſive POMATUM FLORUM NAPHÆ, PHARM. PARIS.

REC. Adipis ſuilli, puri, libras quinque,
Florum Aurantiorum recentium & integrorum, libras ſex,

Indantur fictili vaſi, probe vitreato, atque Balneo Mariæ per unam aut alteram horam, ad digeſtionem, commitantur. Exprimantur, &c, ut cito citius refrigeſcant, & adeps concreſcat, in cellam reponantur.

Repetatur proceſſus tertia vice, adipi recentes flores addendo; ultima tamen unciæ quatuor florum ſufficiunt. Tandem fæces ab unguento, vel pomato ſeparentur, & aquæ florum Naphæ fragrantiſſimæ unciæ octo addantur, liquatum cum aqua unguentum ſupernatans, caute ſeparetur, atque ab omni humiditate liberum, reponatur.

Pari methodo ex aliis floribus odoratis, Jaſmino, Lavendula, Roſis &c. unguenta fragrantia parari poſſunt.

Uſus omnibus eſt notus, coſmeticus, & ad capillamenta & capillos inungendos.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

REC. Olei Roſarum uncias ſex,
Ceræ albæ,
Succi baccarum Solani ana uncias quatuor,
Ceruſſæ optime tritæ uncias duas,
Plumbi uſti,
Pompholygos, ſive Nihili albi,
Thuris electi ana unciam unam.

Oleum roſarum, cum ſucco baccarum ſolani, ad humiditatis conſumtionem, coquitur, & in colatura cera diſſolvitur, quibus refrigeratis, reliqua, in ſubtiliſſimum pollinem trita, admiſcentur.

Commendatur ad ulcera exſiccanda at-

que consolidanda. A nonnullis etiam ad ophthalmiam adhiberi solet.

UNGUENTUM POPULEUM.

REC. Oculorum, sive gemmarum Populi arboris recentium libram unam semis,
Pinguedinis porcinæ depuratæ libras quatuor.

Oculi contundantur & macerentur in pinguedine, donec sequentes herbæ per æstatem colligi queant, scilicet
Cymarum rubi tenerrimarum,
Foliorum Papaveris albi,
Hyoscyami,
Bardanæ, cum radicibus,
Solani,
Lactucæ,
Herbarum Violariæ ana uncias tres,
Sempervivi majoris uncias quatuor,
Sempervivi minoris uncias tres.

Herbæ contundantur, & misceantur cum Oculis Populi & pinguedine, deinde coquantur lento igne, ad humiditatis aqueæ consumtionem, colentur & exprimantur.

Est paregoricum, refrigerans & emolliens; commendatur ad hæmorrhoidum dolores, ambusta, lac in mammis coagulatum dissolvendum, linteis impositum, & in febribus, si temporibus, plantis pedum & pulsibus manuum applicetur, somnum conciliare perhibent.

UNGUENTUM PURPUREUM WURZII.

REC. Terræ Vitrioli dulcis uncias duas,
Viridis Æris drachmas decem,
Aceti vini,
in quo
Radices Scrophulariæ,
Folia Plantaginis, &
Chelidonii majoris, recentia, singulorum drachmæ tres,
per aliquot dies macerata, ac postea expressa fuerint, uncias quinque,
Mellis despumati uncias octo.

Inspissentur leni igne, continuo agitando, ad mellis consistentiam.

Convenit cum Ægyptiaco unguento; commendatur ad gangrænam & sphacelum, ulcera putrida sinuosa, & carnem luxuriantem auferendam.

UNGUENTUM RESUMTIVUM.

REC. Seminum Lini,
Altheæ,
Fœni græci,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ ana drachmas duas.

Macerentur & bulliant in
Aquæ simplicis libra semis,
eliciatur mucilago, quæ cum
Butyri recentis libra dimidia,
Pinguedinis suillæ,
Gallinæ,
Anseris,
Anatis ana unciis duabus,
coquantur, ad humiditatis aquosæ consumtionem, postea addantur
Sevi hircini uncia semis,
Olei Violarum,
Chamæmeli,
Amygdalarum dulcium ana unciæ duæ,
Medullæ vituli libra semis.

Fiat secundum artem unguentum.

Hecticis, pleuriticis & tabidis, e longo morbo resurgentibus, membris a luxatione, vulneratione & fractura rigidis conducit.

UNGUENTUM ROSATUM.

REC. Axungiæ porcinæ albissimæ libram unam.

Lavetur aliquoties Aqua rosarum fragrantissima, adde
Florum rosarum albarum, contusarum, uncias quindecim;

coque lento igne, ad humiditatis consumtionem, colentur & addantur

Olei rosarum veri destillati grana tria.

Misce.

Ad hæmorrhoidum dolores, & unguento infrigidanti & anodyno substitui potest.

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

REC. Axungiæ porci albissimæ libram unam.

Lavetur sæpius aqua rosarum odoratissima, donec albissimum & odoratum fuerit unguentum; adde

Olei ligni Rhodii guttas duodecim.

Usus est ad capillos & capillamenta inungenda, quo pulvis ex amylo facilius adhæreat.

UNGUENTUM RUBRUM, AD LABIA ORIS.

REC. Radicum Alkannæ unciam unam semis,

Ceræ albæ drachmas sex,

Olei amygdalarum dulcium recens expressi, uncias duas,

Vini rubri uncias tres.

Radices minutim incisæ in vino rubro macerentur, his adde oleum amygdalarum, & lenissimo igne, ad humiditatis consumtionem, in vase terreo vitreato coquantur; addatur sub finem cera alba, exprimantur, & in aquam rosarum effundantur. Refrigerata denuo, lenissimo igne liquentur,

Olei cinnamomi guttæ decem

addantur, & in capsulas papyraceas, sicut ceratum citrinum, effusa, in vitro probe clauso serventur.

Ad fissuras labiorum a calore nimio interno, vel a frigore ortas, muliercula utuntur, & nocte, ante cubitum, labia oris eo illinunt.

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

REC. Radicum Alkannæ libram unam,

Vini rubri odorati libram semis.

Macerentur per dies aliquot, loco frigido, cum

Butyri majalis recentis, non saliti, libris sex.

Coquantur leni igne, ad consumtionem humiditatis, colentur & exprimantur.

Commendatur iis, qui ex alto ceciderunt, sanguinem spuentibus, & tussi ferina vexatis, atque ad sanguinem intus coagulatum, a contusione, resolvendum. Datur ad unciam unam, cum jusculo & cerevisia, calidis.

UNGUENTUM SANDALINUM.

REC. Sandali albi,

citrini ana drachmas sex,

rubri drachmas decem,

Florum Papaveris erratici recentium unciam unam semis,

Rosarum rubrarum recentium uncias duas semis.

Macerentur in

Olei rosacei libra una,

Vini albi unciis quatuor, per biduum; postea, ad consumtionem humiditatis, leni igne coquantur, exprimantur & colentur. Expressis adde

Boli Armenæ, in pulverem subtilissimum tritæ,

Ceræ albæ uncias tres,

Camphoræ drachmas duas.

Fiat unguentum.

Virtute gaudet refrigerante & roborante; hepati & lieni a veteribus dicatum est.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

REC. Terebinthinæ, in Aqua rosarum lotæ, uncias duas semis;

Solvantur

Vitellis ovorum numero tribus,

adde

adde
Butyri recentis uncias ſex,
Olei laurini unciam unam,
Styracis liquidæ unciam ſemis,
Mercurii præcipitati albi drachmas duas,
Ceruſſæ Venetæ optime pulveriſatæ, unciam unam.
Miſce exacte, ut fiat unguentum.

Uſum titulus indicat. Inungantur hoc unguento vel articulationes in brachiis, manibus & pedibus, vel puſtulæ ſcabioſæ ipſæ; ſufficit pro una vice drachmam omnibus inungere.

UNGUENTUM AD SCABIEM ZELLERI.

REC. Unguenti roſati uncias tres ſemis,
Mercurii præcipitati albi unciam ſemis.
Miſce.

Proxime antecedentis uſum & vires æquat, odore vero gratius eſt.

UNGUENTUM SOMNIFERUM.

REC. Unguenti alabaſtrini,
roſati ana unciam ſemis,
populei uncias duas,
Olei Hyoſcyami drachmas quatuor,
Nuciſtæ expreſſi drachmam unam ſemis,
Opii Thebaici, in Aqua roſarum ſoluti, drachmam unam,
Croci Orientalis drachmam ſemis,
Ceræ albæ unciam ſemis.
Fiat unguentum.

Vires hujus unguenti titulus docet; temporibus & carpis, non ſine fructu, linteis applicatur.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

REC. Radicum Filicis,
Ari, cum herba, ana uncias duas,
Foliorum Aſari,
Hyoſcyami,
Cicutæ,
Naſturtii aquatici ana unciam unam ſemis,
Nicotianæ drachmas tres,
Florum Chamomillæ,
Hyperici,
Geniſtæ,
Sambuci ana unciam unam.
Omnia contuſa macerentur cum
Axungiæ ſuillæ libra una ſemis, poſtea coquantur lento igne, ad humiditatis conſumtionem; expreſſo colato adde
Ceræ citrinæ unciam unam ſemis,
refrigeratis adjunge
Gummi Ammoniaci,
Galbani ſubtiliſſime pulveriſati ana drachmas ſex,
Olei deſtillati Cymini,
Anethi,
Ceræ ana drachmam unam.
Reponantur ad uſum.

Utiliter adhibetur ad inflationes abdominis, duritiem & infarctum lienis & epatis, prodeſt hypochondriacis, ictericis, & flatibus vexatis; Hypochondria, lumbi & totum abdomen, hoc unguento inungi debent.

UNGUENTUM STOMACHALE.

REC. Herbæ Abſinthii,
Menthæ,
Salviæ ana uncias duas,
Florum roſarum unciam unam,
Olei olivarum uncias decem.
Herbæ & flores, recenter conquaſſati, coquantur lento igne, ad humidi exhalationem, exprimantur, in expreſſo diſſolvantur
Ceræ citrinæ unciæ duæ.
Miſceantur exacte; refrigeratis adde
Styracis liquidæ unciam unam,
Olei deſtill. Menthæ,
Caryophyllorum,
Abſinthii ana ſcrupulum unum.
Serventur.

Illinitur externe ventriculo & abdomini, ad vomitus & diarrhœas compeſcendos, ubi inſimul effectum carminativum præſtat.

UNGUENTUM AD TABIDA MEMBRA.

REC. Olei Laurini uncias tres,
Juniperi,
Laterini, ſive Philoſophorum,
Caſtorei,
Spicæ,
Petræ rubri ana unciam ſemis,
Axungiæ Caponis,
Cati ſilveſtris,
Anatis,
Anſeris ana unciam unam,
Hominis unciam unam ſemis,

Pulveris Euphorbii unciam ſemis,
Aluminis plumoſi,
Herbæ ſabinæ ana drachmas duas,
Saponis Veneti,
Spiritus Vini rectificati ana uncias tres.

Fiat, ſaponem in ſpiritu vini ſolvendo, & cum reliquis commiſcendo, unguentum.

Ad ariduram partium, e cauſa frigida, commendatur; prodeſt paralyticis.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

REC. Radicum Filicis,
Bryoniæ,
Allii ana unciam unam ſemis,
Herbarum Abrotani,
Abſinthii,
Tanaceti ana drachmas duas,
Butyri recentis libram unam.

Contuſa coquantur lento igne, ſub perpetua agitatione, ad humiditatis conſumtionem. Exprimantur, in expreſſo diſſolve
Ceræ flavæ unciam unam ſemis,
refrigeſcant; refrigeratis inſperge
Pulveris Aloës epaticæ unciam unam,
trochiſcorum alhandal unciam ſemis;
probe ſubactis adde
Fellis tauri, ad mellis conſiſtentiam inſpiſſati, uncias duas.
Serventur.

Abdomini inunctum, vel linteis applicitum, vermes enecat, expellit, & alvum laxat.

UNGUENTUM VIRIDE POTABILE.

REC. Herbarum recent. Abrotani,
Artemiſiæ,
Bellidis,
Betonicæ,
Fœniculi,
Hyſſopi,
Menthæ,
Matriſilvæ,
Millefolii,
Majoranæ,
Plantaginis,
Veronicæ,
Herbarum recent. Verbenæ,
Salviæ,
Rutæ ana unciam unam.
Baccarum juniperi viridium uncias tres,
Butyri recentis, non ſaliti, libras tres.

Inciſa & contuſa miſceantur & coquantur cum butyro, leni igne, ad humiditatis evaporationem, exprimantur & colentur.

Tam externus, quam internus ejus eſt uſus; datur ex alto lapſis, parturientibus & vulneratis, cochlear unum aut alterum, cum juſculo; externe ad ſugillationes, & leniendos partium dolores, adhibetur.

UNGUENTUM DE UVIS.

REC. Succi uvarum nigrarum minorum,
Aquæ roſarum fragrantis,
Butyri recentis ana uncias ſedecim,
Ceræ flavæ odoratæ uncias quatuor.

Coquantur lento igne, in vaſe figulino, ſpumam ſub coctura, cochleari ligneo, ſemper auferendo, donec ſpumare deſierit; effundantur refrigerata. Unguentum, ab adhærentibus fecibus mundatum, denuo leniſſimo igne liquetur, atque in patinas, vel vaſa porcellana, antea aqua roſarum humectata, effundatur. Refrigeratum inter chartas in ſcatula, loco frigido, ſervetur.

Refrigerat & leniter adſtringit; ad fiſſuras labiorum oris, mammarum papillas, hæmorrhoides & intertrigines adhibetur.

UNGULA ALCIS PRÆPARATA.

Lima in ſcobem, & poſt in alcohol redigitur.

Pro ſpecifico antepileptico habetur, & fere omnibus pulveribus antepilepticis admiſcetur.

Doſis grana quindecim ad viginti quinque.

UNICORNU MARINUM PRÆPARATUM.

Lima in ſcobem redactum in pulverem ſubtiliſſimum teritur.

Cordiale, antiſpaſmodicum, nervinum prædicatur.

Doſis ſcrupulus ſemis ad drachmam ſemis.

FINIS.

I.

INDEX
SIMPLICIUM ET COMPOSITORUM,
QUÆ
TAM IN PRIORI
QUAM
IN POSTERIORI PARTE
PHARMACOPOEÆ WIRTENBERGICÆ
CONTINENTUR.

NB. Lit. b. partem posteriorem denotat.

Abelmosch. 71
Acaciæ Ægyptiacæ succus. 118
Germanicæ fructus. 84
succus. 118
Acetum bezoardicum. b. 3
Sylvii. b. 22
destillatum. b. 4
Lavendulæ. b. 3
Lithargyrii. b. 3
odoratum. b. 3
Papaveris. b. 3
Rosarum. b. 3
Rutæ. b. 3
Sambuci. b. 3
saturninum. b. 3
scilliticum. b. 4
Tunicæ. b. 3
Vini destillatum. b. 4
Acmella Zeylanica. 43
Ægagropilæ. 125
Ærugo, f. Æs viride. 16
Æs viride crystallisatum. b. 4
ustum. b. 4
Æthiops antimonialis. b. 4
mineralis. b. 4
Aëtites. 7
Agallochum. vid. Lignum.
Agaricus crudus. 123
mineralis. vid. Lac Lunæ.
trochiscatus. b. 5
Alabastrum. 5
Album græcum. 125
Alcis cornu. 125
philosophice ppt. b. 5
ungula. 125
Alkekengi. 84
Aloë caballina. 118
depurata. b. 5
epatica. 118
insuccata. b. 5
lota. b. 5
rosata. b. 5
Soccotrina. 119
violata. b. 5
Alumen crudum vulgare. 5
plumosum. 7
rupeum. 5
Romanum. 5
saccharinum. b. 6
scissile. 7
ustum. b. 6
Ambra grisea. 16
liquida. 115
nigra. 133
Amethystus. vid. Lapis.
Amianthus. 8
Amomum. vid. Semen.
Ammoniacum. vid. Gummi.
Amygdalæ amaræ. 84
dulces. 84
Anacardium. 84
Anatron. 13
Anima Rhabarbari. b. 212
Anisum laxativum. b. 37
stellatum. vid. Semen.
vulgare. vid. Semen.
Anthora. vid. Radix.
Antihecticum Poterii. b. 6
Antimonium crudum. 11
diaphor. martiale. b. 7
simplex. b. 7
Antimonii Butyrum. b. 6
clyssus. b. 6

Antimonii Minera. 11
Antophylli. 93
Apalachine. 139
Apri dentes. 125
Aqua acoviſtica. b. 9
Anhaltina. b. 9
anthyſterica meliſſæ. b. 20
anti-melancholica. b. 20
anti-ſcorbutica temperata. b. 10
apoplect. ſpirituoſa. b. 10
minus ſpirit. b. 10
aſthmatica. b. 11
balſamica ad gonor. Riveri. b. 11
benedicta Serpilli. b. 11
calcis vivæ. b. 11
caponis. b. 12
carbunculi. b. 12
carminativa ordin. b. 12
ſpirituoſa. b. 12
per infuſionem. b. 13
caryophyllorum aromat. b. 13
cephalica Caroli V. b. 13
cinnamomi bugloſſata. b. 14
cordialis. b. 14
cydoniata. b. 14
ſpirituoſa. b. 14
cum vino. b. 14
ſine vino. b. 14
confortativa, ſ. perlata. b. 14
cordialis frigida. b. 15
temperata. b. 15
cornu cervi citrata. b. 15
e corde Cervi. b. 15
cort. aurantior. cum Vino. b. 15
deſtillatæ ſimplices. b. 7. & ſq.
diuretica e nucleis. b. 16
embryonum ordinaria. b. 16
correctior. b. 17
epidemica Londinenſis. b. 17
epileptica Langii. b. 17
florum omnium. b. 18
fortis. b. 18
ad gonorrhœam Hoffmañi. b. 18
Riverii. b. 11
griſea. b. 18
hirundinum cum caſtoreo. b. 18
ſine caſtoreo. b. 18
hungarica. b. 19
hyſterica. b. 19
immortalis. vid. Aq.
carminat. per infuſionem. 13
laxativa Vienn. b. 96
ligni Saſſafras compoſita. b. 19
liliorum convallium c. vino. b. 19
Looch ſani & experti. b. 19
magnanimitatis. b. 20
maſtichina. b. 20
anti-melancholica. b. 20
meliſſæ anthyſterica. b. 20
ſpirituoſa compoſ. b. 21
Aqua meliſſæ cum vino. b. 20
mercurialis externa. b. 21
myrrhæ. b. 21
odorifera. b. 21
ophthalmica ſapphirea. b. 22
panis. b. 22
perlarum confort. b. 14
phagedænica. b. 22
phyſagoga. b. 22
prophylactica. b. 22
Reginæ Hungariæ. b. 19
Regis. b. 23
Salviæ compoſita. b. 23
ſapphirea. b. 22. 23
Spermatis ranarum. b. 23
ſplenetica. b. 23
ſtomachica. b. 23
theriacalis compoſita. b. 23
ſimplex. b. 24
typhorum cervi compoſita. b. 24
ſimplex. b. 24
Veronicæ cum vino. b. 24
viſceralis Mauchardi. b. 24
vitæ mulierum. b. 17. 25
vulneraria ſpirituoſa. b. 25
vinoſa. b. 25
Zedoariæ aniſata. b. 26
ſimplex. b. 26
Arcanum corallinum. b. 26
duplicatum. b. 26
Tartari. b. 27
Argentum foliatum. 11
vivum. 12
Aroph Paracelſi. b. 209
Arſenicum album. 12
citrinum, ſ. flavum. 12
rubrum. 12
Asbeſtus. 8
Aſelli, ſive millepedes. 125
Aſphaltum. 17
Aſa dulcis. vid. Gummi.
fœtida. vid. ibid.
Auripigmentum. 12
Aurum foliatum. 12
fulminans. b. 27
Axungia Anatis. 136
Anguillæ. 136
Anſeris. 136
Ardeæ. 136
Aſchiæ. 137
Canis. 137
Caponis. 137
Caſtorei. 137
Caſtoris. 137
Cati ſylveſtris. 137
Ciconiæ. 137
Coturnicis. 137
Cuniculi. 137
Equi. 137
Gallinæ. 137
Hominis. 137

Axungia Leporis. 137
Lucii piſcis. 137
Lupi. 137
Muris montani. 137
Porci. 137
Serpentum. 137
Taxi. 137
Viperarum. 137
Urſi. 137
Vulpis. 137

Baccæ Alkekengi. 84
Berberum. 85
Ebuli. 88
Halicacabi. 84
Hederæ arboreæ. 89
Juniperi. 89
Lauri. 89
Myrti. 90
Myrtillorum. 90
Paridis. 90
Sambuci. 91
Sorbi torminalis. 91
Spinæ cervinæ. 92
Bacilli ad fornacem. b. 28. 106
de Liquiritia albi. b. 28
citrini. b. 28
Balauſtia. vid. Flores.
Balſamum apoplecticum. b. 28
Arcæi. b. 28
Canadenſe. 115
Caryophyllorum. b. 29
cephalicum Saxonicum. b. 29
Cinnamomi. b. 29
Comendatoris de Perne. b. 29
Copaivæ. 115
Embryonum ordin. b. 16. 29
correct. b. 17
Indicum album. 116
nigrum. 116
ſiccum. 116
Lavendulæ. b. 29
Locatelli. b. 30
magicum Pfortzheim. b. 30
Majoranæ. b. 30
de Meccha. 116
Nuciſtæ. b. 30
Odontalgicum. b. 30
Orientale verum. 116
Peruvianum liquid. 116
ſiccum. 116
Rackaſira. 143
Rutæ. b. 31
ſomniferum. b. 31
ſtomachicum. b. 31
ſuccini. b. 31
ſulphuris amygdalat. b. 31
aniſatum. b. 31
Rulandi. b. 31
ſuccinatum. b. 31
terebinth. b. 31
Balſamum Tolutanum. 117
Vitæ Hoffmanni. b. 32
vulnerarium Dippel. b. 32. 102
liquid. b. 32
Minderer. b. 32
Baniglia. vid. Vainiglia.
Batrachites. 8
Been. 85
Belemnites. 9
Benzoë. vid. Gummi.
Berberes conditæ. b. 36
exſiccatæ. 85
Bezetta cœrulea. vid. Torna ſolis.
rubra. vid. ibid.
Bezoar Coromandel. 142
Occidentalis. 126
Orientalis. 126
Bezoardicum animale. b. 32
joviale. b. 32
martiale. b. 33
minerale. b. 33
Biſmuthum. vid. Marcaſita.
Bitumen Judaicum. 17
Blatta Byzantina. 18
Boletus cervinus. 123
Bolus alba. 3
Armena. 3
præparata. b. 33
rubra vulgaris. 3
Borax Veneta. 5
Bovis Fel inſpiſſatum. 127
Boviſta. 123
Bufones combuſt. 127
exſiccat. 127
Bufonites s. Bufonius lapis. 8
Butyrum Antimonii. b. 6
Cacao. vid. Olea expreſſa.
Majoranæ. vid. Unguent.
rubrum. vid. ibid.
viride. vid. ibid.

Caa-apia. 139
Cacao Butyrum. v. Olea expreſs.
fructus. 85
Cadmia nativa s. Cobaltum. 12
foſſilis. vid. Lap. Calamin.
Cajeput. vid. Oleum.
Calamus aromat. vid. Radix.
conditus. vid. Condit.
Calx. 8
Camphora. vid. Gummi.
Cancrorum Chelæ. 127
Lapides s. Oculi. 127
citrati. b. 112
præparati. b. 112
Candelæ fumales. b. 33
Canella alba. vid. Coſtus corticoſus.
Cubana. 94
Zeylanica. 94
Cantharides. 128

Capita Papaveris. 85
Carbunculus. vid. Lapis.
Cardamomum maximum. 93. 96
minus. 93
Caricæ. 85
Carneolus. vid. Lapis.
Carpionum Lapides. 128
Carpobalſamum. 86
Carthamus. vid. Flores.
Caryophylli aromatici. 94
rotundi. 71. 94
Caſſia caryophyllata. 94
fiſtula. 86
lignea. 94
extracta. vid. Pulpa.
Caſſio-berry-buſch. 139
Caſſum muniar. vid. Radix.
Caſtoreum. 128
Catechu, s. Terra Japonic. v. Terra.
Cauterium potentiale. b. 33
Cera alba. 138
arborea. b. 34
flava. 138
ſigillaris rubra. b. 34
viridis. b. 34
Cerata. vid. Emplaſtra.
Ceraſa acida exſiccata. 86
Ceraunius. 9
Ceruſſa alba Norica. 12
Veneta. 13
Antimonii. vid. Antimon. diaphor.
citrina. 13
Cervi Cornu. 128
Priapus. 129
Ceti Priapus. 129
Sperma. 129
Chalybs limatus. 13
præparatus. b. 34
ſulphuratus. b. 34
Chelæ Cancrorum. vid. Cancr.
Chermes Grana. vid. Grana.
China de China. 99
Chocolata. b. 34
Chryſocolla s. viride montanum. 4
s. Borax. 5
Chryſolithus. vid. Lapis.
Cineres clavellati. 5
Cinnabaris Antimonii. b. 35
factitia. b. 35
nativa. 13
præparata. b. 35
rectificata. b. 35
Cinnamomum. 94
Cipo de Cameras. vid. Radix.
Claretum e ſex ſeminibus. vid. Aqua carminat. per infuſ. 13
Clyſſus Antimonii. b. 6
Cobaltum s. Cadmia nativa. 12. 13
Coccinella. 129
Coccognidium. 86
Cocculi de Levante. 86
Cochlearum opercula. 129
teſtæ. 130
Coffée. 86
Colcothar Vitrioli. b. 35
Colla Piſcium. 131
Colocynthis. 87
Colophonium. vid. Gummi.
Conchæ citratæ. b. 35
marinæ præparatæ. b. 36
Conditum Aurantiorum. b. 36
Berberum. b. 36
Calami aromatici. b. 36
Caryophyllorum. b. 36
Ceraſorum acidor. b. 36
Cichorii rad. b. 36
Citri corticum. b. 36
Cydoniorum. b. 36
Cynosbati. b. 36
Enulæ. b. 36
Eryngii. b. 36
Nucum Indic. b. 36
jugland. b. 36
Ribium. b. 36
Rubi idæi. b. 36
Satyrii. b. 36
Scorzoneræ. b. 36
Zingiberis. b. 36
Confect. Alkermes compl. b. 36
incompl. b. 36
Aniſi laxativa. b. 37
Cinnamomi regia. b. 37
de Hyacintho. b. 37
ſiccæ. b. 37
Conſerva millepedum. b. 37
ſpagyrica ſ. viſceralis. b. 38
Conſervæ ſimplices. b. 38
Copal. vid. Gummi Copal.
Corallium album. 17
nigrum. 17
rubrum. 17
Corallia præparata. b. 39
Corallina. 17
Corna exſiccata. 87
Cornu Alcis. 125
præparat. b. 39
philoſophice ppt. b. 5
Cervi. 128
auratum. b. 39
philoſoph. præp. b. 39
uſtum. b. 39
Rhinocerotis præpar. b. 39
Corrector Starckey. b. 159
Cortex Acaciæ germ. radic. 98
Aurantiorum. 98
Capparis. vid. Radix.
Caſcarillæ. 98
Chinæ Chinæ. 99
Citri. 99

Cortex Coccognidii. 99
Culilavan. 100
Ebuli. vid. Radix.
Eſulæ. vid. Radix.
Frangulæ. 100
Fraxini. 100
Granatorum. 100
Guajaci. 100
Hippocaſtani. 101
Jujaba. 142
Ligni Sancti. 100
Saſſafras. 101
Mandragoræ. 101
Mezerei. 99
Mori radicis. 101
Quercus. 101
Sambuci. 101
Saſſafras. 101
Tamariſci. 101
Thuris. 101
Winteranus. 102
Coſtus amarus. vid. Radix.
corticoſus. 95
dulcis. vid. Radix.
Cranium humanum. 130
præparat. b. 39
Cremor Tartari. b. 39
Crepitus Lupi. vid. Boviſta.
Creta alba. 3
Crocus. 95
Martis adſtringens. b. 40
antimoniatus. b. 40
aperitivus. b. 40
Metallorum. b. 41
Orientalis. 95
Solis. b. 41
Veneris. b. 41
Cryſtallus montana. 8
præparata. b. 41
Cryſtalli Tartari. b. 39
Cubebæ. 95
Cupreſſi Nuces. 87
Cydonia exſiccata. 87
Cynosbati fructus. 87
Cyperus longus, rotundus. vid. Radix.

Dactylus Idæus. 9
Dactyli. 88
Dentes Apri. vid. Apri Dent.
præparati. b. 41
Hippopotami. vid. Hipp.
præp. b. 41
Dentalia. 18
Diacinnamomum reg. vid. Confect.
Diacodium crocatum. vid. Syrupus.
ſimplex. vid. ibid.
Diacrydium liquirit. edulcorat. b. 41
roſatum. b. 42
ſulphuratum. b. 42
Diaphoreticum joviale. b 42
martiale. b. 42
Diaſcordium. vid. Electuarium.

Ebuli Baccæ. 88
Ebur. 130
foſſile. vid. Unicornu.
philoſoph. calcinat. b. 42
uſtum album. b. 42
Elaterium. b. 42
Elæoſacchar. Aniſi. b. 42
Aurantiorum. b. 42
cephal. v. Pulv. ſtern.
Cinnamomi. b. 42
Citri. b. 42
Errhinum. b. 43
Macis. b. 42
Succini. b. 42
Electrum. 18
Electuarium de Acoro. b. 43
Bacc. Lauri. b. 43
Catholicum. b. 43
Chalybeatum. b. 44
Diaſatyrium. b. 44
Diaſcord. Fracaſt. b. 44
Gingivale. b. 45
Hieræ picræ ſimpl. b. 45
Lenitiv. Florenzol. b. 45
de Manna. b. 45
Mithridat. Damocr. b. 46
s. Philon. Rom. b. 47
s. Requies Nicol. b. 47
Reſumtivum. b. 48
Sanans Fulleri. b. 48
Tamarindorum. b. 48
Theriacæ Androm. b. 48
Elixir anticolic. crocat. b. 50
antifebrile. b. 50
aperitivum Clauderi. b. 51
balſamic. ſpirituoſ. Hoffm. b. 51
pectorale Edinb. b. 51
temperat. Hoffm. b. 51
Cordiale, Garrus. b. 52
Fuliginis Claud. vid. Eſſent.
Myrrhæ Londinenſ. b. 52
pectorale Reg. Dan. b. 52
balſam. Edinburg. b. 51
Wedelii. b. 53
polychreſt. Halenſe. b. 53
Propriet. alb. Helmont. b. 53
c. acid. Bœrh. b. 54
ſ. acid. Bœrh. b. 54
dulce. b. 55
Helvetii. b. 53
Paracelſi. b. 54
c. Rhabarb. b. 55
Salutis. b. 55
Vitæ Matthioli. b. 55
mulierum. b. 17. 56
Vitrioli Mynſicht. b. 56

Elixir Uterinum. b. 56
Emplaſtrum album coctum. b. 57
de Ammoniaco. b. 57
antipodagricum. b. 57
pro Apoplecticis. b. 57
de Baccis Lauri. b. 57
de Betonica. b. 58
Capucinorum. b. 58
de Ceruſſa. b. 58
de Cicuta. b. 58
Citrinum. b. 58
ad Clavos Pedum. b. 58
de Cruſta Panis. b. 59
de Cumino. b. 59
Defenſivum rubrum. b. 59
Wepfer. b. 59
Fel. Wurz. b. 59
viride. b. 59
Diabotanum Blondel. b. 60
Diachalciteos. b. 61
Diachylon compoſ. b. 61
ſimplex. b. 61
Diapalmæ. b. 61
Diaphoretic. Mynſicht. b. 62
Diapompholygos. b. 62
Diaſulphur. Ruland. b. 62
Divinum. b. 62
Filii Zachariæ. b. 62
ad Fracturas. b. 63
de Galbano croc. b. 63
Griſeum. b. 63
ad Herniam. b. 63
de Hyoſciamo. b. 63
incognitum. b. 64
iſchiaticum. b. 64
de Lapide Calamin. b. 63
magneticum. b. 64
malacticum c. Gum. b. 64
ſimpl. b. 64
mamillare. b. 64
matricale. b. 65
de Meliloto. b. 65
Mercuriale. b. 65
de minio rubrum. b. 65
miraculoſum. b. 65
nervinum Hoffm. b. 66
Nicotianæ. b. 66
Noricum. b. 66
odontalgicum. b. 66
opodeldoch. b. 66
Oxycroceum. b. 67
de panis cruſta. b. 67
ad Podagram. b. 57
de Ranis c. Mercur. b. 68
ſ. Mercur. b. 67
regium Burrhi. b. 68
ſandalinum. b. 68
ſaponatum Barbette. b. 68
ſaturninum Mynſicht. b. 69
de ſcrophularia. b. 69
Emplaſtrum de Spermate Ceti. b. 69
Ranar. b. 69
ſpleneticum. b. 70
ſtipticum. b. 70
de Tacamahaca. b. 70
Triapharmacum. b. 71
contra Vermes. b. 71
ad Verrucas. b. 58
Veſicatorium. b. 71
Emulſio externa e nucleis. b. 71
violata Mynſicht. b. 71
Entalia. 18
Equi Teſtes. 130
præparat. b. 204
Erinaceus combuſtus. 130
Eſſentia Abietis. vid. Pini.
Abſinthii compoſit. b. 72
ſimplex. b. 72
Alexipharmaca Stahlii. b. 72
temperat. ejusd. b. 72
amara. b. 72
Ambræ balſamic. Dipp. b. 73
liquida. b. 73
ſicca. b. 73
Angelicæ. b. 73
anodina officinalis. b. 73
Ludovici. b. 74
antarthrit. c. opio Hoffm. b. 74
ſ. opio ejusd. b. 74
anthydropica Hoffm. b. 74
antiſcorbutica. b. 75
Aurantior. ſpirituoſa. b. 77
c. vino malv. b. 77
balſamica Gmelini. b. 75
Hoffm. v. Elixir.
Balſami Peruviani. b. 75
Benzoës compoſita. b. 75
ſimplex. b. 76
Cardamomi. b. 76
Cardui benedicti. b. 76
carminativa Wedelii. b. 76
Caſtorei. b. 76
Catechu. b. 76
Centaurii minoris. b. 76
Cephalica. b. 77
Chacarillæ. b. 78
Chinæ chinæ ſimplex. b. 77
compoſita. b. 77
Croci. vid. Tinctura.
Culilawan. b. 78
Dulcis. b. 78
Fuliginis. b. 78
Fumariæ. b. 79
Galangæ. b. 79
Gentianæ. b. 79
Hyperici. b. 79
Leviſtici. b. 79
Ligni Aloës. b. 79
Saſſafr. comp. b. 79
ſimpl. b. 79

Essentia Lignorum. b. 80
Lumbricorum terrestr. b. 80
Martiata aperitiva. b. 80
Millefolii. b. 80
Millepedum. b. 80
Mumiæ purif. Clauder. b. 81
Myrrhæ. b. 81
alcalisata. b. 81
Pareiræ bravæ. b. 81
Pimpinellæ albæ. b. 81
Pini s. Abietis. b. 81
Populi vulneraria. b. 82
Scillæ. b. 82
Scordii simplex. b. 82
composita. b. 82
Serpentariæ Virginianæ. b. 82
Spicæ Indicæ. b. 83
Splenetica Stahlii. b. 83
Stomachica polychresta. b. 83
Succini alcalisata. b. 83
simplex. b. 84
G. b. 83
Terræ Catechu. b. 84
Theriacalis. b. 84
Travmatica. b. 84
Trifolii fibrini. b. 85
Valerianæ composita. b. 85
Vincetoxici. b. 85
Euphorbium. vid. Gummi.
correctum. b. 85
Extractum Absinthii. b. 85
Agarici. b. 85
Aloës gummosum. b. 86
Angelicæ. b. 86
Anodinum. b. 86
Aristolochiæ. b. 86
Artemisiæ. b. 85
Asari. b. 86
Bellidis. b. 85
Bezoardic. Camerar. b. 87
Bryoniæ. b. 87
Calami aromatici. b. 86
Cardui benedicti. b. 85
Diacarthami. b. 88
Castorei. b. 87
Catharcticum. b. 87
Catholicum. b. 88
Centaurii minoris. b. 85
Chacarillæ. b. 86
Chinæ chinæ. b. 86
Cnico-pharmacum. b. 88
Cochleariæ. b. 85
Colocynthidis. b. 88
Croci. b. 88
Diacarthami. b. 88
Enulæ. b. 87
Esulæ. b. 87
Fumariæ. b. 85
Gentianæ. b. 87
Extractum Guajaci. b. 89
Hellebori nigri. b. 87
Hederæ terrestris. b. 85
Hyperici. b. 86
Jalappæ. b. 89
Iridis Florentinæ. b. 87
nostrat. b. 87
Ligni Aloës. b. 89
Guajaci. b. 89
Marocostinum. b. 89
Martis pomatum. b. 90
Mechoacannæ. b. 86
Nicotianæ. b. 90
Opii. b. 90
cydoniatum. b. 90
Pæoniæ. b. 87
Panchymagogum. b. 91
Papaveris erratici. b. 85
Phlegmagogum. b. 91
Pimpinellæ. b. 87
Pini. b. 85
Plantaginis. b. 85
Pæoniæ. b. 85
Rhabarbari. b. 87. 91
Rutæ. b. 85
Sabinæ. b. 85
Sarsæparillæ. b. 87
Sassafras. b. 87
Scordii. b. 85
Sennæ. b. 92
Tanaceti. b. 85
Tormentillæ. b. 87
Trifolii fibrini. b. 85
Turpethi. b. 86
Valerianæ. b. 86
Veronicæ. b. 85
Zedoariæ. b. 86

Faba S. Ignatii. 88
marina. 19
Fæcula Ari radicum. b. 92
Bryoniæ. b. 92
Pæoniæ. b. 92
Fel Tauri. vid. Tauri.
Vitri. 13
Ficus. vid. Caricæ.
Flores Acaciæ. 65
Æris. b. 4
Anethi. 65
Anthos. 65
Antimonii Helmont. b. 92
Aquilegiæ. 65
Arnicæ. 65
Aurantiorum. 65
Balaustiorum. 66
Basilici. 66
Bellidis. 66
Benzoës. b. 93
Betonicæ. 66
Borraginis. 66

Flores Buglossi. 66
Calcatrippæ. 66
Calendulæ. 66
Carthami. 66
Centaurii minoris. 67
Chamomillæ Romanæ. 67
vulgaris. 67
Cheiri s. Keiri. 67
Cichorii. 67
Consolidæ regalis. 67
Cyani. 67
Farfaræ. 67
Ferri. 14
Galeopsidis. 67. 71
Genistæ. 67
Granatorum. 67
Hepaticæ nobilis. 67
Hyperici. 68
Lavendulæ. 68. 70
Liliorum alborum. 68
convallium. 68
Linariæ. 68
Lupuli. 68
Malvæ arboreæ. 68
Meliloti. 68
Naphæ. 65
Nymphææ albæ. 68
Origani. 68
Papaveris erratici. 68
Paralyseos. 69
Persicorum. 69
Pœoniæ. 69
Primulæ Veris. 69
Rorismarini. 65
Rosarum albarum. 69
pallidarum. 69
rubrar. finarum. 69
vulgar. 69
Salis armoniaci martial. b. 93
simpl. b. 93
Salviæ. 69
Sambuci. 69
Saxifragiæ. 69
Scabiosæ. 69
Spicæ Celticæ. 70
hortensis. 70
Indicæ. 70
Stœchadis Arabicæ. 70
citrinæ. 70
Sulphuris compositi. b. 94
simplices. b. 94
Tanaceti. 70
Tiliæ. 70
Tunicæ. 70
Tussilaginis. 70
Verbasci. 70
Violarum. 70
Viridis Æris. vid. Æs virid. cryftall.
Urticæ mortuæ. 71

Folia Indi. / Lauri. / Quercus. / Sennæ. / Vitis. } vide Herba.
Folliculi Sennæ. 61
Fungus cervinus, s. Boletus. 123
Chirurgorum, s. Bovista. 123
Cynosbati. 124
Salicis. 123
Sambuci. 123

Galanga major. 95
minor. 95
Gallæ. 88
Gallinæ ventriculi. 130
Gelatina cornu cervi citrata. b. 94
Gilla Theophrasti. b. 94
Glacies Mariæ Moscovitic. 7
vulgaris. 8
Glandes quercinæ. 88
Globuli bezoardici. b. 94
carminativi. b. 94
martiales. b. 95
moschati. b. 95
Grana Chermes. 88
Paradisi. 96
Tilli, s. Tigliæ. 88
Granatus. 10
Granatorum poma. 89
Gummi Ammoniacum. 106
Animæ. 107
Arabicum. 107
Asæ dulcis. 107
Asæ fœtidæ. 107
Asphaltum. 17
Bdellium. 108
Benzoës. 107
Camphora. 108
Cancamum. 109
Caranna. 109
Cerasorum. 109
Colophonium. 109
Copal. 109
Elemi. 109
Euphorbium. 110
Galbanum. 110
Galda. 141
Guajacum. 110
Gutta. 110
præparat. b. 95
Hederæ. 111
Juniperi. 111
Kikekunemalo. 142
Laccæ. 111
Ladanum. 111
Look. 141
Mastiche. 112
Myrrha. 112
Olampi. 141

Gummi Olibanum. 112
Opopanax. 112
Sagapenum. 113
Sandaraca. 113
Sanguis Draconis. 113
Sarcocolla. 114
Senegal. 114
Styrax calamita. 114
liquida. 117
Tacamahaca. 114
Tragacantha. 115
Guttæ Anglicanæ cephalicæ. b. 95

Hæmatites. 9
Hederæ Baccæ. 89
Hepar Antimonii. vid. Croc. Metall.
Anguillæ ppt. b. 96
Canis rabidi ppt. b. 96
Lupi. 131
ppt. b. 96
Sulphuris. b. 96
Herba Abrotani maris. 42
fœminæ. 48
Abſinthii Pontici. 42
vulgaris. 42
Acetoſæ. 43
Acetoſellæ. 43
Acmellæ. 43
Adianti albi. 43
aurei. 43
nigri. 43
Agrimoniæ. 43
Alceæ. 43
Alchimillæ. 43
Alliariæ. 44
Alſines mediæ. 44
Altheæ. 44
Anagallidis. 44
Anethi. 44
Anſerinæ. 44
Antirrhini. 44
Arnicæ. 44
Ariſtolochiæ. 44
Artemiſiæ. 45
Aſari. 45
Aſplenii. 45
Auriculæ muris. 45
Baſilici. 45
Beccabungæ. 45
Bellidis. 45
Betæ. 45
Betonicæ. 45
Boni Henrici. 45
Borraginis. 45
Botryos. 46
Brancæ urſinæ. 46
Brunellæ. 58
Bugloſſi. 46
Burſæ Paſtoris. 46
Calaminthæ mont. & vulg. 46
Capilli Veneris. 46
Herba Cardiacæ. 46
Cardui benedicti. 46
Mariæ. 47
Centaurii minoris. 47
Centumnodiæ. 47
Cerefolii. 47
Ceterach. 47
Chamædryos veræ. 47
Chamæpytyos. 47
Chelidonii majoris. 47
Cichorii. 48
Cicutæ. 48
Cochleariæ. 48
Conſolidæ majoris. 48
mediæ ſ. Bugulæ. 48
Saracenicæ. 48
Conyzæ cœruleæ. 48
pulicariæ. 48
Craſſulæ majoris. 48
Cupreſſi. 48
Cuſcutæ. 49
Dictamni Cretici. 49
Digitalis. 49
Ebuli. 49
Endiviæ. 49
Epaticæ. 49
Epithymi. 49
Equiſeti. 49
Ericæ. 49
Eryſimi. 49
Eupatorii Avicenn. 49
Euphraſiæ. 50
Farfaræ. 50
Fœniculi. 50
ſ. Folia Indi. 50
Fragariæ. 50
Fumariæ. 50
Galegæ. 50
Gallitrichi. 50
Gallii. 50
Geranii Robert. 51
Gnaphalii montani. 51
Gratiolæ. 51
Hederæ arboreæ. 51
terreſtris. 51
Hepaticæ fontanæ. 51
nobilis. 51
ſtellatæ. 52
Herniariæ. 52
Hiſpidulæ. 52
Hormini. 52
Hyoſciami. 52
Hyperici. 52
Hyſſopi. 52
Jaceæ. 52
Ivæ Artheticæ. 52
Junci odorati. 52
Juniperi. 52
Lamii. 52
Flore albo. 65

Herba Lappæ majoris. 52
Lavendulæ anguſtifoliæ. 52
latifoliæ. 53
ſ. Folia Lauri. 53
Lauro-Ceraſi. 53
Lichenis terreſtris. 53
arborei. 53
Linariæ. 53
Lini catharctici. 53
Lunariæ racemoſæ. 53
Lupuli. 53
Lyſimachiæ luteæ. 53
Majoranæ. 54
Malvæ. 54
Marrubii albi & nigri. 54
Mari veri. 54
Matricariæ. 54
Matriſilvæ. 54
Meliloti. 54
cœruleæ. 54
Meliſſæ. 54
Turcicæ. 55
Meliſſophylli. 55
Menthæ. 55
Mercurialis. 55
Millefolii. 55
Millegranæ. 52. 55
Morſus diaboli. 55
gallinæ. 55
Myrti Italici. 55
Naſturtii aquatici. 55
Nepetæ. 56
Nicotianæ. 56
Nummulariæ. 56
Ocymi. 56
Ophiogloſſi. 56
Origani Cretici. 56
vulgaris. 56
Parietariæ. 56
Parthenii. 56
Pentaphylli. 56
Perfoliatæ. 57
Perforatæ. 57
Petroſelini. 57
Piloſellæ ſ. Gnaph. mont. 57
maj. ſ. auric. mur. 57
Pimpinellæ ſanguiſorb. 57
ſaxifragæ. 57
Plantaginis anguſtifol. 57
latifoliæ. 57
Polii Cretici. 57
montani. 57
Polygalæ. 57
Polygoni. 58
Polytrichi. 58
Potentillæ. 58
Praſii. 58
Prunellæ. 58
Ptarmicæ. 58
Pulegii hortenſis. 58
Herba Pulmonariæ arboreæ. 58
maculoſæ. 58
Pyrolæ. 59
ſ. Folia Quercus. 59
Rorellæ. 59
Rorismarini. 59
ſ. Folia Rubi vulgaris. 59
Rutæ caprariæ. 59
hortenſis. 59
murariæ. 59
Sabinæ. 59
ſ. Folia Salicis. 59
Salviæ hortenſis. 59
ſilveſtris. 59
Sampſuchi ſ. Majoranæ. 60
Saniculæ. 60
Santolinæ. 60
Saponariæ. 60
Saturejæ. 60
Saxifragiæ albæ. 60
Scabioſæ. 60
Scariolæ. 60
Sclareæ. 60
Schœnanti. 60
Scolopendrii veri. 60
vulgaris. 60
Scordii Cretici. 61
vulgaris. 61
Scrophulariæ aquaticæ. 61
minoris. 61
Sedi. 61
ſ. Sennæ folia. 61
folliculi. 61
Senecionis. 62
Serpilli. 62
Sideritidis. 62
Solani vulgaris. 62
Soldanellæ. 62
Squinanti. 60. 62
Tamariſci. 62
Tanaceti. 62
Taraxaci. 63
Theæ. 63
Thymi Cretici. 63
vulgaris. 63
Tormentillæ. 63
Trichomanis. 64
Trifolii fibrini. 64
pratenſis. 64
Tuſſilaginis ſ. Farfaræ. 64
Verbaſci. 64
Verbenæ. 64
Veronicæ. 64
Vincæ per vincæ. 64
Violariæ. 64
ſ. folia vitis. 64
Virgæ aureæ. 65
Urticæ urentis. 65
mortuæ. 65
Uvulariæ. 65

Her-

Hermodactyli. v. Radix. 30
Hiera picra. v. Electuarium. b. 45
Hippocaftanum. 89
Hippopotami dentes. 130
praeparati. b. 41
Hirci fanguis. 130
Hirundines combuftae. 131
Hirundinum nidi. 131
Hordeum. vid. Semen.
Hyacinthus. vid. Lapis.
Hydromel fimplex. b. 96
Hypociftidis fuccus. 119

Jalappa. vid. Radix.
Ichthyocolla. 131
Ikan. vid. Radix.
Indigo. 13
Infufum laxativum Mannagettae. b. 96
Viennenfe. b. 96
Jujaba. vid. Cortex.
Jujubae. 89
Juniperi baccae. 89
Julapium rofatum. b. 97
fambucinum. b. 97
violarum. b. 97

Kermes grana. 88
minerale. b. 97

Lac Lunae. 3
Sulphuris. b. 97
Virginis. b. 97
Lacca coerulea. 14
Florentina. 14
Lacca pictoria in globulis. 14
Ladanum Gummi. 111
Lapis Aëtites. 7
Alabaftrum. 7
Amethyftus. 10
Amianthus. 8
Aquilae. 7
Armenius. 8
Asbeftus. 8
Belemnites. 9
Bezoar Occidentalis. 126
Orientalis. 126
Bufonites. 8
Calaminaris. 8
praeparat. b. 98
Calcarius. 8
Carbunculus. 11
Carneolus. f. Sardius. 10
Carpionis. 128
Ceraunius. 9
Chryfolithus, s. Chryfopafius. 10
Coromandel. 142
Cryftalus montana. 8
Divinus. b. 98
f. Glacies Mariae vulgaris. 8
Mofcovit. 7
de Goa. b. 98
Lapis Granatus. 10
Haematites. 9
Hyacinthus. 10
Infernalis. b. 98
Judaicus. 9
Lazuli. 9
Lyncis. 9
Magnes. 9
Malacenfis. 133
Manati. 132
Medicamentofus. b. 99
Nephriticus. 9
Ophthalmicus. b. 98
Ofteocolla. 9
Percarum. 133
Porcinus. 133
Prunellae. b. 99
Pumex. 10
Rubinus. 11
Sapphirus. 11
Sardius. 10
Selenites. 10
Silex. 10
Smaragdus. 11
Smiris. 10
Specularis. 7
Spongiarum. 10
Talcum. 10
Topafius. 10
Laudanum cydoniatum. b. 90. 100
diureticum. b. 99
hyftericum. b. 99
liquidum Sydenham. b. 99
opiatum. b. 100
Lauri Baccae. 89
Lepus combuftus. 131
Leporis Tali. 131
Lignum Agallochum. 102
Aloës. 102
Afpalathum. 103
Buxi. 103
Colubrinum. 103
Cupreffinum. 103
Ebenum. 103
Guajacum. 103
Juniperinum. 104
Lentifcinum. 104
Moluccenfe. 104
Nephriticum. 104
Pavanum. 105
Rhodium. 105
Sanctum. 105
Sandalinum alb. 105
citrin. 105
coerul. 104
rubrum. 105
Saffafras. 105
Suberis. 106
Limatura Chalybis. vid. Chalybs.
Liquidambra. vid. Ambra liquida.

Liquiritia cocta alba. vid. Bacilli.
citrina. vid. ibid.
Liquiritiæ Succus. 119
Liquor anodinus mineralis. b. 100
cornu cervi ſuccin. offic. b. 100
albus. b. 101
s. Liquamen Myrrhæ. vid. Oleum.
Nitri fixi. b. 101
Salinus laxativus. b. 101
Stypticus Weberi. b. 101
Spleneticus. b. 101
Tartari. b. 101
Terræ foliatæ tartari. b. 102
Viſceralis. b. 102
Vulnerar. Dippel. veget. b. 102
ejusd. miner. b. 102
Lithargyrium Auri. 14
Argenti. 14
Lithomarga. 4
Loch ad Aſthma. b. 103
de Farfara. b. 103
de Pulmone Vulpis. b. 103
ſanum & expertum. b. 103
ſaponatum. b. 103
de Scilla. b. 103
Lucii Mandibulæ. 131
Lupi Hepar. 131
præparat. b. 96
Lumbrici terreſtres. 131
præparat. b. 104
Lycii Succus. 119
Lycopodium. vid. Semen.

Macis. 96
Magiſterium Antimon. diaphor. ſive Materia perlata. b. 106
Coralliorum. b. 104
Gummi guttæ. b. 104
Jalappæ. vid. Reſina.
Marcaſitæ. b. 104
Margaritar. b. 104
Matris perlar. b. 104
Ocul. Cancror. b. 104
Saturni. b. 104
Scammonii. vid. Reſina.
Sulphuris. vid. Lac.
Magnes. vid. Lapis.
arſenicalis. b. 104
Magneſia alba. b. 105
Malabathrum. vid. Folia Indi.
Malicorium. vid. Cort. Granator.
Manati Lapis. 132
Mandibulæ Lucii Piſcis. 131
præparatæ. b. 105
Manna. 120
Manus Chriſti perlata. vid. Sacchar. perlatum.
Marcaſita. 14
Margaritæ. 18
Margaritæ præparatæ. b. 105
Mars ſulphuratus. vid. Chalybs.
Martis Minera Haſſiaca. 14
Maſſa liquiritiæ alba. b. 105. 124
fuſca. b. 105
pro fornace. b. 106
Maſtiche. vid. Gummi.
Mater Perlarum. 18
Materia perlata. b. 106
Mechoacanna alba. vid. Radix.
nigra. vid. ibid.
Medulla Saxorum. 4
Mel. 120
anthoſatum. b. 106
deſpumatum ſimplex. b. 106
mercuriale. b. 106
roſatum ſimplex. b. 106
ſolutivum. b. 107
ſambuci. b. 107
violarum. b. 107
Mercurius dulcificatus. b. 107
præcipit. albus. b. 108
flav. v. Turbeth. mineral.
ruber. b. 108
viridis. b. 108
ſublimatus corroſiv. b. 108
vitæ. b. 108
vivus. 12
Meſpili exſiccati. 89
Millepedes. 125
præparati. b. 109
Minera Martis Haſſiaca. 14
Antimonii. 11
Minium. 15
Mithridatium. vid. Electuarium.
Mixtura ſimplex alba. b. 109
Ludovici. b. 109
ordinaria. b. 109
tonico nervina Stahl. b. 109
Morſuli antimoniales Kunckelii. b. 110
ad ardorem ventriculi. b. 110
Imperatoris. b. 110
purgantes. b. 110
contra vermes. b. 111
Moſchus. 132
Mucharum Roſarum. b. 111
Mumia. 132
Perſica. 133
Mures marini. 132
Muſcus Acaciæ. 124
albus quernus. 124
corallinus. 17. 124
terreſtris, clavatus. 124
Muſtelæ Piſcis Vertebræ. 132
Myrobalani. 89. 90
Myrrha. vid. Gummi.
Myrti Baccæ. 90
Myrtilli exſiccati. 90

Nacra

Nacra perlarum. 18
Nardus Celtica. vid. Spica.
Indica. vid. ibid.
Nidus Hirundinum. 131
Nihilum album. 15
griſeum. 16
Nitrum alkaliſatum. b. 111
antimoniatum. b. 111
crudum. 5
cryſtalliſat. ſ. depurat. b. 111
perlatum. b. 111
roſatum. b. 111
ſaturninum. b. 112
tabulatum. b. 112
vitriolatum. b. 26
Nuces aquaticæ. 92
Cupreſſi. 87
Indicæ condit. vid. Condita.
Juglandes condit. vid. ibid.
moſchatæ. 96
Pineæ. 90
Piſtaciæ. 91
Vomicæ. 90
Nuclei Ceraſorum. 86
Perſicorum. 91

Ochra. 4
Oculi Cancrorum. 127
citrati. b. 112
præparati. b. 112
Oleum deſtill. Abſinthii. b. 118
Ammoniaci. b. 122
Anethi. b. 119
Angelicæ. b. 119
Animale Dippel. b. 120
Aniſi. b. 119
Anthos. b. 119
Antimon. vid. Butyrum.
Artemiſiæ. b. 119
Aurantiorum. b. 121
Benzoës. b. 120
Buxi. b. 120
Calami aromat. b. 119
Camphoræ. b. 120
Cardamomi. b. 119
Carvi. b. 119
Caryophyllorum. b. 119
Ceræ. b. 121
Chamomillæ. b. 119
Chærefolii. b. 119
Cinnamomi. b. 119
Citri. b. 121
Coriandri. b. 119
Cornu Cervi. b. 121
Cubebarum. b. 119
Cumini. b. 119
Fœniculi. b. 119
Galbani. b. 121
Guajaci. b. 119. 120
Oleum deſtill. Hyſſopi. b. 119
Juniperi e baccis. b. 119
ex Lign. b. 120
e Lateribus. b. 122
Lavendulæ. b. 119
Lauri Baccar. b. 119
Ligni Guajaci. b. 119
Rhodii. b. 119
Sandal. citr. b. 119
Saſſafras. b. 119
Macis. b. 119
Majoranæ. b. 119
Maſtiches. b. 122
Meliſſæ. b. 119
Menthæ. b. 119
Millefolii. b. 119
Myrrhæ. b. 122
Nuciſtæ. b. 119
Origani. b. 119
Philoſophorum. b. 122
Piperis. b. 119
Pulegii. b. 119
Rhodii. b. 119
Rorismarini. b. 119
Rutæ. b. 119
Sabinæ. b. 119
Salviæ. b. 119
Santali citrini. b. 119
Saponis. b. 122
Saſſafras. b. 119
Saturejæ. b. 119
Serpilli. b. 119
Spicæ. b. 119
Succini. b. 122
Sulphuris. b. 122
Tacamahacæ. b. 122
Tanaceti. b. 119
Tartari fœtid. b. 183
Terebinthinæ. b. 122
Thymi. b. 118
Vitrioli. b. 122
Zedoariæ. b. 119
Zinziberis. b. 119
expreſſ. Amygdal. amar. b. 112
dulc. b. 112
Cacao. b. 115
Hyoſcyami. b. 115
Lauri. b. 116
Lini. b. 116
Nucis moſchat. b. 117
Nucum jugland. b. 117
Ovorum. b. 117
Papaveris. b. 117
Abſinthii coctum. b. 112
Anagallidis. b. 112
Anethi. b. 113
Bezoardicum Wedel. b. 113
Cajeput. 140
Capparum. b. 113
Carminativum. b. 113

Oleum Caſtorei. b. 113
Chamomillæ. b. 114
Cheiri. b. 114
Colocynthidis. b. 114
Coſtinum. b. 114
Euphorbii. b. 114
Florum Slotani. b. 114
Formicarum. b. 115
Hyperici. b. 115
Liliorum alborum. b. 116
Lumbricorum terreſtr. b. 116
Majoranæ. b. 116
Maſtichinum. b. 116
Menthæ. b. 116
Momordicæ. b. 116
Myrrhæ per deliquium. b. 117
Nicotianæ. b. 117
Petræ album. 15
nigrum. 15
rubrum. 15
Roſarum coctum. b. 117
Rutæ. b. 118
Scorpionum. b. 118
Septem Florum. b. 118
Spermatis Ranarum. b. 118
Tartari per deliquium. b. 101
Terræ. 15
Verbaſci. b. 118
Violarum. b. 118
Vulpinum. b. 118
Olibanum. vid. Gummi.
Opercula Cochlearum. 129
Opium. 120
Opobalſamum. vid. Balſ. Orient.
Opopanax. vid. Gummi.
Orleana. 15
Orvietanum. b. 123
Oſſa de Cordibus Cervi. 133
Sepiæ. 133
Oſteocolla. vid. Lapis.
Ovorum Teſtæ. 133
Oxycroceum. vid. Emplaſtrum.
Oxymel ſcilliticum. b. 123
ſimplex. b. 123
Oxyſaccharum ſcillit. Lond. v. Syrup. ſcillæ.

Panacea mercurialis. b. 124
ſolutiva. vid. Magneſia.
Panis cydoniorum. b. 124
Papaveris capita. 85
Paradiſi Grana. 96
Paraguay. 139
Pareira brava. vid. Radix.
Paridis Baccæ. 90
Paſſulæ majores. 90
minores. 90
laxativæ. b. 124
Paſta Altheæ. b. 124
Pavonum ſtercus. 133
Percarum Lapis. 133
Perlæ. 18
Perſicorum Nuclei. 91
Petroleum. vid. Oleum.
Philonium Romanum. b. 125
Phlegma Vitrioli. vid. Spiritus.
Phu. vid. Radix.
Pila marina. 17
Pilulæ Æthiopicæ. b. 125
Aloëphanginæ. b. 125
de Ammoniaco. b. 125
Angelicæ. b. 125
Aperientes Stahlii. b. 126
Aureæ. b. 126
Balſamicæ Morton. b. 126
Cachecticæ. b. 126
Cephalicæ. b. 126
Cochiæ. b. 126
de Cynogloſſo. b. 127
c. caſtor. b. 127
Emanuelis. b. 127
Fœtidæ majoris. b. 127
Hieræ cum agarico. b. 127
Hydropicæ Bontii. b. 128
Hyſtericæ. b. 128
Lucis majores. b. 128
Marocoſtinæ. vid. Extract.
Maſtichinæ. b. 128
Mercuriales. b. 129
Polychreſtæ balſam. b. 129
Starckey. b. 129
Scilliticæ. b. 129
Solares Wildegans. b. 129
Spleneticæ. b. 130
de Styrace ſine ambra. b. 130
de Succino Cratonis. b. 130
auctæ. b. 130
Tartareæ Bontii. b. 130
Schrœderi. b. 131
de Terebinthina. b. 131
Pineæ Nuces. 90
Piper album. 96
Hiſpanicum. 97
Jamaicum. 96
longum. 97
nigrum. 96
Piſſasphaltum. vid. Asphalt. Gummi.
Piſtaciæ. 91
Pix. 113
navalis. 113
Plumbum uſtum. b. 131
Pompholyx. vid. Nihilum.
Porcinus Lapis. 133
Priapus Cervi. 129
Ceti. 129
Tauri. 135
Propolis. 138
Pruna Damaſcena. 91
laxativa. b. 124
Pulmo Vulpis. 135
præparat. b. 131

Pulpa Cassiæ. b. 131
Passularum. b. 131
Prunorum. b. 131
Tamarindorum. b. 131
Pulvis contra abortum. b. 131
Absorbens Wedelii. b. 132
contra Acredinem. b. 134
albus Viennens. b. 148
alexipharmacus Camer. b. 132
Rollwag. b. 132
ruber. b. 132
analepticus Mindereri. b. 132
anodinus Camerarii. b. 133
Ludovici. b. 133
anonymus. b. 133
antarthriticus Wepferi. b. 133
anticolicus Camerarii. b. 137
antilyssus Lond. b. 133
antispasmodicus nitros. b. 134
bezoardicus alb. Ludov. b. 134
Anglicus compl. b. 134
incompl. b. 134
Sennerti. b. 135
Cachecticus Quercetan. b. 135
ad Calculum. b. 135
Carthusianus. vid. Kerm. mineral.
contra casum. b. 135
Cephalicus albus. b. 136
Camerarii. b. 136
Winteri. b. 136
Cervinus Camerarii. b. 136
e Chelis cancror. pretios. b. 137
minus pret. b. 137
Comitis de Warwick. b. 138
Confortans Camerarii. b. 137
Contrayervæ. b. 137
Cordialis Zellens. b. 138
Cornachini. b. 138
Cosmeticus ad manus. b. 138
dentifricius. b. 138
dysentericus. b. 138
ad Dysuriam. b. 138
epilepticus Cellarii. b. 139
de Gutteta Riverii. b. 139
Holsaticus. b. 139
Marchionis. b. 140
mirabilis Mynsicht. b. 140
niger. b. 140
ruber. b. 140
Viennens. niger. b. 140
Erysipelatodes Mynsicht. b. 140
ad flatus. b. 141
fumalis odoratus. b. 141
Haugii. b. 141
Galactopœus. b. 141
Haly contra Phthisin. b. 142
hepaticus Dresdens. b. 142
hystericus. b. 142
incidens Stahlii. b. 142
Pulvis lenitivus tartarisat. b. 142
Mantuanus. b. 142
Martialis Anglicus. b. 143
mitigans Wepferi. b. 138
ad morsum canis rabidi. b. 143
nephriticus pretiosus. b. 143
Pannonicus ruber. b. 144
min. pretios. b. 143
ad Partum. b. 144
pleuriticus. b. 144
Mynsichti. b. 144
præcipitans Stahlii. b. 145
purpureus Anglicus. b. 145
resolvens Stahl. simplex. b. 145
compos. b. 144
Scillæ compositus Stahl. b. 145
sternutat. alb. Camerar. b. 146
Gmelini. b. 146
Nopsii. b. 146
variegatus. b. 147
viridis. b. 145
stomachicus Birckmann. b. 147
ad Strumas cum sacch. b. 147
temperans. b. 147
ad Tormina Infantum. b. 148
contra vermes. b. 148
Viennensis albus. b. 148
niger. b. 140
Vitæ Imperatoris. b. 148
Pumex. vid. Lapis.

Quercus Folia. vid. Herba.
Viscus. vid. Lignum.

Radix Acetosæ. 20
Acori veri. 20
vulgaris. 20
Alceæ. 20
Alkannæ rubræ. 21
Allii sativi. 20
Altheæ. 20
Amaræ dulcis. 20
Anchusæ florib. puniceis. 21
Angelicæ silvestris. 21
veræ. 21
Anthoræ. 21
Apii palustris. 21
sativi. 21
Aquilegiæ. 21
Ari. 21
præparatæ. b. 149
Aristolochiæ clematit. 22
fabaceæ. 22
longæ veræ. 22
rotund. veræ. 22
vulg. 22
Arnicæ. 22
Artemisiæ. 23
Asari. 23
Asparagi. 23
Asphodeli. 23

Radix Barbæ caprinæ. 23
Bardanæ. 23
Been albi. 23
rubri. 23
Betæ rubræ. 24
Bistortæ. 24
Borraginis. 24
Brusci. 24
Bryoniæ. 24
Buglossi. 24
arvensis annui. 21
Calami aromat. 20. 24
Capparis. 24
Cardopatii. 24
Cardui benedicti, s. Sancti. 25
Caroli Sancti. 140
Caryophyllatæ. 25
Cassummuniar. 140
Cavæ. vid. Aristoloch.
Chelidonii majoris. 25
minoris. 25
Chinæ. 25
Cichorii. 25. 26
Cipo de Cameras. 140
Colchici albi. 26
Colubrinæ. vid. Bistortæ. 26
Consolidæ majoris. 26
Contrajervæ. 26
novæ, albæ, major. 141
Costi amari. 26
dulcis. 26
Cucumeris asinini. 27
Curcumæ. 27
Cyclaminis. 27
Cynoglossi. 27
Cyperi longi. 27
odoris Peruv. 26
rotundi. 27
Dentariæ majoris. 27
minoris. 28
Diptamni, s. Dictamni. 28
Doronici Roman. 28
Ebuli. 28
Ellebori albi. 28
nigri. 28
Enulæ. 29
Eryngii. 29
Esulæ. 29
Farfaræ. 29
Filicis. 29
Filipendulæ. 29
Fœniculi. 30
Fragariæ. 30
Fraxinellæ. 28
Galangæ. 30
Gentianæ cruciatæ, min. 30
Indicæ. 141
major. luteæ. 30
Glycyrrhizæ. 32
Graminis. 30
Radix Helenæ Sanctæ. 141
Hellebori. vid. Ellebor.
Hermodactyli. 30
Hirundinariæ. 30
Hydrolapathi. 31
Hyosciami. 31
Hypecacuanhæ. 31
Jalappæ. 31
Ikan. 141
Imperatoriæ. 32
Iridis Florentinæ. 32
nostratis. 32
Lapathi acuti. 32
Levistici. 32
Liliorum alborum. 32
Liquiritiæ. 32
Malvæ. 32
Mandragoræ. 33
Machoacannæ albæ. 33
nigræ. 33
Metalistæ. 33
Mei. 33
Moringa. 142
Morsus Diaboli. 33
Mungos. 33
Ninzin. 34
Nympheæ albæ. 34
Olsnitii. 35
Ononidis. 35
Ostrutii. 35
Oxylapathi. 35
Palmæ Christi. 35
Pareiræ bravæ. 35
Pentaphylli. 36
Petasitidis. 36
Petroselini. 36
Peucedani. 36
Pesaulina. 142
Phu Pontici. 36
Pimpinellæ albæ. 36
latifoliæ. 36
sanguisorbæ. 36
saxifragæ. 36
Plantaginis. 36
Pœoniæ. 37
Polygonati majoris. 37
Polypodii. 37
Pseudacori. 20. 37
Pulsatillæ. 37
Pyrethri. 37
Quinquefolii. 37
Raphani rusticani. 37
Rhabarbari Monachorum. 37
veri. 38
Rhapontici officinalis. 38
veri. 38
Rhodiæ, seu Rosariæ. 38
Rubiæ tinctorum. 39
Rusci, vel Brusci. 39
Salab. 143

Radix Saniculæ. 39
Sanley. 143
Saponariæ. 39
Sarſaparillæ. 39
Satyrii. 39
Saxifragiæ albæ. 39
rubræ. 29
Scillæ. 40
Scorzoneræ. 40
Scrophulariæ. 40
Seneka. 144
Serpentariæ Virginianæ. 40
Sigilli Salomonis. 40
Simaruba. 144
Spicæ Celticæ. 40
Indicæ. 40
Squamariæ. 41
Succiſæ. 41
Taraxaci. 41
Tormentillæ. 41
Trifolii aquatici, s. fibrini. 41
Turbith. 41
Tuſſilaginis. 29. 41
Valerianæ. 41
Victorialis longæ. 41
rotundæ. 42
Vincetoxici. 30. 42
Ulmariæ. 23. 42
Urticæ. 42
Zedoariæ. 97
Zinziberis albi. 97
vulgaris. 97
Recrementum vitri. 13
Regulus Antimonii martialis. b. 149
medicinal. b. 149
Antimonii ſimplex. b. 150
uſtus. b. 134
Reſina Jalappæ. b. 150
Ligni Sancti. vid. Extract.
Scammonii. b. 150
vulgaris Pini. 113
Rhabarbarum verum. vid. Radix.
Rhaponticum. vid. ibid.
Rhinocerotis Cornu. 134
Ribes conditæ. vid. Condita.
Riſigallum. 16
Roob Berberum. b. 150
Ceraſorum. b. 151
Cornorum. b. 151
Cydoniorum. b. 151
Cynosbati. b. 151
Ebuli. b. 151
Juniperi. b. 151
Mororum. b. 151
Nucum. b. 151
Ribium. b. 151
Rubi idæi. b. 151
Sambuci. b. 151
Rorella. vid. Herba.
Rotulæ Berberum. b. 151
Rotulæ Diaireos. b. 151
Manus Chriſti parlat. b. 152
contra vermes. b. 152
Rubinus. vid. Lapis.
Rubrica fabrilis. 4
Saccharum. 121
candiſatum. 122
clarificatum. b. 152
lactis. b. 152
liquidum. 121
perlatum. b. 152
roſatum tabul. b. 152
Saturni cryſtal. b. 152
Thomæ. 121
Sagapenum. vid. Gummi.
Sagu. 143
Sal Abſinthii. b. 153
Acetoſellæ eſſentiale. b. 154
alkali vulgare. 5
Ammoniacum. 6
Anglicum laxativum. 6
volatile. b. 153
Coralliorum. b. 154
Cornu Cervi volatile. b. 154
Egranum. 6
Ebshamenſe. 6
Febrifugum Sylvii. b. 155
Gemmæ. 6
Lumbricorum terreſtr. volat. b. 155
Margaritarum. b. 154
Marinus. 6
Matris perlarum. b. 154
Mirabilis Glauberi. b. 155
Oculorum Cancrorum. b. 154
Petræ. 5
Polychreſtum de Seignette. b. 155
Sedlizenſe. 6
s. Soda Hiſpanica. 6
Succini volatile. b. 156
Tartari fixum. b. 156
volatile. b. 156
Tackenii. b. 156
Vegetabilium fixum. b. 153
Viperarum volatile. b. 157
Vitri. 13
Volatile cornu cervi. b. 154
lumbric. terreſtr. b. 155
oleoſum. b. 157
Angelicæ. b. 157
Sylvii. b. 157
ſiccum Anglic. b. 153
ſuccini. b. 156
tartari. b. 156
Tackenii. b. 156
viperarum. b. 157
urinæ. b. 158
Sandaracha Arabum. v. Gummi.
Græcorum. 12. 16
Sambuci baccæ exſiccatæ. 91

Sanguis draconis. 113
hirci præparat. b. 158
Sandalum. vid. Lignum.
Sapo medicatus. b. 158
tartareus. b. 159
Sapphirus. vid. Lapis.
Sarcocolla. vid. Gummi.
Sarda. vid. Lapis.
Sarſaparilla. vid. Radix.
Saſſafras. vid. Lignum.
Scammonium. 122
Schœnanthum. vid. Herba.
Scilla præparat. b. 159
Scinci marini. 134
Sebeſten. 91
Secundinæ humanæ pptæ. b. 160
Sego. 143
Semen Abelmoſch. 71
Acetoſæ. 71
Agni caſti. 71
Alkekengi. 71
Altheæ. 71
Ameos. 71
Amomi. 71
Anethi. 72
Angelicæ. 72
Aniſi ſtellati. 72
vulgaris. 72
Apii. 73
Aquilegiæ. 73
Aſparagi. 73
Atriplicis. 73
Aurantiorum. 73
Bardanæ. 73
Baſilici. 73
Berberum. 73
Bombacis. 73
Braſſicæ. 74
Buniadis. 74
Cannabis. 74
Cardui benedicti. 74
Mariæ. 74
Carthami. 74
Carvi. 74
Cataputiæ majoris. 74
minoris. 75
Chærefolii. 75
Cicerum rubrorum. 75
Cichorii. 75
Cinæ ſ. Cynæ. 75
Citri. 75
Citrulli. 75
Coccognidii. 75
Cochleariæ. 76
Colocynthidis. 76
Coriandri. 76
Cucumeris. 76
Cucurbitæ. 76
Cumini. 76
Cydoniorum. 76
Semen Cymini. 76
Cynosbati. 77
Dauci Cretici. 77
noſtratis. 77
Ebuli. 77
Endiviæ. 77
Erucæ. 77
Fabarum. 77
Fagopyri. 78
Fœniculi Cretici. 78
vulgaris. 78
Fœni græci. 78
Fraxini. 78
Geniſtæ. 78
Halicacabi. 71
Hordei. 78
Hyoſciami. 78
Hyperici. 79
Lactucæ. 79
Lapathi acuti. 79
Lappæ majoris. 79
Leviſtici. 79
Lini. 79
Lithoſpermi. vid. Milii ſolis. 80
Lupinorum. 79
Lycopodii. 79
Malvæ. 80
Melonum. 80
Milii Solis. 80
Napi ſativi. 80
Naſturtii hortenſis. 80
Nigellæ. 80
Orobi. 80
Papaveris albi. 80
nigri. 81
Perfoliatæ. 81
Petroſelini Macedonici. 81
vulgaris. 81
Plantaginis. 81
Pœoniæ. 81
Portulacæ. 81
Pſyllii. 81
Raparum. 81
Raphani. 81
Ruſci. 82
Rutæ. 82
Sabadilli. 82
Sambuci. 82
Sanctum ſ. Santonicum. 82
Saxifragiæ. 82
Scariolæ. 82
Seſami. 82
Seſeli Cretici. 82
Maſſilienſis. 82
Sinapi. 83
Sophiæ Chirurgorum. 83
Staphidis agriæ. 83
Sumach. 83
Tanaceti. 83
Thlaspios. 83

Semen Violarum. 83
Viticis. 84
Urticæ Romanæ. 84
vulgaris. 84
Zedoariæ. 84
Sennæ Folia. 61
Folliculi. 61
Sericum crudum. 134
toſtum. b. 110
Serpentaria Virginian. vid. Radix.
Serpentum exuviæ. 134
Sevum bovinum. 136
cervinum. 136
hircinum. 136
Sief album. b. 160
Silex. 10
Siliqua dulcis. 91
Sinopis. 4
Smaragdus. vid. Lapis.
Smiris. vid. ibid.
Soda Hiſpanica. 6
Solutio Coralliorum. b. 160
Margaritarum. b. 160
Matris Perlarum. b. 160
Oculorum Cancrorum. b. 160
Sorbus torminalis. 91
Sparadrap, s. tela Gualth. b. 160
Species Diambræ. b. 160
Dianiſi. b. 161
Dianthos. b. 161
contra Apoplexiam. b. 161
aromaticæ caryophyll. b. 161
roſatæ. b. 162
Diaboracis. b. 162
Cephalicæ pro Cucuph. b. 168
Epithem. b. 168
Diacinnamomi. b. 162
Cordiales temperatæ. b. 162
Diacretæ Camerarii. b. 163
Mynſichti. b. 163
pro Epithemat. Cord. & Puls. b. 168
de Gemmis frigidæ. b. 163
de Hiera picra. b. 164
de Hyacintho. b. 164
Diajalappæ Mynſicht. b. 164
Imperatoris. b. 164
Diaireos ſimpl. b. 164
Lætificantes Rhaſis. b. 165
Diamargaritæ calidæ. b. 165
frigidæ. b. 165
Diarrhodon Abbat. b. 165
tabaci pro fumo offic. b. 166
Camer. b. 166
Dia-trion ſandalon. b. 166
Diatragacanthæ frigidæ. b. 166
Diaturbith. b. 167
Decocti Avenæ. b. 167
carminativi. b. 167
emollientes. b. 168
Species Decocti Florum & Fruct. b. 169
ad Gangrænam. b. 169
pro Gargarismate adſtring. & emoll. b. 169
Lignorum. b. 170
nephritici. b. 167
nigri. b. 170
pectoralis. b. 170
pro potu infant. b. 170
vulnerarii. b. 171
Specificum Antatrophum Wepferi. b. 171
Antihect. Pot. vid. Antihect.
Cephalicum Michaëlis. b. 171
febrifugum Craani. b. 172
Antifebrile Crollii. b. 171
jalappinum. b. 172
Tartari. pharyng. Zobel. b. 172
Sperma Ceti. vid. Ceti Sperma.
Sperniola Crollii. b. 172
Sphæra marina. 17
Spica Celtica. vid. Radix.
Indica. vid. ibid.
Spina cervina. vid. Baccæ. 92
Spiritus Æruginis. b. 172
Angelicæ. b. 173
Aniſi. b. 173
Anthos. b. 173
Aperitivus Penoti. b. 173
Balſami Peruviani. b. 173
Balſamicus albus. b. 173
Bezoardicus Buſſii. b. 174
Carminativus Sylvii. b. 174
de tribus. b. 174
Caſtorei comp. Lond. b. 175
Ceraſorum nigror. b. 175
Cochleariæ. b. 175
Cornu Cervi. b. 175
ad uſus externos. b. 175
Corticum Aurantiorum. b. 176
citri. b. 176
Croci. b. 176
Cydoniorum. b. 175
Ebuli. b. 175
Formicarum. b. 176
Fragorum. b. 175
Fuliginis. b. 176
Juniperi. b. 176
Lavendulæ. b. 177
Ligni Guajaci. b. 177
Liliorum convall. b. 177
Lumbricor. terr. vinos. b. 177
volat. b. 177
maſtichinus. b. 177
matricalis. b. 178
Meliſſæ comp. vid. Aqua.
ſimplex. b. 178

Spiritus Mellis. b. 178
Menthæ. b. 178
Nitri anticolicus. b. 178
concentrat. b. 179
dulcis. b. 179
vulgaris. b. 178
Panis. b. 179
Rosarum per ferment. b. 179
cum vino. b. 179
Salis Ammon. anisat. b. 179
aromat. b. 180
succinat. b. 180
volat. vin: b. 180
urin. b. 180
coagulatus. b. 181
commun. acidus. b. 181
concent. b. 181
dulcis. b. 181
Sambuci ex Baccis. b. 175
Florib. b. 181
antiscorbuticus Draw. b. 181
Serpilli. b. 182
Sulphuris per campan. b. 182
Tartari simplex. b. 182
volatilis. b. 183
Terebinthinæ. b. 183
Theriacalis. b. 183
camphor. b. 183
de tribus. vid. Mixtur. simpl.
Trifolii fibrini. b. 183
Vini camphorat. b. 183
rectificat. b. 184
tartarisat. b. 184
Vitrioli dulc. v. Liq. anodyn. mineralis.
coagulatus. b. 184
philosophicus. b. 184
vulgaris. b. 184
Urinæ. b. 184
Spodium album. b. 42
Spongia marina. 18
tostæ. b. 184
Squilla. vid. Radix.
Stella terræ. 10
Stibium. 11
Stincus marinus. 134
Storax calamita. vid. Gummi. 114
liquida. 117
Struthionis ova. 135
Succinum. 18
præparatum. b. 185
Succus Acetosellæ. b. 185
Berberum. b. 185
Citri. b. 185
Cydoniorum. b. 185
Mororum. b. 185
Rubi Idæi. b. 185
Sulphur auratum Antimonii. b. 185
caballinum. 16
citrinum. 16
Sulphur rubrum Antimonii. b. 97
vivum griseum. 16
Suppositoria. b. 185
Syringites. 18
Syrupus Absinthii. b. 185
Acaciarum. b. 186
Acetosæ. b. 186
Acetosellæ. b. 186
Acetositatis Citri. b. 186
de Agresta. b. 186
de Althea Fernelii. b. 186
de Ammoniaco. b. 186
de Artemisia. b. 187
Balsamicus. b. 187
Bellidis. b. 187
Berberum. b. 187
Betonicæ. b. 187
Borraginis. b. 188
Buglossi. b. 188
Brunellæ. b. 188
Bryoniæ. b. 188
Capillor. vener. comp. b. 188
simpl. b. 188
Cardiacus. b. 189
Cardui benedicti. b. 189
Cascarillæ. b. 196
Centaurii minoris. b. 189
Cerasorum acidorum. b. 189
Chacarillæ. b. 196
Chamomillæ. b. 189
Chenepodii. b. 189
de Cichorio c. Rhab. b. 190
Cinnamomi. b. 190
Citri e toto. b. 190
Cochleariæ. b. 190
Contrayervæ. b. 190
composit. b. 191
Coralliorum. b. 191
Cort. Aurantiorum. b. 191
Citri. b. 191
Croci. b. 192
de Cucurbita. b. 192
Cydoniorum. b. 192
Diacodium montan. b. 192
crocat. b. 192
Domesticus. b. 193
Emeticus. b. 193
Ang. Sal. b. 193
Enulæ. b. 193
de Erysimo Lobelii. b. 193
Farfaræ. b. 194
Fragorum. b. 194
Fumariæ. b. 194
Glycyrrhizæ. b. 194
Granatorum. b. 194
Granorum kermes. b. 194
Hederæ terrestris. b. 195
Hyperici. b. 195
Hyssopi. b. 195
de Jujubis. b. 195

Syrupus

Syrupus Kinæ Kinæ. b. 196
Ligni Saſſafras. b. 196
Liquiritiæ. b. 194
de Manna. b. 196
Maſtichinus. b. 196
Meliſſæ. b. 197
Menthæ. b. 196
Mercurialis. b. 197
Mororum. b. 197
Muſci querni. b. 197
Myrtillorum. b. 197
Nicotianæ. b. 197
Nuciſtæ. b. 198
Papaveris albi. b. 198
erratici. b. 198
Paralyſeos. b. 198
Perſicorum e Floribus. b. 199
Plantaginis. b. 188
Pœoniæ. b. 199
de Rhabarbaro. b. 199
Ribium. b. 199
Rorellæ. b. 199
Roſarum ſiccarum. b. 200
ſimplex. b. 200
ſolutivus. b. 200
Rubi idæi. b. 200
Scelotyrbicus. b. 200
de Scilla. b. 200
Scordii. b. 200
Sedi majoris. b. 201
Stœchadis. b. 201
Sulphuris. b. 201
Symphyti Fernelii. b. 201
Tunicæ. b. 202
Veronicæ. b. 202
Violarum. b. 202
ſolutivus. b. 202

Talcum. 10
Tali leporis. 131
Talpæ combuſtæ. 135
Tamarindi. 92
Tartarus Chalybeatus. b. 203
crudus. 122
emeticus. b. 203
tartariſatus. b. 203
vitriolatus. b. 203
Tackenii. b. 203
Tartari oleum per deliquium. b. 202
Terra foliata. v. Terra.
Tauri Priapus. 135
Terebinthina cocta. b. 204
communis. 117
Cypria. 118
Veneta. 117
Terra Catechu. 122
foliata Tartari. b. 27. 203
Japonica. 122
Lemnia. 4
Orleana. 15
ſigillata alba Turcica. 4
Terra ſigillata alba Goldbergenſis. 4
Melitenſis. 4
griſea Sileſiaca vel lutea
Strigonienſis. 4
rubra Turcica. 4
Tripolitana. 4
viridis. 4
Teſticuli equi præparati. b. 204
Theriaca Andromachi. v. Electuarium.
Cœleſtis Wirtenb. b. 204
Thus. vid. Olibanum.
Thutia. vid. Tutia.
Tinctura Aloës. b. 204
Amara Londin. b. 204
Anodyna. vide Eſſentia.
Antimonii acris. b. 205
tartariſ. b. 205
Antiphthiſica Garm. b. 205
Aquilegiæ. b. 206
Aromatica Londin. b. 206
Bellidis. b. 206
Bezoardica Michaëlis. b. 206
Ludovici. b. 206
officinalis. b. 207
Wedelii. b. 207
Cantharidum. b. 208
Coralliorum. b. 208
Croci. b. 208
vinoſa. b. 208
Gingivalis balſamica. b. 208
Hellebori comp. b. 209
Laccæ. b. 209
Martis adſtring. b. 209
aper. ſpirit. b. 209
Ludov. b. 210
cœrulea Ettner. b. 210
cydoniata. b. 210
hellebor. b. 210
pomata. b. 210
c. vin. malv. b. 211
Zwœlff. b. 211
Metallorum. b. 211
Odontalgica. b. 211
Papaveris. b. 206
Proprietatis Myns. b. 212
Rhabarbari ſimpl. b. 212
compl. b. 212
Roſarum. b. 206
Stomach. aromat. b. 212
Lipſiens. b. 213
martial. b. 213
Succini. vid. Eſſent.
Sulphuris. b. 213
Tartari. b. 213
acris. b. 213
Topaſius. vid. Lapis.
Torna ſolis cœrulea. 16
rubra. 16
Tragacantha. vid. Gummi.

Tragea aromatic. Gabelkov. b. 214
officin. b. 214
granorum actes. b. 214
ophthalmica. b. 214
Tribuli aquatici. 92
Trichites. 7
Tripolis. 4
Trochisci Alhandal. b. 214
aliptæ moschatæ. b. 215
Alkekengi. b. 215
cum opio. b. 215
Alkermes complet. b. 215
de Ambra. b. 216
Anthelmintici Scretæ, b. 216
Bechici albi. b. 216
citrini. b. 216
nigri. b. 216
rubri. b. 216
de Carabe. b. 216
de Catechu muscerdæ. b. 217
ad sput. cruent. b. 217
de Cremore Tartari. b. 217
Escharotici. b. 217
Galliæ moschatæ. b. 217
Hermetici. b. 216
de Myrrha. b. 217
de Scilla. b. 218
de Vipera. b. 218
Turbith. vid. Radix.
Turpethum minerale. b. 218
Tutia Alexandrina. 16
præparata. b. 219

Vainiglia. 92
Ventriculi Gallinar. 130
præpar. b. 219
Vinum cydoniorum. b. 219
Granatorum. b. 219
Rubi idæi. b. 219
Viperæ. 135
Viride æris. 16
montanum. 4
Viscus corylinus. 106
quernus. 106
Vitriolum album. 6
Cyprinum, f. cœruleum. 7
Martis. b. 219
Veneris. v. Æs vir. cryftall.
viride Hungar. Angl. Rom. 7
vulgare. 7
Vitrioli Gilla Theophrafti. b. 219
Ros f. Phlegma. b. 219
Terra dulcis. b. 219
Vitrum Antimonii hyacinth. b. 219
Venetum. 16
Umbilicus marinus. 19
Uniones. 18
Unguentum Ægyptiacum. b. 220
Agrippæ. b. 220
alabaftrinum. b. 220
Unguentum album camphorat. b. 220
simplex. b. 220
Altheæ. b. 221
ad Ambufta. b. 221
anodynum. b. 221
Apostolorum. b. 221
de Arthanita. b. 222
aureum. b. 222
Basilicum. b. 223
Calendulæ. b. 223
carminativum. b. 223
clysmaticum. b. 223
Comitissæ. b. 224
digestivum. b. 224
Digitalis. b. 224
enulatum. b. 224
fuscum. b. 225
Hyosciami. b. 225
infrigidans Galen. b. 225
Linariæ. b. 225
Liquiritiæ. b. 225
Lithargyrii. b. 225
Majoranæ. b. 226
Malvæ. b. 226
Martiatum. b. 226
de Minio Camph. b. 226
Mundificans Stahl. b. 226
Neapolitanum. b. 227
Nervinum. b. 227
Nicotianæ. b. 227
Nihili. b. 227
Pectorale. b. 228
Pediculorum. b. 228
pomatum Naphæ. b. 228
dia Pompholygos. b. 228
populeum. b. 229
purpureum Wurz. b. 229
resumtivum. b. 229
rosatum. b. 229
simplex. b. 230
rubrum ad Labia. b. 230
potabile. b. 230
Sandalinum. b. 230
ad Scabiem officin. b. 230
Zelleri. b. 231
somniferum. b. 231
spleneticum. b. 231
stomachale. b. 231
ad tabida membra. b. 231
contra Vermes. b. 232
viride potabile. b. 232
de Uvis. b. 232
Unguis odoratus. 18
Ungula Alcis. 125
præparata. b. 232
Unicornu fossile. 136
marinum s. ver. 135
præpar. b. 232
Uvæ passæ. vid. Passulæ.

Uvæ quercinæ. 92
Vulpis Pulmones. 135
Xylo Aloës. vid. Lignum Aloës.
Zagoe. 143
Zedoaria. 97
Zibethum. 136
Zingiber album. 97
conditum. vid. Condita.
vulgare. 97
Zopiſſa. vid. Pix navalis.

II.

Table des noms françois, contenues dans la premiere Partie de cet Ouvrage.

Abſinthe. 42
Romain ou Pontic. 42
Acanthe. 46
Aceteuſe. 43
Achiote. 15
Acmelle. 43
Adiante blanche. 43
Ægagropila. 125
Agaric. 123
mineral. 3
Agripaume. 46
Aigremoine. 43
Ail. 20
Aiman. 9
Albâtre. 7
Alcée. 43
Alleluja. 43
Alliaire. 44
Aloë caballine. 118
hepatique. 118
ſuccotrine. 119
Alun blanc, vulgaire. 5
de plume. 7
de roche. 5
Romain. 5
Aluyne. 42
Amandes ameres. 84
douces. 84
Ambre gris. 16
jaune. 18
liquide. 115
Ametiſte. 10
Amiante. 8
vulgaire. 8
Anacardes. 84
Anagallis le mâle. 44
Anet. 44
Anis êtoilé. 72
Antimoine. 11
Arêtes de Murene. 132
Argent fin en feuilles. 11
vif. 12
Argentine. 44
Ariſtoloche menue. 44
Armoiſe blanche. 45
rouge. 44
Arſemiſe. v. Armoiſe.
Arſenic blanc. 12
jaune. 12
rouge. 12
Aſa fœtida. 107
Asbeſte. 8
Aſpic. 53
Auronne le mâle. 42
Axonge d'Anguille. 136
de Blaireau. 137
de Brochet. 137
de Caille. 137
de Canard. 136
de Caſtor. 137
de Caſtoreum. 137
de Chapon. 137
de Chat ſauvage. 137
de Chien. 137
de Cicogne. 137
de Col de cheval. 137
de Couleuvre. 137
de Heron. 136
Humaine. 137
de Lapin. 137
de Lievre. 137
de Loup. 137
de Marmotte. 137
d'Ours. 137
d'Oye. 136
de Porc. 137
de Poule. 137
de Renard. 137
de Thymallus. 137
des Viperes. 137
Azur. 8. 9
Bardane *grande*. 52
Baſilic. 45
Batrachite. 8
Baume de Canada. 115
de Capahu, ou de Copaiba. 115

Baume dur. 116
de Judée. 116
de Mecha. 116
de Perou *blanc.* 116
noir. 116
rouge ſec. 116
de Tolu. 117
Bayes de Coqueret. 71
de Genevre. 89
de Laurier. 89
de Lierre. 89
de Myrte. 90
de Myrtille. 90
de Nerprun. 92
des raiſins de Renard. 90
de Sureau. 91
Bdellium. 108
Becabunge. 45
Bec de grue. 51
Belemnite. 9
Ben. 85
Benjoin. 107
Berberis ſeché. 85
Beterave. 24
Betoine. 45
Bezoard d'Allemagne. 125
Occidental. 126
Oriental. 126
de Porcépi des Indes. 133
Bismuth. 14
Bitume de Judée. 17
Blanc de baleine. 129
de plomb. 12
Blatte Byzantine. 18
Blé noir. 78
Bois d'Aloës. 102
d'Aſpalat. 103
de Buis. 103
Couleuvré. 103
de Cypre. 105
de Cyprés. 103
Ebene. v. Ebene.
de Gayac. 103
de Genevre. 104
Lentisque. 104
Liege. v. Liege.
des Moluques. 104
nephretique. 104
de Rhode. 105
des Roſes. 105
ſaint. 103. 105
de Santal *blanc.* 105
citrin. 105
rouge. 105
de Saſſafras. 105
Bol d'Armenie. 3
blanc. 3
rouge vulgaire. 3
Boletus cervinus. 123
Bon Henri. 45
Homme. 64
Borax de Veniſe. 5
Borrage. 45
Bougrande. 35
Bouillon blanc. 64
Bourrache. 45
Bourſa à berger. 46
Branque urſine. 46
Brunelle. 58
Bruyere. 49
Bugle. 48
Bugloſſe. 46
Cabaret. 45
Cacao. 85
Cachou. 122
Cadmie. 8. 12
Caffé. 86
Caillelait. 50
Caillou. 10
Calamente. 46
Calamine. 8. 12
blanche. 15
Camphre. 108
Cancamum. 109
Canelle *blanche.* 95
fine. 94
Cantharides. 128
Capillaire. 43
Caragne. 109
Cardamome *grand.* 96
petit. 93
Carotte ſauvage. 77
Carouge. 91
Carpobalſam. 86
Caſſe. 94
en bâton. 86
Caſtorée ou Caſtoreum. 128
Cedon. 61
Cendre gravelée. 5
Centaurée *petit.* 47
Centinode. 47
Ceriſes aigres ſeches. 86
Cerfeuil. 47
Ceruſe blanche. 12
jaune. 13
de Veniſe. 13
Ceterac. 47
Chacarille. 98
Chardon benit. 46
de nôtre Dame. 47
Chaux. 8
Chelidoine *grande* eclaire. 47
petite. 61
Chene *petit.* 47
Cheveux de Venus. 43
Chicorée. 48
Chine Chine. 99
Choumarin. 62

Chry-

Chryſocotte. 4
Chryſolith. 10
Ciguë. 48
Cinabre artificiel. 13
mineral. 13
Cire *blanche.* 138
jaune. 138
Civette. 136
Cloportes. 125
Clous des Girofles. 94
Cobalt. 12
Cochenille. 129
Coins. 87
Collechair. 114
Colle de poiſſon. 131
Colophone. 109
Coloquinte. 87
Coniſe. 48
jaune. 48
Conſoude *grande.* 48
moyenne. 48
Coquilles d'Eſcargots. 130
Corail *blanc.* 17
noir. 17
rouge. 17
Coraline. 17
Cornaline. 10
Corneille. 53
Corne de cerf. 128
d'Elan. 125
de Rhinoceros. 134
Cornouilles. 87
Coquerets. 84
Coques de Levant. 86
des œufs. 133
Couvercles d'Eſcargots. 129
Crane humain. 130
Crapaudine. 8. 62
Crapaux. 127
Craye *blanche.* 3
rouge. 4
Creſſon d'eau. 55
Criſtal. 8
Crotte de chien. 125
de Paon. 133
Cubebes. 95
Culilavan. 100
Cuſcute. 49
Cynorrhodons. 87

Dattes. 88
Dent de Lion. 41. 63
Dentales. 18
Dents d'Hippopotame, ou de Chaval marin. 130
de Sanglier. 125
Depouilles de Serpent. 134
Dictam, Dictame ou Dictamne de Crete. 49
Digitale. 49

Ebene. 103
Ecorce de bois gentil. 99
ſaint. 100
Chacarille. 98
de Chêne. 101
Chine Chine. 99
des Citrons. 99
Culilavan. 100
de Frangula. 100
de Frêne. 100
de Garou. 99
de Gayac. 100
de Girofle. 94
des Grenades. 100
de Maronier d'Inde. 101
de Meurier. 101
d'Orange. 98
de Prunier ſauvage. 98
Quinquina. 98
de Saſſafras. 101
Styrax Thymiama. 101
de Sureau *mediane.* 101
de Tamaris. 101
de Winter. 102
Ecoſſe de Sené. 61
Ecreviſſes *pattes.* v. Pattes.
Yeux. v. Yeux.
Emeraude. 11
Emeri. 10
Endive. 49
Entalies. 18
Epine des viperes. 135
Epithyme. 49
Eponge. 18
de Cynorrhodon. 124
de Saule. 123
d'Eſcargots *couvercles.* 130
coquilles. 130
Etain de glace. 14
Eupatoire bâtard. 50
Eufraiſe ou Euphraiſe. 50

Feve de S. Ignace. 88
Feuilles de chêne. 59
Indienne. 50
de Laurier. 53
ceriſier. 53
de Ronce. 59
de Saule. 59
de Sené. 61
des vignes. 64
Fiel de bœuf épaiſſi. 127
de verre. 13
Figues ſeches. 85
Fleurs d'Ancolie. 65
d'Anet. 65
Balauſtes. 66
de Baſilic. 66
de Betoine. 66
de Bluet. 67
de Borrache. 66
des Bouillons. 70

Fleurs de Buglosse. 66
de Carthame. 66
de Chamomille Romaine. 67
de champs. 67
de Chicorée. 67
de Coquelicot. 68
de Genet. 67
de Giroflée jaune. 67
d'Hepatique. 67
de Houblon. 68
de Lamium. 71
de Lavande. 68
de Laurier. 53
cerisier. 53
des Lis blancs. 68
des marguerittes *petites.* 66
rouges. 66
de Mars. 14
de Mauve de jardin. 68
de Melilote. 68
de Millepertuis. 68
de Muguet. 68
de Muscade. 96
de Nymphée *blanche.* 68
d'Oeuillets *rouges.* 70
d'Orange. 65
d'Ortie morte. 71
de Passevelours. 70
de pecher. 69
de Pied d'Alouette. 66
de Pivoine. 69
de Primevere. 69
des Pruniers sauvages. 65
de Romarin. 65
des Roses *blanches.* 69
pâles. 69
de Provins. 69
rouges. 69
de Sauge. 69
de Scabieuse. 69
de Soucy. 66
de Spica. 70
de Sœchas *Arabique.* 70
citrin. 70
de Sureau. 69
de Tanesie. 70
de Tillau, Tilleul, ou Tillot. 70
de Tussilage. 67
des Violettes de Mars. 70
Foye de Loup préparé. 131
Fumeterre. 50

Galanga *grand.* 95
petit. 95
Galega. 50
Garderobbe. 42. 48
Germandrée. 47
d'eau. 61
Gingembre. 97
blanc. 97
Girofles. 94
Girofles *ecorce.* v. Ecorce.
Glands. 88
Gomme Adraganth, ou d'Adragan. 115
Ammoniac. 106
Animé. 107
Arabique. 107
des cerises. 109
Copal. 109
Elemi. 109
d'Epine de bouc. 115
Euphorbe. 110
Galbanum. 110
de Gayac. 110
de Genevre. 113
Goutte. 110
Ladanum. 111
Lacque en bâton. 111
en graines. 111
en oreilles. 111
de Lierre. 111
de Senegal. 114
Goutte de Lin. 49
Graines d'Ecarlate. 88
de Musc. 71
de Paradis. 96
de Tilli. 88
Gratiole. 51
Gratte-cu. 87
Grenat. 10
Gui. 106
de Bouleau. 106
de Chene. 106
de Coudrier. 106
de Saule. 106
de Tillau. 106
Guimauve. 44
Gysieres. 130

Hanebane. 52
Haricots. 77
Hematite. 9
Hepatique d'eau. 51
noble. 51
Herbe des Aux. 44
aux chats. 46. 56
aux cuillers. 48
de fenouil. 50
de fraisier. 50
de la goutte. 59
a pauvre homme. 51
Robert. 51
Herison calciné. 130
Herniale. 52
Hieble. 49
Hirondelles calcinées. 131
Hisope. 52
Huile de pétrole clair. 15
noir, ou de Gabian. 15
roug. 15
de terre. 15
Hyacinthe. 10

Inde,

Inde, Indigo. 13
Jonc Oriental odorant. 60
Irette. 47
Jujubes. 89
Jus de Regliſſe en bâton. 119
Jusquiame. 52

Kermes. 88

Lacque colombine, en boules. 14
de Florence *fine*. 14
Lait de Lune. 3
Langue de Cerf. 60
de Serpent. 56
Laque. v. Lacque.
Lavande. 52
Licorne veritable. 135
Liege. 106
Lierre. 51
terreſtre. 51
Lievre calciné. 131
talons. v. Talons.
Limaille d'acier de fer, de Mars. 13
Lin cathartique. 53
Linaire. 53
Litharge d'argent. 14
d'or. 14
Lunaire. 53
Lyſimachie. 53

Machoires de Brochet. 131
Macis. 96
Manne de Calabre. 120
Marcaſite. 14
Marjolaine. 54
Marons d'Inde. 89
Marube *blanc*. 54
noir. 54
Marum. 54
Maſtic. 112
Matricaire. 54
Mauve. 54
ſauvage. 43
Melilot. 54
bleu. 54
Meliſſe. 54
ſauvage. 55
Turque. 55
Menthe crêpue. 55
Menyanthe. 64
Mercure. 12
Mercuriale. 55
Meres des Girofles. 93
Miel. 120
Millefeuille. 55
Mille pertuis. 52
Mine d'Antimoine. 11
martial d'Heſſe. 14
Minium. 15
Miroir d'Ane. 7
Moëlle de pierre. 4
Molene. 64
Morelle. 62
Morgeline. 44. *bis*.
Mouget de bois. 54
Mourron. 44
Mouſſe de chene. 124
marin. 17
de Prunier ſauvage. 124
terreſtre. 124
Muffle de veau. 44
Mumie. 132
Muſc. 132
Muſcades. 96
fleurs. v. Fleurs.
Myrobolans Bellerics. 89
Chebules. 89
Citrins. 89
Emblics. 90
Indiens noirs. 90
Myrrhe. 112
Myrte. 55

Nacre de perle. 18
Nefles ſeches. 89
Nids d'Hirondelles. 131
Nitre. 5
Noix de Cyrès. 87
de Galle. 88
vomiques. 90
Nombril marin. 19
Noyaux des Ceriſes. 86
de Peches. 91
Nummulaire. 56

Ochre, Ocre. 4
Oeufs d'Autruche. 135
Oignon marin. 40
Oliban. 112
Ongle d'Elan. 125
Opium de Thebes. 120
Opopanac. 112
Or fin en feuilles, or battu. 12
Orcanette. 21
Oreille d'Homme. 23. 45
de Judas, ou de Juif. 123
de ſouris. 57
Origan. 56
de Crete. 56
Orignon marin. 40
Orléan. 15
Ormin. 50
Orpiment. 12
Orpin. 12. 48
Orſeille. 14
Ortie *commune*. 65
blanche ou morte. 65
Os de cœur de cerf. 133
de Seiche. 133

Oseille. 43
sauvage. 43
Ostéocolle. 9
Outremer. 9
Ozeille. v. Oseille.

Pâquerette. 45
Parietaire. 56
Pas d'Ane. 50
Pasquette. 66
Pattes des Ecrevisses. 127
d'Oye. 46
Pavot *rouge.* 68
Pelote de mer. 17
Pensée. 52
Perce-feuille. 57
Perce-mousse. 43
Perles. 18
Persil. 57
Pervenche. 64
Pétrole *blanc.* 15
noir. 15
rouge. 15
Pied de Chat. 51
de Lion. 44
Pierre d'Aigle. 7
d'Aimant. 9
Armenienne. 8
d'Azur. 9
calaminaire. 8
des carpes. 128
a chaux. 8
d'éponge. 10
Judaïque. 9
de Lynx. 9
de Malacco. 133
nephretique. 9
de perche. 133
ponce. 10
speculaire. 7. 10
de vache marine. 132
Pignons. 90
Piloselle. 57
Piment. 46
Pimprenelle sanguisorbe. 57
saxifrage. 57
Pissenlit. 41. 63
Pistaches. 91
Plantain *long.* 57
majeure. 56
des montagnes. 44
Poignons d'Inde. 88
Poirée *blanche.* 45
Poivre *blanc.* 36
d'Espange. 97
long. 97
noir. 97
Poix. 113
blanche. 113
navale. 113
Poix *noire.* 113
Polium de Crête. 57
de montagne. 57
Pulygale. 57
Pompholyx. 15
Potasse. 5
Poûmons de Renards. 135
Préle. 49
Priape de baleine. 129
de cerf. 129
de taureau. 135
Propolis. 138
Pruneaux *doux.* 91
Prunelle. 58
sauvage. 84
Ptarmica. 58
Puliot. 58
Pulmonaire. 58
de chêne. 58
Pyrole. 59

Queue de Cheval. 49
Quinquina. 99
Quinte-feuille. 56

Racine d'Aceteuse. 20
d'Ache. 21
d'Acorus, le faux. 20
le veritable. 20
d'Alcée. 20
d'Althé. 20
d'Alkanna. 21
d'Ancolie. 21
d'Angelique. 21
sauvage. 21
d'Anthore. 21
d'Api. 21
d'Aristoloche *longue verit.* 22
ronde comun. 22
petite. 22
verit. 22
clémat des ving. 22
d'Armoise. 23
d'Arrête bœuf. 35
d'Asarum. 23
d'Asclepias. 30
d'Asperge. 23
d'Asphodele. 23
d'Aunée. 29
de barbe de chevre. 23
de Bardane. 23
de Been *blanc.* 23
rouge. 23
de Benoite. 25
de Beloine de montage. 22
de Bistorte. 24
de Boucage. 36
de Bourrache. 24
de Bryone. 24
de Buglose. 21. 24
de Cabaret. 23

Racine de Calamus aromatique. 20
de Caprier. 24
de Carline. 24
de Celeri. 21
de Chardon benit. 25
Roland. 29
de grande & petite Chelidoine. 25
de Chicorée. 25
ſauvage. 26
de Chien-dent. 30
de Concombre ſauvage. 27
de grande Conſoude. 26
de Contrayerve. 26
de Coquelourde. 37
de Coſtus *amèr.* 26
doux. 26
de Coulevrée. 24
de Curcuma. 27
de Dentaire *grande.* 27
petite. 28
de Dompte venin. 30
de Doronic. 28
de Douce-amere. 20
d'Ellebore *blanc.* 28
noir. 28
du St. Eſprit. 21
d'Eſquine. 25
de Fenouil. 30
de Filipendule. 29
de Fougére *aquatique.* 29
femelle. 29
de Fraiſier. 30
de Fraxinelle. 28
de Frêlon. 24
de Garance. 39
de Gentiane. 30
croiſette. 30
de Gin-ſeng. 34
de Glayeul. 20. 32
de Glouteron. 23
de Guimauve. 20
d'Hannebane. 31
d'Hermodattes. 30
de petit Houx. 24
de Hydrolapathum. 31
de Jalap. 31
d'Jeble. 28
d'Imperatoire. 35
d'Ipecacuana. 31
d'Iris *bleue.* 32
de Florence. 32
de Jusquiame *blanche.* 31
de langue de chien. 27
de Leveche. 32
des Lis *blancs.* 32
de Mandragore. 33
de Mauve. 32
ſauvage. 43. 20
de Méchoacan. 33
Racine de Metaliſte. 33
de Meum. 33
de Morelle rampanta. 20
Mungos. 33
de Nard Celtique. 40
de Nenufar. 34
de Ninzin. 34
d'Olſnitium. 35
d'Orchanette. 21
d'Ortie. 42
d'Oſtroloche. 22
d'Otruche. 35
d'Ozeille. 20
de pain de pourceau. 27
de Palme de Chriſt. 35
de Panicaut. 29
de Pareira brava. 35
de Parelle. 32
de Pas d'Ane. 29
de grand Pas d'Ane. 36
de patience *grande.* 38
de Marais. 30
ſauvage. 32
de Pempedula. 36
de Perſil. 36
de Pétaſite. 36
de pied de veau. 21
de Pimprenelle. 36
blanche. 36
de Piſſe en lit. 41
de Pivoine. 37
de Plantain. 36
de Polypode. 37
de Pyrethre. 37
de Queue de pourceau. 36
de Quinte feuille. 36
de grand Raifort. 37
de Rapontic. 38
de Rattelou. 22
de Régliſſe. 32
de la Reine des prez. 23
de Rhodus. 38
de Rhubarbe. 38
des moines. 37
de Ruſc. 24
ſalivaire. 37
de Salſepareille. 39
de Sanicle. 39
de Saponaire. 39
de Sarcepareille. 39
de Sarraſine. 22
de Satyrion. 39
de Savoniere. 39
de Saxifrage. 39
rouge. 29
de Sceau de Salomon. 37
de Scille. 40
de Scorzonnere. 40
de Scrophulaire. 40
Serpentaire. 40

Racine de Souchet *long.* 27
rond. 27
de Spica Nard. 40
de Succiſe. 33
de Tithymale. 29
de Tormentille. 41
de Trefle de Caſtor. 41
de Turbit. 41
de Tuſſilage. 29
de Valeriane. 41
grande. 36
de Victorialis *longue.* 41
ronde. 42
de Vigne *blanche.* 24
Viperine, de Virginée. 40
Raiſins de Corinthe. 91
de Damas. 90
gros. 90
Ratelou. 44
Renouée. 47
Reſine. 113
blanche. 113
navale. 113
noire. 113
de Storax. 114
Rocou. 15
Rômarin. 59
Ros ſolis. 59
Roucou. 15
Roitelets brulées. 134
Rubis. 11
Ruë. 59

Sabine. 59
Safran. 95
bâtard. 66
d'Indes. 27
Sagapenum. 113
Salpetre. 5
Sang de bouc ſec. 130
de Dragon. 113
Sanguine. 9
Sanicle. 60
Saphir. 11
Saponaire. 60
Sarcocolle. 114
Sardoine. 10
Sariette. 60
Sarraſin. 78
Sarraſine. 44
Sauge. 59
ſauvage. 59
Saxifrage. 60
Scabieuſe. 60
Scamonée. 122
Schœnanth. 60
Scinc marin. 134
Scordium. 61
de Crete. 61
Scrophulaire. 61
Sebeſtes. 91
Sedum. 61
Sel ammoniac, ou armoniac. 6
d'Epſon. 6
gemme. 6
marin. 6
purgatif amer. 6
d'Eger. 6
de Sedliz. 6
de verre. 13
Semence d'Ache. 73
d'Agnus caſtus. 71
d'Ammi. 71
d'Amome. 71
d'Ancholie ou d'Ancolie. 73
d'Anet. 72
d'Angelique. 72
d'Anis. 72
de la Chine. 72
d'Arroche. 73
d'Aſperge. 73
de Baſilic. 73
de Bardane. 73
de Carvi. 74
de Cerfeuil. 75
de Chanvre. 74
de Chardon *benit.* 74
Marie. 74
de Chaſſetaupe. 74
de Chicorée. 75
de Chou rouge. 74
de Citron. 75
de Citrouille. 75
de Cochlearia. 76
des Coins. 76
de Coloquinte. 76
de Concombre. 76
de Coriandre. 76
de Coton. 73
des Courges. 76
de Creſſon. 80
de Cumin. 76
de Daucus. 77
d'Eglantier. 77
d'Endive. 77
d'Epine vinette. 73
d'Epurge. 75
de Fenouil *commun.* 78
doux. 78
de Fenugrec. 78
de Fresne. 78
de Gênet. 78
de Guimauve. 71
de Gremil. 80
de l'herbe aux pouces. 81
de Houx-frelon. 82
de Jugeoline. 82
de Jusquiame. 78
de Laitue. 79
de Laureole. 76
de Leveſche. 79

Se-

Semence de Lin. 79
de Lupins. 79
de Lycopodium. 79
de Mauve. 80
de Melon. 80
de Millepertuis. 79
de Moutarde. 83
de Navet. 80
de Nielle. 80
d'Orange. 73
d'Orge. 78
d'Orobe. 80
d'Ortie. 84
Romaine. 84
d'Ozeille. 71
de Panais. 77
de Patience. 79
de Pavot *blanc.* 80
noir. 81
de Percefeuille. 81
de Persil. 81
de Macedoine. 81
de Pivoine. 81
de Plantain. 81
des pois chiches rouges. 75
de Pourpier. 81
de Raifort. 81
de Rave. 81
de Ricin. 74
de Roquette. 77
de Rüe. 82
de Sabadillum. 82
de Safran bâtard. 74
de Sesame. 82
de Sisymbrium. 83
de Staphis aigre. 83
de Sumach. 83
de Sureau. 82
de Tanesie. 83
de Thlaspi. 83
contre les vers. 75
de Violette. 83
d'Yevle. 77
Sené. 61
Seneçon. 62
Serpolet. 62
Seseli de Candie. 82
de montagne. 81
Sommitées de genevrier. 52
Soude, en pierre. 6
Soufre *grossier.* 16
jaune, commun. 16
vif, gris. 16
Sorbes sechées. 91
Soye brulée. 134
Sperme de baleine. 129
Storax. vid. Resine.
liquide. 117
Styrax Thymiama. 101
Suc d'Acacia veritable d'Egypte. 118
Suc d'Hypociste. 119
de Lycium. 119
des Prunes sauvage. 118
Succin. 18
Succise. 55
Succre. 121
liquide. 121
Suif de Bœuf. 136
de Bouc. 136
de Cerf. 136

Tabac. 56
Tabouret. 46
Tacamahac ou Tacamaque. 114
Talc. 10
Talons de Lievre. 131
Tamarinds. 92
Tamaris. 62
Tanesie. 62
Tartre. 122
Taupes brulées. 135
Terebinthine *de Chypre.* 118
ordinaire. 117
de Venise. 117
Terre Lemnienne. 4
sigillée *blanche* de Malthe. 4
de Silesie. 4
de Turquie. 4
grise de Silesie. 4
rouge de Turquie. 4
verde. 4
Terrette. 51
Testicules de cheval. 130
Têtes de Pavot. 85
Thée. 63
de la mer du Sud. 139
Thym *de Crete.* 63
a feuille menue. 63
vulgaire. 63
Topaze. 10
Tormentille. 63
Tournesol *bleu.* 16
en drapeau. 16
en pâte, en pain, en pierre. 14
Toute bonne. 45
Treffle de Castor. 64
des prées. 64
Tribules aquatiques. 92
Tripoli. 4
Turquette. 52
Tutie. 16

Vanilles. 92
Vedasse. 5
Velar. 49
Verd de gris. 16
de montagne. 4
Verge d'or. 48
Vermillon artificiel. 13
mineral. 13
Veronique. 64

Verre de Venise. 16
Vers de terre secs. 131
Verveine. 64
Vesse de Loup. 123
Violette. 64
Vitriol *d'Allemagne vulgaire.* 7
d'Angleterre. 7
blanc. 6
de Chypre. 7
d'Hongrie. 7
Vitriol *Romain.* 7
Verd. 7
Unicorne mineral. 136
Uvulaire. 65

Yeble. 49
Yeux d'ecrevisses. 127
Yvoir. 130

Zedoire. 97

III.

Teutsches Register/

über die in dem ersten Theil vorkommende/ und aus denen dreyen Natur-Reichen gebräuchliche Simplicien oder einfache Arzneyen.

Aalruppen-Gräte. 132
Aal-Schmaltz. 136
Abbiß-Wurtzel. 34
Acatien-Safft, Egyptischer. 118
Aeschbaum-Rinde. 100
Saamen. 78
Ackmellen, Ceylanische. 43
Ackermann. 20
Ackermüntz, Katzenmüntz. 56
Acorus-Wurtz, falsche. 20
Adler-Holtz. s. Paradieß-Holtz.
Stein. 7
Affodill-Wurtz. 23
Ageley-Blumen. 65
Saamen. 73
Wurtzel. 21
Agtstein. 18
Alabaster-Stein. 7
Alant-Wurtz. 29
Alaun gemeiner, weisser. 5
rother Römischer. 5
Allermannsharnisch. 42
Aloe feine von Soccotora. 119
gemeine. 118
Leber-färbige. 118
Roß- 118
Alloes-Holtz. s. Paradieß-Holtz.
Alraun-Wurtz. 33
Althea-Wurtz. 20
Ambra flüßige. 115
graue. 16
schwartze. 113
Amber-Kraut. 54
Amethist. 10
Ammey-Saamen. 71
Amömlein. 71
Ammoniac-Gummi. 106
Anacardien. 84
Andorn schwartzer. 54
weisser. 54
Angelick-Saamen. 72
Wurtzel. 21
wilde. 21
Angurien-Saamen. 75
Anime-Gummi. 107
Anis gemeiner. 72
Indianischer. 72
Antoni-Kraut. 57
Apostem-Kraut. 60
Blumen. 69
Arabisches Gummi. 107
Arabische Stöchas-Blumen. 70
Armenischer Bolus. 3
Stein. 8
Aron-Wurtzel. 21
Arlas-Beer. 91
Arnick. 22
Arsenick gelber. 12
rother. 12
weisser. 12
Asand stinckender. 107
wohlriechender. 107
Asbest. 8
Aschen-Schmaltz. 137
Asphalt. 17
Asphodill-Wurtz. 23
Attich-Beer. 88
Kraut. 49
Saamen. 77
Wurtzel. 28
Augentrost. 50
Aurin-Kraut. 51
Auripigment. 12

Bachbungen. 45
Badian. 72

Bad-

Bad-Schwamm. 18
Bären-Fenchel. 33
Klauen. 46
Lappen. 79
Schmaltz. 137
Tatzen. 46
Bär-Wurtzel. 33
Baldrian grosser. 36
Katzen- 41
kleiner. 41
Balsam von Canada. 115
von Copaiva. 115
Indianisch-schwartzer. 116
weisser. 116
von Mecha. 116
Peruvianischer. 116
von Tolu. 117
Körner. 86
Basilic, Basilien-Blumen. 66
Kraut. 45
Saamen. 73
Bathengen. 69
Baum-Epheu-Blätter. 51
Mooß. 124
Baum-Wollen-Saamen. 73
Bauren-Senff. 83
Bdellium-Gummi. 108
Been-Früchte. 85
Wurtz rothe. 23
weisse. 23
Beerlapen-Saamen. 79
Behen. s. Been.
Beinbruch-Stein. 9
Benedict-Wurtz. 25
Benzoin. 107
Berg-Blau. 9
Crystall. 8
Grün. 4
Müntz. 46
Poley. 57
Zinnober. 13
Bernstein. 18
Bertram-Kraut. 58
Wurtz. 37
Beruf- oder Beschrey-Kraut. 48
Besen-Kraut. 83
Betonien-Blumen. 66
Kraut. 58
Bett-Stroh. 50
Beyfuß-Kraut. 44
Wurtz. 23
Bezoar Occidentalischer. 126
Orientalischer. 126
Biebergail. 128
Schmaltz. 137
Klee. 64
Bibernell-Kraut. 57
Wurtz. 36
Bilsen-Kraut. 52
Bilsen-Kraut-Wurtzel. 31
Saamen. 78
Bimsen-Stein. 10
Bingel-Kraut. 55
Bisam. 132
Saamen. 71
Bißmuth. s. Wismuth. 14
Bitter-Klee. 47
Bittere Costen-Wurtz. 26
Mandeln. 84
Bittersüß. 20
Blackfisch-Bein. 133
Blaue Violen. 70
Bleygelb. 13
Bleyweiß gemeines. 12
Venedisches. 13
Blut-Kraut. 47. 57
Wurtz. 36
Stein. 9
Bocks-Blut. 130
Horn-Saamen. 78
Hörnlein. 91
Inschlitt. 136
Peterlein. 57
Bohnen. 77
Bolus Armenischer. 3
rother. 3
weisser. 3
Borax, Borras. 5
Borragen-Blüth. 66
Kraut. 45
Wurtz. 24
Bovist. 123
Brand-Lattich. 50
Wurtzel. 29
Brackendistel-Wurtz. 29
Braun-Wurtz. 40. 61
Braunellen-Kraut. 58
Brenn-Nesseln-Kraut. 65
Saamen. 84
Wurtz. 42
Brombeer-Laub. 59
Bruch-Kraut. 48. 52
Stein. 9
Brunnellen-Kraut. 58
Brunnen-Kresse. 55
Brusch-Wurtz. 24
Brustbeer rothe. 89
schwartze. 91
Brust-Wurtz. 21
Bubenfist. 123
Buch-Ampfer. 43
Buchsbaum-Holtz. 103
Buch-Weitzen. 78
Buck rother. 44
weisser. 45
Burzel-Kraut-Saamen. 81
Buxdorn-Safft. 119
Buzen-Kletten-Wurtz. 23

Cacau-Nüsse. 85
Caffee-Bohnen. 86
Calmus. 20. 24
Cameel-Stroh. 60
Campfer. 108
Canell. 94
Caninchen-Schmaltz. 137
Capaunen-Fett. 137
Cappern-Rinde. 24
Caranna-Gummi. 109
Cardamomen grosse. 93
kleine. 93
Cardobenedicten-Kraut. 46
Saamen. 74
Wurtzel. 25
Carneol. 10
Cappern-Wurtzel. 24
Cassia-Frucht. 86
Rinde. 94
Castanien wilde. 89
Rinde. 101
Celtischer Spick. 40
Chacarillen-Rinde. 98
Chamillen-Blumen gemeine. 67
Römische. 67
China-Rinde. 99
Wurtzel. 25
Christ-Wurtzel. 28
Chrysolith. 10
Cisten-Safft. 119
Citronen-Saamen. 75
Schalen. 99
Citrullen-Kern. 75
Cobalt. 12
Coccels-Körner. 86
Colophonium. 109
Coloquinten. 78
Saamen. 76
Copal-Gummi. 109
Corallen rothe. 17
schwartze. 17
weisse. 17
Mooß. 17
Corinthen. 91
Cornell-Kirschen. 87
Costen-Wurtz bittere. 26
süsse. 26
Cretische Ammey-Saamen. 71
Poley. 57
Thym-Seide. 49
Creutz-Beer. 92
Blumen. 57
Wurtz. 35
Wurtz. 28. 30. 62
Crystall-Stein. 8
Cubeben. 95
Cuccinell. 129
Curcuma. 27
Cupressen-Holtz. 103
Cupressen-Nüsse. 87
Cyper-Wurtz lange. 27
runde. 27
Cyprischer Terpentin. 118
Vitriol. 7
Dachs-Schmaltz. 137
Datteln. 88
Dictam Cretischer. 49
weisser. 28
Dillen-Blumen. 65
Kraut. 44
Saamen. 72
Dinten-Gummi. 107
Donnerstein. 9
Dosten. 56
Cretische. 56
Drachen-Blut. 113
Draganth. 115
Dreyfaltigkeits-Blumen-Kraut. 52
Druydenfinger. 9
Dürrlützen. 87
Dürrwurtz blaue. 48
Durchwachs-Kraut. 57
Saamen. 81
Eben-Holtz. 103
Eber-Wurtz. 24
Edel-Leber-Kraut. 51
Blumen. 67
Egel-Kraut. 56
Ehrenpreiß. 64
Eibisch-Wurtzel. 20
Eicheln. 88
Eichen-Laub. 59
Mistel. 106
Mooß. 124
Rinde. 101
Traube. 92
Einhorn gegrabenes. 136
wahres. 135
Eisen-Blüthe. 14
Feyle. 13
Kraut, Eisenhart. 64
Vitriol-Kieß, Heßischer. 14
Elends-Horn. 125
Klauen. 125
Elephanten-Läuse. 84
Elfenbein. 130
Elsenich-Wurtz. 35
Elsen-Beer. 91
Endivien-Kraut. 49
Saamen. 77
Engelsüß. 37
Engel-Wurtz. 21
Enten-Schmaltz. 136
Entian-Wurtz grosse. 30
kleine. 30
weisser. 24. 125
Epheu-Beer. 89
Blätter. 51

Epheu-Hartz oder Gummi. 111
Eppich-Saamen. 73
Garten- 21
gemeiner. 21
Wasser- 21
Wurtz. 21
Erbseln-Frucht. 85
Saamen. 73
Erdäpffel. 27
Erdbeer-Kraut. 50
Wurtz. 30
Erde gesiegelte, graue Schlesische. 4
rothe Türckische. 4
weisse Schlesische. 4
Türckische. 4
Malthesische. 4
grüne. 4
Japanische. 4
Lemnische. 4
Trippel. 4
Erd-Kiefer. 47
Oehl. 15
Erdrauch. 50
Erdscheib-Wurtz. 27
Erven-Saamen. 80
Esels-Kürbsen-Wurtz. 27
Eschbaum-Rinde. 100
Saamen. 78
Euphorbium. 110
Eyer-Schaalen. 133
Fall-Kraut. 44
Wurtz. 22
Färber-Baum-Saamen. 83
Röthe. 39
Farben-Cobolt. 12
Farb-Flecklein blaue. 16
rothe. 16
Farnkraut-Wurtzel. 29
Faulbaum-Rinde. 100
Federweiß. 7.8
Feigbohnen. 79
Feigen. 85
Feig-Wartzen-Kraut. 61
Wurtzel. 25.40
Feld-Andorn. 62
Cypressen. 47
Katzen. 51
Kümmel. 74
Poley. 62
Fellriß-Wurtzel. 20
Fenchel-Holtz. s. Sassafras.
Kraut. 50
Saamen. 78
Cretischer. 78
Wurtz. 30
Fette Henne. 48
Fichten-Hartz. 113
Fieber- oder Bieber-Klee. 64
Wurtz. 41
Kraut. 47
Fieber-Rinde. 99
Fingerhut. 49
Fisch-Bein weisses. 133
Körner. 86
Leim. 191
Flachs-Dotter. 49
Seide. 49
wilder purgierender. 53
Fleischleim-Gummi. 114
Flieder. s. Hollunder.
Flöh-Saamen. 81
Flor Spanischer. 16
Florentiner Lacc. 14
Florentinische Violen-Wurtz. 32
Flüßige Ambra. 115
Storax. 117
Fönugräc. s. Bockshorn. 78
Frantzosen-Holtz. 103
Rinde. 100
Gummi. 110
Frauen-Distel. 47
Dosten. 56
Eiß. 7.8.10
Glaß. 7.10
Haar. 43
Mantel. 44
Freysam-Kraut. 52
Fuchs-Lungen. 135
Schmaltz. 137
Fünffinger-Kraut. 56
Wurtz. 36
Gänserich. 44
Gänß-Blumen. 66
Kraut. 45
Kraut. 44
Schmaltz. 136
Galban. 110
Galgant grosser. 95
kleiner. 95
Galitzen-Stein. 6
blauer. 7
Galläpfel. 8
Gallmey. 8
Gamander-Kraut. 47
Garben-Kraut. 55
Gärber-Baum. 83
Garten-Nägelein. 70
Gauchheil. 44
Geigen-Hartz. 109
Geiß-Bart-Wurtz. 23
Raute. 50
Gelber Ingber. 27
Violen. 67
Gemsen-Kugel. 125
Wurtz. 28
Gerste. 78
Gewürtz-Nelcken. 94
Gicht-Rosen. 69
Saamen. 81
Wurtz. 37

Gifftheil-Wurtzel. 21
Gifft-Wurtz bittere. 33
Peruvianische. 26
Gilb-Wurtz. 27
Ginster-Blumen. 67
Saamen. 78
Glaß-Galle. 13
Kraut. 56
Venedisches. 16
Glied-Kraut. 62
Weich-Wurtzel. 23
Glocken-Blumen. 65
Saamen. 73
Gold-Blättlein. 12
gelb. 12
Glette. 14
Kraut. 62
Wurtz. 23
Golden-Wiederthon. 43
Gottes-Gnad. 51
Granat. 10
Granaten-Blumen. 66
Schalen. 100
Graß-Blumen. 70
Wurtzel. 30
Grieß-Holtz. 104
Stein. 9
Wurtz Americanische. 35
Grind-Kraut. 62
Wurtzel. 32
Grün-Span. 16
Gürtel-Kraut-Saamen. 79
Gulden-Günsel. 48
Klee. 55
Gummi-Ammoniac. 106
Cancam. 109
Copal. 109
Caranna. 109
Galban. 110
Gutt. 110
Lac. 111
Ladan. 111
Gundel-Reben. 51
Gunder-Mann. 51
Gurcken-Saamen. 76
Guter Heinrich. 45

Haarstrang-Wurtz. 36
Hagenbutten. 87
Saamen. 77
Schwamm. 124
Hanff-Saamen. 74
Harn-Kraut. 52
Indianisches. 43
Hartz. 113
Haaß gebranter. 131
Haasen-Fett. 137
Pfötlein. 51
Sprünge. 131
Hasel-Mistel. 106
Wurtz. 23
Hasel-Kraut. 45
Hauchhechel-Wurtz. 35
Hausen-Blasen. 131
Hauß-Wurtz. 61
Hecht-Kiefer. 131
Fett. 137
Heidel-Beer. 90
Heide-Korn. 78
Kraut. 49
Heidnisch Wund-Kraut. 48
Heilig Geist-Wurtz. 21
Heil aller Schaden. 64
Heinrich guter, stoltzer. 45
Herbst-Rosen. 68
Hermodatteln. 30
Hertz-Gespan-Kraut. 46
Wurtz. 21.22
Himmel-Schlüssel. 69
Hind-Läuff-Blumen. 67
Kraut. s. Wegwart.
Wurtz. 25.26
Hinsch-Kraut-Wurtz. 20
Hirn-Schaale menschliche. 130
Hirsch-Brunst. 123
Hertz-Creutz. 133
Horn. 128
Inschlitt. 136
Klee. 50
Ruthe. 129
Zungen-Kraut. 60
Hohl-Wurtz. 22
Hollunder-Beer. 91
Blüth. 69
Rinde. 101
Saamen. 82
Schwamm. 123
Honig. 120
Klee. 54
Hopfen. 68
Huff-Lattich-Blumen. 67
Kraut. 50
Wurtzel. 20
Hüner-Darm-Kraut. 44
Magen-Häutlein. 130
Scherben. 44
Schmaltz. 137
Hunds-Fett. 137
Graß-Wurtz. 30
Kopf. 55
Koth. 125
Kürbsen-Wurtz. 24
Zungen-Wurtz. 27
Hyacinth. 10
Hypecacuanha. 31
Hypocisten-Safft. 119
Hyssopp. 52

Jalappen-Wurtzel. 31
weisse. 33
Japanische Erde. 122
Je Länger je Lieber. 20

Igel gebrannter. 130
St. Ignatius-Bohnen. 88
Indig. 13
Ingwer, Imber. 97
teutscher. 21
gelber. 27
Ingrün. 64
Inschlitt Bocks- 136
Hirsch- 136
Rinder- 136
Johannes-Blumen. 68
Brod. 91
Gürtel-Wurtz. 23
Kraut. 52
Saamen. 79
Wurtz. 37
Ispen-Kraut. 52
Judas-Ohr. 123
Juden-Kirschen. 71. 84
Pech. 17
Stein. 9
Weyrauch. 101

Käß-Pappeln. 54
Kalch-Stein. 8
Kammels-Stroh. 60
Kamm-Fett. 134
Kampfer. 108
Karpfen-Stein. 128
Kaul-Pfersich-Stein. 133
Kaysers-Wurtz. 35
Katzen-Müntz. 56
Stein. 9
Träublein. 61
Wadel. 49
Keller-Esel. 125
Hals-Rinde. 99
Saamen. 76
Keuschlamm-Saamen. 71
Kichern. 75
Kiesel-Stein. 10
Kirschen-Hartz. 109
Kern. 86
Loorbeer-Blätter. 53
Klapper-Rosen. 68
Klee. 64
Kletten-Blätter. 52
Saamen. 73
Wurtz. 23
Knaben-Kraut. 48
Wurtz. 39
Knoblauch. 20
Kraut. 44
Kobalt. 12
Kölblein-Kraut. 57
Königs-Kertze. 64
Körfel-Kraut. 47
Saamen. 75
Kohl-Saamen. 74
Korck. 106
Korn-Blumen blaue. 67
rothe. 68
Müntze. 46
Rosen. 68
Krähen-Augen. 90
Kraft-Wurtz Japanische. 134
Krausemüntz. 55
Krebs-Augen. 127
Scheeren. 127
Steine. 127
Kreide weisse. 3
Kressen-Kraut. 55
Saamen. 80
Kröten getrocknete. 127
Stein. 8
Küchen-Schell-Wurtz. 37
Kugel-Lacc. 14
Kübel-Hartz. 113
Kümmel. 74
Römischer. 76
schwartzer. 80
Künschroten-Blumen. 67
Kürbiß-Saamen. 76
Kunigund-Kraut. 50
Kupfer gebrantes. vid. Æs ustum.
Wasser. s. Vitriol.

Lac-Gummi. 111
Lack blauer. 14
Florentiner. 14
in Kugeln. 14
Muß. 14
rother. 14
Lachen-Knoblauch. 61
Cretischer. 61
Lactuc. 79
Ladan-Gummi. 111
Lasur-Stein. 9
Lattich-Saamen. 79
Lavendul-Blumen. 68
Kraut. 62
Laus-Körner. 83
Saamen Mexicanischer. 82
Leber-Kletten. 43
Kraut edel. 51
Blüthe. 67
Leindotter-Saamen. 82
Lein-Kraut. 53
Saamen. 79
Lerchen-Klauen-Blumen. 66
Schwamm. 123
Lieb-Stöckel-Saamen. 79
Wurtzel. 32
Lilien weisse. 68
Wurtzel. 32
Linden-Blüth. 70
Löffel-Kraut. 48
Saamen. 76
Löwen-Fuß. 44
Maul. 44

Löwen-Zahn-Kraut. 63
Wurtz. 41
Loorbeer. 89
Blätter. 53
Luchs-Stein. 9
Lucians-Kraut. 22. 44
Lungen-Kraut fleckicht. 58
moosigtes. 58

Maaßlieben-Blumen rothe. 66
Kraut. 45
Macedonischer Petersill. 81
Madelgeer-Wurtz. 30
Magdalenen-Blumen-Kraut. 40
Magnetstein. 9
Magsaamen schwartzer. 81
weisser. 82
Mayen-Blumen. 68
Majoran-Kraut. 54
Mandeln bittere. 84
süsse. 84
Mangold. 59
Manna. 120
Manns-Treu-Wurtz. 29
Margarethen-Blumen. 66
Kraut. 45
Marien-Distel-Kraut. 47
Saamen. 70
Magdalenen-Blumen. 40
Marum verum. 54
Mastich. 112
Holtz. 104
Kraut. 54
Mauer-Esel. 125
Pfeffer. 61
Rauten. 43
Maulbeer-Wurtzel-Rinde. 101
Maul-Würff gebrannte. 135
Mausdorn-Wurtzel. 24
Meer-Ballen. 17
Bohnen. 19
Hirschen. 80
Kohl. 62
Mooß. 17
Nabel. 19
Rettig. 37
Stintz. 134
Winde. 62
Zwiebel. 40
Meger-Kraut. 50
Mengel-Saamen. 79
Meister-Wurtz. 35
Melissen. 55
Melonen-Kern. 80
Melten-Saamen. 73
Mengel-Wurtzel. 31
Mennig rother. 15
Menschen-Hirnschaalen. 130
Schmaltz. 137
Metterich. 54
Miltz-Farn. 47
Kraut. 47
Mini rothe. 15
Mispeln. 89
Mistel Eichen- 106
Hasel- 106
Linden- 106
Weiden- 106
Möhren-Saamen. 77
Mohren-Kümmich. 77
Moluckisches Purgier-Holtz. 104
Mond-Kraut. 53
Rauten. 53
Mon-Häupter. 85
Milch. 3
Rauten. 53
Saamen schwartzer. 81
weisser. 82
Mooß. 124
Motten-Kraut. 46
Mucken-Gifft. 12
Münch-Rhabarbar. 37
Müntze Berg- 46
Feld- 46
Krause- 55
Mumien. 132
Persianische. 133
Murmel-Thier-Schmaltz. 137
Muscaten-Blüthe. 96
Nuß. 96
Muscheln wohlriechende. 18
Mutter-Kraut. 46
Nägelen. 93
Wurtz. 22. 23
Zimmet. 94
Myrrhen. 112
Myrten-Beer. 90
Blätter. 55

Nabelstein. 19
Nacht-Schatten. 62
Nägelein-Blumen. 70
Gewürtz- 94
Rinde. 94
Wurtz. 25
Zimmet. 94
Nardus wilder. 23
Naß-Horn. 134
Nattern oder Vipern. 135
Wurtz. 24
Zungen. 56
Nelcken. s. Nägelein.
Nessel-Blumen. 71
Saamen. 84
Römischer. 84
todte. 65
Nichts weisses. 15
Nieß-Wurtz schwartze. 28
weisse. 28

Ocher-

Ochergelb. 4
Ochsen-Galle. 127
Ruthe. 135
Zungen-Blumen. 66
Kraut. 46
Wurtzel. 24
rothe. 21
Odermenning. 43
Oehl-Baum-Gummi. 109
Operment. 12
Opium. 120
Orant-Kraut. 44
Orlean. 15
Oster-Blumen-Wurtz. 37
Osterlucey-Kraut. 44
Wurtz. 22

Panax-Gummi. 112
Pantoffel-Holtz. 106
Pappel-Blumen. 68
Kraut. 54
Saamen. 80
Wurtzel. 32
Paradiß-Holtz. 102
Körner. 96
Pech. 113
Perlen-Hirse. 80
Mutter. 18
Occidentalische. 18
Orientalische. 18
Persichstein. 133
Peruvianischer Balsam. 116
Gift-Wurtz. 26
Pestilenz-Wurtz. 36
Petersilien-Kraut. 57
Saamen. 81
Wurtz. 36
Peters-Kraut. 56
Pfaffen-Pint. 21
Röhrlein-Wurtz. 41
Pfauen-Koth. 133
Pfeffer langer. 97
Spanischer. 97
schwartzer. 97
weisser. 96
Pfenning-Kraut. 56
Pferde-Gailen. 130
Schmaltz. 137
Pfersich-Blüth. 69
Kern. 91
Pfingst-Rosen, Blumen. 69
Wurtz. 37
Pflaumen. 137
Pfriemen-Blumen. 67
Saamen. 78
Pimpernell-Kraut. 57
Wurtz. 36
Pimper-Nüßlein. 91
Pimsenstein. 10
Pinien-Nüßlein. 90
Pistacien. 91
Pocken-Holtz. 105
Wurtzel. 25
Pöonien-Wurtz. 37
Poley-Kraut. 58
Polium Cretischer. 57
Pomerantzen-Blüth. 65
Saamen. 73
Schaalen. 98
Porst. 62
Portulac-Saamen. 81
Potasche. 5
Prunellen-Kraut. 58
Purgier-Flachs. 53
Körner. 74. 88
Purpur-Schnecken. 18

Quecken-Wurtz. 30
Queck-Silber. 12
Quendel. 62
Quiten getrocknete. 87
Kern. 76

Raden-Distel-Wurtz. 29
Ratten-Pulver. 12
Rausch-Gelb. 16
Rauten-Kraut. 59
Saamen. 82
Regen-Würm. 131
Reiger-Schmaltz. 136
Rettich-Saamen. 81
Rhabarbara edle. 38
Münchs- 38
weisse. 33
Rhapontic. 38
Rhein-Blumen. 70
Farn. 62
weisser. 58
Saamen. 83
Rhodiser Dorn-Holtz. 103
Rinder Inschlitt. 136
Ringel-Blumen. 66
Ritter-Sporn. 66
Römische Chamillen. 67
Fenchel. 78
Kümmel. 76
Rosen-Holtz. 105
rothe. 69
weisse. 69
Wurtz. 38
Rosinen grosse. 90
kleine. 91
Roß-Aloe. 118
Schwefel. 16
Roßhub-Blumen. 67
Roßmarin-Blüth. 65
Kraut. 59
Röthe-Wurtz. 39
Röthel-Stein. 4
Rüben-Saamen. 81

Rüben rothe. 24
Rubin. 11
Ruhr-Kraut. 48
Wurtz Indianische. 31
Teutsche. 41
Ruperts-Kraut. 51

Sade-Baum. 59
Safflor-Blumen. 66
Saamen. 74
Saffran. 95
Sagapen-Gummi. 113
Salbey-Blumen. 69
Kraut. 59
wilde. 59
Saliter. 5
Salmiac. 6
Salpeter. 5
Saltz Egrisches Laxir. 6
Englisches Laxir. 6
Meer. 6
Sedlitzer. 6
Spanisches. Soda. 6
Stein. 6
Sandarach. 113
Sandel-Holtz blaues. 104
gelbes. 105
rothes. 105
weisses. 105
Sanickel-Kraut. 60
Wurtz. 39
Sapphyr. 11
Salsaparill. 39
Sassafras-Holtz. 105
Rinde. 101
Saturey. 60
Sau-Brod-Wurtz. 27
Fenchel. 36
Kraut-Wurtz. 20. 40
Sauerampfer-Kraut. 43
Saamen. 71
Wurtzel. 20
Sauer-Klee. 43
Saurach-Beer. 85
Saamen. 73
Scabiosen-Blumen. 69
Kraut. 60
Scammonium. 122
Schaf-Garben-Kraut. 55
Schafft-Heu. 49
Scharbocks-Klee. 64
Kraut. 64
Wurtzel. 25
Scharlach-Beer. 88
Kraut. 50
Schellkraut-Wurtzel. 25
Schiff-Pech. 113
Schirling-Kraut. 48
Schlaf-Kraut-Wurtz. 31
Kunzen. 124
Schlag-Kraut. 47
Schlangen-Haut. 134
Holtz. 103
Kraut. 56
Schmaltz. 137
Wurtz. 24
Virginianische. 40
Schlehen. 84
Blüth. 65
Dorn-Rinde. 98
Mooß. 124
Safft. 118
Schlüsselblumen. 69
Schmaragd. 11
Schmerbel. 45
Schmergel. 10
Schmeer-Wurtz. 26
Schminck-Wurtz. 37
Schmirgel-Stein. 10
Schnecken-Deckel. 129
Häuslein. 130
Schöll-Kraut grosses. 47
kleines. 25
Wurtz. 25
Schotten-Dorn-Safft. 118
Schuppen-Wurtzel. 27
Schwalben gebrannte. 131
Nest. 131
Wurtz. 30
Schwamm. 18
Stein. 10
Schwartze Ambra. s. Ambra.
Brustbeer. 91
Kümmich. 80
Nieß-Wurtz. 28
Wurtz. 26
Schwefel gelber. 16
lebendiger, grauer. 16
Roß. 16
Wurtz. 36
Schweins-Brod-Wurtz. 27
Schmaltz. 137
Zähne. 125
Schwindel-Körner. 95
Wurtz. 28
Schwertel-Wurtz, blaue. 32
gelbe. 20
Scordien, Lachen-Knoblauch. 61
Scorzonera-Wurtz. 40
See-Blumen. 68
Wurtz. 34
Kuh-Stein. 132
Mäuse. 132
Pferd-Zahn. 130
Seckel-Kraut. 46
Seidel-Bast-Rinden. 99
Saamen. 76
Seiffen-Kraut. 60
Wurtz. 39
Seiden-Bälglein. 134

Selery-Saamen. 73
Wurtz. 21
Senff-Saamen rother. 83
weisser. 77
Senegal-Gummi. 114
Sennet-Bälglein. 61
Blätter. 61
Serapin-Safft. 113
Sesel-Kraut-Saamen. 82
Seven-Baum. 59
Siebenfinger-Kraut. 63
Siegel-Erde. s. Erde. 4
Siegmars-Kraut. 20. 43
Sieg-Wurtz. 42
Silber-Blättlein, geschlagen Silber. 11
Glette. 14
Kraut. 44
Simeons-Kraut. 43
Sinau-Kraut. 44
Singrün. 64
Smaragd. 11
Soden-Brod. 91
Sonnen-Thau. 59
Wend. 48
Sophia-Saamen. 83
Span-Grün. 16
Spanische Fliegen, Mücken. 128
Flor. 16
Spargel-Saamen. 73
Wurtz. 23
Speichel-Wurtz. 37
Spick-Blumen. 70
Celtischer. 40
Indianischer. 40
Narden. 40
Spieß-Glas. 11
Ertz. 11
Spring-Körner. 75
Kürbis-Wurtz. 27
Staab-Wurtz. 42. 48
Stachel-Schwein-Stein. 133
Stahl-Feile. 13
Stall-Kraut. 35
Steck-Rüben-Saamen. 80
Stein-Brech rother. 29
weisser Kraut. 60
Wurtzel. 28. 39
Flachs. 8
Klee blauer. 54
gelber. 54
weisser. 54
Blumen. 68
Leber-Kraut. 51
Marck. 4
Oehl rothes. 15
schwartzes. 15
weisses. 15
Peterlein-Wurtz. 36
Saltz. 6
Wurtz. 43
Stech-Körner. 92
Nüsse. 92
Stendel-Wurtz. 39
Stephans-Körner. 83
Sterck-Kraut. 44
Stern-Anis. 72
Leber-Kraut. 54
Stick-Wurtz. 24
Stöchas-Blumen Arabische. 70
gelbe. 70
Storax-Gummi. 114
fliessender. 117
in Körnern. 114
Storchen-Schmaltz. 137
Schnabel. 51
Straussen-Ey. 135
Süß-Holtz. 32
Safft. 119

Tacamahac-Gummi. 114
Tag und Nacht-Kraut. 56
Talck. 10
Tamarinden. 92
Tamarisken-Kraut. 62
Rinde. 101
Tannen-Hartz. 113
Tauben-Kropf. 50
Tausend-Gulden-Kraut. 47
Terpentin Cyprischer. 118
gemeiner. 117
Venedischer. 117
Teschel-Kraut. 46
Teufels-Abbiß. 55
Wurtz. 33
Dreck. 107
Thee. 63
Thomas-Zucker. 121
Tymian Cretischer. 63
gemeiner. 63
Rinde. 101
Thym-Seide. 49
Toback-Kraut. 56
Toll-Wurtz. 31
Tormentill-Kraut. 63
Wurtz. 41
Traganth. 115
Trauben-Kraut. 46
Treib-Körner grosse. 74
kleine. 75
Trippel-Erde. 4
Türckische Melissen. 55
Turbith-Wurtzel. 41
Tutia. 16

Vanillien. 92
Veh-Distel. 47
Venedisches Bleyweiß. 13
Borax. 5
Venus-Haar. 42
Violen-Blumen blaue. 70

Violen-Blumen gelbe. 67
Kraut. 64
Saamen. 83
Wurtz Florentinische. 32
gemeine. 32
Vippern-Gräte. 135
Schmaltz. 137
Vitriol blauer. 7
Cyprischer. 7
Englischer. 7
grüner. 7
Römischer. 7
Ungrischer. 7
weisser. 6
Vogel-Kraut. 44
Nest-Saamen. 77
Zungen. 78

Wachholder-Beer. 89
Gummi. 113
Holtz. 104
Lympf. 52
Wachs gelbes. 138
Stopf- 138
weisses. 138
Wachtel-Schmaltz. 137
Wald-Meister. 54
Rüben. 27
Wallfisch-Ruthe. 129
Wallrad. 129
Wallroß-Zahn. 130
Wall-Wurtz. 26
Kraut. 48
Wasser-Dosten. 50
Eppich. 21
Melonen-Saamen. 75
Mengel-Wurtz. 31
Wegbreit. 57
Wegrich-Kraut. 57
Saamen. 81
Wurtz. 36
Weg-Senff. 49
Tritt. 47
Warten-Blumen. 67
Kraut. 48
Saamen. 75
Wurtz. 25. 26
Weichseln. 86
Weiderich gelber. 53
Weiden-Laub. 59
Schwamm. 123
Wein-Beer. 91
Laub. 64
Nägelen. 85
Stein. 122
Wein-Raute. 59
Wurtz. 25
Weisses Nichts. 15
Weis-Wurtz. 37
Well-Saamen. 83
Wermuth gemeiner. 42
Römischer. 42
Weyhrauch. 112
Rinde. 101
Wiederstoß. 23
Wiesen-Klee. 64
Wilde Schweins-Zähne. 125
Winde. 62
Winters Americ. Gewürtz-Rinde. 102
Winter-Grün. 64
Wißmuth. 14
Wohlgemuth. 56
Wolffs-Beer. 90
Bohnen. 79
Fett. 137
Leber. 131
Milch-Wurtz. 29
Wollen-Blumen. 70
Kraut. 64
Wolverley. 22
Wunderbaum-Saamen.
Wund-Kraut gulden. 48
heydnisches. 48
Wurm-Farn. 62
Saamen. 75
Wurtz. 24

Zahn-Purpur-Schnecken. 18
Schnecken. 18
Wurtz. 28
Zapfen-Holtz-Rinde. 100
Zäpflein-Kraut. 65
Zaun-König. 134
Rüben-Wurtz. 24
Zehr-Wurtz. 21
Zeitlosen-Wurtz. 30
Zibeben. 90
Zibeth. 136
Zimmet. 94
bitterer. 100
Mutter- 94
Nägelein. 94
weisser. 95
Zinnober. 13
Zirbel-Nüßlein. 90
Zittwer-Saamen. 75
Wurtz. 97
Zucker. 121
Zwetschgen. 91
Zwiebel Meer- 40

SYLLABVS MEDICAMENTORVM COMPOSITORVM, IN PHARMACOPOEA WIRTENBERGICA COMPREHENSORVM,

IVXTA QVEM
PHARMACOPOLIA
COMMODE VISITARI POSSVNT,
ET QVI SIMVL
PHARMACOPOEIS PRO CANONE
INSERVIRE DEBET.

ILLA SCILICET,
QVAE MAIORIBVS LITTERIS SVNT EXCVSA,
OMNIA,
ETIAM IN MINORVM OPPIDORVM
PHARMACOPOLIIS,
SECVNDVM HOC
DISPENSATORIVM
PRAEPARATA,
PROSTARE,
ATQVE
TEMPORE VISITATIONIS,
VISITATORIBVS
EXHIBERI DEBENT.

HIS,
PHARMACOPOEI MAIORVM OPPIDORVM,
ADDANT ILLA,
QVIBVS ASTERISCVS PRAEMISSVS EST.

CAETERA,
MINORIBVS TYPIS EXCVSA,
MINVS VSVALIA,
MEDICORVM ET PHARMACOPOEORVM
RELIQVVNTVR ARBITRIO.

STVTGARDIAE,
SVMTIBVS IOANNIS CHRISTOPHORI ERHARDI, BIBLIOPOLAE.
ANNO MDCCLX.

CLASSIS PRIMA.

AQUÆ COMPOSITÆ ET SIMPLICES CUM VINO DESTILLATÆ:

Aqua Acuſtica.
Anhaltina.
*Antiſcorbutica temperata.
Apoplectica ſpirituoſa.
Apoplectica minus ſpirituoſa.
Arthritica.
*Aſthmatica.
*Balſamica Riverii.
*Benedicta Serpilli.
Calcis vivæ per infuſionem.
Caponis.
Carbunculi.
*Carminativa officinalis.
*Carminativa ſpirituoſa.
Carminativa per infuſionem.
*Caryophyllorum aromaticorum.
*Cephalica C. V.
Cinnamomi bugloſſata.
Cinnamomi cydoniata.
Cinnamomi ſine vino.
*Cinnamomi ſpirituoſa.
Cinnamomi vinoſa.
Confortativa ſive perlata.
Cordialis frigida.
*Cordialis temperata.
Cordis cervi.

Aqua *Cornu cervi citrata.
*Corticum Aurantiorum.
*Diuretica e nucleis.
Embryonum ſeu Balſamum Embryonum.
Epidemica.
Epileptica Langii.
Fortis.
*ad Gonorrhœam.
Griſea.
Hirundinum cum caſtoreo.
Hirundinum ſine caſtoreo.
*Hyſterica.
Hungarica.
Ligni Saſſafras compoſita.
Liliorum convallium vinoſa.
Looch ſani & experti.
Magnanimitatis.
Maſtichina.
*Anti-Melancholica.
Meliſſæ compoſita, ſ. *Eau des Carmes.*
Meliſſæ anthyſterica.
Meliſſæ cum vino.
Mercurialis ad uſus externos.
Myrrhæ.
*Odorifera.
Ophthalmica ſapphirina.
*Panis.
Phagedænica.
*Phyſagoga.
Prophylactica.
Regis.
Salviæ compoſita.
Splenetica.
Stomachica.
Theriacalis compoſita.
Theriacalis ſimplex.

Aqua Typhorum cervi composita.
Typhorum cervi simplex.
*Veronicæ cum vino.
*Visceralis.
Vitæ mulierum.
Vulneraria, *Eau d'Arquebusade spirituosa.*
Vulneraria, *Eau d'Arquebusade vinosa.*
*Zedoariæ anisata.
Zedoariæ cum vino.

CLASSIS SECUNDA.
AQUÆ SIMPLICES SINE VINO DESTILLATÆ.

Aqua Absinthii.
Acaciarum ex floribus.
Acetosæ.
Acetosellæ.
Alkekengi ex fructibus.
Anagallidis.
*Anethi.
*Angelicæ.
*Anisi.
Anserinæ.
Artemisiæ.
*Aurantiorum ex floribus.
Beccabungæ.
Betonicæ.
Borraginis.
Buglossi.
Bursæ pastoris.
Calami.
*Calcatrippæ sive consolidæ regalis.
Cardui benedicti.

Aqua Cardui Mariæ.
* Carvi.
Centaurii minoris.
Cerasorum.
Cerefolii.
Chamomillæ.
* Cheiri.
Chelidonii majoris.
* Cichorii.
* Citri e corticibus.
Cochleariæ.
Coriandri.
Cyani ex floribus.
Endiviæ.
Euphrasiæ.
Fabarum e floribus.
Farfaræ.
Florum omnium.
Fœniculi.
Fragariæ.
Fragorum.
Fumariæ.
* Galegæ.
Graminis ex radicibus.
Hederæ terrestris.
Hepaticæ nobilis.
Hyperici.
Hyssopi.
Juniperi.
* Lactucæ.
Lavendulæ.
* Levistici.
Liliorum alborum.
Liliorum convallium.
Majoranæ.
Matricariæ.

Aqua Marrubii.
* Meliloti.
Meliſſæ.
Menthæ.
* Millefolii.
* Naſturtii aquatici.
Nivis.
Nymphææ.
Ononidis.
Origani.
Papaveris erratici.
Paralyſeos ſeu primulæ veris.
Petroſelini.
Plantaginis.
Pæoniæ ex floribus.
Portulacæ.
Prunellæ.
Pulegii.
Quercus ex foliis.
Raphani.
Roris majalis.
Rosmarini.
Roſarum albarum.
Roſarum rubrarum.
Rubi idæi.
Rutæ.
Salviæ.
Sambuci.
Saxifragiæ.
Scabioſæ.
Scordii.
Scorzoneræ.
Sedi majoris.
Serpilli.
Sigilli Salomonis.
* Solani.

Aqua Spermatis ranarum.
Squamariæ.
Tanaceti.
Taraxaci.
Tiliæ florum.
Tormentillæ.
* Trifolii fibrini.
* Tunicæ florum.
Valerianæ.
Verbaſci.
Verbenæ.
Veronicæ.
Violarum.
Ulmariæ.
Virgæ aureæ.
Urticæ.

CLASSIS TERTIA.
ACETA, VINA ET SUCCI.

Acetum Bezoardicum.
Lavendulæ.
Odoratum.
Papaveris.
Roſarum.
Rutæ.
Sambuci.
* Saturninum.
Scilliticum.
Theriacale.
Tunicæ.
Vini deſtillatum.

Vinum Ceraſorum.
Cydoniorum.
Granatorum.
Rubi idæi.

Succus Acetosellæ.
Berberum.
Chermes.
Citri.
Mororum.

CLASSIS QUARTA.
SPIRITUS.

Spiritus Æruginis.
Angelicæ.
Anisi.
Anthos.
Aperitivus Penoti.
*Aurantiorum e corticibus.
*Balsami Peruviani.
Balsamicus, v. Balsamum vitæ album.
Bezoardicus Bussii.
Carminativus Sylvii.
Castorei compositus.
Cerasorum.
Cochleariæ.
Cornu cervi volatilis.
Cornu cervi ad usus externos.
Corticum citri.
*Croci.
Formicarum.
*Fuliginis.
Juniperi.
*Lavendulæ.
*Ligni Guajaci.
*Liliorum convallium.
Lumbricorum vinosus.
Lumbricorum volatilis.
*Matricalis.
Mastichinus.

Spiritus Melissæ compositus, sive *Eau des Carmes.*
Mellis.
Menthæ.
Nitri anticolicus.
Nitri communis.
* Nitri concentratus.
Nitri dulcis.
Panis.
Rosarum abstractitius.
Rosarum per fermentationem.
Rorismarini sive Anthos.
Salis armoniaci anisatus.
* Salis armoniaci aromaticus Edinburg.
* Salis armoniaci succinatus.
Salis armoniaci vinosus.
Salis armoniaci urinosus.
Salis communis.
Salis concentratus Glauber.
Salis dulcis.
* Sambuci florum.
Antiscorbuticus Drawiz.
* Serpilli.
Sulphuris per campanam.
Tartari ordinarius.
Tartari volatilis.
Terebinthinæ.
Theriacalis.
Trifolii fibrini.
Vini camphoratus.
Vini rectificatus.
Vini tartarisatus.
Vitrioli dulcis, sive Liquor anodinus.
Vitrioli philosophicus.
Vitrioli communis.
Urinæ.

CLASSIS QUINTA.

ELIXIRIA, ESSENTIÆ, LIQUORES ET TINCTURÆ.

Elixir Antifebrile.
Anticolicum crocatum. v. Elix. cord. & stomach. vulgo *Garrus*.
Aperitivum Clauderi.
Balsamicum pectorale Edinburgens.
Balsamicum spirituosum Hoffm.
Balsamicum stomachicum temperatum Hof.
Cordiale & stomach. vulgo *Garrus*.
Myrrhæ, Lond.
Pectorale Reg. Dan.
Pectorale Wedel.
Polychrestum Halens.
Proprietatis album Helmontii.
Proprietatis dulce.
*Proprietatis cum acido Bœrhav.
Proprietatis sine acido Bœrhav.
Proprietatis Helvetii.
Proprietatis Paracels.
Proprietatis Rhabarbarinum.
Salutis.
Vitæ Matthioli.
Vitrioli Mynsicht.
Uterinum Croll.

Essentia Absinthii composita.
Absinthii simplex.
Alexipharmaca ordinaria St.
Alexipharmaca temperata.
Amara.
Ambræ balsamica Dippel.
Ambræ liquida.
Ambræ sicca.
*Angelicæ.
Anodyna officinal.

Eſſentia Anodyna Ludovic.
Anodyna antarthritica opiata M. Hoffm.
*Anodyna antarthritica ſine opio.
Anthydropica Hoffm.
Antiſcorbutica.
*Balſamica Gmelin.
*Balſami Peruviani.
Benzoës compoſita.
Benzoës ſimplex.
Cardamomi minoris.
Cardui benedicti.
Carminativa Wedel.
Caſtorei.
Centaurii minoris.
*Cephalica.
Corticum aurantiorum ſpirituoſa.
Corticum aurantior. cum vino malvatico.
Corticum chacarillæ.
Corticum chinæ chinæ.
Corticum chinæ compoſita Hellw.
*Corticum Culilawani.
Dulcis.
*Fuliginis.
Fumariæ.
Galangæ.
Gentianæ.
*Hyperici.
Leviſtici.
*Ligni Aloës.
Ligni Saſſafras compoſita.
Ligni Saſſafras ſimplex.
Lignorum.
Lumbricorum terreſtrium.
Martiata aperitiva.
Millefolii.

Essentia Millepedum.
Mumiæ purificans Clauder.
*Myrrhæ alkalisata.
Myrrhæ sine alkali.
Pareiræ bravæ.
Pimpinellæ.
Pini antiscorbutica.
*Populi vulneraria.
Scillæ.
Scordii composita.
Scordii simplex.
*Serpentariæ Virginianæ.
Spicæ Indicæ.
Splenetica Stahlii.
*Stomachica polychresta Gundelsh.
Succini alcalisata.
Succini sine alcali.
Succini G.
Terræ Catechu.
Theriacalis.
Trifolii fibrini.
Travmatica.
Valerianæ composita.
Vincetoxici.

Liquor *Anodinus mineralis.
*Cornu cervi succinatus albus.
Cornu cervi succinatus ordinarius.
sive Guttæ Anglicanæ cephalicæ.
Laudanum liquidum Sydenhami.
Nitri fixi.
Oleosus, sive Sal volatile oleosum Sylvii.
Oleosus, sive Sal volatile oleosum aromaticum.
sive Sal volatile Angelicæ Bœrh.
Salinus laxativus.
Spleneticus Tartari.
Stypticus Weberi.
Tartari, sive Oleum Tartari per deliquium.

Liquor *Terræ foliatæ Tartari ſpirituoſus.
Terræ foliatæ Tartari aquoſus.
*Viſceralis.
Vulnerarius mineralis Dippelii.
Vulnerarius vegetabilis Dippel.

Mixtura Simplex alba.
Simplex Ludovic.
Simplex ordinaria.
Tonico - nervina Stahl.

Clyſſus *Antimonii.

Tinctura *Aloës.
Amara Londinenſ.
Antimonii acris.
Antimonii tartariſata.
*Antiphthiſica.
Aquilegiæ.
Aromatica Londinenſ.
Bellidis.
Bezoardica Ludovici.
Bezoardica Mich.
Bezoardica officinal.
Bezoardica Wedel.
Cantharidum Edinburg.
*Coralliorum.
Croci Spirituoſa.
Croci vinoſa.
Gingivalis Balſamica.
Hellebori compoſita.
Laccæ.
*Martis adſtringens.
*Martis aperitiva, Aroph Paracels.
Martis cœrulea Ettn.
Martis cydoniata.
Martis elleborata.
Martis pomata.
*Martis cum vino malvatico & pomis aurantiis.

Tinctura Martis ex vitriolo Zwœlff.
*Metallorum.
Odontalgica Hoffm.
Papaveris.
Proprietatis M.
*Rhabarbari.
Roſarum.
Stomachica martialis Edinburg.
Stomachica Lipſienſis.
Sulphuris.
Tartari acris.
Tartari ordinaria.

CLASSIS SEXTA.
OLEA DESTILLATA.

Oleum Abſinthii.
Ammoniaci.
*Anethi.
Angelicæ.
*Animale Dippelii.
Aniſi.
Antimonii, ſive Butyrum Antimonii.
Artemiſiæ.
*Aurantiorum e corticibus.
Benzoës.
Bezoardicum Wedelii.
Buxi ex ligno.
*Calami aromatici.
*Camphoræ.
*Cardamomi.
Caryophyllorum.
Ceræ.
Chamomillæ cœruleum.
Chærefolii.
Cinnamomi.
*Citri.

Oleum * Coriandri.
Cornu cervi.
Cubebarum.
Cymini.
Fœniculi.
Fuliginis.
* Galbani.
* Guajaci ligni.
Hyſſopi.
Juniperi e baccis.
Lavendulæ.
Lauri.
Macis.
Majoranæ.
Maſtiches.
Meliſſæ.
Menthæ.
Millefolii.
Myrrhæ.
Nucis moſchatæ.
* Origani.
Philoſophorum ſ. laterum.
Piperis.
Pulegii.
Rhodii ligni.
Rorismarini.
* Roſarum.
Rutæ.
Sabinæ.
Salviæ.
Sandali citrini.
* Saponis.
* Saſſafras.
* Serpilli.
Spicæ.

Oleum Succini album.
Succini rubrum.
*Sulphuris.
*Tanaceti.
Tartari.
Terebinthinæ.
Thymi.
Vitrioli.
Zedoariæ.
Zinziberis.

CLASSIS SEPTIMA.
BALSAMA.

Balſamum Arcæi.
Apoplecticum.
*Caryophyllorum.
Cephalicum.
*Cinnamomi.
Commendatoris de Perne.
*Lavendulæ.
*Locatelli.
*Magicum.
*Majoranæ.
Odontalgicum.
Rutæ.
Somniferum.
Stomachicum.
Succini.
Sulphuris amygdalatum.
Sulphuris aniſatum.
Sulphuris Rulandi.
Sulphuris ſuccinatum.
Sulphuris terebinthinatum.
Vitæ.
*Vulnerarium Dippel. vid. Liquor.
Vulnerarium Minder.

CLASSIS OCTAVA.

JULAPIA, SYRUPI ET MELLA.

Julapium Rosatum.
Sambucinum.
*Violatum.

Syrupus Absinthii.
Acaciarum ex floribus.
*Acetosellæ.
Acetositatis citri.
de Agresta.
Altheæ Fernelii.
de Ammoniaco.
*Artemisiæ.
*Balsamicus.
*Bellidis.
Berberum.
Betonicæ.
Borraginis.
Brunellæ.
*Bryoniæ.
Buglossi.
Capillorum veneris compositus.
*Capillorum veneris simplex.
*Cardiacus.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
*Cerasorum acidorum.
Chacarillæ.
*Chamomillæ.
Chenopodii composit.
Cichorii cum Rhabarbaro.
Cinnamomi.
Citri e toto.
*Cochleariæ.
Contrajervæ simplex.
*Contrajervæ compositus.

Syrupus Coralliorum.
Corticum aurantiorum.
* Corticum citri.
* Croci.
Cucurbitæ Mesues.
Cydoniorum.
Diacodium, sive Capitum Papaveris.
Diacodium crocatum.
Domesticus.
Emeticus Noricor.
Emeticus Angel. Sal.
Enulæ.
Erysimi Lobel.
Farfaræ.
* Fragorum.
* Fumariæ.
Glyzyrrhizæ.
Granatorum.
* Granorum Kermes.
Hederæ terrestris.
* Hyperici.
* Hyssopi.
Jujubinus.
Kinæ Kinæ.
Mannæ laxativus.
* Masstichinus.
Mercurialis compositus ad vitam longam.
* Menthæ.
Melissæ.
Mororum.
Musci querni ad Tussim convulsivam.
* Myrtillorum.
* Nicotianæ.
Nucistæ.
Papaveris albi.

Syrupus Papaveris erratici.
Paralyſeos ſive primulæ veris.
Perſicorum ex floribus.
Plantaginis.
Pæoniæ.
*Rhabarbari Deodati.
Ribium.
Roſatus ſimplex.
*Roſatus ſolutivus.
*Roſarum ſiccarum.
Rorellæ.
Rubi idæi.
Scelotyrbicus.
*Scordii.
Scillæ ſive Oxyſaccharum ſcilliticum.
Sedi majoris.
Stœchadis Arabicæ.
Sulphuris Williſii.
*Symphyti Majoris.
Tunicæ ex floribus.
*Veronicæ.
Violarum purpurearum.
*Violarum ſolutivus.

Mel Anthoſatum.
Deſpumatum.
Mercuriale.
Roſatum ſimplex.
*Roſatum ſolutivum.
Salviatum.
*Sambuci.
Violarum.

Oxymel Scilliticum.

CLASSIS NONA.
ROOB ET CONSERVÆ.

Roob Berberum.
Ceraſorum.

Roob *Cornorum.
Cydoniorum.
*Cynosbati.
Ebuli.
Juniperi.
Mororum.
*Nucum.
Ribium.
Rubi idæi.
Sambuci.

Conſerva *Abſinthii.
Acetoſæ.
Acetoſellæ.
*Anthos.
*Beccabungæ.
Bellidis.
*Betonicæ.
*Borraginis.
*Buglosſi.
Cichorii.
Citri ex pulpa.
Cochleariæ.
Euphraſiæ.
Farfaræ.
Fumariæ.
Hederæ terreſtris.
*Majoranæ.
*Meliſſæ.
*Menthæ.
Millepedum.
*Naſturtii aquatici.
Papaveris erratici.
Perſicorum florum.
Pæoniæ.

Conserva *Primulæ veris.
Rosarum albarum.
Rosarum rubrarum.
*Rosarum vitriolata.
Salviæ.
Scabiosæ.
*Spagyrica completa.
Spagyrica incompleta.
Tunicæ.
*Veronicæ.
Violarum.

CLASSIS DECIMA.

C O N D I T A.

Conditum Aurantiorum cortic.
Berberum.
Calami aromatici.
*Caryophillorum aromaticor.
Cerasorum acidorum.
*Cichorii radicum.
Citri carnis.
Citri corticum.
Consolidæ majoris radicum.
Cydoniorum.
*Enulæ radicum.
Eryngii radicum.
Lactucæ Hispanicæ.
Nucum Indicarum.
Nucum juglandium.
Ribium.
Rubi idæi.
*Satyrii radicum.
Scorzoneræ radic.
Zinziberis in India confecti.

CLASSIS UNDECIMA.
CONFECTIONES LIQUIDÆ, ELECTUARIA ET PULPÆ.

Confectio	Alkermes completa.
	Alkermes incompleta.
	de Cinnamomo regia.
	de Hyacintho.
Electuarium	*de Acoro.
	*Baccarum lauri.
	Catholicum.
	Chalybeatum.
	Gingivale.
	Hieræ picræ.
	*Lenitivum Florenzol.
	*de Manna.
	Mithridatium.
	Orvietanum.
	Philonium Romanum.
	Requies Nicolai.
	Resumtivum.
	Sanans Fulleri.
	*de Satyrio.
	dia Scordii.
	Tamarindorum.
	Theriacæ Andromach.
Looch	*ad Asthma s. de Scilla.
	*de Farfara.
	de Pulmone vulpis.
	Sanum & expertum.
	Saponatum.
Pulpa	Cassiæ.
	Passularum.
	Prunorum.
	*Tamarindorum.
Passulæ	Laxativæ.
Pruna	Laxativa.

CLASSIS DUODECIMA.
EXTRACTA COMPOSITA ET SIMPLICIA.

Extractum Anodynum.
Bezoardicum Camerar.
Catharcticum Londin.
Catholicum.
Diacarthami.
Laudanum opiatum.
* Marocostinum.
* Martis pomatum.
* Opii cydoniatum.
Panchymagogum.
* Phlegmagogum.
Theriacale.
Absinthii.
* Agarici.
Aloës gummosum.
Aloës insuccatæ.
* Aloës rosatæ.
Aloës violatæ.
Angelicæ.
Aristolochiæ longæ.
Aristolochiæ clematitidis.
Artemisiæ.
Asari.
Bellidis.
Bryoniæ.
Calami aromatici.
Cardui benedicti.
Castorei.
Centaurii minoris.
Chacarillæ.
Chinæ chinæ.

Extractum *Cochleariæ.
*Colocynthidis.
Croci.
*Elaterii.
*Enulæ.
*Esulæ.
Fumariæ.
Gentianæ.
Hellebori nigri.
Jalappæ.
Iridis florentinæ.
Iridis nostratis.
*Ligni Aloës.
*Ligni Guajaci.
Mechoacannæ albæ.
*Nicotianæ.
Opii simplex.
*Opii per fermentationem.
Papaveris.
Pimpinellæ.
*Pini ex summitatibus.
Plantaginis.
Pæoniæ.
Rhabarbari veri.
Rutæ.
*Sabinæ.
*Sarsaparillæ.
Scordii.
*Sennæ foliorum.
*Tanaceti.
Tormentillæ.
Trifolii fibrini.
Veronicæ.
Zedoariæ.

CLASSIS DECIMA TERTIA.
PILULÆ.

Pilulæ Æthiopicæ.
Aloëphanginæ.
de Ammoniaco.
Angelicæ.
Aperientes Stahlii.
Aureæ.
* Balſamicæ Morton.
* Cachecticæ.
Cephalicæ.
Cochiæ.
* de cynogloſſo c. caſtoreo.
de cynogloſſo ſ. caſtoreo.
Emanuelis.
Fœtidæ.
de Hiera c. Agarico.
Hydropicæ.
Hyſtericæ.
Laudani diuretici, ſ. urinarii M.
Laudani hyſterici.
Laudani opiati.
* Lucis, ſive opticæ.
Maſtichinæ.
Mercuriales.
Polychreſtæ balſamicæ.
* Polychreſtæ Starckey.
Scilliticæ.
Solares Wildeganſii.
Spleneticæ.
de Styrace.
de Succino Cratonis.
* Tartareæ Bontii.
Tartareæ Schrœder.
de Therebinthina.
de Theriaca cœleſti.

CLASSIS DECIMA QUARTA.

TROCHISCI, PASTÆ ET BACILLI, &c.

Trochiſci Alhandal.
Aliptæ moſchatæ.
*Alkekengi, cum & ſine opio.
*Alkermes.
de Ambra.
*Anthelmintici, ſive Hermetici.
Bechici albi.
*Bechici citrini.
Bechici nigri.
*Bechici rubri.
*de Carabe ſ. ſuccino.
*de Catechu, ſive Muſcerdæ moſchatæ.
de Catechu ad Sputum cruentum.
de cremore Tartari.
Diarrhodon.
*Eſcharotici.
Galliæ moſchatæ.
de Myrrha.
*de Scilla.
Sief albi cum & ſine opio.
de Viperis.

Agaricus trochiſcatus.
*Paſta Altheæ, Gallis, *Pâte de Guimauve.*
Bacilli de liquiritia cocta albi.
Bacilli de liquiritia cocta citrini.
Chocolada.
Maſſa ad fornacem.
Maſſa liquiritiæ fuſca.
Candelæ fumales.
Globuli carminativi.
Suppoſitoria.

CLASSIS DECIMA QUINTA.

CONFECTIONES SACCHARATÆ SICCÆ, MORSULI ET ROTULÆ.

Confectio Anisi laxativa.
Aurantiorum corticum.
Calami.
Cardamomi.
Caryophyllorum.
Carvi.
Cichorii radicum.
Cynæ.
Cort. citri.
Coriandri.
*Cubebarum.
Erucæ.
Fœniculi.

Morsuli ad Ardorem ventriculi s. Sodam.
Imperatoris.
Purgantes.
Restaurantes Kunckel.
Rosati, s. Saccharum rosat. tabulatum.
Contra vermes.

Rotulæ Berberum.
Diaireos.
Manus Christi sive saccharum perlatum.
Contra vermes.

Globuli Moschati.

Panis Cydoniorum sine & cum aromatibus.

CLASSIS DECIMA SEXTA.

PULVERES COMPOSITI.

Pulvis Contra Abortum.
Abſorbens Wedel.
*Contra Acredinem.
Alexipharmacus ruber.
Alexipharmacus Camerar.
Alexipharmacus ſive Bezoardicus Rollwag.
Analepticus frigid. Mind.
Anodynus Ludovici.
Anodynus Camerarii.
Anonymus.
Antarthriticus.
Antilyſſus Lond.
Antiſpasmodicus nitroſus.
*Bezoardicus Sennerti cum pretioſis.
Bezoardicus Sennerti ſine pretioſis.
Bezoardicus albus Ludov.
Bezoardicus Anglicus completus.
Bezoardicus Anglicus incompletus.
Cachecticus Quercetani.
ad Calculum.
Contra Caſum.
Cervinus Camerarii.
Cephalicus albus.
*Cephalicus Camerarii.
Cephalicus ruber, ſive Specific. cephal. Michaëlis.
Cephalicus Winteri.
e Chelis cancrorum compoſitus pretioſus.
e Chelis cancrorum minus pretioſus.
Anticolicus Camerar.
Confortans Camerar.
Contrayervæ compoſitus.
*Cordialis Cellenſis.

Pulvis Cornachini.
Cosmeticus ad manus.
Dentifricius.
Dyſentericus.
ad Dyſuriam ſ. mitigans Wepferi.
* Epilepticus Cellarii.
* Epilepticus de Gutteta River.
* Epilepticus Holſaticus.
Epilepticus marchionis.
Epilepticus mirabilis Mynſ.
Epilepticus niger Viennenſ.
Epilepticus ruber.
Eryſipelatodes M.
ad Flatus.
Fumalis Haug.
Fumalis odoratus.
Galactopœus.
Haly contra phthiſin.
* Hepaticus ruber.
* Hyſtericus.
Incidens Stahl.
* Lenitivus tartariſatus.
Mantuanus.
Martialis Anglicus.
Mitigans ſ. ad dyſuriam.
ad Morſum canis rabidi.
Nephriticus pretioſus.
Pannonicus ruber minus pretioſus.
Pannonicus ruber ordinarius completus.
Pannonicus ruber incompletus.
Parturientium ſive Partum promovens.
Pleuriticus.
Pleuriticus Mynſicht.
Præcipitans Stahl.
Purpureus Anglicus.
Reſolvens compoſitus Stahl.
* Scillæ compoſitus.

Pulvis *Sternutatorius albus Camerar.
Sternutatorius albus Gmelin.
Sternutatorius Nopſii.
Sternutatorius variegatus.
Sternutatorius viridis.
Stomachicus Birckmanni.
Strumalis.
Temperans Stahl.
ad Tormina infantum.
Contra vermes.
Viennenſis albus.
*Vitæ Imperatoris.
Tragea Aromatica Gabelkover.
Aromatica officinalis.
*Granorum actes.
Ophthalmica.

CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

SPECIES AROMATICÆ, ALTERANTES ET PURGANTES.

Species Diambræ.
Dianiſi.
Dianthos.
contra Apoplexiam.
Aromaticæ caryophyllatæ.
*Aromaticæ roſatæ.
*Diaboracis.
Diacinnamomi.
Cordiales temperatæ.
Diacretæ Camerarii.
Diacretæ Mynſichti.
de Gemmis frigidæ.

Species de Hiera.
de Hiacyntho.
Diajalappæ Mynſ.
*Imperatoris.
Diaireos.
*Lætificantes Galen.
Diamargaritæ calidæ.
Diamargaritæ frigidæ.
Diarrhodon Abbat.
Diatrion ſandalon.
Diatragacanthæ frigid.
Dia Turbith c. rhabarbaro.

CLASSIS DECIMA OCTAVA.
PRÆPARATA.

Præparatum Alabaſtri.
Amethyſti.
Boli Armenæ.
Calaminaris lapidis.
Carneoli ſ. Sardæ.
Chalybis ſ. alcohol Martis.
Chryſolithi.
Cinnabaris antimonii.
Cinnabaris factitiæ.
Cinnabaris nativæ.
Concharum.
Concharum citratum ſ. acido citri ſaturatum.
Coralliorum alborum.
Coralliorum rubrorum.
Cornu alcis.
Cornu cervi ſine igne.

Præparatum Cornu cervi uſti.
Cornu Rhinocerotis.
Cranii humani.
Cretæ albæ.
Cryſtalli montanæ.
Dentium Apri.
Dentium Hippopotami.
Eboris ſine igne.
Eboris uſti, ſive Spodii.
Granati.
Hæmatitæ.
Hyacinthi.
Judaici lapidis.
Lyncis lapidis.
Magnetis.
Manati lapidis.
* Mandibularum lucii piſcis.
Margaritarum Orientalium.
Margaritarum Occidentalium.
Matris perlarum acido citri ſaturatum.
Oculorum Cancrorum.
Oculorum Cancrorum acido citri ſaturatum.
* Percarum lapidum.
Pumicis lapidis.
Rubini.
Sapphiri.
Smaragdi.
Succini albi.
Topaſii.
Tutiæ.

Præparatum Ungularum alcis.
Unicornu foſſilis.
Unicornu marini ſ. veri.

CLASSIS DECIMA NONA.
PRÆPARATA CHEMICA.

Æs uſtum.
Æthiops antimonialis.
Æthiops mineralis.
*Alumen ſaccharinum.
Alumen uſtum.
Antihecticum Poterii, ſive Diaphoreticum joviale.
Antimon. diaph. ſimplex.
Antimon. diaphoreticum martiale Ludov.
Arcanum corallinum.
Arcanum duplicatum.
*Arcanum Tartari.
*Aurum fulminans.
*Bezoardicum animale.
*Bezoardicum joviale.
*Bezoardicum martiale.
*Bezoardicum minerale.
Cauterium potentiale.
Chalybs ſulphure præparatus.
Cinnabaris antimonii.
Cinnabaris factitia.
Cinnabaris nativa rectificata.
Colcothar.
*Cornu cervi auratum.
Crocus Martis adſtringens.
Crocus Martis aperitivus.
Crocus Martis aperitivus antimonialis Stahl.

Crocus metallorum.
Crocus ſolis.
Crocus veneris.
Diacrydium Glycyrrhizatum.
Diacrydium roſatum.
Diacrydium ſulphuratum.
Flores Antimonii.
* Flores Benzoës.
Flores ſalis armoniaci martiales.
Flores ſalis armoniaci ſimplices.
Flores ſulphuris compoſiti.
Flores ſulphuris ſimplices.
Flores viridis æris, ſ. Æs viride cryſtalliſatum.
Fæcula Ari.
Fæcula Bryoniæ.
Fæcula Iridis noſtratis.
Fæcula Pæoniæ.
Gilla Theophraſti.
* Globuli bezoardici.
* Globuli martiales.
* Hepar Antimonii.
Hepar Sulphuris.
Kermes minerale.
Lac Sulphuris.
* Lapis divinus ſ. ophthalmicus.
Lapis de Goa.
* Lapis infernalis.
Lapis medicamentoſus Crollii.
Lapis prunellæ.
Magiſterium Gummi Guttæ.
Magiſterium, ſive Reſina jalappæ.
* Magiſterium marcaſitæ.
* Magiſterium ſaturni.
Magiſterium ſive Reſina ſcammonii.
Magnes arſenicalis.

Magnesia alba.
Materia perlata.
Mercurius dulcificatus.
Mercurius præcipitatus albus.
Mercurius præcipitatus ruber.
Mercurius præcipitatus viridis.
Mercurius sublimatus corrosivus.
*Mercurius vitæ.
Nitrum antimoniatum.
Nitrum crystallisatum.
Nitrum perlatum.
Nitrum rosatum.
*Nitrum saturnisatum.
Nitrum tabulatum.
*Panacea mercurialis.
Plumbum ustum.
*Regulus Antimonii martialis.
Regulus Antimonii medicinalis.
*Regulus Antimonii simplex.
Saccharum lactis.
Saccharum saturni.
*Sapo sive Corrector Starckeii.
Solutio coralliorum.
Solutio matris perlarum.
*Solutio oculorum cancrorum.
*Specificum antatrophicum Wepferi.
Specificum antifebrile Croll.
Specificum cephalicum Michaëlis.
*Specificum jalappinum.
*Specificum stomachicum Poterii.
Specificum Tartari Zobelii.
Sperniola Crollii.
Spiritus salis coagulatus.
Spiritus vitrioli coagulatus.

Sulphur

*Sulphur auratum Antimonii.
*Sulphur auratum Antimonii tertiæ præcipitationis.
Tartarus chalybeatus.
Tartarus emeticus.
Tartarus ſolubilis, ſive tartariſatus.
Tartarus vitriolatus Tachenii.
*Terra foliata Tartari, ſive Arcanum Tartari.
Terra vitrioli dulcis.
*Turpethum minerale.
Vitriolum Martis.
Vitriolum Veneris.
Vitrum antimonii.
Sal Abſinthii.
Acetoſellæ eſſentiale.
Anglicum catharticum.
Artemiſiæ.
Berberum eſſentiale.
Cardui benedicti.
Centaurii minoris.
Cichorii.
Cinerum clavellatorum.
Digeſtivum Sylvii.
Ebuli.
*Egranum ex acidulis.
Fabarum e ſtipitibus.
Febrifugum Sylvii.
Fumariæ.
Fraxini.
Geniſtæ.
Mirabile Glauberi.
Ononidis.
Petroſelini.
*Polychreſtum Seignette.
*Sedlicenſe.

Sal Tartari fixum.
Volatile anglicum odoratum.
*Volatile cornu cervi.
Volatile Lumbricorum.
Volatile Tartari.
Volatile Succini.
Volatile viperarum.
Volatile urinæ.

CLASSIS VIGESIMA.

DE SPECIEBUS PRO DECOCTIS ET EPITHEMATIBUS.

Species decocti Avenæ.
Antinephritici Foreſt.
Carminativi.
Cephalici pro fotu.
Emollientis.
*Florum & fructuum.
*ad Gangrænam.
*pro Gargariſmate adſtringente.
*pro Gargariſmate emolliente.
Lignorum.
Nigri.
Pectoralis.
pro potu infantum.
Vulnerarii.
Cephalicæ pro cucuphis.
*pro Epithemate cordis & pulſuum.
*Tabaci pro fumo Camerar.
Tabaci pro fumo officinales.

CLASSIS

CLASSIS VIGESIMA PRIMA.

OLEA COCTA, INFUSA ET EXPRESSA.

Oleum Abſinthii.
Amygdalarum amararum.
Amygdalarum dulcium.
*Anagallidis.
*Anethi.
*ſive Butyrum Cacao.
*Capparum.
Carminativum.
*Caſtorei.
Chamomillæ.
*Cheiri.
Colocynthidis.
Coſtinum.
Euphorbii.
Florum Slotani.
Formicarum.
Hyoſciami.
Hyperici.
Laurinum.
Liliorum alborum.
Lini.
Lumbricorum terreſtrium.
Majoranæ.
*Maſtichinum.
Menthæ.
*Momordicæ.
Nicotianæ.
Nuciſtæ.

Oleum Nucum.
Olivarum.
Ovorum.
Papaveris.
Rosarum.
Rutæ.
Scorpionum.
Septem florum.
Spermatis ranarum.
Verbasci.
Violarum.
*Vulpinum.

CLASSIS VIGESIMA SECUNDA.

UNGUENTA ET AXUNGIÆ.

Unguentum Ægyptiacum.
*Agrippæ.
Alabastrinum.
*Album camphoratum.
Album simplex.
Altheæ.
*Ambustorum.
Anodynum.
*Apostolorum.
Arthanitæ.
Aureum.
Basilicum.
*Calendulæ.
Carminativum.
Clysmaticum.
*Comitissæ.

Un-

Unguentum Digestivum.
Enulatum.
Fuscum.
de Hyosciamo.
Infrigidans Galeni.
de Linaria.
de Liquiritia.
de Lithargyrio.
*Malvæ.
Majoranæ.
*Martiatum.
de Minio camphoratum.
Mundificans Stahlii.
Neapolitanum.
Nervinum.
Nicotianæ.
Nihili ad oculos.
Pectorale.
Pediculorum.
sive Pomatum florum Naphæ.
Diapompholygos.
Populeum.
*Purpureum felic. Wurz.
*Resumtivum.
Rosatum.
*Rosatum simplex.
Rubrum ad labia oris.
Rubrum potabile.
Sandalinum.
ad Scabiem officinal.
ad Scabiem Zelleri.
Somniferum.
Spleneticum.
Stomachale.
ad Tabem.
*Contra vermes.

Unguentum Viride potabile.
de Uvis.

CLASSIS VIGESIMA TERTIA.

EMPLASTRA ET CERATA.

Emplaſtrum Album coctum.
*de Ammoniaco.
Anodynum.
Antipodagricum.
pro Apoplecticis.
*de Baccis lauri.
de Betonica.
Capucinorum.
de Cicuta.
Citrinum.
ad Clavos & verrucas.
*de Cruſta panis.
*de Cumino.
Defenſivum rubrum officinale.
Defenſivum Wepferi.
Defenſivum viride.
Diabotanum Blondelli.
Diachylon cum Gummi.
Diachylon ſimplex.
Diapalmæ.
Diaphoreticum.
Diapompholygos.
Diaſulphuris Rulandi.
Divinum.
Filii Zachariæ.

Emplaſtrum ad Fracturas.
de Galbano crocatum.
Griſeum.
*pro Hernioſis.
Hyoſciami.
Iſchiaticum.
Magneticum.
*Malacticum ſine Gummi.
Malacticum c. Gummi.
Mammillare.
*Matricale.
de Meliloto.
Mercuriale.
de minio rubrum.
Miraculoſum.
Nervinum.
de Nicotiana.
Noricum.
Odontalgicum.
*Opodeldoch.
Oxycroceum.
de Ranis c. Mercurio.
de Ranis ſ. Mercurio.
*Regium Burrhi.
*Sandalinum ſive incognitum.
Saponatum Barbette.
*Saturninum.
de Scrophularia.
Spermatis ceti.
Spermatis ranarum.
Spleneticum.
Sticticum Croll.
Stomachale de Tacamahaca.

Emplaſtrum Triapharmacum.
*Contra vermes.
Veſicatorium.

Cera Arborea.
Sigillaris rubra.
Sigillaris viridis.

FINIS.

TUBINGÆ
LITTERIS IOANNIS PHILIPPI ERHARDI.



TAXA
SEU
PRETIUM
TAM
SIMPLICIUM
QUAM
COMPOSITORUM
JUXTA
PHARMACOPOEAM
WIRTENBERGICAM
PRAEPARANDORUM
ET ALIORUM
IN OFFICINIS PHARMACEVTICIS
USUALIUM
MEDICAMENTORUM.



Cum Gratia & Privilegiis Sacr. Cæs. Maj. Reg. Polon. ac Elect. Saxon. nec non Seren. Dni Ducis Wirtenberg.

STUTGARDIAE,
SUMTIBUS IOANNIS CHRISTOPHORI ERHARDI, BIBLIOPOLAE.
ANNO MDCCLV.

A.

		kr.
Abelmoſch grana. Biſamkörner oder Biſamſaamen.	1.Loth.	6
Acaciæ Ægyptiacæ ſuccus. Aegyptiſcher Schottendornſafft.	—	4
Germanicæ exſiccati fructus. Gedörrte Schlehen.	2.Loth.	1
Germanicæ ſuccus. Truckener Schlehenſafft.	1.Loth.	3
Acetum bezoardicum. Giffteßig.	—	2
Lavendulæ. Lavandereßig.	—	1
Odoratum. Eßig zum riechen oder Anſtrich.	—	4
Papaveris erratici. Schnallenblumeneßig.	—	1
Roſarum. Roſeneßig.	—	1
Rutæ. Rauteneßig.	—	1
Sambuci. Holdereßig.	—	1
Saturninum ſ. Lithargyrii. Silberglätteßig.	—	2
Scilliticum. Meerzwiebeleßig.	—	2
Vini deſtillatum. Deſtillirter Weineßig.	—	2
Acmellæ folia. Acmellen. Indianiſch Harnkraut. Secundum æquitatem.	—	—
Ægagropila. Gemſenkugel.	1.Qtl.	30
Ærugo ſ. viride æris. Grünſpan.	1.Loth.	4
Æs viride Cryſtalliſatum. Cryſtalliſirter Grünſpan.	—	12
uſtum. Gebrannt Kupffer.	—	3
Æthiops Antimonialis. Schwartzes Antimonialpulver.	—	12
mineralis. Schwartzes Mercurialpulver.	—	12
Aëtites ſ. Aquilæ Lapis. Adlerſtein.	1.St.	10
*Agallochum ſ. Lignum Aloës. Paradißholtz.	1.Loth.	16
Agaricus crudus. Lerchenſchwamm.	—	3
trochiſcatus. Präparirter Lerchenſchwamm.	—	6
Agreſta ſ. Omphacium. Unzeitiger Traubenſafft.	—	1
Alabaſtrum præparatum. Präparirter Alabaſter.	—	2
Album græcum. Weiſſer Enzian.	2.Loth.	1
Alkekengi ſ. Halicacabi fructus. Judenkirſchen.	1.Loth.	2
Aloë caballina. Roß Aloe.	—	2
depurata ſ. lota. Gereinigte Aloe.	—	12
*epatica. Gemeine Aloe.	—	4
*inſuccata. Safft Aloe.	—	12
Roſata. Roſen Aloe.	—	12
*Soccotrina. Feine Aloe aus der Inſul Soccotera.	—	6
violata. Violen Aloe.	—	12
Alumen crudum vulgare. Alaun.	2.Loth.	1
plumoſum. Federweis.	—	1
rupeum, rubrum ſ. Romanum. Rother Römiſcher Alaun.	1.Loth.	1
ſaccharinum. Alaunzucker.	—	3
ſciſſile ſ. Lapis ſpecularis. Moſcow. Fraueneiß.	1.Loth.	2
uſtum. Gebrannter Alaun.	—	3

		kr.
*Ambra grysea s. Ambarum. Grauer Amber.	1.Gran.	6
liquida. Flüßiger Amber, s. liquid Amber.	1.Loth.	48
nigra. Schwartzer Amber.	1.Gran.	4
Amethystus Orient. Amethyst.	1.Loth.	12
præparatus. Präparirter Amethyst.	—	24
Amianthus. Amianthstein.	—	2
*Amomum. Fremder wohlriechender Saamen.	—	6
*Ammoniacum Gummi. Amoniac.	—	4
*Amygdalæ amaræ. Bittere Mandel.	1.Loth.	2
*dulces. Süsse Mandel.	—	1
Amylum. Weisse Stärck, Krafftmeel.	2.Loth.	1
Anacardium. Elephantenläuß.	1.Loth.	3
Anima Rhabarbari s. Tinctura Rhabarb. Rhabarbaratinctur.	—	8
Anisum. Anißsaamen.	—	1
laxativum. Laxieranis.	—	6
*stellatum. Sternanis oder Badiansaamen.	—	8
*Anthoræ radices. Gifftheilwurtzel.	—	12
*Antophylli. Mutternägelein.	—	12
Antihecticum Poterii s. Diaphoreticum Joviale Poterii. Schwindpulver.	—	24
*Antimonium crudum. Rohes Spießglaß.	—	1
diaphoreticum martiale. Schwitzpulver mit Stahl.	—	16
simplex. Schwitzpulver aus Spießglaß.	—	12
*Antimonii minera. Spießglaßertz.	—	1
Antidotus Matthioli. Matthioli Gifftlattwerge.	—	12
Aqua Abrotani. Stabwurtzwasser.	2.Loth.	1
Absinthii. Wermuthwasser.	—	1
Acaciarum ex floribus. Schlehenblüthwasser.	—	1
Acetosæ. Sauerampfferwasser.	—	1
Acetosellæ. Buchampfferwasser.	—	1
Acovistica. Wasser zum Gehör.	—	12
Agrimoniæ. Odermengwasser.	—	1
Alkekengi. Judenkirschenwasser.	—	1
Anagallidis. Hünerdarm, Gauchheil, Vogelkrautwasser.	—	1
Anethi. Dillwasser.	—	1
Angelicæ. Angelicwasser.	—	1
Anhaltina. Anhaltisch Wasser.	—	8
Anisi. Aniswasser.	—	1
Anthos. Roßmarinblüthwasser.	—	2
Anti-melancholica. Wasser wider die Schwermuth.	—	4
Antiscorbutica temperata. Temperirtes Scharbockswasser.	—	4
Apoplectica spirituosa. Starck Schlagwasser.	—	8
minus spirituosa. Gemein Schlagwasser.	—	6
Artemisiæ. Beyfußwasser.	—	1
Asthmatica. Lufft- oder Brustwasser.	—	6
*Aurantiorum e floribus sive Naphæ. Pomerantzenblüthwasser.	—	4

*Aqua

		kr.
*Aqua Aurantiorum ex corticibus. Pomerantzenschaalenwasser.	2. Loth.	2
Balsamica Riverii s. ad Gnorrhæam. Balsamisch Wasser.	—	6
Beccabungæ. Bachbungenwasser.	—	1
Benedicta Serpilli. Starck Quendelwasser.	—	8
Betonicæ. Bethonienwasser.	—	1
Borraginis. Borretschwasser.	—	1
Buglossi. Ochsenzungenwasser.	—	1
Bursæ pastoris. Täschelkrautwasser.	—	1
Calcis vivæ, Aq. simplici parata. Kalchwasser.	4. Loth.	1
Aq. fol. quercus parata. Kalchwasser mit Eichenlaubwasser.	2. Loth.	1
Calendulæ. Ringelblumenwasser.	—	1
Carbunculi c. Auro. Hertzcarfunckelwasser mit Gold.	—	8
sine Auro. ohne Gold.	—	6
Cardui benedicti. Cardobenedictwasser.	—	1
Mariæ. Frauendistelwasser.	—	1
Caryophyllorum. Gewürtznägeleinwasser.	—	4
Carminativa ordinaria. Grimmen- oder Windwasser.	—	4
spirituosa. Starck Grimmen- oder Windwasser.	—	6
per infusionem. Windrossolis.	—	6
Carvi. Kümmichwasser.	—	1
Centaurii minoris. Tausend Guldenkrautwasser.	—	1
Cephalica Caroli V. compl. Kayser Carls Wasser mit Bisam.	—	10
incompleta. Kayser Carls Wasser ohne Bisam.	—	8
Cerasorum nigrorum. Schwartz Kirschenwasser.	—	1
Chærefolii. Körfelkrautwasser.	—	1
Chamædryos. Gamanderlewasser.	—	1
Chamæpytyos. Feldcypressenwasser.	—	1
Chamomillæ. Chammillenwasser.	—	1
Chelidonii. Schölkrautwasser.	—	1
Cichorii. Wegwartwasser.	—	1
Cinnamomi buglossata. Zimmetwasser mit Ochsenzungen.	—	6
cordialis. Krafft- oder Hertzzimmetwasser.	—	6
cum vino. Zimmetwasser mit Wein.	—	8
sine vino. Zimmetwasser ohne Wein.	—	6
cydoniata. Quittenzimmetwasser.	—	8
spirituosa. Starckes Zimmetwasser.	—	8
Confortativa s. perlata. Krafft- oder Perlenwasser.	—	6
Consolidæ regalis. Rittersporrnwasser.	—	1
Cordialis frigida. Kühlendes Hertzwasser.	—	6
temperata. Temperirtes Hertzwasser.	—	8
Cornu Cervi citrata. Hirschhornwasser mit Citronen.	—	4
Corticum Aurantiorum vinosa. Pomerantzenschaalenwasser mit Wein.	—	4
e corde Cervi. Hirschhertzwasser.	—	4

		kr.
Aqua cosmetica. Schminckwasser.	2. Loth.	4
Cyani. Kornblumenwasser.	—	1
Cydoniorum. Quittenwasser.	—	1
Diuretica. Harntreibendes Wasser.	—	6
Embryonum sive Balsamus Embryonum. Kinder-Balsam.	—	8
correcta s. vitæ mulierum. Weiber-Aquavit.	—	6
Epidemica Londinensis. Englisch Wasser wider die Seuch.	—	4
Epileptica Langii. D. Langen Gicht- und Schlagwasser.	—	8
Equiseti. Katzenwedel, Schafftheuwasser.	—	1
Euphrasiæ. Augentrostwasser.	—	1
Farfaræ. Hufflattichwasser.	—	1
Florum omnium. Allerley Blümleinwasser.	—	1
Fœniculi. Fenchelwasser.	—	1
Fortis. Scheidwasser oder Aquafort.	—	4
Fragariæ. Erdbeerkrautwasser.	—	1
Fragorum. Erdbeerwasser.	—	1
Fumariæ. Erdrauchwasser.	—	1
Graminis. Graßwurtzelwasser.	—	1
ad Gonorrhœam. Wasser gegen dem Saamenfluß.	—	6
Grysea. Grau Wundwasser.	—	4
Hederæ terrestris. Gundelrebenwasser.	—	1
Hirundinum c. Castoreo. Schwalbenwasser mit Bibergeil.	—	8
s. Castoreo. Schwalbenwasser ohne Bibergeil.	—	6
Hungarica. vide Aq. Reginæ.		
Hyssopi. Issopenwasser.	—	1
Hysterica. Mutterwasser.	—	4
Lactucæ. Lattichwasser.	—	1
Laxativa Viennensis. s. Infusum Laxativ. Managettæ. Wienerträncklein.	—	6
Looch sani & experti. Brustwasser.	—	4
Levistici. Liebstöckelwasser.	—	1
Ligni Sassafras compos. Fenchelholtzwasser.	—	8
Liliorum alborum. Weiß Lilienwasser.	—	1
Liliorum convallium vinosa. Mayenblümleinwasser mit Wein.	—	4
s. vino. Mayenblümleinwasser ohne Wein.	—	2
Magnanimitatis. Stärckend Ameisenwasser.	—	8
Anti-Melancholica. Wasser wider die Schwermuth.	—	4
Majoranæ. Meron, Majoranwasser.	—	1
Malvæ. Pappelnwasser.	—	1
Marrubii Albi. Weiß Andornwasser.	—	1
Mastichina. Mastichwasser.	—	8
Matricariæ. Mutterkrautwasser.	—	1
Melissæ anthysterica. Melissenwasser gegen das Mutterweh.	—	4

Aqua

		fr.
Aqua Melissæ vinosa, Melissenwasser mit Wein.	2. Loth.	2
s. vino, Melissenwasser ohne Wein.	—	I
spirituosa composita s. *Eau de Carmes.* Carmeliterwasser.	—	8
Menthæ. Beymenthenwasser.	—	I
Mercurialis externa. Aeusserlich Mercurialwasser.	—	8
Millefolii. Schaffgarbenwasser.	—	I
Myrrhæ. Myrrhenwasser.	—	6
Nasturtii aquatici. Bronnenkreßigwasser.	—	I
Nympheæ. Seeblumenwasser.	—	I
Odorifera. Wohlriechendes Wasser.	—	10
Ononidis. Hauhechelwasser.	—	I
Ophthalmica Haugii. D. Haugens äusserlich Augen-Wasser.	—	8
Panis. Destillirt Brodwasser.	—	4
Papaveris erratici. Schnallenblumenwasser.	—	I
Paralyseos. Batengen oder Schlüsselblumenwasser.	—	I
Perlarum seu Confortativa. Perlenwasser.	—	6
Petroselini. Peterlingwasser.	—	I
Phagedænica. Alt Schaden oder Dupffwasser.	—	4
Physagoga. Windwasser.	—	6
Pœoniæ. Gichtrosenwasser.	—	I
Prophylactica s. Acetum prophylacticum Sylvii. Sylvii Pestwasser.	—	6
Prunellæ. Brunnellenwasser.	—	I
Pulegii. Poleywasser.	—	I
Quercus e foliis. Eichenlaubwasser.	—	I
Reginæ Hungariæ. Ungarisch Wasser.	—	8
Regis. Goldscheidwasser.	—	6
Rosarum albarum. Weiß Rosenwasser.	—	I
rubrarum. Roth Rosenwasser.	—	I
Rubi Idæi. Himbeerwasser.	—	I
Salviæ composita. Golden Salbeywasser.	—	8
vinosa. Salbeywasser mit Wein.	—	3
sine vino. Salbeywasser ohne Wein.	—	I
Sambuci. Holderblüthwasser.	—	I
Sapphirina. Blau Augenwasser.	—	8
Saxifragæ. Steinbrechwasser.	—	I
Scabiosæ. Apostemmkrautwasser.	—	I
Scordii. Lachenknoblauchwasser.	—	I
Scorzoneræ. Scorzonernwasser.	—	I
Serpilli. Quendelwasser.	—	I
Sigilli Salomonis. Weißwurtzelwasser.	—	I
Splenetica Officinalis. Miltzwasser.	—	6
Stomachica. Magenwasser.	—	6
Taraxaci. Pfaffenröhrleinwasser.	—	I
Tiliæ. Lindenblüthwasser.	—	I
Theriacalis composita. Vermehrtes Theriac oder Gifftwasser.	—	6
Theriacalis simplex. Theriacwasser.	—	6
Tormentillæ. Tormentill oder Ruhrkrautwasser.	—	I
e Typhis Cervi c. vino. Hirschkolbenwasser mit Wein.	—	8

	2. Loth.	kr.
Aqua e Typhis Cervi composita. Vermehrtes Hirschkolbenwasser.	—	6
per se destillata. Ohne Zusatz destillirtes Hirschkolbenwasser	—	30
Valerianæ. Baldrianwasser.	—	1
Verbenæ. Eisenkrautwasser.	—	1
Veronicæ simplex. Ehrenpreißwasser.	—	1
cum vino. Ehrenpreißwasser mit Wein.	—	4
Violarum. Mertzen Violenwasser.	—	1
Visceralis. Geräusch- oder Visceralwasser.	—	4
Vitæ mulierum, s. Aqua Embryonis correcta. Weiberaquavit.	—	6
Vulneraria Gallorum vinosa. Arquebusade- oder Wundwasser.	—	4
spirituosa. Starckes Arquebusadewasser.	—	6
Urticæ. Brennesselwasser.	—	1
Zedoariæ anisata. Zitwerwasser mit Anis.	—	4
cum vino. Zitwerwasser mit Wein.	—	4
Arcanum Corallinum. Rothes Mercurialpulver.	1. Loth.	40
duplicatum Myns. Mynsichts Miltzsaltz.	—	8
Arcanum Tartari. s. Terra foliata Tartari. Mit Eßig saturirtes Weinsteinsaltz.	—	24
Argentum foliatum. Silberblättlein.	2. St.	1
vivum s. Mercurius vivus. Quecksilber.	1. Loth.	6
Aroph Paracelsi. s. Tinctura martis aperitiva spirituosa. Paracelsi eröffnende Stahltinctur.	—	24
Arsenicum album. Maus- oder Rattengifft.	—	1
citrinum. Gelber Arsenic.	—	1
rubrum. Rauschgelb.	—	1
*Asa dulcis. Feiner wohlriechender Asand. vid. Gum. Benzoe.		
*fœtida. Teufelsdreck.	—	6
Asbestus. Steinflachs.	—	3
Aselli sive Millepedes præparati. Präparirte Keller- oder Maueresel.	—	16
Asphaltum s. Bitumen Judaicum. Judenpech.	—	3
Auripigmentum. Goldgelb, Operment.	—	2
Aurum foliatum. Goldblättlein.	1. St.	1
fulminans. Schlaggold.	1. Gran.	6
Axungia Anatis. Entenschmaltz.	1. Loth.	3
Anguillæ. Aalfett.	—	8
Anseris. Gänseschmaltz.	—	2
Ardeæ. Reigerschmaltz.	—	8
Aschii s. Thymalli. Aeschenschmaltz.	—	6
Canis. Hundsschmaltz.	—	2
Caponis. Koppenschmaltz.	—	3
Castoris. Bieberschmaltz.	—	12
*Castorei e testiculis. Biebergeilschmaltz.	1. Qtl.	16
Cati sylvestris. Wild Katzenschmaltz.	1. Loth.	4
Ciconiæ. Storckenschmaltz.	—	6
Coturnicis. Wachtelschmaltz.	—	8

		kr.
Axungia Cuniculi. Caninchenschmaltz.	1. Loth.	4
Equi ex juba. Pferdschmaltz. Kammfett.	—	1
Gallinæ. Hünerfett.	—	2
Hominis. Menschenschmaltz.	—	8
Leporis. Haasenschmaltz.	—	4
Lucii piscis. Hechtschmaltz.	—	8
Lupi. Wolffsschmaltz.	—	4
Muris montani. Murmelthierschmaltz.	—	6
Porci. Schweinenschmaltz.	2. Loth.	1
Serpentum. Schlangenschmaltz.	1. Loth.	32
Taxi. Dachsschmaltz.	—	2
Viperarum. Vipernschmaltz.	1. Qtl.	14
Ursi. Bärenschmaltz.	1. Loth.	2
Vulpis. Fuchsschmaltz.	—	2

B.

Baccæ Alkekengi s. Halicacabi. Judenkirschen.	1. Loth.	2
Berberum. Erbselen.	—	1
Ebuli. Attichbeer.	—	1
Hederæ arboreæ. Epheubeer.	—	2
Juniperi. Wachholderbeer.	2. Loth.	1
Lauri. Lorbeer.	1. Loth.	1
Myrtillorum exsiccatæ. Gedörrte Heydelbeer.	—	1
Paridis. Einbeer.	—	10
Sambuci s. grana actes. Holderbeer.	—	1
Bacilli ad fornacem. Wohlriechend Ofenwachs.	—	20
de Liquiritia albi. Gebachen weiß Süßholtz.	—	2
citrini. Gebachen Süßholtz.	—	2
Balaustia. Granatenblüth.	—	4
Balsamus Apoplecticus. Schlagbalsam.	1. Scrup.	20
Arcæi. Arcäi Wundbalsam.	1. Loth.	4
Caryophyllorum. Negelbalsam.	1. Qtl.	16
Cephalicus Saxonicus. Sächsischer Hauptbalsam.	—	16
Cinnamomi. Zimmetbalsam.	1. Scrup.	20
Commendatoris. Balsam des Commendeurs von Perne.	1. Loth.	20
* de Copayva s. Indicus albus. Weisser Indianischer Balsam.	—	12
Embryonis s. aqua Embryonis. Kinderbalsam.	2. Loth.	8
* Indicus niger s. de Peru. Peruvianischer Wund-Balsam.	1. Loth.	32
siccus. Trockener Indianischer Balsam.	—	32
Lavendulæ. Lavanderbalsam.	1. Qtl.	16
Locatelli. Locatellbalsam.	1. Loth.	4
Magicus Pforzheimensis. Zauberbalsam.	—	12
Majoranæ. Mayoranbalsam.	1. Qtl.	16
* de Mecha s. Opobalsamum verum. *Beaume de Meche ou de Judée.* Arabischer Balsam.	—	30
Nucis Moschatæ. Muscatenbalsam.	—	16
Odontalgicus. Zahnbalsam.	—	16
de Peru s. Indicus niger. Schwartzer Indianischer oder Peruvianischer Balsam.	1. Loth.	32

		kr.
Balsamus Rutæ. Rauten Balsam.	1. Qtl.	16
Somniferus. Schlaff Balsam.	1. Loth.	24
Stomachicus. Magen Balsam.	1. Qtl.	16
Succini. Agtstein Balsam mit Muscaten Oel.	—	16
ordinarius. Ordinari Agtstein Balsam.	—	5
Sulphuris amygdalatus. Balsam Sulpher mit Mandel Oel.	1. Loth.	12
anisatus. Balsam Sulpher mit Anis.	—	32
Rulandi. Rulands Balsam Sulpher.	—	8
succinatus. Balsam Sulpher mit Agtstein Oel.	—	32
terebinthinatus. Balsam Sulpher mit Terbenthin Oel.	—	8
Tolutanus. Tolutanischer Balsam.	—	32
Vitæ Hoffmanni. Hoffmanns Lebens Balsam.	1. Qtl.	15
vulnerarius officinal. Wund Balsam.	1. Loth.	4
Mindereri. Minderers Wund-Balsam.	—	4
Vegetabilis Dippelii. Dippels saurer Wund Balsam.	—	6
*Banigliæ. Banillen.	1. St.	20
*Benzoe s. Asa dulcis. Benzoe, wohlriechender Aßand.	1. Loth.	8
Berberes conditæ. Eingemachte Erbselen.	—	2
*Bezetta cærulea. Blaue Farbflecklein.	—	12
rubra. Rothe Farbflecklein, Spanischer Flor.	—	16
*Bezoar Occidentalis. Occidentalischer Bezoar.	1. Gran.	2
*Orientalis. Orientalischer Bezoar.	—	6
Bezoardicum animale s. Pulvis viperarum Italicarum. Italiänisches Vippern Pulver.	1. Qtl.	24
Joviale. Bezoardisches Zinn Pulver.	—	20
Martiale. Bezoardisches Stahl Pulver.	—	20
Minerale. Mineralisches Bezoar Pulver.	—	16
Blatta Byzantina s. Unguis odoratus. Muschelschaalen.	1. Loth.	4
Boletus Cervinus. Hirschbrunst.	—	3
Bolus alba. weisser Bolus.	2. Loth.	1
Armena. Armenischer Bolus.	1. Loth.	2
præparata. Präparirter Armenischer Bolus.	—	4
Vulgaris. Gemeiner Bolus.	2. Loth.	1
*Borax Veneta. Venedischer Borax.	1. Loth.	6
Bovis fel inspissatum. Eingekochte Ochsen Galle.	—	8
Bovista Chirurgorum, seu crepitus Lupi. Bovist.	—	3
Bufones combusti. Gebrandte Krötten.	—	24
exsiccati. Gedörrte Krötten.	1. St.	3
Bufonites s. Lapis bufonius. Krottenstein.	—	20
Butyrum Antimonii. Spießglaß Butter oder Oel.	1. Loth.	16
Cacao. Cacao Butter.	—	30
rubrum. Rother Butter.	—	3
viride. Grüner Butter.	—	3

C.

Cacao. Cacau.	—	3
Cadmia nativa metallica s. Cobaltum. Cobalt, Mucken Pulver.	—	1

Cadmia

	1. Loth.	kr.
Cadmia nativa non metallica, s. Lapis Calaminaris. Gallmey Stein.	—	1
Calamus aromaticus. Calmus.	—	1
conditus. Eingemachter Calmus.	—	2
*Camphora. Campher.	—	10
Candelæ fumales. Rauch Kärzlein.	—	4
*Cantharides. Spanische Mucken.	—	8
Caput mortuum vitrioli. Calcinirter Vitriol.	—	1
edulcoratum. Abgesüßte Vitriol Erde.	—	2
*Cardamomum majus s. grana Paradisi. Paradieß Körner.	—	2
*minus. Cardamomen.	—	6
Caricæ s. ficus. Feigen.	—	1
Caro Citri condita. Eingemachter Citronat.	—	3
Carpionum Lapis. Karpffenstein.	—	16
Carpobalsamum. Balsam Körner.	—	10
Carthamus s. Cnicus. Wilder Saffran, Safflor.	—	3
*Caryophylli aromatici. Gewürtz Negelein.	—	12
Cassia Caryophyllata. Nelcken Zimmet.	—	4
fistula. Rohr Caßia.	—	2
*lignea. Mutter Zimmet.	—	6
*Castoreum. Biebergeil.	1. Qtl.	15
*Catechu, s. terra Japonica. Japonische Erde.	1. Loth.	6
Cauterium potentiale. Dupff Saltz oder Aezstein.	—	20
Cera alba. Weiß Wachs.	—	3
arborea. Baum Wachs.	—	1
citrina. Gelb Wachs.	—	3
sigillata rubra. Roth Siegelwachs.	—	3
viridis. Grün Wachs.	—	3
Ceratum vide Emplastrum.	—	3
Cerasa acida. Gedörrte Wein Kirschen.	—	1
condita. Eingemachte Wein Kirschen.	—	2
Cerussa alba Veneta. Schön Venetianisch Bleyweiß.	—	2
in laminis. Schiefferweiß.	—	2
Norica. Gemein Bleyweiß.	2. Loth.	1
Antimonii ex regulo. Weisses Schweiß treibendes Antimonial Pulver.	1. Loth.	20
lota. Gewaschen Bleyweiß.	—	2
Chalcitis. Calcinirter Eisen Vitriol.	—	8
Chalybis limatura. Gefeilter Stahl.	—	1
præparata. Präparirte Stahl Feile.	—	8
c. sulphure præparata. Präparirter Stahl mit Schweffel.	—	8
Chelæ Cancrorum præparatæ. Meer Krebsscheeren oder Spitzen.	—	12
Chermes grana. Scharlach Beer.	—	10
*China de China s. Cortex Peruvianus. Fieber Rinde, Kinkina.	—	12
*Chocolada. Chocolade.	—	3
Chrysolithus præparata. Präparirter Chrysolith.	—	16
Chrysocolla s. viride montanum. Berg Grün.	—	3
*Crystallisata factitia. Borax.	—	6

		kr.
*Cinnamomum. Zimmet, Canell.	1. Loth.	12
Cineres clavellati. Potasche.	2. Loth.	1
Herbarum. Kräuter Asche.	1. Loth.	2
Cinnabaris Antimonii rectificata. Cinober aus Spießglaß.	—	32
Artificialis s. factitia. Gemachter Cinober.	—	6
præparata.	—	8
*nativa Hungarica cruda.	—	24
præparata. Ungarisch präparirter Berg Cinober.	—	32
Clyssus Antimonii s. mineralis. Saurer Spießglaß Geist.	—	12
Cobaltum s. Cadmia Metallica nativa. Mucken Pulver.	—	1
*Coccionella. Cuzinell.	—	30
Coccognidium. Kellerhals Saamen.	—	4
*Cocculi de Levante. Coccel oder Fisch und Laus Körner.	—	3
Cochlearum opercula. Schnecken Deckelein präparirt.	—	12
Colcothar Vitrioli vel caput mortuum.	—	1
*Colla piscium s. Ichtyocolla. Fischleim, Hausblasen.	—	4
*electa. Weisse Hausblasen.	—	8
*Colocynthis. Colloquinten.	—	6
Colocynthidis pulpa. Coloquinten Marck.	—	16
Colophonium. Geigenhartz.	—	1
Conchæ Marinæ. Meer Muscheln.	—	2
citratæ. Meer Muscheln, mit Citronen Safft präparirt.	—	12
præparatæ. Präparirte Meer Muscheln.	—	8
Conditum Aurantiorum. Eingemachte Pomerantzen Schaalen.	—	3
Berberum. Eingemachte Erbselen.	—	2
Calami Aromatici. Eingemachter Calmus.	—	2
Carnis citri. Eingemachter Citronat.	—	3
Cerasorum acidorum. Eingemachte Weichseln.	—	2
Cichorii. Eingemachte Wegwart Wurtz.	—	2
Citri Corticum. Eingemachte Citronen Schaalen.	—	3
Cydoniorum. Eingemachte Quitten.	—	2
Cynosbati fructus. Eingemachte Hagenbutzen.	—	2
Enulæ. Eingemachte Alant Wurtz.	—	2
Eryngii. Eingemachte Mannstreu Wurtz.	—	2
*Nucum Indicarum. Indianische Nüß.	1. St.	30
Nucum Juglandium. Eingemachte Nüß.	—	3
Ribium. Eingemachte Johannis Beerlein.	1. Loth.	2
Rubi Idæi. Eingemachte Himbeer.	—	2
Satyrii Radicis. Eingemachte Stendelwurtz.	—	4
*Zingiberis indicum. Eingemachter Ingber.	—	4
Confectio Alkermes completa. Alkermes Lattwerg mit Ambra.	—	24
incompleta. Alkermes Lattwerg ohne Ambra.	—	16
Anisi laxativa. Laxier Anis.	—	6
Cinnamomi regia Myns. Mynsichts stärckende Zimmet Lattwerg.	1. Qtl.	20

Con-

			kr.
Confectio	Cinnamomi noſtrat. Zimmet Lattwerg.	1. Loth.	32
	Cubebarum. Ueberzuckerte Cubeben.	—	3
	Cynæ ſeminis. Ueberzuckerter Wurm Saamen.	—	4
	Hamech. Purgier Lattwerg.	—	6
	de Hyacintho. Hyacinthen Lattwerg.	—	12
Conſerva	Abſinthii. Wermuth Zucker.	—	2
	Acetoſæ. Saurampfer Zucker.	—	2
	Acetoſellæ. Buchampfer Zucker.	—	2
	Anthos. Roßmarin Zucker.	—	4
	Aurantiorum e floribus. Pomerantzenblüth Zucker.	—	4
	Bellidis. Gänßblümlein Zucker.	—	2
	Betonicæ. Betonien Zucker.	—	2
	Borraginis. Borragen Zucker.	—	2
	Bugloſſæ. Ochſenzungen Zucker.	—	2
	Centaurii minoris. Tauſendguldenkraut Zucker.	—	2
	Cichorii e floribus. Wegwartenblumen Zucker.	—	2
	Cochleariæ. Löffelkraut Zucker.	—	2
	Euphraſiæ. Augentroſt Zucker.	—	2
	Fumariæ. Erdrauch Zucker.	—	2
	Hederæ terreſtris. Gundelreben Zucker.	—	2
	Hyſſopi. Jſſopen Zucker.	—	2
	Lavendulæ. Lavander Zucker.	—	3
	Liliorum Convallium. Mayenblümlein Zucker.	—	4
	Majoranæ. Majoran Zucker.	—	3
	Meliſſæ. Meliſſen Zucker.	—	2
	Menthæ. Beymenten Zucker.	—	2
	Millepedum. Keller Eſel Zucker.	—	10
	Naſturtii aquatici. Bronnencreßig Zucker.	—	2
	Nymphææ. Seeblumen Zucker.	—	2
	Papaveris erratici. Schnallenblumen Zucker.	—	2
	Paralyſeos e floribus. Bathengen oder Schlüſſelblumen Zucker.	—	3
	Pæoniæ. Gichtroſen Zucker.	—	2
	Roſarum albarum. Weiß Roſen Zucker.	—	2
	rubrarum. Roſen Zucker.	—	3
	antiqua. Alter Roſen Zucker.	—	3
	vitriolata. ſauerlechter Roſen Zucker.	—	3
	Salviæ. Salbey Zucker.	—	2
	Sambuci e floribus. Holderblüth Zucker.	—	2
	Scabioſæ. Scabioſen Zucker.	—	2
	Spagyrica completa.	—	24
	incompleta.	—	12
	Symphyti e floribus. Wallwurtzblumen Zucker.	—	3
	Tunicæ florum. Negelblumen Zucker.	—	4
	Veronicæ. Ehrenpreiß Zucker.	—	2
	Violarum. Blauer Violen Zucker.	—	4
	Viſceralis ſ. ſpagyrica c. ſ. c. ol. & Ambra. Stärckende Viſceral Lattwerg.	—	24
	incompleta ſ. ſine oleo & Ambra. Stärckende Viſceral Lattwerg.	—	12

		kr.
Copal. Gummi Copal.	1. Loth.	8
Corallina s. muscus Corallinus. Corallen oder Meermooß.	—	3
Corallia alba. Weisse Corallen.	—	4
præparata. Präparirte weisse Corallen.	—	8
rubra. Feine rothe Corallen.	—	6
præparata. Präparirte rothe Corallen.	—	8
Corna exsiccata. Getrocknete Dörrlitzen.	—	2
Cornu Alcis. Elends Horn.	—	3
præparatum. Präparirt Elends Horn.	—	8
Cervi. Hirschhorn.	2. Loth.	1
Auratum. Hirschhorn mit Gold.	1. Gran.	2
philosophice præparatum. Ohne Feuer präparirt Hirschhorn.	1. Loth.	8
raspatum s. rasura Cornu Cervi. Geraspelt Hirschhorn.	—	1
ustum. Gebrannt Hirschhorn.	—	1
præparatum. Präparirt gebrannt Hirschhorn.	—	4
Rhinocerotis. Naßhorn.	—	10
præparatum. Präparirt Naßhorn.	—	20
Cortex Acaciæ. Schlehenwurtz Rinden.	—	1
Aurantiorum. Pomerantzen Schaalen.	—	2
Capparum. Kappern Rinde.	—	3
Cascarillæ. Chagrillen Rinde.	—	4
*China de China. Fieber Rinde oder Kinkina.	—	12
Citri. Citronen Schaalen.	—	2
Coccognidii s. Mezerei. Kellerhals Rinde.	—	3
Culilavan. Bittere Zimmet Rinde.	—	10
Curassavici. Bittere Pomerantzen Schaalen von Curassau.	—	3
Ebuli. Attich Rinde.	—	1
Esulæ minoris. Klein Wolffsmilch Rinde.	—	3
Frangulæ. Faulbaum oder Zapffenholtz Rinde.	—	2
Fraxini. Eschenbaum Rinde.	—	1
Granatorum. Granat Aepffel Schaalen.	—	1
Hippocastani. Wild Castanienbaum Rinde.	—	2
Ligni Sancti s. Guajaci. Frantzosenholtz Rinde.	—	2
Sassafras. Sassafras Rinde.	—	4
Mandragoræ. Allraun Rinde.	—	3
Quercus. Eichbaum Rinde.	2. Loth.	1
Sambuci. Mittlere Hollunder Rinde.	—	2
Tamarisci. Tamarisken Rinde.	—	2
Thuris. Weyrauch Rinde oder Juden Weyrauch.	—	6
*Winteranus. Scharbocks Rinde.	—	8
Costus corticosus, aliis Canella alba. Weisser Zimmet.	1. Loth.	6
Cranium humanum. Menschen Hirnschaale.	—	12
præparatum. Präparirte Menschen Hirnschaale.	—	24
Cremor Tartari. Präparirter Weinstein.	—	3
Crepitus lupi s. Bovista Chirurgorum. Bovist.	—	3
Creta Coloniensis. Cöllnische Kreiden.	2. Loth.	1

Creta

		kr.
Creta Coloniensis præparata. Präparirte Cöllnische Kreiden.	2. Loth.	2
* Crocus Austriacus. Oesterreicher oder Wiener Saffran.	1. Qtl.	15
Martis adstringens. Anhaltendes Stahl Pulver.	1. Loth.	12
Antimoniatus Stahlii ordinarius. D. Stahls Antimonialisches Stahl Pulver.	—	32
tenuissimus. D. Stahls zartes Stahl Pulver.	1. Qtl.	15
Aperitivus vulgaris. Eröffnendes Stahl Pulver.	1. Loth.	16
Metallorum. Metallisches Brech Pulver.	—	8
* Orientalis v. Gallicus. Orientalischer Saffran.	—	40
Solis. Gold Kalch.	1. Gran.	8
Veneris. Kupffer Kalch.	1. Loth.	16
Crystalli Tartari s. Cremor Tartari. Präparirter Weinstein.	—	3
Crystallus montana. Berg Crystall.	—	2
præparata. Präparirter Berg Crystall.	—	8
* Cubebæ. Cubeben oder Schwindel Körner.	—	4
Cupressi Nuces. Cypressen Nüsse.	—	3
Cydonia exsiccata. Dürre Quitten Schnitz.	—	1
Cynosbati enucleati. Gedörrte Hagenbutzen.	—	1
Cyperus longus. Lange Cyper Wurtz.	—	3
rotundus. Runde Cyper Wurtz.	—	3
Cypressi Nuces s. Cupressi. Cypressen Nüß.	—	3

D.

* Dactyli. Datteln.	—	3
Dentes apri. Wilde Schweins Zähn.	—	3
præparati. Präparirte wilde Schweins Zähn.	—	12
Hippopotami. See Pferds oder Wallroß Zähn.	—	12
præparati. Präparirte Wallroß Zähn.	—	24
Dentalia. Zahn oder Purpur Schnecken.	—	8
Diacinnamomum regium Myns. Mynsichts stärckende Lattwerg.	1. Qtl.	20
Diacodium crocatum. Johannis Brod Safft mit Saffran.	1. Loth.	4
Montani. Johannis Brod Safft.	—	3
Diacrydium liquiritiatum. Bereitetes Scammonium mit Süßholtz.	—	40
rosatum. Bereitetes Scammonium mit Rosen.	—	40
sulphuratum. Bereitetes Scammonium mit Schwefel.	—	40
Diacydonium lucidum Jalappinum. Purgierende Quitten Lattwerg.	—	12
simplex. Quitten Lattwerg.	—	2
Diaphoreticum Joviale s. Antihecticum Poterii. Poterii Schwind Pulver.	—	24

	1. Loth.	kr.
Diaphoreticum Martiale ſ. Antimonium Diaphoreticum Martiale. Schwitz Pulver mit Stahl.	—	16
Diaſcordium Fracaſtorii. Fracaſtorii Gifft oder Lachen Knoblauch Lattwerg.	—	6
Diateſſeron. Bauren oder gemeiner Theriac.	—	2

E.

	1. Loth.	kr.
Ebur ſ. unicornu foſſile. Gegraben Helffenbein oder Einhorn.	—	6
— præparatum. Präparirt Einhorn.	—	12
— Philoſophice præparatum. Präparirt Elffenbein.	—	8
— uſtum. Gebrannt Elffenbein.	—	6
— — præparatum album ſ. Spodium album. Weiß gebrannt Elffenbein.	—	12
— — nigrum ſ. Spodium nigrum. Schwartz gebrannt Elffenbein.	—	4
Elaterium. Esels Kürbis Safft.	—	30
Elæoſaccharum Aniſi. Anis Zucker.	—	4
— Aurantiorum per affrictionem. Pomerantzen Zucker.	—	8
— Cinnamomi. Zimmet Oel Zucker.	—	32
— — cum cinnabare. Rothes Gold Pulver.	—	48
— Citri per affrictionem. Citronen Zucker.	—	8
— Errhinum. Weisser Schnupff Taback.	—	24
— Macis. Muſcat Oel Zucker.	—	12
— Succini. Agtſtein Oel Zucker.	—	4
Electuarium Diacori. Ackermann Magen Lattwerg.	—	3
— Baccarum Lauri. Loorbeer Lattwerg.	—	4
— Catholicum. Laxier Lattwerg.	—	6
— Chalybeatum. Stahl Lattwerg.	—	6
— Dia Cydonium Lucidum Jalapinum. Purgirende Quitten Lattwerg.	—	4
— — ſimplex. Quitten Lattwerg.	—	2
— Gingivale. Mund Lattwerg. Zahn Opiat.	—	5
— Hiera picra. Bitter Purgier Lattwerg.	—	5
— Lenitivum Florenzulæ. Laxier Lattwerg.	—	4
— de Manna. Manna Lattwerg.	—	6
— Mithridatium Damocratis. Mithridat.	—	8
— Orvietanum. Orvietti Gifft Lattwerg.	—	8
— Philonium Romanum. Ruhe Lattwerg.	—	8
— Requies Nicolai. Kinder Theriac.	—	8
— Reſumptivum. Stärckende Schwind Lattwerg.	—	3
— Sanans. Heilende Bruſt Lattwerg.	—	3
— Diaſatyrium. Stendelwurtz Lattwerg.	—	6
— Diaſcordium Fracaſtorii. Gifft oder Lachen Knoblauch Lattwerg.	—	6
— Tamarindorum. Tamarinden Lattwerg.	—	6
— Theriacæ Andromachi. Theriac.	—	6

		fr.
Elixir album Helmontii. Helmonts weisses Magen Elixir.	1. Loth.	12
Anticolicum crocatum, v. *Garrus*. Saffran Elixier.	—	24
antifebrile. Fieber Elixier.	—	12
Aperitivum Clauderi. Clauders eröffnend Elixier.	—	8
Balsamicum pectorale Edinburgens. Edinburgisches Balsamisches Elixier.	—	12
spirituosum Hoffmanni. D. Hoffmanns starckes Balsamisches Elixier.	—	12
temperatum Hoffmanni. D. Hoffmanns Balsamisches Elixier.	—	12
Cordiale crocatum. v. *Garrus*. Saffran Elixier.	—	24
Fuliginis Clauderi. Ruß Elixier.	—	4
Myrrhæ. Myrrhen Elixier.	—	20
Pectorale Wedelii. D. Wedels Brust Elixier.	—	12
Danicum. Dähnisch Brust Elixier.	—	16
Polychrestum Hallense. Miltz Essentz oder Tinctur.	—	16
Proprietatis album Helmont. Helmonts weisses Elixier.	—	16
cum Acido Bœrhavii. Börhavs saures Magen Elixier.	—	16
s. Acido Bœrhavii. Börhavens süsses Magen Elixier.	—	16
Dulce. Elixir Proprietatis ohne Säure.	—	12
Helvetii. Helvetii Magen Elixier.	—	20
Paracelsi. Paracelsi Magen Elixier.	—	12
cum Rhabarbaro. Elixir Proprietatis mit Rhabarbara.	—	12
Salutis. Eröffnendes Elixier.	—	8
Vitæ Matthioli ad mod. Viennens. c. Ambra. Matthiolen Lebens Elixier mit Ambra.	—	8
s. Ambra.	—	5
Vitrioli Mynsichti. Mynsichts saures Magen Elixier.	—	12
Uterinum Crollii. Crollii Mutter Elixier.	—	32
Emplastrum Album coctum s. de cerussa. Bleyweiß Pflaster.	—	2
de Ammoniaco. Ammoniac Pflaster.	—	4
Antipodagricum. Zipperleins Pflaster.	—	3
pro Apoplecticis. Haupt Pflaster zum Schlag.	—	16
de Baccis Lauri. Lorbeer Pflaster.	—	3
Betonica. Bethonien Pflaster.	—	3
Capucinorum. Capuciner Pflaster.	—	4
Cicutæ c. Gummi Ammoniaco. Schierling Pflaster.	—	4
Citrinum. Gelb Zug Pflaster.	—	2
ad Clavos pedum. Hüneraugen Pflaster.	—	8
de Crusta Panis. Brod Pflaster.	—	3
Cumino. Kümmich Pflaster.	—	3
Defensivum rubrum officinale. Rothes Defensiv Pflaster	—	3

	1. Loth.	kr.
Emplastrum Defensivum rubrum Wepferi. Wepfers Defensiv Pflaster.	—	3
viride. Grünes Defensiv Pflaster.	—	2
Diabotanum. Zertheilend Kräuter Pflaster	—	8
Diachylon compositum. Vermehrtes Diachylon Pflaster	—	4
simplex. Diachylon Pflaster.	—	2
Diapalma s. Diachalcyteos. Diapalmen Pflaster.	—	2
*Diaphoreticum Mynsichti. Mynsichts zertheilend Pflaster	—	4
Diapompholygos. Pompholix oder Nichts Pflaster.	—	3
Diasulphuris. Schwefel Pflaster.	—	6
Divinum. Besonder Pflaster.	—	6
Filii Zachariæ. Zachariä linderend Pflaster.	—	3
ad fracturas sive Catagmaticum. Beinbruch Pflaster.	—	2
de Galbano crocatum. Galban Pflaster mit Saffran.	—	6
Griseum s. de lapide Calaminari. Gallmey-Pflaster.	—	2
ad Herniam. Weyd Bruch Pflaster.	—	4
de Hyosciamo. Bilsen Kraut Pflaster.	—	4
Incognitum s. Sandalinum. Roth Sandel Pflaster.	—	3
Ischiaticum. Pflaster zu dem Lenden Weh.	—	3
de Lapide Calaminari s. Griseum. Gallmey Pflaster.	—	2
Magneticum. Magnet Pflaster.	—	6
Malacticum cum Gummi. Erweichendes Pflaster mit Gummi.	—	4
sine Gummi. Erweichendes Pflaster.	—	2
Mammillare. Erweichend und zertheilend Brust Pflaster.	—	8
Matricale. Mutter Pflaster.	—	6
de Meliloto. Meliloten Pflaster.	—	3
Mercuriale. Mercurial Pflaster.	—	6
de Minio. Mini Pflaster.	—	2
Miraculosum. Wunder Pflaster.	—	3
Nervinum Hoffmanni. Nerven Pflaster	—	6
Nicotianæ. Toback Pflaster.	—	4
Noricum. Nürnberger Pflaster.	—	3
Odontalgicum. Zahn Pflaster.	—	16
Opodeldoch. Besonder Wund Pflaster.	—	6
Oxycroceum. Saffran Pflaster.	—	6
ad Podagram. v. antipodagricum. Pflaster wider das Podagra.	—	3
de Ranis Vigonis c. Mercurio. Froschpflaster mit Quecksilber.	—	6
s. Mercurio. Froschpflaster ohne Quecksilber.	—	4

		kr.
Emplaſtrum Regium Burrhi. Royal Pflaſter.	1. Loth.	8
Santalinum ſ. Incognitum. Roth Santel Pflaſter.	—	3
Saponatum Barbette. Seiffen Pflaſter.	—	3
Saturninum. Bley Pflaſter.	—	3
de ſpermate Ceti. Wallrath Pflaſter.	—	8
Ranarum. Froſchleich Pflaſter.	—	2
Spleneticum. Miltz Pflaſter.	—	6
Stipticum. Stich Pflaſter.	—	4
de Tacamahaca. Tacamahac Pflaſter.	—	6
Triapharmacum. Braunes Mini oder Jrnſinger Pflaſter.	—	2
contra vermes. Pflaſter wider die Würme.	—	8
verrucas. Wartzen Pflaſter.	—	8
Veſicatorium. Blattern Pflaſter.	—	6
Emulſio externa e nucleis. Aeuſſerliche Kühl Milch.	2. Loth.	4
Violata Mynſicht. Violen Saamen Milch.	—	3
Equi teſtes. Pferds Geile.	1. Loth.	8
Erinaceus combuſtus. Gebrannter Jgel.	—	8
Eſſentia Abietis ſ. Pini c. ſpiritu cochleariæ. Tannzapfen Eſſentz.	—	8
Abſintii compoſita per duplicem infuſionem. Vermehrte Wermuth Eſſentz.	—	4
per ſimplicem Infuſionem. Wermuth Eſſentz.	—	2
Alexipharmaca ordinar. Stahlii. D. Stahlens Bezoar Tinctur oder Gifft Eſſentz.	—	8
temperata. Temperirte Stahliſche Gifft Eſſentz.	—	8
Amara. Bittere Eſſentz.	—	12
Ambræ liquida. Ambra Eſſentz.	1. Qtl.	24
Balſamica. Dippels Balſamiſche Ambra Eſſentz.	—	16
ſicca. Trockene Ambra Eſſentz.	—	18
Angelicæ. Angelic Eſſentz.	1. Loth.	8
Anodyna officinalis. Schmertz ſtillende Eſſentz.	—	24
Ludovici. Ludwigs Schmertz ſtillende Eſſentz.	—	24
Antarthritica J.M.Hoffm. c. opio. Hoffmanns Glieder Eſſentz mit Opio.	—	20
ſ. opio. Hoffmanns Glieder Eſſentz ohne Opio.	—	16
Anthydropica. Waſſerſucht Eſſentz.	—	12
Antiſcorbutica. Scharbocks Eſſentz.	—	12
Aurantiorum c. Vino Malvatico. Pomerantzen Eſſentz mit Malvaſier.	—	4
ſpirituoſa.	—	8
Balſamica Gmelini. D. Gmelins Balſamiſche Eſſentz.	—	16

	1. Loth.	kr.
Essentia Balsamica Hoffmanni. D. Hoffmanns Balsamische Essentz.	—	12
Ludovici. D. Ludwigs Balsamische Essentz.	—	12
Balsami Peruviani. Peruvianische Balsam Essentz.	—	16
Benzoës composita. Vermehrte Benzoe Tinctur.	—	8
simplex. Ordinari Benzoe Tinctur.	—	6
Cardamomi. Cardamomen Essentz.	—	8
Cardui Benedicti. Cardobenedicten Essentz.	—	8
Carminativa Wedelii. D. Wedels Grimmen Essentz.	—	12
Castorei. Biebergeil Essentz.	—	20
Catechu s. terræ Japonicæ. Japanische Erden Essentz.	—	8
Centaurii minoris. Tausendgüldenkraut Essentz.	—	6
Cephalica. Hauptstärckende Essentz.	—	16
Chinæ de China. Fieber Rinden Essentz.	—	12
composita. Vermehrte Fieber Rinden Essentz.	—	12
Corticis Chacarillæ. Chacarill Essentz.	—	8
Croci. Saffran Essentz.	—	20
Culilavan. Bitter Zimmet Essentz.	—	12
Dulcis. Stärckende Essentz.	—	32
Fuliginis. Ruß Tropffen.	—	4
Fumariæ. Erdrauch Essentz.	—	6
Gentianæ. Entian Essentz.	—	6
Hyperici. Johannes Blumen Essentz.	—	6
Levistici. Liebstöckel Essentz.	—	6
Ligni Aloës. Paradieß Holtz Essentz.	—	16
Sassafras composita. Vermehrte Sassafras Essentz.	—	12
simplex. Einfache Sassafras Essentz.	—	8
Lignorum. Holtz Essentz.	—	8
Lumbricorum terrestrium. Regenwürmer Essentz.	—	10
Martiata aperitiva. Eröffnende Essentz mit Stahl.	—	12
Menthæ. Beymenthen Essentz.	—	6
Millefolii. Schaffgarben Essentz.	—	6
Millepedum. Maur Essel Essentz.	—	16
Mumiæ. Mumien Essentz.	—	8
Myrrhæ. Myrrhen Essentz.	—	8
Alkalisata. Myrrhen Essentz mit Alcali.	—	8
Pareiræ bravæ. Grieß Wurtz Essentz.	—	8
Pimpinellæ albæ. Bibernell Essentz.	—	8
Pini sive Abietis c. Spiritu Cochleariæ. Tannzapffen Essentz.	—	12
Populi vulneraria. Wund Essentz.	—	12
Scillæ. Meer Zwiebel Essentz.	—	12
Scordii. Gifft oder Lachen Knoblauch Essentz.	—	8
Composita s. Diascordium liquidum. Vermehrte Gifft oder Lachen Knoblauch Essentz.	—	12

Essentia

	1. Loth.	kr.
Essentia Serpentariæ Virginianæ. Virginianische Schlangen Wurtz Essentz.	—	12
Spicæ Indicæ. Indianische Spick Essentz.	—	8
Splenetica Stahlii. D. Stahls Miltz Essentz.	—	8
Stomachica Polychresta. Magen Essentz.	—	16
Succini Alkalisata. Agtstein Essentz mit Alcali.	—	12
G. Besondere Agtstein Essentz.	—	32
simplex. Agtstein Essentz.	—	12
Terræ Catechu. Japanische Erden Essentz.	—	8
Theriacalis. Theriack oder Gifft Essentz.	—	12
Travmatica. Wund Essentz.	—	12
Trifolii fibrini. Bieberklee Essentz.	—	6
Valerianæ composita. Baldrian Essentz.	—	12
Vincetoxici. Schwalbenwurtz Essentz.	—	6
Euphorbium. Euphorbien Safft.	—	4
correctum. Präparirter Euphorbien Safft.	—	8
Extractum Absinthii. Wermuth Extract.	—	16
Agarici. Lerchenschwamm Extract.	—	48
Aloës Gummosum. Aloe Extract.	—	12
Angelicæ. Angelic Extract.	—	16
Anodynum. Schmertzstillend Extract.	—	48
Aristolochiæ longæ. Lang Osterlucey Wurtz Extract.	—	16
rotundæ. Runde Osterlucey Wurtz Extract.	—	16
Artemisiæ. Beyfuß Extract.	—	16
Asari. Haselwurtz Extract.	—	20
Bellidis. Gänßblümleins Extract.	—	16
Bezoardicum Camerarii. Bezoard Extract.	2. Gran.	1
Bryoniæ. Zaunrüben Extract.	1. Loth.	16
Calami Aromatici. Callmus Extract.	—	16
Cardui benedicti. Cardobenedicten Extract.	—	16
Dia Carthami. Wild Saffran Extract.	1. Qtl.	12
Castorei. Biebergeil Extract.	1. Gran.	1
Catharcticum. Purgierender Extract.	1. Qtl.	12
Catholicum. Allgemeiner Purgier Extract.	—	16
Centaurii minoris. Tausendguldenkraut Extract.	1. Loth.	16
Chærefolii. Cherfelkraut Extract.	—	16
Chamædryos. Gamanderle Extract.	—	16
Chamæpyteos. Feld Cypressen Extract.	—	16
Chinæ de China. Fieberrinden Extract.	1. Qtl.	24
Cochiarum s. Pilul. Cochiæ. Starck purgierende Haupt Pillulen.	1. Loth.	24
Cochleariæ. Löffelkraut Extract.	—	24
Colocynthidis. Colloquinten Extract.	1. Qtl.	20
Corticis Chacarillæ. Chacarill Extract.	—	8
Croci. Saffran Extract.	—	48
Enulæ. Alant Extract.	1. Loth.	16
Esulæ. Wolffsmilch Extract.	—	24
Euphrasiæ. Augentrost Extract.	—	16
Fumariæ. Erdrauch Extract.	—	16

			kr.
Extractum Gentianæ.	Enzian Extract.	1. Loth.	12
Guajaci.	Frantzosenholtz Extract.	—	24
Hellebori nigri.	Schwartz Nießwurtz Extract.	—	24
Hederæ terrestris.	Gundelreben Extract.	—	16
Hyosciami.	Bilsamkraut Extract.	—	16
Jalappæ.	Jalappen Extract.	—	24
Levistici.	Liebstöckel Extract.	—	16
Ligni Aloës.	Paradißholtz Extract.	1. Qtl.	48
Liquiritiæ.	Süßholtz Extract.	1. Loth.	3
Ligni Quajaci.	Frantzosenholtz Extract.	—	24
Marocostinum.	Balsamischer Purgier Extract.	—	48
Martis pomatum.	Stahl Extract.	—	16
Mechoacannæ albæ.	Weiß Rhabarbara Extract.	—	48
Melissæ.	Melissen Extract.	—	16
Menthæ.	Beymenten Extract.	—	16
Nicotianæ.	Taback Extract.	—	24
Opii.	Opium Extract.	—	48
cydoniatum. s. Opium cydoniatum fermentatum.	Opium mit Quittensafft fermentirt.	—	48
Pæoniæ.	Gichtrosen Extract.	—	16
Panchymagogum.	Laxier Extract.	—	48
Papaveris erratici.	Schnallenblumen Extract.	—	24
Phlegmagogum.	Abführender Extract.	—	40
Pini.	Tannzapffen Extract.	—	16
Plantaginis.	Wegerich Extract.	—	16
Pulegii.	Poley Extract.	—	16
*Rhabarbari.	Rhabarbaren Extract.	1. Qtl.	24
Rutæ.	Rauten Extract.	1. Loth.	16
Sabinæ.	Sevenbaum Extract.	—	16
Salviæ.	Salbey Extract.	—	16
Sancti s. Ligni Quajaci.	Frantzosenholtz Extract.	—	24
*Sarsaparillæ.	Sarsaparillen Extract.	—	48
Scabiosæ.	Apostemkraut Extract.	—	16
Scordii.	Lachenknoblauch Extract.	—	16
Scorzoneræ.	Scorzoneren Extract.	—	16
*Sennæ.	Sennä Blätter Extract.	—	32
Tanaceti.	Rheinfarn Extract.	—	16
Tormentillæ.	Tormentill Extract.	—	16
Trifolii fibrini.	Bieberklee Extract.	—	16
Valerianæ.	Baldrian Extract.	—	16
Veronicæ.	Ehrenpreiß Extract.	—	16
Zedoariæ.	Zittwer Extract.	—	32
Exuviæ Serpentum.	Schlangen Bälge.	1. St.	3

F.

Fabæ s. Ignatii.	Ignatii Bohnen.	1. St.	20
Fecula radicis Ari.	Präparirtes Aron Pulver.	1. Loth.	12
Bryoniæ.	Präparirtes Zaunrüben Pulver.	—	12
Ireos nostratis.	Präparirtes Schwertel Pulver.	—	12

	1. Loth.	kr.
Fecula radicis Pæoniæ. Präparirtes Gicht Rosen Wurtz Pulver.	—	12
Fel Tauri inspissatum. Eingekochte Ochsengalle.	—	8
Vitri. Glaß Galle.	—	1
Ficus s. Caricæ. Feigen.	—	1

Flores Chemici.

Flores Antimonii Helmont. Spießglaß Blumen.	1. Qtl.	12
*Benzoës. Benzoe Blumen.	—	30
Ferri nativi. Eisenblüth. Sinter.	1. Loth.	2
Salis ammoniaci martiales. Salmiac Blumen mit Stahl.	—	16
simplices. Weisse Salmiac Blumen.	—	8
Sulphuris compositi. Versetzte Schweffel Blumen.	—	12
simplices. Schweffel Blumen oder präparirter Schweffel.	—	4
Viridis æris s. Crystalli viridis æris. Grünspan Blumen.	—	16

Flores Herbarum.

Flores Acaciæ, sive pruni silvestris. Schlehenblüth.	1. Hvoll.	1
Anethi. Dillblumen.	—	1
Anthos. Roßmarin Blüth.	1. Loth.	6
Aquilegiæ. Agley oder Glockenblumen.	1. Hvoll.	2
Arnicæ. Lucian oder Fallkraut Blüth.	—	4
Aurantiorum, s. Naphæ. Pomerantzenblüth.	—	6
Balaustiarum. Granathenblüth.	—	6
Basilici s. Ocymi. Basilienblüth.	—	4
Bellidis. Gänßblümlein.	—	2
minoris hortensis. Rothe Maßliebenblüth.	—	4
Betonicæ. Bethonienblüth.	—	2
Borraginis. Boretschblüth.	—	4
Buglossi. Ochsenzungen Blumen.	—	4
Calcatrippæ. s. Consolidæ Regalis. Rittersporn Blumen.	—	2
Calendulæ. Ringelblumen.	—	3
Carthami s. Cnici. Safflor.	—	3
Centaurii minoris. Tausendguldenkraut Blüth.	—	3
Chamomillæ Romanæ. Römisch Chamillen.	—	2
vulgaris. Gemeine Chamillen.	—	1
Cheiri s. Levcoji lutei. Gelbe Veilgen.	—	4
Cichorii. Wegwart Blumen.	—	2
Consolidæ Regalis. s. Calcatrippa. Rittersporn Blumen.	—	2
Cyani Cœrulei. Blaue Kornblumen.	—	3
Fabarum. Bohnen Blüth.	—	3
Farfaræ. s. Tussilaginis. Hufflattich Blumen.	—	2
Galeopsidis. s. Urticæ. Todte Nesselblumen.	—	3
Genistæ. Pfriemen oder Künschotten Blumen.	—	2
Hepaticæ nobilis. Edelleberkraut Blüth.	—	4
Hyperici. Johannes Blumen.	—	2

	1. Hvoll.	kr.
Flores Lavendulæ. Lavendel Blumen.	—	3
Ligustri. Hartriegel Blumen.	—	2
Liliorum alborum. Weisse Lilien.	—	3
convallium. Mayenblumen.	—	4
Lupuli. Hopfen.	—	1
Malvæ arboreæ. Herbst Rosen.	—	1
Meliloti. Steinklee Blumen.	—	1
Nympheæ albæ. Weisse Seeblumen.	—	2
Papaveris erratici. s. Rhæados. Klapper Rosen, Schnallenblumen.	—	2
Persicorum. Pfersichblüth.	—	6
Pœoniæ. Gichtrosen.	—	2
Primulæ veris. s. Paralyseos. Schlüsselblumen.	—	3
Rosarum albarum. Weisse Rosen.	—	2
pallidarum. Blasse oder Ulmer Rosen.	—	2
rubrarum finarum. Sammet oder Eßig Rosen.	1. Loth.	6
Vulgarium. Rothe oder Zucker Rosen.	1. Hvoll.	2
Salviæ hortensis. Garten Salbey Blüth.	—	3
Sambuci. Hollunder Blüth.	—	1
Saxifragiæ v. Herba. Steinbrech Blüth.	—	2
Scabiosæ. Apostemkraut Blüth.	—	2
Spicæ Celticæ. Celtische Narden, Maria Magdalenen Blumen.	1. Loth.	3
hortensis. Spicblumen.	—	2
Indicæ. Indianischer Spicanard.	—	10
Stœchadis Arabicæ. Arabischer Stöchas.	—	3
citrinæ. Rheinblumen.	1. Hvoll.	2
Tanaceti. Rheinfarn Blumen.	—	2
Tiliæ. Lindenblüth.	—	1
Tunicæ. Negelblumen.	—	4
Verbasci. Wullenkrautblumen.	—	2
Violarum martialium. Mertzen Violen.	—	6
Urticæ mortuæ s. Lamii. Todte Nesselblumen.	—	3
Folium Indum, Malabathrum. Indianisch Blatt.	1. Loth.	8
Folia Lauri. Lorbeer Blätter.	—	2
Quercus. Eichenlaub.	1. Hvoll.	1
*Sennæ electæ. Auserlesene Sennet Blätter.	1. Loth.	6
Folliculi Sennæ. Sennet Bälglein.	—	4
Fungus Cervinus s. Boletus Cervinus. Hirschbrunst.	—	3
Chirurgorum s. crepitus Lupi. Bovist.	—	3
Cynosbati. Schlaff Kuntzen, Schlaff Aepffel.	—	4
Salicis. Weiden Schwamm.	—	2
Sambuci. Hollunder Schwamm, Judas Ohr.	—	4

G.

*Galanga major. Groß Galgant.	—	2
*minor. Klein Galgant.	—	3
Gallæ Turcicæ. Galläpffel.	—	2
Gallinarum Ventriculorum Tunicæ interiores. Innere Hünermagen Häutlein.	—	8

Gelatina

	2. Loth.	kr.
Gelatina Cornu Cervi citrata. Hirschhorn Sultz mit Citronen.	—	3
sicca. Trockene Hirschhorn Sultz.	1. Loth.	4
Gialappa. vid. Ref. Jalappæ.		
Gilla Theophrasti f. Gilla Vitrioli. Brech Vitriol.	—	8
Glacies mariæ vulgaris. Frauen Eis.	2. Loth.	1
Moscovitica seu Specularis. Moscowitisch Frauen Eiß.	1. Loth.	2
Glandes quercinæ. Eichelen.	2. Loth.	1
Glossopetra. Natterzungen.	2. St.	3
Globuli Bezoardici Anglici f. Mecklenburg. Bezoar Kugel.	1. Scrup.	20
Carminativi. Wind Kugeln.	Nro. 1.	1.2
martiales. Stahl Kugeln. Gallis, *Boule martiale.*	1. Loth.	8
moschati. Bisam Kugeln.	Nro. 1.	1.2
Grana Chermes. Chermes oder Carmosin Beer.	1. Loth.	10
*Paradisi. Paradiß Körner.	—	2
Tilli f. Tiglia. Purgier Nüß, Purgier Körner.	—	12
Granatorum Poma. Granat Aepffel. Secundum æquum & bonum.	1. St.	—
*Gummi ammoniacum. Gummi Ammoniac.	1. Loth.	4
*Animæ.	—	6
Arabicum. Dinten Gummi.	—	1
*Asæ dulcis f. Benzoes. Wohlriechender Asand.	—	10
*fœtidæ. Teuffels Dreck, stinckender Asand.	—	6
Asphaltum. f. Bitumen Judaicum. Judenbech.	—	4
Bdellium. Bdelli Gummi.	—	6
*Benzoes. f. Asa dulcis. Wohlriechender Asand.	—	8
Bitumen Judaicum, f. Asphaltum. Judenbech.	—	4
*Camphoræ. Campher.	—	10
*Carannæ. Gummi Carann.	—	10
Cerasorum. Kirschenhartz.	—	2
Colophonium. Geigenhartz.	—	1
*Copal. Copal.	—	8
Elemi. Wild Oelbaumhartz.	—	6
Euphorbium. Euphorbien Safft.	—	4
*Galbanum. Galban, Mutter Gummi.	—	8
Gutæ. Gummi Gutt.	—	10
Hedcræ. Epheu Gummi.	—	8
Juniperi f. Sandarac. Trockener Firnies, Wachholderhartz.	—	3
Laccæ in baculis. Rothes Gummi Lac an Stecken.	—	4
granis. Lac in Körnern.	—	6
tabulis. Blatt oder Schål Lac.	—	6
Ladanum. Gummi Ladan.	—	4
*Mastiches. Mastiche electa f. in granis. Auserlesen Mastix.	—	8
*in sorte. Gemeiner Mastix.	—	4
*Myrrhæ electæ. Auserlesene Myrrhen.	—	8
*in sorte. Gemeine Myrrhen.	—	6
*Olibanum electum. Auserlesen Weyrauch.	—	4
*vulgare. Gemeiner Weyrauch.	—	3

		fr.
Gummi Olibanum vulgare germanicum. Waldrauch.	1. Loth.	1
*Opopanax. Panax Gummi.	—	16
*Sagapenum. Serapin Gummi.	—	10
Sandaraca s. Gummi Juniperi. Sandarac, trockener Furnies.	—	3
*Sanguis Draconis in Lachrymis. Fein Drachen Blut.	—	10
tabulis. Drachen Blut.	—	4
Sarcocolla. Fleischleim Gummi.	—	4
*Styracis in granis. Auserlesener Storax.	—	30
liquidæ. Flüßiger Storax.	—	4
ordinariæ. Gemeiner Storax.	—	6
*Tacamahaca. Tacamahac.	—	6
Tragacantha vulgaris. Tragant.	—	4
electa. Auserlesen Tragant.	—	6
Guttæ Anglicæ cephalicæ. Englische Haupt Tropffen.	—	40

H.

Hepar antimonii s. crocus metallorum. Metallisches Brech Pulver.	—	8
Anguillæ præparatum. Präparirte Aal Leber.	—	20
Canis rabidi præparatum. Präparirte Leber von wütigen Hund.	—	8
Lupi præparatum. Präparirte Wolffs Leber.	—	6
Sulphuris. Schweffel Leber.	—	8
Herba Abrotani, maris. Stabwurtz, Gartach.	1. Hvoll.	2
Absinthii Pontici. Römischer Wermuth.	—	2
vulgaris. Gemeiner Wermuth.	—	1
Acetosæ. Saurampfer.	—	1
Acetosellæ s. Halleluja. Buchampfer, Saurklee.	—	1
*Acmellæ. Acmellen. Indianisch Harnkraut.	1. Qtl.	=
Adianthi albi s. Rutæ murariæ. Stein oder Maur Rauten.	1. Hvoll.	1
aurei. Gulden Wiederthon.	—	2
nigri. Frauenhaar.	—	1
Agrimoniæ. Odermennig.	—	1
Alchimillæ. Sinau.	—	1
Alliariæ. Knoblauchkraut.	—	1
Alceæ. Sigmarskraut.	—	2
Alsines. Hünerdarm, Nagelkraut.	—	1
Altheæ. Eybischkraut.	—	1
Anagallidis. Hünerdarm, Gauchheil.	—	1
Anethi hortensis. Gartendill.	—	1
Anserinæ. Genserich.	—	1
Antirrhini. Löwenmäulerkraut.	—	2
Arnicæ. Lucian. Fallkraut.	—	2
Aristolochiæ. Osterluceykraut.	—	1
Artemisiæ albæ. Weisser Buck oder Beyfuß.	—	1
vulgaris. Rother Beyfuß.	—	1
Asari. Haselwurtzkraut.	—	1
Basilici. Basilienkraut.	—	2
Beccabungæ. Bachbungen.	—	1

Herba

		kr.
Herba Bellidis minoris. Maßliebenkraut.	1. Hvoll.	1
Betæ albæ. Mangoldt.	—	1
Betonicæ. Braune Bethonien.	—	1
Boni Henrici. Guter stoltzer Heinrich.	—	1
Borraginis. Borretschkraut.	—	1
Botryos s. Atriplicis suaveolentis Mexicanæ. Traubenkraut.	—	2
Brancæ Ursinæ. Bärenklau.	—	1
Brunellæ. Braunellenkraut.	—	1
Buglossi. Ochsenzungen.	—	1
Bursæ Pastoris. Täschelkraut.	—	1
Calaminthæ montanæ. Bergmüntz.	—	1
vulgaris. Ackermüntz.	—	1
Capilli veneris s. Adianthum nigrum. Frauen Haar.	—	1
Cardiacæ. Hertzgespankraut.	—	1
Cardui benedicti. Cardobenedicten.	—	2
mariæ. Mariendistel.	—	1
Centaurii minoris. Tausendguldenkraut.	—	2
Centumnodii. Weggraß. Wegtritt.	—	1
Cerefolii. Körfelkraut.	—	2
Ceterach. Miltzkraut.	—	3
Chamædryos veræ. Gamanderlein.	—	2
Chamæpithyos. Feld Cypressen, je länger je lieber.	—	2
Chelidonii majoris. Groß Schölkraut.	—	1
Cichorii hortensis. Wegwartenkraut.	—	1
Cicutæ. Schierling.	—	1
Cochleariæ. Löffelkraut.	—	3
Consolidæ majoris. Schwartzwurtzkraut.	—	1
mediæ s. Bugulæ. Guldengunßel.	—	1
Saracenicæ. Heydnisch Wundkraut.	—	1
Conyzæ Cœruleæ. Blaudürr Wurtzkraut.	—	2
pulicariæ s. mediæ. Gelbe Müntz, Ruhrkraut.	—	1
Crassulæ majoris. Knabenkraut, fette Henne.	—	1
Cupressi. Garten Cypressen.	—	4
Cuscutæ. Flachs Seiden.	—	2
Dictamni Cretici. Cretischer Diptam.	1. Loth.	8
Ebuli. Attichkraut.	1. Hvoll.	1
Endiviæ latifoliæ. Endivien Blätter.	—	1
Epithymi cretici. Thym Seyde.	1. Loth.	4
Equiseti. Katzenwedel, Schafftheu.	1. Hvoll.	1
Erisimi. Wilder Senff, Hederich.	—	1
Eupatorii Avicennæ. Kunigundskraut.	—	1
Euphrasiæ. Augentrost.	—	2
Farfaræ. Huff Lattich.	—	1
Fœniculi. Fenchelkraut.	—	1
s. Folia Indi, Malabatri. Indianisch Blatt.	1. Loth.	8
Fragariæ. Erdbeerkraut.	1. Hvoll.	1
Fumariæ. Erdrauch.	—	1
Galegæ. Geis Rauten.	—	2
Gallitrichi, s. Sclaræa. Scharlachkraut.	—	2

		kr.
Herba Gallii lutei. Unser Frauen Bettstroh.	1. Hvoll.	1
Geranii Rupertiani. Storchen Schnabel, Gottes Gnad.	—	1
Gnaphalii montani, Pilosellæ. Haasen Pfötlein.	—	1
Gratiolæ. Wilder Aurin, Gottes Gnade.	—	2
Hederæ arboreæ. Epheu Blätter.	—	1
terrestris. Gundel Reben.	—	1
Hepaticæ fontanæ, s. Lichenis petræi. Steinleberkraut.	—	2
nobilis. Edel Leberkraut.	—	2
stellatæ. Sternleberkraut.	—	1
Herniariæ. Harn oder Bruchkraut.	—	2
Hispidulæ, s. auriculæ muris. vid. Gnaphalii montani.	—	1
Hormini, s. sclareæ majoris. Garten Scharlach.	—	1
Hyosciami. Bilsenkraut.	—	1
Hyperici. Johanneskraut.	—	1
Hyssopi. Issoppen, Ispen.	—	2
Jaceæ, s. violæ tricoloris. Dreyfaltigkeitkraut.	—	1
Juniperi, s. summitates Juniperi. Wachholder Sprossen.	—	1
Lappæ majoris. Groß Kletten Blätter.	—	1
Lavendulæ angustifoliæ. Lavendelkraut.	—	2
Lauri. Lorbeer Blätter.	—	2
Linariæ vulgaris. Leinkraut.	—	1
Lini carharctici. Purgier Flachs.	—	6
Lunariæ racemosæ. Mondkraut, Mondrauten.	—	4
Lupuli. Hopfen.	—	1
Lysimachiæ luteæ. Gelber Weyderich.	—	1
Majoranæ. Meron, Majoran.	—	3
Malvæ arboreæ. Gartenpappeln, Herbstrosen.	—	1
vulgaris. Käßpappeln.	—	1
Marrubii albi. Weiß Andorn.	—	2
nigri s. fœtidi. Schwartz Andorn.	—	1
Mari veri. Amberkraut, Mastichkraut.	1. Loth.	16
Matricariæ. Mutterkraut, Metterich.	1. Hvoll.	1
Matrisylvæ s. hepaticæ stellatæ. Waldmeister, Sternleberkraut.	—	1
Meliloti. Meliloten, Steinklee.	—	1
cœrulei s. loti hortensis. Sibengezeit.	—	3
Melissæ hortensis. Garten Melissen.	—	2
turcicæ. Türckische Melissen.	—	2
Melissophyli. Wald Melissen.	—	2
Menthæ crispæ. Grausemüntz.	—	1
Mercurialis. Bingelkraut.	—	1
Millefolii. Schaffgarben.	—	1
Millegranæ s. herniariæ. Harn oder Bruchkraut.	—	2
Morsus Diaboli s. Succisæ. Teuffels Abbiß.	—	1
Gallinæ s. alsines. Hünerdarm, Vogelkraut.	—	1
Myrti Italici. Myrrten Blätter.	—	3
Nasturtii aquatici s. Sisymbrii. Bronnencreßig.	—	1
Nicotianæ majoris. Tabacks Blätter.	—	2

		kr.
Herba Nummulariæ. Pfenning oder Nagelkraut.	1. Hvoll.	1
Ocymi s. Basilici. Basilienkraut.	—	2
Ophioglossi. Natter Zünglein.	—	4
Origani Cretici. Cretische Dosten.	1. Loth.	6
vulgaris. Dosten, Wohlgemuth.	1. Hvoll.	1
Parietariæ s. Helxines. St. Peters oder Glaßkraut.	—	1
Parthenii s. matricariæ. Mutterkraut.	—	1
Pentaphylli. Fünff Fingerkraut.	—	1
Perfoliatæ. Durchwachs.	—	1
Perforatæ s. Hyperici. Johannes Blumen.	—	1
Petroselini. Peterling.	—	1
Pilosellæ s. gnaphalii, montani. Nagelkraut.	—	1
majoris s. auriculæ muris. Gelbe Maus-Oehrlein.	—	1
Pimpinellæ sanguisorbæ. Welsche Bibernell.	—	1
saxifragæ. Steinbrech oder weisse Bibernell.	—	1
Plantaginis angustifoliæ. Spitz Wegerich.	—	1
majoris. Breit Wegerich.	—	1
Polii Cretici. Cretische Poley.	—	3
montani. Berg Poley.	—	2
Potentillæ s. Anserinæ. Gänserich.	—	1
Polygoni s. centumnodii. Weggraß.	—	1
Polytrichi s. Adianthi rubri. Roth Wiederthon.	—	2
Prassii s. Marrubii albi. Weisser Andorn.	—	2
Prunellæ. Braunellen.	—	1
Ptarmicæ. Wilder Bertram.	—	2
Pulegii hortensis. Poley.	—	2
Pulmonariæ arboreæ. Lungenkraut.	—	1
maculosæ. Flecken Lungenkraut.	—	1
Pyrolæ. Wintergrün.	—	2
s. Quercus folia. Eichen Laub.	—	1
Rorellæ. Sonnen Thau.	—	4
Rorismarini. Roßmarin.	—	3
Rubi vulgaris. Braunbeer Laub.	—	1
Rutæ hortensis. Garten Rauten.	—	1
caprariæ s. Galegæ. Geiß Rauten.	—	2
murariæ s. adianthi albi. Maur Rauten.	—	1
Sabinæ. Sevenbaum.	—	1
Salicis. Weiden Blätter.	—	1
Salviæ hortensis. Salbey.	—	1
silvestris. Wilder Salbey.	—	1
Sampsuchi s. Majoranæ. Majoran.	—	3
Saniculæ. Sanickel.	—	2
Saponariæ. Seiffenkraut.	—	1
Saturejæ sativæ. Saturey.	—	2
Saxifragiæ albæ. Weisser Steinbrech.	—	2
Scabiosæ. Apostemkraut.	—	1
Scariolæ s. Endiviæ. Endivien.	—	1
Sclareæ s. Gallitrichi. Scharlachkraut.	—	1
Schœnanthi. Cameel Stroh.	1. Loth.	8
Scolopendrii veri s. Ceterach. Miltzkraut.	1. Hvoll.	3

			kr.
Herba	Scolopendrii vulgaris. Hirschzungen.	1. Hvoll.	2
	Scordii Cretici. Cretischer Lachen Knoblauch.	1. Loth.	6
	nostratis. Lachen Knoblauch.	1. Hvoll.	2
	Sedi minoris. Klein Haußwurtz.	—	1
	*Sennæ folia. Sennen Blätter.	1. Loth.	6
	folliculi. Sennet Bälglein.	—	4
	Senecionis. Goldkraut oder Creutzwurtz.	1. Hvoll.	1
	Serpilli vulg. Quendel.	—	1
	Sideritidis. Glied oder Beschreykraut.	—	1
	Solani vulgaris. Nachtschattenkraut.	—	1
	Soldanellæ. Meer Kohlkraut.	—	4
	Squinanthi. vid. Schœnanthi.		
	Tamarisci. Tamariscen.	—	2
	Tanaceti. Rheinfarn.	—	1
	Taraxaci. Pfaffenröhrlein.	—	1
	*Thee. Thee. Secundum æquum & bonum.	—	—
	Thymii Cretici. Cretischer Thymian.	1. Loth.	6
	vulgaris. Thymian.	1. Hvoll.	2
	Tormentillæ. Tormentillkraut.	—	1
	Trichomanis s. Adianthi aurei. Gülden Wiederthon.	—	2
	Trifolii fibrini. Biberklee, Fieberklee.	—	1
	pratensis. Wiesenklee.	—	1
	Tussilaginis s. Farfaræ. Hufflattich.	—	1
	Verbasci. Wullenkraut.	—	1
	Verbenæ. Eisenkraut.	—	1
	Veronicæ majoris. Ehrenpreiß.	—	1
	Vincæ per Vincæ. Sin oder Wintergrün.	—	2
	Violariæ. Mertzen Violenkraut.	—	1
	Vitis. Weintrauben Blätter.	—	1
	Virgæ aureæ s. consolidæ Saracenicæ. Heydnisch Wundkraut.	—	1
	Urticæ mortuæ. Taube Nessel.	—	1
	urentis. Brenn Nessel.	—	1
	Uvulariæ. Zapffenkraut.	—	3
*Hermodactyli.	Hermodattel. Fremde Zeitlosenwurtz.	1. Loth.	3
Hiera picra.	Bittere Purgier Lattwerg.	—	6
Hippopotami dentes.	Seepferd Wallroß Zähn.	—	12
	præparati.	—	24
Hirci sanguis.	Bocks Blut.	—	3
Hirundines combustæ.	Gebrannte Schwalben.	—	8
Hirundinum nidus.	Schwalben Nest.	Nro. I.	2
Hordeum integrum.	Gantze Gersten.	2. Loth.	1
Hyacinthus præparata.	Präparirter Hyacinth.	1. Loth.	36
Hydromel simplex.	Süsses Honig Wasser.	2. Loth.	1
Hypocistidis succus.	Cisten Safft.	1. Loth.	6

I.

*Jalappa, vid. Radix Jalappæ.	Jalappen.	—	6
*Ichtyocolla electa.	Weisse auserlesene Hausblasen.	—	8
*vulgaris.	Gemeine Hausblasen.	—	4
*Indigo.	Indig.	—	6

Infusum

	1. Loth.	kr.
Infusum laxativum Mannagettæ. Laxier Tränklein mit Manna auf einmahl.	—	20
Viennense. Wiener Tränklein.	—	3
*Jujubæ. Rothe Brustbeer.	—	2
Juniperi Baccæ. Wachholderbeer.	2. Loth.	1
Julapium Rosarum. Rosen Julepp.	1. Loth.	2
Sambucinum. Holder Julepp.	—	2
Violatum. Violen Julepp.	—	2
K.		
Kermes grana seu baccæ. Scharlach Beer.	—	10
minerale s. Pulvis Carthusianorum. Rothes mineralisches Brech Pulver.	1. Gran.	2
L.		
Lacca cœrulea. Lacmus. Blauer Lac.	1. Loth.	3
*Florentina. Florentinischer Lac.	—	24
in globis s. rotunda. Kugel Lac.	—	4
in granis. vid. Gummi.	—	—
Lac Lunæ. Mond Milch.	—	3
sulphuris s. magisterium sulphuris. Schweffel Milch.	—	24
virginis. Jungfern Milch.	—	2
Ladanum vid. Gummi. Gummi Ladan.	—	4
Lapis Aetites s. Aquilæ. Adler Stein.	1. St.	10
Alabastri præparatus. Präparirter Alabaster Stein.	1. Loth.	2
Amethystus Orientalis præparatus. Präparirter Amethyst.	—	24
Amianthus. Amianthen Stein.	—	2
Armenius. Armenier Stein.	—	8
Bufonites. Krotten Stein.	1. St.	20
Calaminaris. Gallmay Stein.	1. Loth.	1
præparatus. Präparirter Gallmay Stein.	—	4
*Cancrorum s. oculi cancrorum crudi. Krebs Augen.	—	4
præparati. Präparirte Krebs Augen.	—	8
citrati. Präparirte Krebs Augen mit Citronen Safft.	—	12
Carneolus præparatus. Präparirter Carniol.	—	16
Carpionum. Karpfen Stein.	—	12
Chrysolithus præparatus. Präparirter Chrysolith.	—	16
Crystalli montanæ præparatæ. Präparirter Berg Crystall.	—	8
Divinus. s. ophthalmicus. Augen Stein.	—	8
de Goa pretiosus. Kostbahrer und wohlriechender Bezoar Stein von Goa.	1. Gran.	3
minus pretiosus.	—	1
Granatus præparata. Präparirter Granat Stein.	1. Loth.	16
Hæmatites. Blut Stein.	—	2
præparatus. Präparirter Blut Stein.	—	4

		kr.
Lapis Hyacinthus præparata. Präparirter Hyacinth.	1. Loth.	32
Infernalis. Silber Corrosiv.	1. Qtl.	24
Judaicus. Juden Stein.	1. Loth.	4
præparatus. Präparirter Juden Stein.	—	8
Lazuli Orientalis. Lassur Stein.	—	24
præparatus. Präparirter Lassur Stein.	—	36
Lyncis. Belemnites. Ceraunius. Luchs Stein, Katzen Stein.	—	2
præparatus. Präparirte Luchs Stein.	—	8
Magnes. Magnet Stein.	—	2
præparatus. Präparirter Magnet Stein.	—	8
Manati. Seekuh Stein.	—	16
præparatus. Präparirter Seekuh Stein.	—	24
medicamentosus. Wund und Heil Stein.	—	4
Nephriticus. Gries Stein.	—	4
præparatus. Präparirter Gries Stein.	—	12
Osteocolla. Beinbruch Stein.	—	1
præparatus. Präparirter Beinbruch Stein.	—	4
Percarum. Bersich Stein.	—	6
præparatus. Präparirter Bersich Stein.	—	12
Prunellæ s. Nitrum tabulatum. Salpeter Täfelein.	—	3
Pumex. Bimsen Stein.	—	1
præparatus. Präparirter Bimsen Stein.	—	4
Rubinus s. Carbunculus præparatus. Präparirter Rubin.	—	48
Sapphirus præparata. Präparirter Saphyr.	—	24
Sarda s. Carneolus præparatus. Präparirter Carniol.	—	16
Selenites. Frauen Eiß.	—	1
præparatus. Präparirt Frauen Eiß.	—	3
Silex calcinatus. Gebrannte Kieselstein.	—	1
Smaragdus præparatus. Präparirter Smaragd.	—	32
Smiris. Smirgel.	—	1
Specularis s. Selenites. Frauen Eiß.	—	1
præparatus. Präparirt Frauen Eiß.	—	3
Spongiarum. Schwamm Stein.	—	3
præparatus. Präparirter Schwamm Stein.	—	6
Laudanum Cydoniatum. vid. extractum opii Cydoniatum. Opium mit Quittensafft.	—	48
— diureticum v. urinarium. Schmertzen stillender Gries Extract.	—	24
— hystericum. Schmertzen stillender Mutter Extract.	1. Qtl.	20
liquidum Sydenham. Sydenhams Schmertzen stillende Essentz.	1. Loth.	32
opiatum. Versetzter Opium Extract.	1. Gran.	1
Lepus combustus. Gebrannter Haaß.	1. Loth.	6
Leporis Tali. Haasensprüng.	—	20
* Lignum Aloes s. Agalochum. Paradieß Holtz.	—	20

		kr.
Lignum Aspalatum. Rhodiser Dorn.	1. Loth.	8
Brassiliense citrinum. Gelb Braßilien Holtz.	—	1
cœruleum. Blau Holtz.	—	1
rubrum. Roth Braßilien Holtz.	—	1
Buxi arboreæ. Buxbaum Holtz.	—	1
Colubrinum s. serpentinum. Schlangen Holtz.	—	4
Cupressi. Cypressen Holtz.	—	3
Ebenum. Eben Holtz.	—	2
Guajacum s. sanctum. Frantzosen Holtz.	—	1
Juniperinum. Wachholder Holtz.	2. Loth.	1
Lentiscinum. Mastixbaum Holtz.	1. Loth.	2
Mollucense. Molluccisch Purgier Holtz.	—	8
Nephriticum. Grieß Holtz.	—	3
Rhodium. Rosen Holtz.	—	3
Sanctum s. Guajacum. Frantzosen oder Pocken Holtz.	—	1
Santalinum album. Weiß Santel Holtz.	—	3
citrinum. Gelb Santel Holtz.	—	4
rubrum. Rother Santel.	—	2
Sassafras. Sassafras, oder Fenchel Holtz.	—	2
Suberis. Pantoffel Holtz.	—	1
Tamarisci. Tamarißken Holtz.	—	1
Visci querni. Eichen Mispel.	—	2
Limatura Chalybis. Stahl Feile.	—	1
præp. seu alcohol. Präp. Stahl Feile.	—	8
Liquidamber. s. Ambra liquida. Liquidamber.	1. Qtl.	24
Liquiritia cocta alba. Weiß gebachen Süßholtz.	1. Loth.	2
citrina. Gebachen Süßholtz.	—	2
Liquor C. C. succinatus. Hirschhorn Geist mit Agtstein.	—	24
albus. Weisser Hirschhorn Geist mit Agtstein.	—	24
mineralis anodinus Hoffmanni. D. Hoffmanns mineralischer Schmertz stillender Liquor.	—	24
sive Liquamen Myrrhæ. Myrrhen Liquor.	—	20
nitri fixi. Liquor vom fixirten Salpeter.	—	8
Salinus Laxativus. Saltzichter Laxier Liquor.	—	4
Stipticus. Blutstillender Liquor.	—	4
Spleneticus. Miltz Liquor.	—	6
Tartari s. oleum Tartari per deliquium. Weinstein Oel.	—	4
Terræ foliatæ Tartari spirituosus. Besondere Weinstein Tinctur mit Spiritus.	—	24
non spirituosus. Besonderer Weinstein Liquor.	—	16
Visceralis. Visceral Liquor.	—	6
Vulnerarius. s. Balsamus Travmaticus vegetabilis Dippelii. Dippels Wund Balsam.	—	4
mineralis. Mineralischer Wund Balsam.	—	8
Lithargyrium Auri. Gold Glätte.	2. Loth.	1

		kr.
Lithargyrium Argenti. Silber Glätte.	2. Loth.	1
Lithomarga. Steinmarck, Mergel.	1. Loth.	2
Lohoch ad Asthma. s. de scilla. Meerzwiebel Lattwerg.	—	3
de Farfara. Hufflattich Lattwerg.	—	2
pulmonum Vulpis. Fuchslungen Lattwerg.	—	2
sanum & expertum. Husten Lattwerg.	—	2
Saponatum. Seiffen Lattwerg.	—	5
de Scilla s. ad Asthma. Meerzwiebel Lattwerg.	—	3
Lucii mandibulæ. Hechts Kiefer.	—	6
præparatæ. Präparirte Hechts Kiefer.	—	12
Lupi hepar. Präparirte Wolffs Leber.	—	6
Lumbrici terrestres præp. Zubereitete Regenwürmer.	—	4
& pulverisati. Präparirte und pulverisirte Regenwürmer.	—	8
Lycii succus. Buxdorn Safft.	—	6
Lycopodium, vid. Semen Lycopodii. Beerlappen oder Schlangen Moos Saamen.	—	4
M.		
* Macis. Muscat Blüth.	—	16
Magisterium Coralliorum alborum. Weiß Corallen Magisterium.	1. Qtl.	12
rubrorum. Roth Corallen Magisterium.	—	12
Gummi Guttæ. Gummi Gut Magisterium.	—	8
* Jalappæ s. resina Jalappæ. Jalappen Magisterium.	—	16
Marcasitæ. Marcasit Magisterium, Mineralisches Schminck Pulver.	—	6
Perlarum. Perlen Magisterium.	1. Gran.	4
Saturni. Bley Magisterium.	1. Qtl.	6
* Scammonii s. Resina Scammonii. Scammonien Hartz Magisterium.	—	16
Sulphuris. vid. Lac Sulphuris. Schwefel Milch.	—	6
Magnes, vid. Lapis Magnetis. Magnet Stein.	1. Loth.	2
Arsenicalis. Gifft Magnet.	—	8
Magnesia alba s. Panacæa solutiva. Weisse Magnesia.	—	12
Malabathrum, folium Indum. Indianisch Blatt.	—	8
Manati Lapis. Seekuh Stein.	—	16
præparatus. Präparirter Seekuh Stein.	—	24
Mandibulæ Lucii Piscis. Hechts Kiefer.	—	6
præparatæ. Präparirter Hechts Kiefer.	—	12
* Manna Calabrina vulgaris. Gemeine Manna.	—	5
* Cannulata. Feine weisse Manna in Stücken.	—	8
* Electa. Auserlesene Manna.	—	6
Manus Christi perlata. s. Saccharum perlatum.	—	4
Marcasita Arg. s. Bismuthum. Bißmuth, Wißmuth.	—	2
* Margaritæ Occidentales præparatæ. Präparirte Occidentalische Perlen.	1. Qtl.	40

* Marga-

	1. Gran.	kr.
* Margaritæ Orientales præparatæ. Präparirte Orientalische Perlen.	—	2
Mars sulphuratus v. Chalybs sulphure præparatus. Präparirter Stahl mit Schweffel.	1. Loth.	8
Massa ad fornacem. Ofenwachs, Kachelreiber.	—	20
liquiritiæ fusca. Brauner Süßholtz Zucker.	—	3
* Mastiche electa. Auserlesener Mastix.	—	8
* in sorte. Mastix.	—	4
Mater Perlarum. Perlen Mutter.	—	4
præparata. Präparirte Perlen Mutter.	—	8
Materia perlata s. Magisterium Antimonii diaphoretici. Spießglaß Magisterium.	—	32
* Mechoacanna alba. Weisse Jalappen.	—	8
* nigra. Jalappen.	—	6
Medulla Cervi. Hirsch Marck.	—	2
* Mel. Honig.	2. Loth.	1
Anthosatum. Roßmarin Honig.	1. Loth.	3
despumatum. Geläuterter Honig.	—	1
Mercuriale. Bingelkraut Honig.	—	2
Rosatum. Rosen Honig.	—	2
solutivum. Laxier Rosen Honig.	—	3
Sambuci. Holder Honig.	—	2
Violarum. Violen Honig.	—	3
Virgineum. Jungfern Honig.	—	1
Mercurius dulcis. Süsser Sublimat.	—	32
præcipitatus albus. Weisser Präcipitat.	—	32
ruber. Rother Präcipitat.	—	12
flavus s. Turpethum minerale. Gelber Präcipitat.	—	24
viridis. Grüner Präcipitat.	—	32
Sublimatus corrosivus. Sublimat.	—	12
Vitæ. Antimonialisch Brech Pulver.	2. Gran.	1
* Vivus. Quecksilber.	1. Loth.	6
Mespili exsiccati. Ausgedorrte Mespelen.	—	1
Millepedes s. Aselli. Maur Esel.	—	16
præparati. Präparirte Maur Esel.	—	20
Minera martis Hassiaca solaris. Heßisch Eisen Vitriol Ertz.	—	2
Minium rubrum. Rothe Mini.	—	1
Mithridatium Damocratis. Mithridat.	—	8
Miva Cydoniorum aromatica. Gewürtzte Quitten Lattwerg.	—	3
simplex. Quitten Lattwerg.	—	2
Mixtura simplex Correcta. Weisse Bezoar Tinctur.	—	16
ordinaria s. Ludovici. Ordin. oder D. Ludwigs Bezoar Tinctur.	—	12
tonico-nervina Stahlii. D. Stahlens Nerven Mixtur.	—	20
Morsuli ad ardorem ventriculi. Sod Morsellen.	2. Loth.	6
Imperatoris. Magen Morsellen.	—	4
Kunkelii Antimoniales. Kunckels Geblüth reinigende Morsellen.	—	6
citri e succo. Citronen Morsellen.	—	3
contra vermes. Wurm Zucker.	1. Loth.	4

		kr.
Morsuli purgantes. Purgier Zucker.	1. Loth.	6
* Moschus. Bisam.	1. Gran.	3
Mucharum rosarum. Rosen Infusion.	1. Loth.	1
Mumia. Mumien.	—	4
Mures marini. Seemauß.	1. St.	16
Muscerda de Catechu. Japanischer Mausdreck oder Caschu.	1. Qtl.	16
Muscus Acaciæ. Schlehen Moos.	1. Loth.	1
albus quernus. Eichenbaum Moos.	—	1
Corallinus. Corallina. Corallen Moos.	—	4
Cranii, s. usnea. Menschen Hirnschaalen Moos.	—	—
terrestris clavatus. Druttenfuß.	—	2
Mustelæ vertebræ dorsi. Aalruppen Grath.	—	12
Myrobalani belliricæ. Bellirische oder runde Myrobelen.	—	4
Chebulæ. Grosse schwartzbraune Myrobelen.	—	4
citrinæ. Gelbe Myrobelen.	—	4
emblicæ. Aschenfarbige Myrobelen.	—	4
Indicæ. Indianisch schwartze Myrobelen.	—	4
* Myrrha electa. Auserlesene Myrrhen.	—	8
* vulgaris s. in sorte. Gemeine Myrrhen.	—	4
Myrtilli exsiccati. Gedörrte Heydelbeer.	—	1
N.		
Nardus Celtica. Celtischer Spick.	—	3
* Indica. Indianische Spicanard.	—	16
Nidus hirundinum. Schwalben Nest.	1. St.	2
Nihilum album s. Pomphylix. Weisses Nichts.	1. Loth.	2
Nitrum Antimoniatum. Spießglaß Salpeter.	—	4
crudum in crystallis. Feiner Salpeter.	—	1
crystallisatum s. depuratum. Gereinigter und crystallisirter Salpeter.	—	2
perlatum. Perlenmutter Salpeter.	—	8
rosatum. Rosen Salpeter.	—	6
saturnisatum. Bley Salpeter.	—	12
tabulatum s. Sal Prunellæ. Salpeter Täfelein.	—	3
Nuces aquaticæ s. Tribuli aquatici. Wasser oder Stech Nuß.	—	2
cupressi. Cupressen Nüß.	—	2
* Indicæ conditæ. Eingemachte Indianische Nüß.	1. St.	30
* Juglandes conditæ. Eingemachte welsche Nüß.	—	3
* moschatæ s. myristicæ. Muscatnuß.	1. Loth.	8
* Pineæ. Pine oder Zürbel Nüßlein.	—	3
* Pistaceæ. Welsche Pimper Nüßlein.	—	6
* vomicæ. Krähen Aeuglein.	—	2
Nuclei cerasorum. Kirschen Kern.	—	1
Persicorum. Pfersich Kern.	—	2
O.		
Ochra. Ocher Gelb.	—	2
* Oculi cancrorum. Krebs Augen.	—	4
aceto destillato Saturati. Krebs Augen mit Eßig präparirt.	—	8
citrati. Krebs Augen mit Citronen Safft.	—	12

Oculi

		kr.
Oculi cancrorum præparati. Präparirte Krebs Augen.	1.Loth.	8
Populi. Pappel Knöpff.	—	1

Olea destillata, destillirte Oele.

		kr.
Oleum destillatum Absinthii. Wermuth Oel.	1. Qtl.	12
Ammoniaci Gummi. Ammoniac Oel.	—	12
Anethi. Dill Oel.	—	8
Angelicæ. Angelic Oel.	—	12
Animale Dippelii. Dippels Animalisches Oel.	1.Scrup.	20
Anisi. Anis Oel.	1. Qtl.	4
Anthos. Roßmarin Oel.	—	8
Antimonii, vid. Butyrum Antimonii. Spießglaß Oel.	—	4
Artemisiæ. Beyfuß Oel.	—	12
Aurantiorum. Pomerantzen Oel.	—	12
Benzoes. Benzoe Oel.	—	12
de Bergamo. Bergamot Oel.	1.Gläßl.	30
Buxi. Buchsbaum Oel.	1. Qtl.	6
Cajeputh.	—	30
Calami aromatici. Calmus Oel.	—	16
Camphoræ liquidæ. Flüßiges Campher Oel.	1.Scrup.	20
spissum. Dickes Campher Oel.	1. Qtl.	20
*Canangæ. Cameel Stroh Oel.	—	40
Cardamomi. Cardamomen Oel.	—	40
Carvi. Wiesenkümmel Oel.	—	4
*Caryophyllorum. Nägelein Oel.	—	16
Ceræ rectificatum. Wachs Oel.	—	6
Chamomillæ. Chamillen Oel.	—	20
Cinnamomi. Zimmet Oel.	1.Tropf.	3
Citri. Citronen Oel.	1. Qtl.	8
de Cedro. Cedern Oel.	1.Gläßl.	48
Cochleariæ. Löffelkraut Oel.	1.Scrup.	30
Coriandri. Coriander Oel.	1. Qtl.	16
Cornu cervi. Hirschhorn Oel.	1.Loth.	2
*Cubebarum. Cubeben Oel.	1. Qtl.	30
Cumini. Welsch Kümmich Oel.	—	10
Fœniculi. Fenchel Oel.	—	8
Galbani. Galban Oel.	—	12
Hyssopi. Isopen Oel.	—	12
Juniperi e baccis verum, gutes Wachholderbeer Oel.	—	3
vulgare. gemeines.	1.Loth.	4
e ligno. Wachholderholtz Oel.	—	4
Lavendulæ. Lavendel Oel.	1. Qtl.	16
Lauri. Loorbeer Oel.	—	20
Ligni Quajaci. Frantzosenholtz Oel.	—	4
Rhodii. Rosenholtz Oel.	1.Tropf.	1
Sassafras. Sassafras Oel.	1. Qtl.	24
Macis. Muscatblüth Oel. 1.Tropf. 1.kr.	—	48

		kr.
Oleum deſtillatum Majoranæ. Majoran Oel.	1. Qtl.	16
Maſtiches. Maſtix Oel.	—	12
Meliſſæ verum. Meliſſen Oel.	—	48
Menthæ. Beymenthen Oel.	—	16
Myrrhæ. Myrrhen Oel.	—	24
per deliquium ſive liquamen. Flieſſende Myrrhen.	—	5
*Neroli.	—	40
*Nucis moſchatæ. Muſcatnuß Oel.	—	48
Origani Cretici. Cretiſch Wohlgemuth Oel.	—	20
Philoſophorum ſ. e lateribus. Ziegel Oel.	1. Loth.	4
Petroſelini. Peterſilien Oel.	1. Qtl.	16
Piperis. Pfeffer Oel.	—	30
Pulegii. Poley Oel.	—	16
Roſarum. Roſen Oel.	1. Gran.	4
Rorismarini. Roßmarin Oel.	1. Qtl.	8
Rutæ. Rauten Oel.	—	16
Sabinæ. Sevenbaum Oel.	—	8
Salviæ. Salbeyen Oel.	—	12
Saponis. Saiffen Oel.	—	3
Serpilli. Quendel Oel.	—	20
Spicæ commune. Gemeines Spick Oel.	—	1
verum. Wahres und gutes Spick Oel.	—	12
Succini album. Weiſſes Agtſtein Oel.	—	5
rubrum. Rothes Agtſtein Oel.	—	3
Syræ. Fremdes wohlriechendes Oel.	—	40
Tanaceti. Rheinfarn Oel.	—	16
Tartari per deliquium. Weinſtein Oel.	1. Loth.	4
fœtidum. ſtinckend Weinſtein Oel.	—	3
Templinum. Kühn Oel.	—	2
Terebinthinæ. Terbenthin Oel.	—	2
Thymi. Thimian Oel.	1. Qtl.	20
Vitrioli. Vitriol Oel.	1. Loth.	10
Zedoariæ. Zittwer Oel.	1. Qtl.	48

Olea expreſſa, infuſa & cocta. Ausgepreßte, gekochte, und andere Oele von geringerem Preiß.

Oleum Abſinthii infuſum. Wermuth Oel.	1. Loth.	2
Amygdalarum dulcium expreſſum. Süß Mandel Oel.	—	5
amararum. Bitter Mandel Oel.	—	8
Anagallidis. Hünerdarm Oel.	—	2
Anethi. Dill Oel.	—	2
Bezoardicum Wedel. D. Wedels letzte Tropfen.	—	16
Capparum. Kappern Oel.	—	3
Carminativum. Grimmen Oel.	—	3

Oleum

		fr.
Oleum Castorei. Biebergail Oel.	1. Loth.	6
Chamomillæ. Chamillen Oel.	—	2
Cheiri. Gelb Violen Oel.	—	3
Colocynthidis. Coloquinthen Oel.	—	4
Costinum. Costus Oel.	—	3
Euphorbii. Euphorbien Oel.	—	3
Florum Slotani. Slotani Blumen Oel.	—	6
Formicarum. Ameisen Oel.	—	3
*Fructus Cacao s. Butyrum Cacao. Cacao Butter.	—	30
Hyoscyami expressum. Bilsen Saamen Oel.	—	6
Hyperici. Johannes Oel.	—	3
Jasmini. Jasmin Oel.	—	6
Laurinum. Loorbeer Oel.	—	2
Liliorum alborum. Weiß Lilien Oel.	—	2
Lini depuratum. Destillirt oder gereinigtes Lein Oel.	—	1
Lumbricorum terrestrium. Regenwurm Oel.	—	2
Majoranæ. Majoran Oel.	—	3
Mastichinum. Mastix Oel.	—	4
Menthæ. Beymenthen Oel.	—	2
Momordicæ. Balsam Aepffel Oel.	—	12
Myrrhæ per deliquium. Fliessende Myrrhen.	—	20
Nicotianæ. Taback Kraut Oel.	—	2
*Nucis Moschatæ expressum. Muscatnuß Oel.	1. Qtl.	12
Nucum juglandium. Nuß Oel.	1. Loth.	3
Ovorum. Eyer Oel. 8 — 12. à	—	16
Papaveris albi expreß. Monsaamen Oel.	—	3
Petræ album. Petroleum. Weisses Stein Oel.	—	4
nigrum. Schwartz stinckendes Stein Oel.	—	3
rubrum. Roth Stein oder Cathrinen Oel.	—	4
Rosarum. Rosen Oel.	—	2
Rutæ. Rauten Oel.	—	2
Scorpionum simplex. Scorpion Oel.	—	4
Septem florum. Siebenblumen Oel.	—	3
Spermatis Ranarum. Froschleich Oel.	—	2
Verbasci. Wullenkraut Oel.	—	2
Violarum. Mertzen Violen Oel.	—	3
Vulpinum. Fuchs Oel.	—	3
*Olibanum electum. Auserlesener Weyrauch.	—	4
*in sorte. Gemeiner Weyrauch.	—	3
Germanicum. Waldrauch.	—	1
Opercula cochlearum. Schnecken Deckelein.	—	6
*Opium. Indianischer Monsafft.	—	24
Opobalsamum s. Balsamum de Mecha, *Beaume de Mecha.* Arabischer oder Türckischer Balsam.	1. Qtl.	30
*Opopanax. vid. Gummi Opopanax. Panax Gummi.	1. Loth.	16
Orvietan. vid. Electuarium.		
Ossa de cordibus Cervorum. Hirsch Creutz, Hirsch Hertz Bein.	1. St.	6
Sepiæ. Weisses Fischbein.	1. Loth.	2
Osteocolla. vid. Lapis Osteocollæ. Bein Bruchstein.	—	1
præparata. Präparirter Bein Bruchstein.	—	4

		kr.
Ovorum teſtæ præparatæ. Präparirte Eyerſchalen.	1. Loth.	4
Oxycroceum. vid. Emplaſtrum Oxycroceum. Saffran Pflaſter.	—	6
Oxymel helleboratum. Schwartz Nießwurtz Honig.	—	6
ſimplex. Saurer Honig.	—	1
ſquilliticum. Saurer Meer Zwiebel Honig oder Safft.	—	2

P.

Panacea Mercurialis. Mercurial Panacee.	1. Qtl.	16
ſolutiva ſ. Magneſia alba.	1. Loth.	12
Panis Cydoniorum cum aromatibus. Quittenbrod mit Gewürtz.	—	3
ſine aromatibus. Quittenbrod ohne Gewürtz.	—	2
*Paradiſi grana. Paradieß Körner.	—	2
Pareira brava. vid. Radix Pareiræ bravæ. Indianiſche Grieß Wurtz.	—	4
Paridis baccæ. Einbeer.	—	10
Paſſulæ majores. Zibeben, groſſe Roſinen.	—	1
minores. Kleine Roſinlein.	—	1
laxativæ. Laxier Roſinlein.	—	3
Paſta de Althea. *Pate de Guimauve.* Huſten Paſta.	—	4
Pavonum ſtercus. Pfauen Koth.	—	2
Percarum lapis. Berſichſtein.	—	6
Perſicorum ſ. nuclei. Pferſich Kern.	—	2
Petaſites. vid. Radix Petaſitidis. Peſtilentz Wurtz.	—	1
Petroleum. Stein Oel. vid. Ol. Petræ.		
Peucedanum. Sau Fenchel. vid. Radix Peucedani. oder Haar Strang Wurtz.	—	2
Philonium Romanum. vid. Elect. Ruh Lattwerg.	—	8
Phlegma Vitrioli. Vitriol Waſſer.	—	2
Phu magnum. vid. Radix Valerianæ maj. Baldrian Wurtz.	—	2
Pilæ marinæ ſ. Sphæræ marinæ. Meer Ballen.	—	3
Pilulæ Æthiopicæ. Schwartze Mercurial Pilulen.	1. Qtl.	10
Aloëphanginæ. Aromatiſche Aloe Pilulen.	—	6
de Ammoniaco. Ammoniac Pilulen.	—	6
Angelicæ. Engliſche Pilulen.	—	4
aperientes Stahlii ſ. contra obſtructionem. Eröffnende oder Obſtructions Pilulen.	—	8
aureæ. Güldene Haupt Pilulen.	—	6
balſamicæ Mortonianæ. Balſamiſche Pilulen.	—	16
Cachecticæ. Bleichſucht Pilulen.	—	6
Cephalicæ. Haupt Pilulen.	—	6
Cochiæ Raſis. Rhaſis purgirende Haupt Pilulen.	—	4
de Cynogloſſo. Hunds Zungen Pilulen.	—	4
cum caſtoreo. Hunds Zungen Pilulen mit Bibergail.	—	6
Emanuelis. Immanuels Pilulen.	—	4
Fætidæ. Mutter Pilulen.	—	6
Hieræ picræ. Bittere Pilulen mit Lerchen Schwamm.	—	4

Pilulæ

		fr.
Pilulæ Hydropicæ Bontii. Bontii Waſſerſucht Pilulen.	1. Qtl.	6
Hyſtericæ. Mutter Pilulen.	—	10
Lucis majores ſ. opticæ. Augen Pilulen.	—	4
Marocoſtinæ. Coſtus Pilulen.	—	8
Maſtichinæ. Maſtix Pilulen.	—	4
Mercuriales. Mercurial Pilulen.	—	12
Polychreſtæ balſamicæ. Laxirende Polychreſt Pilulen.	—	12
Starkey. Starckey Polychreſt Pilulen.	—	24
Scilliticæ. Meer Zwiebel Pilulen.	—	3
Solares Wildeganſii. Wildegans Pilulen.	1. Gran.	1
Spleneticæ. Miltz Pilulen.	1. Qtl.	6
de Styrace ſ. Ambra. Storax Pilulen.	—	12
Succino Cratonis. Agtſtein Pilulen.	—	4
cum magiſterio Jalappæ. Verſtärckte Agtſtein Pilulen.	—	12
Tartareæ Bontii. Bontii Weinſtein Pilulen.	—	4
Schrœderi. Schröders Weinſtein Pilulen.	—	8
Quercetani. Quercetani Weinſtein Pilulen.	—	10
de Terebinthina. Terpentin Pilulen.	—	6
*Pineæ. vid. nuces Pineæ. Pinien oder Zürbelnüßlein.	1. Loth.	3
*Piper album. Weiſſer Pfeffer.	—	3
hiſpanicum. Spanniſcher Pfeffer.	—	2
*longum. Langer Pfeffer.	—	4
*nigrum. Schwartzer Pfeffer.	—	2
*Piſtaceæ. vid. Nuces piſtaceæ. Welſche Pimpernüßlein.	—	6
Pix navalis. Schiff Pech.	—	1
Plumbum uſtum. Gebrannt Bley.	—	2
Pompholyx ſ. nihilum album. Weiſſer Nichts.	—	2
Priapus cervi. Hirſch Ruthe.	—	6
ceti. Wallfiſch Ruthe.	—	8
Tauri. Ochſen Senne.	—	3
Propolis. Stopf Wachs.	—	2
Pruna Laxativa. Laxier Zwetſchgen.	—	6
Pulmo Vulpis præparatus. Präparirte Fuchs Lungen.	—	6
Pulpa Caſſiæ. Caßien Marck.	—	6
Paſſularum minorum. Roſinen Marck.	—	2
Prunorum. Zwetſchgen Marck.	—	2
Tamarindorum. Tamarinden Marck.	—	4
Pulvis contra abortum. Pulver wider die frühzeitige Geburt mit Zucker.	—	4
Abſorbens Wedel. Wedels abſorbirend Pulver.	—	24
contra acredinem. Pulver wider die Schärffe.	—	12
Albus Viennenſis. Weiſſes Wiener Pulver.	—	8
Alexipharmacus Camerarii. D. Cammerers Gifft Pulver.	—	8
Rollwagii. D. Rollwags Gifft Pulver.	—	12
ruber. Rothes Gifft Pulver.	—	12
Analepticus frig. Mindereri Compl. Minderers ſtärckend Pulver mit Ambra.	—	48

	1. Loth.	kr.
Pulvis Analepticus frig. Mindereri incompl. Minderers stärckend Pulver ohne Ambra.	—	16
Anodynus Camerarii. D. Camerers schmertzstillendes Pulver.	—	48
Ludovici. Ludwigs schmertzstillendes Pulver.	—	48
Anonymus. Brust und Husten Pulver.	—	8
Antarthriticus Wepferi. D. Wepfers Glieder Pulver.	—	24
Antilyssus. Pulver gegen den tollen Hunds Biß.	—	8
Antispasmodicus Stahlii. Kühlendes Krampf Pulver.	—	12
Bezoardicus albus Ludovici. Ludwigs weiß Bezoar Pulver.	—	12
Anglicus s. Kentianus compl. Englisch Bezoar Pulver.	3. Gran. 1. Qtl.	2 40
incompletus. Englisch Bezoar Pulver ohne Perlen und Bezoar.	1. Loth.	32
Sennerti. Sennerts Bezoar Pulver. 1. Quintl. 1. fl.	2. Gran.	3
Cachecticus Quercetani completus. Bleichsucht Pulver mit Ambra.	1. Qtl.	24
incompletus. Bleichsucht Pulver ohne Ambra.	1. Loth.	16
ad Calculum. Grieß oder Stein Pulver.	—	24
Carthusianus s. kermes minerale. Rothes mineralisches Brech Pulver.	1. Gran.	2
contra Casum. Fall Pulver.	1. Loth.	12
cephalicus albus c. saccharo. Weisses Haupt Pulver.	—	16
Camerarii c. saccharo. D. Cammerers Haupt Pulver mit Zucker.	—	16
s. saccharo. ohne Zucker.	—	24
Winteri. D. Winters Haupt Pulver.	—	32
Cervinus Camerarii. D. Cammerers Hirsch Pulver.	—	16
e chelis cancrorum compos. completus. Krebs Pulver mit Bezoar und Perlen.	1. Qtl.	40
incompletus. ohne Bezoar und Perlen.	1. Loth.	16
anticolicus Camerarii. D. Cammerers Pulver wider die Colic.	—	16
confortans Camerarii. D. Cammerers stärckend Pulver.	1. Scrup.	20
contrayervæ compositus. Besonder Gifft Pulver.	1. Loth.	32
cordialis Zellensis. Zellisches rothes Gold Pulver.	—	48
Cornachinus s. comitis de Warwich. Cornachin Pulver zum Purgieren.	—	32
Cosmeticus ad manus. Pulver zum Handwaschen.	—	3
dentifricius. Zahn Pulver.	—	6
Dysentericus. Pulver wider die Ruhr.	—	12

	1. Loth.	kr.
Pulvis ad Dysuriam cum saccharo. s. mitigans Wepferi. Harnwind Pulver.	—	8
epilepticus Cellarii cum castoreo. Cellarii Gicht Pulver mit Bibergail.	1. Qtl.	24
s. castoreo. Cellarii Gicht Pulver ohne Bibergail.	1. Loth.	20
de Gutteta Riverii. Riverii Gicht Pulver.	—	32
Holsaticus. Hollsteinisch Gicht Pulver.	—	48
Marchionis. Marggrafen Pulver.	—	48
mirabilis Mynsichti. Mynsichts Gicht Pulver.	—	40
ruber. Rothes Gicht Pulver.	—	40
Viennensis niger. Schwartz Wiener Pulver.	—	24
erysipelatodes. Mynsichts äusserlich Rothlauffen Pulver.	—	3
ad flatus. Wind Pulver.	—	6
fumalis odoratus. Wohlriechend Rauch Pulver.	—	6
Haugii. D. Haugens Rauch Pulver.	—	4
Galactopæus. Milch Pulver.	—	8
Haly contra Phthisin. Pulver wider die Schwindsucht.	—	8
Hepaticus Dresdensis. Rothleber Pulver.	—	12
Hystericus. Mutter Pulver.	—	16
incidens Stahlii. D. Stahlens auflösend Pulver.	—	12
lenitivus. Gelind laxirend Pulver.	—	12
Mantuanus. Mantuanisches Bezoar Pulver.	1. Gran.	1
Martialis Anglicus. Englisches Stahl Pulver.	1. Loth.	16
mitigans Wepferi. Wepfers lindrendes Pulver.	—	8
ad morsum canis rabidi. Pulver wider den wütigen Hundsbiß.	—	8
Nephriticus pretiosus. Kostbares Grieß Pulver.	1. Qtl.	12
Pannonicus ruber minus pretiosus. Corrigirtes Ungarisch Gifft Pulver.	1. Loth.	16
ordin. completus. Ord. Ungarisch Gifft Pulver mit Pretiosis.	—	40
incompletus. Ord. Ungarisch Gifft Pulver ohne Pretiosis.	—	20
ad Partum. Pulver zur schwehren Geburt.	—	24
Pleuriticus August. Pulver wider das Seitenstechen.	—	16
Mynsichti. Mynsichts Seitenstechen Pulver.	—	16
præcipitans Stahlii. D. Stahlens Präcipitir Pulver.	—	12
Purpureus Anglicus. Rothes Englisches Gifft Pulver.	—	16
resolvens Stahlii simplex. D. Stahlens resolvirendes Pulver.	—	12
compositus. D. Stahlens vermehrt Resolvir Pulver.	—	16
Scillæ compositus. Meerzwiebel Pulver.	—	12
antispasmodicus nitrosus. Kühlend Krampf Pulver.	—	12

	1. Loth.	kr.
Pulvis Sternutatorius albus Camerarii. Cammerers weisser Schnupf Tabac.	—	24
Gmelini. D. Gmelins weisser Schnupf Tabac.	—	32
Nopsii. Nopsens Tabac.	—	20
viridis. Grüner Schnupf Tabac.	—	16
Stomachicus Birkmanni. Birckmann Magen Pulver.	—	8
ad Strumas. Kropff Pulver.	—	6
temperans. Rothes Temperir Pulver.	—	12
ad Tormina infantum. Kinder Grimmen Pulver.	—	16
Vermes. Wurm Pulver.	—	24
Viennensis albus. weiß Wiener Pulver.	—	8
niger. schwartz Wiener Pulver.	—	24
Vitæ Imperatoris. Kayserl. Lebens Pulver.	—	8
Pumex. Bimsenstein.	—	1
præparatus. Präparirter Bimsenstein.	—	4
Pyrethrum. vid. Radix Pyrethri. Bertram Wurtz.	—	2
Q.		
Quercus folia. Eichen Laub.	1. Hvoll.	1
R.		
Radix Acetosæ. Sauerampffer Wurtzel.	1. Loth.	1
Acori veri s. Calami aromatici. Calmus.	—	1
vulgaris. Ackermann.	—	1
Alceæ. Fellriß Wurtz, Sigmars Wurtz.	—	3
Allii vulgaris. Knoblauch Wurtz.	—	1
Altheæ. Eibisch Wurtz.	—	1
Amaræ dulcis. Hünschkraut Wurtz, Bittersüß.	—	2
Anchusæ s. Alkannæ rubræ. Roth Ochsenzungen Wurtz.	—	2
Angelicæ veræ. Angelic, Brust oder Engel Wurtz.	—	2
silvestris. Wild oder gemein Angelic.	—	2
*Anthoræ. Gifftheil.	—	10
Apii palustris, Paludapii. Gemeiner Eppich.	—	1
sativi. Garten Eppich.	—	1
Aquilegiæ. Agley Wurtz.	—	2
Arnicæ s. lapsorum Panacea. Wollferley, Arnic oder Fallkraut Wurtz.	—	3
Ari, Barbæ Aronis. Aaron Wurtz, Pfaffenbünd.	—	2
præparata. Präparirte Aaron Wurtz.	—	4
Aristolochiæ Clematidis rectæ. Osterlucey Wurtz.	—	2
fabaceæ. Runde kleine Hohlwurtz.	—	2
longæ veræ. Lang Osterlucey Wurtz.	—	3
rotundæ veræ. Welsch runde Osterlucey Wurtz.	—	3
vulgaris s. fumariæ bulbosæ. gemeine Hohlwurtz.	—	1
Artemisiæ. Beyfuß oder Gürtelwurtz.	—	2
Asari. Haselwurtz.	—	2
Asparagi sativi. Spargel Wurtz.	—	1

		kr.
Radix Asphodeli. Asphodill oder Gold Wurtz.	1. Loth.	2
Barbæ caprinæ s. Ulmariæ. Geisbart Wurtz.	—	1
Bardanæ s. Lappæ majoris. Kletten Wurtz.	—	1
Been albi. Weiß Been Wurtzel, Widerstoß.	—	2
rubri. Roth Been Wurtz.	—	3
Bistortæ. Natter Wurtz.	—	1
Borraginis. Borretsch Wurtz.	—	1
Brusci rusci. Mausdorn Wurtz.	—	2
Bryoniæ. Zaunrüben, Stickwurtz.	—	1
Buglossæ. Ochsenzungen Wurtz.	—	1
Capparis. Cappern Wurtz.	—	2
Cardopatii s. Carlinæ. Eberwurtz.	—	1
Cardui benedicti. Cardobenedicten Wurtz.	—	1
Caryophyllatæ. Nägel Benedicten Wurtz.	—	1
Chelidonii majoris vulg. Groß Schelkraut Wurtz.	—	1
minoris. Feigwartzen Wurtz.	—	3
*Chinæ. China oder Pocken Wurtz.	—	4
Cichorii hortensis. Gartenwegwart Wurtz.	—	1
silvestris. Wild Wegwart Wurtz.	—	1
Colchici albi s. Hermodactylorum. Hermodattel.	—	3
Colubrinæ s. Bistortæ. Natter Wurtz.	—	1
Consolidæ s. symphiti majoris. Wallwurtz.	—	1
*Contrajervæ. Gifftwurtz.	—	10
*Costi amari. Bitter Costwurtz.	—	6
*dulcis. Süsse Costwurtz.	—	4
Cucumeris Asinini. Esels Kürbis Wurtz.	—	2
*Curcumæ. Gilbwurtz.	—	2
Cyclaminis. Schweinbrod Wurtz.	—	3
Cynoglossæ majoris. Hundszungen Wurtz.	—	2
Cyperi longi. Lang Cyper Wurtz.	—	3
rotundi. Rund Cyper Wurtz.	—	2
Dentariæ majoris. Groß Schuppen Wurtz.	—	2
minoris. Klein Zahn oder Schuppen Wurtz, weisse Steinbrech Wurtz.	—	2
Dentis Leonis s. Taraxaci. Pfaffenröhrlein Wurtz.	—	1
Diptamni albi. Weisser Diptam.	—	2
*Doronici Romani. Römisch Gemsen Wurtz.	—	6
*vulgaris. Gemsen Wurtz.	—	4
Dracunculi palustris. Drachen Wurtz.	—	2
Ebuli. Attich Wurtz.	—	1
Ellebori albi. Weiß Nießwurtz.	—	1
nigri styriaci. Schwartz Nießwurtz.	—	2
Enulæ campanæ s. Helenii. Alant Wurtz.	—	1
Eryngii. Mannstreu Wurtz.	—	2
Esulæ minoris. Klein Wolffsmilch Wurtz.	—	3
Farfaræ. Hufflattich Wurtz.	—	1
Filicis fœmininæ. Farnkraut Wurtz.	—	1
Filipendulæ. Roth Steinbrech Wurtz.	—	2
Fœniculi. Fenchel Wurtz.	—	2
Fragariæ. Erdbeer Wurtz.	—	2
Fraxinellæ. vid. Diptamni albi.	—	2
*Galangæ. Galgant.	—	3

		kr.
Radix Gentianæ cruciatæ. Creutz Wurtz, bittere Wurtz.	1. Loth.	2
majoris luteæ. Gemeiner Entian.	—	1
Graminis. Gras oder Quecken Wurtz.	—	1
*Hermodactylorum. Hermodattel.	—	3
Hirundinariæ s. Vincetoxici. Schwalben Wurtz.	—	1
Hyosciami. Bilsen Wurtz.	—	1
Hydrolapathi. Wasser Mengel Wurtz.	—	1
*Hypecacuanhæ. Brech oder Ruhr Wurtz.	—	16
in pulvere.	—	20
*Jalappæ. Jalappen Wurtz, Gallen Wurtz.	—	6
Imperatoriæ s. Ostrutii. Meisterwurtz.	—	1
*Ipecacuanhæ. vid. Hypecacuanhæ.		
Iridis Florentinæ. Florentinische Veiel Wurtz.	—	2
nostratis. Schwertel Wurtz.	—	1
Lapathi acuti. Grindwurtz.	—	2
Levistici. Liebstöckel Wurtz.	—	2
Liliorum alborum. Weiß Lilien Wurtz.	—	2
Liquiritiæ recentis. Frisch Süßholtz Wurtz.	—	1
exsiccatæ. Dürr Süßholtz.	—	2
Malvæ. Pappel Wurtz.	—	1
Mandragoræ. Alraun Wurtz.	—	3
*Mechoacannæ albæ. Weisse Jalappen.	—	8
*nigræ s. Jalappæ. Jalappen.	—	6
*Metalistæ. ad Æquitat. Bonit.	—	—
Meu. Bärwurtz.	—	2
Mongos. Mongos, Indianische Gifft Wurtz.	—	—
Morsus diaboli s. Succisæ. Teuffels Abbiß.	—	1
Ninsing. Indianische Krafft Wurtz.	1. Gran.	6
Nymphææ albæ. Weisse Seeblumen Wurtz.	1. Loth.	1
citrinæ. Gelbe Seeblumen Wurtz.	—	1
Oelsnitii. Oelsenich.	—	2
Ononidis sive Restæ bovis. Hauhechel Wurtz.	—	1
Ostrutii s. Imperatoriæ. Meisterwurtz.	—	1
Oxylapathi s. Lapathi acuti. Grindwurtz.	—	1
Palmæ Christi. Creutzblum Wurtz.	—	3
Pareiræ bravæ. Indianische Grieß Wurtz.	—	6
Pentaphylli. Fünffingerkraut Wurtz.	—	1
Petasitidis. Pestilentz Wurtz.	—	1
Petroselini. Peterling Wurtz.	—	1
Peucedani. Haarstrang.	—	2
Phu Pontici s. Valerianæ hortensis. Welscher Baldrian.	—	3
Pimpinellæ sanguisorbæ. Welsch Bibernell Wurtz.	—	2
saxifragæ s. albæ. Weiß Bibernell Wurtz.	—	2
Plantaginis. Wegerich Wurtz.	—	1
Pæoniæ. Gichtrosen Wurtz.	—	3
Polygonati majoris s. sigilli Salomonis. Weiß oder Schminck Wurtz.	—	2
Polypodii querni. Engelsüß.	—	1
Pseudoacori s. Acori vulgaris. Ackermann.	—	1
Pulsatillæ. Kuchenschell, Osterblum Wurtz.	—	3
Pyrethri. Bertram, St. Johannes Wurtz.	—	3

		kr.
Radix Raphani rustici s. armoraciæ. Meer Rettig.	1. Loth.	2
Rhabarbari Monachorum. Mönchs Rhabarbara.	—	2
*veri. Edel Rhabarbara, von der feinsten.	—	48
Rhapontici veri. Gerechte Rhapontic.	—	6
vulgaris. Gemeine Rhapontic.	—	3
Rhodiæ. Rosenwurtz.	—	4
Rubiæ tinctorum. Färberwurtz oder Färberröthe.	—	2
Rusci. vid. Radix Brusci. Mausdorn Wurtz.	—	2
Saniculæ. Sanikel Wurtz.	—	2
Saponariæ. Seiffenkraut Wurtz.	—	2
*Sarssaparillæ. Sarssaparill.	—	4
*selectæ. Auserlesene Sarssaparill.	—	6
Satyrii. Stendelwurtz.	—	4
Saxifragiæ albæ. Weisser Steinbrech Wurtz.	—	4
rubræ s. filipendulæ. Rother Steinbrech Wurtz.	—	2
Scabiosæ. Apostemkraut Wurtz.	—	6
Scillæ præparatæ. Präparirte Meer Zwiebel.	—	6
recentis. Frische Meer Zwiebel.	—	2
Scorzoneræ. Scorzoneren Wurtz.	—	2
Scrophulariæ. Kropff oder Braun Wurtz.	—	1
Serpentariæ Virginianæ. Virginianisch Schlangen Wurtz.	—	12
Sigilli Salomonis. vid. polygonati major. Weiß oder Schminck Wurtz.	—	2
Simarubæ.	—	40
Squamariæ s. Dentariæ minoris. Schuppen Wurtz.	—	2
Succisæ s. morsus diaboli. Teuffels Abbiß.	—	1
Spicæ Celticæ. Celtischer Narden.	—	3
*Indicæ. Indianische Spicanard.	—	16
Taraxaci. Pfaffenröhrlein Wurtz.	—	1
Tormentillæ. Tormentill oder Ruhrwurtz.	—	1
Trifolii aquatici s. fibrini. Fieberklee Wurtz.	—	2
Tussilaginis s. farfaræ. Hufflattich Wurtz.	—	1
*Turbith. Turbith oder Purgier Wurtz.	—	8
Valerianæ minoris silvestris. Baldrian Wurtz.	—	1
Victorialis longæ. Allermannsharnisch Wurtz.	—	2
rotundæ. Rund Allermannsharnisch Wurtz.	—	3
Vincetoxici s. Hirundinariæ. Schwalben Wurtz.	—	1
Ulmariæ s. Barbæ caprinæ. Geißbart Wurtz.	—	1
Urticæ. Nessel Wurtz.	—	1
*Zedoariæ. Zitwer Wurtz.	—	4
Zingiberis albi. Weiß Ingber.	—	2
vulgaris. Gemeiner Ingber.	—	1
Regulus Antimonii martialis. Spießglaß König mit Stahl.	—	12
medicinalis. Medicinalischer Spießglaß König.	—	12
simplex. Spießglaß König.	—	8
ustus. Gebrannter Zaun König oder Zaun schlupfferlein.	—	16
*Resina Jalappæ s. Magisterium Jalappæ. Jalappen Hartz.	1. Qtl.	16

		kr.
Resina Ligni sancti. Frantzosenholtz Hartz.	1. Qtl.	4
*scammonii. Scammonien Hartz.	—	16
vulgaris. Gemeines Hartz, Fichten Hartz.	2. Loth.	1
*Rhabarbarum verum. Edel Rhabarbara der feinsten.	1. Loth.	48
der mittlern.	—	30
Rhaponticum verum. Gerechte Rhapontic.	—	6
vulgare. Gemeine Rhapontic.	—	3
Rhinocerotis cornu. Naßhorn.	—	10
præparatum. Präparirt Naßhorn.	—	20
Ribes conditi. Eingemachte Johannes Beerlein.	—	2
Rob Acaciarum. Eingesottener Schlehen Safft.	—	2
Berberum. Eingesottener Erbselen Safft.	—	2
Cerasorum. Eingesottener Kirschen Safft.	—	2
Cornorum. Dörrlitzen Lattwerg.	—	2
Cynosbati. Hagenbutzen Geseltz.	—	2
Diamoron. Dicker Maulbeer Safft.	—	3
Ebuli. Attich Geseltz.	—	1
Juniperi. Wachholder Geseltz.	—	1
Nucum. Nuß Geseltz.	—	2
Ribium. Johannes Beer Geseltz.	—	2
Rubi Idæi. Himbeer Geseltz.	—	2
Sambuci. Holder Geseltz.	—	1
Rorella. Sonnenthau.	1. Hvoll.	4
Rotulæ Berberum. Rothe Krafft Küchlein.	1. Loth.	2
Diaireos. Violen Wurtz Küchlein.	—	3
Manus Christi s. saccharum perlatum. Perlen Mutter Zucker.	—	4
Diatragacanthi, Traganth Küchlein.	—	3
contra vermes. Wurm Küchlein.	—	8
Rubinus præparatus. Präparirter Rubin.	—	48

S.

		kr.
Sabina. vid. herba sabina. Sevenbaum.	1. Hvoll.	1
*Saccharum Canariense. Canarien Zucker des feinsten.	1. Loth.	2
*Candi album. Weisser Zucker Candel.	—	3
rubrum. Brauner Zucker Candel.	—	2
violatum. Violen Zucker.	—	3
clarificatum. Geläuterter Zucker.	—	2
Lactis crystallisatum. Feiner Milch Zucker.	—	16
Butyros. Gemeiner Milch Zucker.	—	8
Perlatum s. manus Christi. Perlenmutter Zucker.	—	4
Rosatum tabulatum. Rosenzucker Morsellen.	—	3
Saturni crystallisatum. Crystallisirter Bley Zucker.	—	20
ordinar. Ordinari Bley Zucker.	—	12
Thomæ. Thomas Zucker.	—	1
Saflor. vid. Flores Carthami s. Cnici.	—	3
*Sagapenum. Serapin Gummi.	—	10
Sal Absinthii. Wermuth Salz.	—	16
Acetosellæ essentiale. Essentialisch Buchampffer oder Sauer Klee Salz.	—	40

Sal

		kr.
Sal Agrimoniæ. Odermeng Salz.	1.Loth.	16
Ammoniacum. Salmiac.	—	3
Anglicum laxativum s. Sal Ebsham. Englisch Laxier Salz.	—	3
depuratum. Gereinigt Englisch Laxier Salz.	—	4
volatile, s. sal Armoniacum volatile siccum. Englisches flüchtiges Salz zum riechen.	—	24
Artemisiæ. Beyfuß Salz.	—	16
Cardui benedicti. Cardobenedicten Salz.	—	20
Catharcticum amarum s. sal Ebsham. Englisch Laxier Salz.	—	3
Centaurii minoris. Tausendgüldenkraut Salz.	—	20
Cichorii. Wegwarten Salz.	—	16
Chamomillæ. Chamillen Salz.	—	16
Coralliorum s. solutio. Corallen Salz.	—	24
Cornu cervi volatile. Flüchtig Hirschhorn Salz.	—	48
Egranum. Eger Sauerbrunnen Salz.	—	10
Ebshamense s. catharcticum amarum. Englisch Laxier Salz.	—	3
Euphrasiæ. Augentrost Salz.	—	20
Fœniculi. Fenchel Salz.	—	16
Febrifugum Sylvii. Sylvii Fieber Salz.	—	12
Fraxini. Eschenholtz Salz.	—	16
Fumariæ. Erdrauch Salz.	—	16
Gemmæ. Stein Salz.	—	1
Genistæ. Pfriemen Blumen Salz.	—	16
Hyperici. Johanneskraut Salz.	—	20
Juniperi. Wachholder Salz.	—	12
Lumbricorum terrestrium volatile. Flüchtig Regen Würm Salz.	1. Qtl.	20
Margaritarum. Perlen Salz.	1.Gran.	2
Marinum. Meer Salz.	1. Loth.	1
Matris perlarum. Perlenmutter Salz.	1. Qtl.	6
Mirabile Glauberi. Glaubers Wunder Salz.	1.Loth.	12
Ononidis. Hauhechel Salz.	—	16
Petroselini. Peterling Salz.	—	20
Polychrestum de Seignette. Seignetens Polychrest oder Laxier Salz.	—	8
Sedlizense. Sedlitzer bitter Salz.	—	6
Sodæ Hispanicæ. Soda Salz.	—	1
Succini volatile. Flüchtig Agtstein Salz.	1. Qtl.	10
Tartari fixum. Fixirtes Weinstein Salz.	1. Loth.	4
volatile Takenii. Takenii flüchtig Weinstein Salz.	1. Qtl.	30
ordinarium. Ordinari flüchtig Weinstein Salz.	—	15
Tamarisci. Tamarisken Salz.	1. Loth.	16
Tanaceti. Rheinfarn Salz.	—	16
Veronicæ. Ehrenpreiß Salz.	—	20
Viperarum volatile. Flüchtig Vipern Salz.	1. Qtl.	30

	1. Loth.	kr.
Sal volatile oleosum Angelicæ. Börhavs flüchtige Angelick Tropffen.	—	20
liquidum Sylvii. Sylvii feuchtes flüchtiges Salz.	—	24
Gmelini. D. Gmelins flüchtig flüßiges Salz.	—	16
siccum Anglicum. Englisch flüchtig Salz.	—	24
Urinæ volatile. Flüchtig Urin Salz.	1. Qtl.	16
Sandaraca Arabum s. Gummi Juniperi. Wachholder Hartz, trockener Firnieß.	1. Loth.	3
Græcorum s. mineralis. vid. Arsenicum rubrum. Rausch Gelb.	—	2
Sambuci baccæ s. grana Actes. Holderbeer.	—	1
*Sanguis Draconis in lachrymis. Fein Drachen Blut.	—	10
tabulis. Drachen Blut das ordinari.	—	4
Hirci præparatus & pulveris. Präparirt Bocks Blut.	—	3
Sandalum, vide Lignum santali album. Weiß Santelholtz.	—	3
citrinum. Gelb Santelholtz.	—	4
rubrum. Roth Santelholtz.	—	2
Sapo medicatus. Medicinische Seiffe.	—	3
Tartareus s. corrector Starkey. Starckeys Weinstein Seiffe.	—	24
Venetus. Venedische Seiffe.	—	2
Sarcocolla. Fleischleim Gummi.	—	4
*Sarsaparilla electa. vid. Radix Sarsaparillæ. Sarsaparill.	—	6
Sassafras. vid. Lignum Sassafras. Sassafras Holtz.	—	1
*Scammonium. Scammonium oder Purgier Safft.	—	24
præparatum. vid. Diacrydium.	1. Qtl.	10
Schœnanthum. Cammelstroh.	1. Loth.	6
Scilla præparata. Präparirte Meer Zwiebel.	—	6
*Sebesten. Schwartze Brustbeerlein.	—	3
Secundinæ humanæ præparatæ. Präparirte Nachgeburt.	—	40
Semen Abel Mosch. Bisam Saamen.	—	6
Acetosæ. Sauerampfer Saamen.	—	2
Agni casti. Keuschbaum Saamen.	—	3
Alkekengi s. Halicacabi. Juden Kirschen.	—	2
Altheæ. Eibisch Saamen.	—	2
Amaranthi s. fl. Amoris. Amaranthen Saamen.	—	3
Ammeos veri. Cretischer Ammi Saamen.	—	4
vulgaris. Gemeiner Ammi Saamen.	—	2
Amomi. Amomen, wohlriechender Saamen.	—	6
Anethi. Dill Saamen.	—	1
Angelicæ. Angelick Saamen.	—	2
Anisi. Aniß.	—	1
*Stellati. Stern Aniß, Badian.	—	8
Apii sativi. Eppich Saamen.	—	1
Aquilegiæ. Agley Saamen.	—	3
Asparagi. Spargel Saamen.	—	2
Atriplicis hortensis. Melten Saamen.	—	2
Aurantiorum. Pommerantzen Kern.	—	2

Semen

			fr.
Semen Basilici.	Basilien Saamen.	1. Loth.	4
Berberum.	Erbselen Saamen.	—	1
Bombacis.	Baumwollen Saamen.	—	3
Brassicæ rubræ.	Rother Köhl Saamen.	—	2
Buniadis s. napi.	Steckrüben Saamen.	—	2
Cannabis.	Hanff Saamen.	—	1
Cardui benedicti.	Cardobenedicten Saamen.	—	3
Mariæ.	Marien Distel Saamen.	—	2
Carthami s. Cnici.	Wilder Saffran Saamen.	—	2
Carvi.	Kümmich.	—	1
Cataputiæ majoris s. Ricini.	Wunderbaum Saamen.	—	8
minoris s. Tithymali.	Klein Spring Körner.	—	6
Chærefolii.	Körfel Kraut Saamen.	—	2
Cicerum alborum.	Weisse Ziesser Erbsen.	—	1
rubrorum.	Rothe Ziesser Erbsen.	—	1
Cichorii hortensis sativi.	Wegwarten Saamen.	—	2
*Cinnæ s. Cynæ.	Wurm Saamen.	—	6
Citri.	Citronen Kern.	—	4
Citrulli.	Citrullen oder Angurien Saamen.	—	2
Coccognidii.	Kellerhals Saamen.	—	4
Cochleariæ.	Löffelkraut Saamen.	—	4
Colocynthidis.	Coloquinten Saamen.	—	2
Coriandri.	Coriander.	—	1
Cucumeris.	Cucummer Kern.	—	3
excorticatum.	Ausgescheelte Cucummer Kern.	—	8
Cucurbitæ.	Kürbis Kern.	—	2
excorticatum.	Ausgescheelte Kürbis Kern.	—	6
Cumini Romani.	Römischer Kümmich.	—	2
*Cydoniorum.	Quitten Kern.	—	6
Cynosbati.	Hagenbutzen Saamen.	—	1
Dauci Cretici.	Cretischer Möhren Kümmel.	—	4
vulgaris.	Gemeiner Möhren Kümmel.	—	1
Ebuli.	Attich Saamen.	—	2
Endiviæ albæ.	Winter Endivien Saamen.	—	4
Erucæ.	Weisser Senff.	—	1
Fabarum albarum.	Weisse Bohnen.	2. Loth.	1
Fœniculi cretici.	Römischer Fenchel Saamen.	1. Loth.	3
vulgaris.	Fenchel Saamen.	—	1
Fœnu græci.	Bockshorn Saamen.	2. Loth.	1
Fraxini.	Eschbaum Saamen.	1. Loth.	3
Fumariæ.	Erdrauch Saamen.	—	3
Genistæ.	Pfriemen Saamen.	—	2
Hyosciami albi.	Weisser Bilsamkraut Saamen.	—	2
Hyperici.	Johannesblumen Saamen.	—	4
Hyssopi.	Isoppen Saamen.	—	2
Lactucæ sativæ.	Lattich Saamen.	—	2
Lapathi acuti.	Grindwurtz Saamen.	—	2
Levistici.	Liebstöckel Saamen.	—	2

			kr.
Semen	Lini. Lein Saamen.	2. Loth.	1
	Lithospermi. vid. Milii solis. Meer Hirsen Saamen.	1. Loth.	2
	Lycopodii. Beerlappen Saamen.	—	4
	Malvæ. Pappeln Saamen.	—	2
	Melonum. Melonen Kern.	—	3
	excorticatum. Ausgeschelte Melonen Kern.	—	8
	Milii solis s. Lithospermi. Meer Hirsen Saamen.	—	2
	Napi sativi s. Buniadis. Steckrüben Saamen.	—	2
	Nasturtii hortensis. Gartenkreßig Saamen.	—	2
	Nigellæ. Schwartzer Kümmich.	—	1
	Papaveris albi. Weiß Oelmagen, Mohn Saamen.	—	2
	nigri. Schwatz Oelmagen Saamen.	—	1
	Perfoliatæ. Durchwachs Saamen.	—	2
	Petroselini Macedonici. Macedonischer Peterling Saamen.	—	4
	vulgaris. Gemeiner Peterling Saamen.	—	1
	Plantaginis. Spitzenwegerich Saamen.	—	2
	Pœoniæ. Gichtrosen Kern.	—	3
	Portulacæ. Portulac Saamen.	—	3
	Psyllii. Flöhkraut Saamen.	—	2
	Raparum. Rüben Saamen.	—	1
	Raphani. Rettich Saamen.	—	2
	Rusci. Mausdorn Saamen.	—	2
	Rutæ. Rauten Saamen.	—	3
	Sabadilli. Americanischer Läuß Saamen.	—	8
	Sambuci. Hollunder Beer.	—	1
	Santonici s. Cynæ. Wurm Saamen.	—	6
	Saxifragiæ. Steinbrech Saamen.	—	4
	Seseli Cretici. Cretischer Berg Kümmel.	—	4
	Masiliensis. Massilischer Berg Kümmel.	—	3
	Sinapi. Senff Saamen.	—	1
	Sophiæ Chirurgorum. Wall Saamen.	—	2
	Staphidis agriæ. Stephans Körner oder Laus Saamen.	—	2
	Sumach. Färberbaum Saamen.	—	2
	Thlaspi. Bauren Senff.	—	2
	Violarum. Blauer Violen Saamen.	—	12
	Viticis s. Agni casti. Keuschbaum Saamen.	—	3
	Urticæ Romanæ. Römischer Nessel Saamen.	—	3
	urentis vulgaris. Gemeiner Brenn Nessel Saamen.	—	2
Sennæ	folia electa. Auserlesene Sennet Blätter.	—	6
	folliculi. Sennet Bälglein.	—	4
Sericum	tostum. Präparirte Seiden Bälglein.	—	12
Serpentum	exuviæ. Schlangen Balg.	1. St.	3
Serpentaria	Virginiana. Virginianische Schlangen Wurtz.	1. Loth.	16
Sevum	bovinum. Ochsen Unschlitt.	2. Loth.	1
	cervinum. Hirsch Unschlitt.	1. Loth.	1
	hircinum. Bocks Unschlitt.	—	1
Sief	album c. opio. Augenzelten mit Opio.	—	12
	s. opio. Augenzelten ohne Opio.	—	12

		kr.
Siliqua dulcis. Johannis oder Sodt Brod.	1. Loth.	1
Smaragdus præparata. Präparirter Smaragd.	—	32
Smiris. Schmirgel.	—	1
Soda Hispanica. Spanisch Soda.	—	1
Solutio Coralliorum. vid. Sal Coralliorum. Corallen Salz.	—	24
matris Perlarum. Aufgelößte Perlenmutter.	—	16
Ocul. cancror. Aufgelößte Krebs Augen.	—	12
Sorbi torminalis fructus. Elster Beer.	—	1
Sotirella parva. Zahn Pilulen.	1. Qtl.	24
Species diambræ completæ. Ambrä Species mit Ambra.	—	20
incompleta. Ambrä Species ohne Ambra.	—	6
Dianisi. Anis Species.	—	4
Dianthos. Roßmarin.	—	4
contra apoplexiam completæ. Species wider den Schlag mit Ambra.	—	12
incompletæ. Species wider den Schlag ohne Ambra.	—	6
aromaticæ caryophyllatæ completæ. Gewürtz Species mit Nelcken und Ambra.	—	14
incompletæ. Gewürtz Species mit Nelcken ohne Ambra.	—	6
rosatæ completæ. Gewürtz Species mit Rosen und Ambra.	—	10
incompletæ. Gewürtz Species mit Rosen ohne Ambra.	—	6
Diaborracis. Borax Species.	1. Loth.	24
Diacinnamomi. Zimmet Species.	—	16
Cordiales temperatæ. Temperirte Hertz Species.	1. Qtl.	16
Diacretæ Mynsichti. Mynsichts Kreiden Trisenet.	1. Loth.	5
Camerarii. D. Cammerers Kreiden Trisenet.	—	6
de Gemmis frigidæ. Kühlend Edelgestein Pulver.	1. Qtl.	12
de Hiera. Bittere Aloe Species.	—	4
de Hyacintho completæ. Hyacinthen Species mit Ambra.	—	15
incompletæ. Hyacinthen Species.	—	6
dia Jalappæ Mynsichti. Jalappen Species.	—	6
Imperatoris. Triseneth Species.	—	3
dia Ireos simplices. Vejel Wurtz Species.	—	2
Lætificantes incompletæ. Aufmunterungs Species.	—	6
diamargaritæ calidæ. Erwärmende Perlen Species.	—	12
frigidæ. Kühlende Perlen Species.	—	15
diarrhodon Abbatis. Rosen oder Leber Species.	—	4
Tabaci pro fumo. Fluß Rauch Tabac.	1. Loth.	4
Camerarii. D. Cammerers Rauch Tabac.	—	6
Diatrion Santalon. Santel Species.	—	12
Diatragacanthæ frigidæ. Kühlende Tragant Species.	—	8
Diaturbith cum Rhabarbaro. Thurbith Species mit Rhabarbara.	—	32

Species pro decoctis.	1. Loth.	kr.
Species Decocti Avenæ s. Bromium. Species zur Haber Cur.	—	1
Carminativi. Wind Species zum Clystier.	—	2
emollientis. Erweichende Clystier Species.	—	2
florum & fructuum. Blumen und Frucht Species.	—	2
ad Gangrænam. Species zu Brand Umschlag.	—	2
Lignorum. Species zum Holtz Tranck.	—	3
nephritici Forest. Species zum Tranck wider das Grieß.	—	2
nigri. Species zum schwartzen Umschlag.	—	2
Pectoralis. Brust Species.	—	2
pro potu infantum. Kinder Tranck Species.	—	2
vulnerarii. Species zum Wund Tranck.	—	2
cephalicæ pro Cucupha. Haupt Species zum Kräuter Säcklein.	—	8
pro Epithemate. Haupt Species zum Umschlag.	—	3
pro Epithemate cordis & pulsuum. Hertz und Puls Umschläg.	—	8
pro Gargarismate adstringente. Species zum anziehenden Gurgel Wasser.	—	3
emolliente. Species zum erweichenden Gurgel Wasser.	—	2
Specificum antatrophon. Pulver gegen das Abnehmen.	—	8
antifebrile Crollii. Crollens Fieber Pulver.	—	8
cephalicum Michaelis. D. Michels Haupt Pulver.	—	48
antihecticum Poterii. Poterii Schwindsucht Pulver.	—	24
Jalappinum. Besonder Jalappen Pulver.	—	48
stomachicum Poterii. Poterii Magen Pulver.	—	32
Tartari pharyngicum. Salz zum Gurgel Wasser.	—	3
*Sperma Ceti. Wallrath.	—	8
Sperniola Crollii. Froschleich Pulver.	—	16
Spica Celtica. Celtischer Nardus.	—	3
*Indica. Indianischer Spicanard.	—	16
Spiritus Æruginis. Grünspan Geist.	—	16
Angelicæ. Angelick Spiritus.	—	4
Anisi. Anis Geist.	—	2
Anthos. Roßmarin Geist.	—	4
Antiscorbuticus. Spiritus wider den Scharbock.	—	8
Aperitivus Penoti. Penots eröffnender Geist.	—	20
Balsamicus. Weisser Lebens Balsam.	—	16
Balsami Peruviani. Peruvianischer Balsam Spiritus.	—	12

Spiritus

		kr.
Spiritus Bezoardicus Bussii. Bezoardischer Geist.	1. Loth.	24
Carminativus Sylvii. Sylvii Wind Spiritus.	—	8
de tribus. Besonderer Wind Spiritus.	—	8
Castorei. Bibergeil Geist.	—	24
Cerasorum nigrorum. Kirschen Geist.	—	2
Cochleariæ per cohobationem. Löffelkraut Geist.	—	6
Cornu cervi rectificatus. Hirschhorn Geist.	—	16
Corticum Aurantiorum. Pomerantzen Geist.	—	4
Citri. Citronen Geist.	—	4
Croci. Saffran Geist.	—	12
Cydoniorum per fermentationem. Quitten Geist.	—	4
Ebuli per fermentationem. Attich Geist.	—	4
Fragorum per fermentationem. Erdbeer Geist.	—	4
Fœniculi. Fenchel Geist.	—	2
Formicarum per abstractionem. Ameisen Geist.	—	4
Fuliginis. Ruß Geist.	—	12
Juniperi. Wachholder Geist.	—	2
Lavendulæ. Lavendel Geist.	—	4
Ligni Guajaci. Frantzosenholtz Geist.	—	8
Liliorum convallium. Mayenblümleins Geist.	—	4
Lumbricorum terrestrium vinosus. Regenwürm Geist.	—	4
volatilis. Flüchtiger Regenwürm Geist.	—	8
Mastichinus. Mastich Geist.	—	4
Matricalis. Matrical oder Glieder Geist.	—	4
Melissæ. Melissen Geist.	—	4
Mellis. Honig Geist.	—	8
Menthæ. Beymenthen Geist.	—	2
Nitri acidus. Salpeter Geist.	—	6
concentratus. Concentrirter Salpeter Geist.	—	16
anticolicus. Salpeter Geist gegen die Colick.	—	6
dulcis. Versüßter Salpeter Geist.	—	16
Panis. Brod Geist.	—	8
Rosarum per fermentationem. Fermentirter Rosen Geist.	—	16
cum vino. Rosen Geist mit Wein.	—	8
Salis Ammoniaci anisatus. Salmiac Geist mit Anis.	—	12
aromaticus. Salmiac Geist mit Gewürtz.	—	16
simplex vinosus. Gemeiner Salmiac Geist.	—	12
volatilis urinosus. Salmiac Geist mit Kalch.	—	12
succinatus. Salmiac Geist mit Agtstein.	—	16
coagulatus. Coagulirter Salz Geist.	—	20
communis acidus. Salz Geist.	—	4
concentratus s. Glauberianus. Glaubers concentrirter Salz Geist.	—	12

		kr.
Spiritus Salis dulcis. Versüßter Salz Geist.	1. Loth.	12
— Sambuci e floribus. Holderblüth Geist.	—	4
— Serpilli. Quendel Geist.	—	4
— Sulphuris. Schweffel Geist.	—	6
— Tartari simplex. Weinstein Geist.	—	8
— volatilis. Flüchtiger Weinstein Geist.	—	8
— Terebinthinæ. Terpenthin Geist.	—	3
— Theriacalis cum Camphora. Theriac Geist mit Campher.	—	12
— s. Camphora. Theriac Geist ohne Campher.	—	10
— de tribus. vid. Mixtura simplex. Weisse Bezoar Tinctur.	—	16
— Trifolii fibrini. Biberklee Geist.	—	4
— Vini Camphoratus. Campher Brantenwein.	—	3
— rectificatus. Rectificirter Brantenwein.	—	2
— simplex. Gemeiner Wein Brantenwein.	—	1
— tartarisatus. Tartarisirter Brantenwein.	—	4
— Vitrioli simplex. Vitriol Geist.	—	4
— coagulatus. Coagulirter Vitriol Geist.	—	16
— Philosophicus. Philosophischer Vitriol Geist.	—	8
— Urinæ. Urin Geist.	—	16
Spodium album s. Ebur ustum. Weiß gebrannt Elffenbein.	—	8
— præparatum. Präparirt Elffenbein.	—	12
— nigrum s. Ebur ustum nigrum. Schwartz gebrannt Elffenbein.	—	4
Spongia marina. Baad Schwamm.	—	4
— in fragmentis. Baad Schwamm in Stücken.	—	3
— combusta. Gebrannter Baad oder Kropff Schwamm.	—	12
Squinanthum. Cameelstroh.	—	8
Staphis agria. vid. Semen staphidis agriæ. Stephans Körner oder Lauß Saamen.	—	2
Stercus Pavonum. Pfauen Koth.	—	3
Stinci marini. Meer Stinz.	1. St.	24
Stœchas Arabica. Arabische Stöchas Blumen.	1. Loth.	3
— citrina. Gelbe Rhein Blumen.	—	2
Storax Calamita ordinaria. Storax, ein wohlriechender Gummi zum räuchern.	—	8
— in granis. Auserlesener Sorax.	—	30
— Liquida. Fliessender Storax.	—	4
Struthionis ova. Strausen Eyer.	—	12
Succinum album. Weisser Agtstein.	—	6
— flavum s. Carabe, Electrum flavum. Agt- oder gelber Bernstein.	—	4
— raspatum. Geraspelter Agtstein.	—	2
— præparatum album. Präparirter weisser Agtstein.	—	12

		kr.
*Succolade. Chocolade.	1. Loth.	3
Succus Berberum. Erbselen Safft.	—	2
*Chermes. Chermes, oder Scharlachbeer Safft.	—	8
Citri. Citronen Safft.	—	3
Cydoniorum. Quitten Safft.	—	2
Mororum. Maulbeer Safft.	—	3
Rubi Idæi. Himbeer Safft.	—	2
Hypociſtidis. Cisten Safft.	—	6
Liquiritiæ inſpiſſatus. Süßholtz oder Liquiritien Safft.	—	2
Sulphur auratum Antimonii primæ præcipitationis. Schwefel aus Spießglaß.	—	32
tertiæ præcipitationis. des feinsten Schwefels aus Spießglaß.	1. Qtl.	30
caballinum. Roß Schwefel.	2. Loth.	1
citrinum. Gelber Schwefel.	—	1
vivum gryſeum. Lebendiger grauer Schwefel.	1. Loth.	1
Suppoſitorium compoſitum. Stuhlzäpflein.	Nro. 1.	2
Syrupus Abſinthii compoſitus. Vermehrter Wermuth Safft.	1. Loth.	3
Acaciarum e floribus. Schlehenblüth Safft.	—	2
Acetoſæ. Sauerampffer Safft.	—	2
Acetoſellæ. Buchampffer Safft.	—	2
Acetoſitatis citri. Citronen Marck Safft.	—	3
Agreſtæ. Unzeitiger Weintrauben Safft.	—	2
de Althea Fernelii. Fernelii Eybisch Safft.	—	2
de Ammoniaco. Ammoniac Safft.	—	4
Artemiſiæ. Beyfuß Safft.	—	3
Balſamicus. Balsamischer Safft.	—	4
Bellidis ex ſucco. Gänßblumen Safft.	—	2
Berberum. Erbselen Safft.	—	2
Betonicæ. Betonien Safft.	—	2
Borraginis. Borragen Safft.	—	3
Bugloſſæ. Ochsenzungen Safft.	—	3
Brunellæ. Brunellen Safft.	—	2
Bryoniæ. Zaunrüben Safft.	—	2
Capillorum veneris ſimplex. Frauenhaar Safft.	—	2
Cardiacus. Hertzstärckender Safft.	—	4
Cardui benedicti. Cardobenedicten Safft.	—	2
Caſcarillæ. Chaquerillen Safft.	—	4
Centaurii minoris. Tausendguldenkraut Safft.	—	2
Ceraſorum acidorum. Weixeln Safft.	—	2
Chamomillæ vulg. Chamillen Safft.	—	2
Chenopodii ſ. Atriplicis Mexicanæ. Traubenkraut Safft.	—	2
de Cichorio cum Rhabarbaro. Wegwarten Safft mit Rhabarbara.	—	6
Cinnamomi. Zimmet Safft.	—	4
Citri e toto. Citronen Safft.	—	4
Cochleariæ. Löffelkraut Safft.	—	3
Contrajervæ. Indianischer Gifftwurtz Safft.	—	4

	1. Loth.	kr.
Syrupus Contrajervæ compositus. Vermehrter Indianischer Gifftwurtz Safft.	—	6
Coralliorum. Corallen Safft.	—	4
corticum Aurantiorum. Pomerantzenschaalen Safft.	—	3
Citri. Citronenschaalen Safft.	—	3
Croci. Saffran Safft.	—	6
de Cucurbita. Kürbiß Safft.	—	2
Cydoniorum. Quitten Safft.	—	2
Diacodium Montani. Johannisbrod Safft.	—	3
crocatum. Johannisbrod Safft mit Saffran.	—	4
domesticus s. de spina cervina. Creutzbeer Safft.	—	3
emeticus. Brech Safft.	—	4
Enulæ. Alant Safft.	—	2
de Erysimo Lobelii. Lobelii auflösender Brust Safft.	—	3
Farfaræ e floribus. Hufflattich Safft.	—	2
Fragorum. Erdbeer Safft.	—	2
Fumariæ. Erdrauch Safft.	—	2
Granatorum. Granaten Safft.	—	6
Granorum chermes. Chermes Safft.	—	6
Hederæ terrestris. Gundelreben Safft.	—	2
Hyperici. Johannisblumen Safft.	—	2
Hyssopi. Isoppen Safft.	—	2
de Jujubis. Brustbeerlein Safft.	—	2
Kinkinæ. Fieberrinden Safft.	—	4
Ligni Sassafras. Sassafras Safft.	—	4
Liquiritiæ. Süßholtz Safft.	—	2
de Manna. Manna Safft.	—	4
Masticinus. Mastix Safft.	—	4
Melissæ. Melissen Safft.	—	2
Menthæ. Beymenthen Safft.	—	2
Mercurialis, s. *de longue vie*. Safft zum langen Leben.	—	3
Mororum. Maulbeer Safft.	—	2
de Musco querno. Safft wider den wilden Husten.	—	4
Myrtillorum. Heydelbeer Safft.	—	2
Nicotianæ. Tabac Safft.	—	4
Nucistæ. Muscatnuß Safft.	—	4
Papaveris albi. Weisser Oelmagen Safft.	—	2
erratici. Schnallen Safft.	—	2
Paralyseos e floribus. Schlüsselblumen Safft.	—	2
Persicorum e floribus. Pfersichblüth Safft.	—	4
Plantaginis. Wegrich Safft.	—	2
Pœoniæ e floribus. Gichtrosen Safft.	—	2
de Rhabarbaro. Rhabarbara Safft.	—	6
Ribium. Johannisbeer Safft.	—	2
Rorellæ. Sonnenthau Safft.	—	4
Rosarum solutivus. Laxier Rosen Safft.	—	3
siccarum. Safft von trocknen Rosen.	—	2
simplex. Gemeiner Rosen Safft.	—	2

		kr.
Syrupus Rubi idæi. Himbeer Safft.	1. Loth.	2
Scelotyrbicus. Scharbocks Safft.	—	3
Scordii. Lachenknoblauch Safft.	—	3
Sedi Majoris. Haußwurtzel Safft.	—	2
de Squilla. Meer Zwiebel Safft.	—	4
Stœchadis. Stöchas Safft.	—	3
Sulphuris. Schwefel Safft.	—	3
Symphiti Fernelii. Wallwurtz Safft.	—	3
Tunicæ e floribus. Negelblumen Safft.	—	3
Veronicæ. Ehrenpreiß Safft.	—	2
Violarum. Blauer Violen Safft.	—	3
solutivus. Laxier Violen Safft.	—	4

T.

Tabulæ di Ambræ. Ambra Täffelein.	—	4
Berberum. vid. Rotulæ. Rothe Krafft Küchlein.	—	2
diaireos. vid. Rotulæ. Violenwurtz Küchlein.	—	3
dia Tragacanthi. Tragant Küchlein.	—	3
Talcum. Talck, Venedischer Talck.	—	2
Tali Leporis. Haasenspring.	—	16
Talpæ combustæ. Gebrannte Maulwürff.	—	12
*Tamarindi. Tamarinden, Saure Datteln.	—	3
Tamarindorum Pulpa. Tamarinden Marck.	—	4
Tartarus Chalybeatus. Gestählter Weinstein.	—	12
crudus. Weinstein.	2. Loth.	1
emeticus. Brech Weinstein.	1. Loth.	48
tartarisatus. Eröffnendes Weinstein Saltz.	—	12
Vitriolatus Takenii. Vitriolirter Weinstein.	—	8
ordin. Ord. vitriolirter Weinstein.	—	16
Terebinthina communis. Claret, gemeiner Terbenthin.	2. Loth.	1
Veneta. Venedischer Terbenthin.	—	3
vera s. de Cypro. Cyprischer Terbenthin.	1. Loth.	2
cocta. Gekochter Terbenthin.	—	4
*Terra Catechu s. Japonica. Japonische Erde.	—	6
foliata tartari. Mit Eßig saturirtes Weinstein Saltz.	—	32
Lemnia. Lemnische Erde.	—	3
Orleana. Orlean.	—	4
sigillata alba Goldberg. Weisse Schlesische Sigel Erde.	—	2
Melitensis. Maltheßische weisse Sigel Erde.	—	8
Turcica. Türckische weisse Sigel Erde.	—	2
grisea Siles. vel lutea Strigon. Graue Schlesische Sigel Erde.	—	2
rubra Turcica. Rothe Türckische Sigel Erde.	—	2
Tripolitana. Trippel Erde.	—	1
viridis, s. viride mont. Grüne Erde.	—	3
Vitrioli dulcis. Abgesüßte Vitriol Erde.	—	2
Testiculi equi. Pferds Geilen.	—	8
pulverisati. Pulverisirte Pferds Geilen.	—	12

		kr.
Theriaca Andromachi. Theriac.	1. Loth.	6
cœlestis. Himmlischer Theriac.	1. Gran.	3
*Thus s. olibanum. Weyrauch.	1. Loth.	3
*electum. Auserlesener Weyrauch.	—	4
Tinctura Aloës. Aloes Tinctur.	—	8
Amara. Bittere Englische Magen Tinctur.	—	8
Antimonii acris. Scharffe Spießglaß Tinctur.	—	16
tartarisata. Spießglaß Tinctur.	—	16
Antiphthisica Gramanni. Schwindsucht Tinctur.	—	12
Aquilegiæ e floribus. Agley Tinctur.	—	4
Aromatica. Gewürtz Tinctur.	—	8
Bellidis. Roth Maslieben Tinctur.	—	4
Bezoardica Ludovici. D. Ludwigs Bezoar Tinctur.	—	16
Michaëlis. Michaelis Bezoar Tinctur.	—	16
officinalis. Officinal Bezoar Tinctur.	—	16
Wedelii. Wedels Bezoar Tinctur.	—	16
Cantharidum. Spanische Mucken Tinctur.	—	16
Coralliorum. Corallen Tinctur.	—	20
Croci. Saffran Tinctur.	—	16
vinosa. Saffran Tinctur mit Wein.	—	24
Gingivalis balsamica. Balsamische Zahn Tinctur.	—	12
Hellebori composita. Schwartze Nießwurtz Tinctur.	—	12
Laccæ. Lack oder Zahn Tinctur.	—	16
Martis adstringens. Anhaltende Stahl Tinctur.	—	16
aperitiva spirituosa. s. Aroph Paracelsi. Paracelsi eröffnende Tinctur.	—	24
Tartarisata Ludovici. Ludwigs eröffnende Stahl Tinctur.	—	12
cydoniata. Quitten Stahl Tinctur.	—	8
helleborata. Stahl Tinctur mit schwartzer Nießwurtz.	—	12
pomata. Stahl Tinctur mit Aepffelsafft.	—	8
c. Vino Malvatico. Stahl Tinctur mit Malvasier und Pomerantzen.	—	12
ex vitriolo Zwelfferi. Zwelffers Stahl Tinctur.	—	16
Metallorum. Metall Tinctur.	—	16
Odontalgica Hoffmanni. Hoffmanns Tinctur in Zahnschmertzen.	—	12
proprietatis Mynsichti. Mynsichts Magen Tinctur.	—	8
Rhabarbari aquosa. Rhabarbara Tinctur mit Wasser.	—	8
composita. Zusammengesetzte Rhabarbara Tinctur.	—	16
spirituosa. Rhabarbara Tinctur mit Spiritu.	—	12
stomachica aromatica. Magen Tinctur mit Gewürtz.	—	16

Tinctura

	1. Loth.	kr.
Tinctura stomachica martialis. Magen Tinctur mit Stahl.	—	8
Lipsiensis. Leipziger Magen Tinctur.	—	12
Succini. s. Essentia Succini. Agtstein Tinctur.	—	16
Sulphuris. Schwefel Tinctur.	—	12
Tartari. Weinstein Tinctur.	—	12
Topasius præparatus. Präparirter Chrysolith.	—	16
Torna solis rubra s. Bezetta. Rother Spanischer Flor.	—	16
cœrulea. Blaufarb Flecklein.	—	12
Tragacantha vulgaris. Gemeiner Tragant.	—	4
electa. Auserlesener Tragant.	—	6
Tragea aromatica Gabelkoveri. Gabelkovers Magen Triseneth.	—	3
officinalis. Magen Triseneth.	—	3
Granorum Actes. Holder Triseneth.	—	4
Ophthalmica. Augen Triseneth.	—	4
Tribuli aquatici. Wasser oder Stechnüß.	—	2
Trochisci alhandal. Coloquinten Küchlein.	—	32
aliptæ moschatæ. Wohlriechende Zeltlein mit Ambra und Bisam.	—	48
Alkekengi c. opio. Judenkirschen Zeltlein mit Opio.	—	12
s. opio. Judenkirschen Zeltlein ohne Opio.	—	12
Alkermes completi. Alkermes Küchlein mit Bisam.	—	12
de Ambra. Ambra Zeltlein.	—	12
Anthelmintici s. hermetici Scretæ. D. Scretä Wurm Zeltlein.	—	16
Bechici albi. Weisse Husten Zeltlein.	—	2
citrini. Gelbe Husten Küchlein.	—	2
nigri. Schwartze Husten oder Stimm Küchlein.	—	2
rubri. Rothe Husten Küchlein.	—	2
de cremore Tartari. Weinstein Zeltlein.	—	2
de Carabe. Agtstein Zeltlein.	—	12
Catechu s. muscerda. Caschu mit Ambra.	1. Qtl.	16
ad sputum cruentum. Japonische Erden Zeltlein gegen das Blutspeyen.	1. Loth.	8
escharotici. Aez Zeltlein.	—	12
Galliæ moschatæ. Ambra Zeltlein.	1. Gran.	3
de Myrrha. Myrrhen Zeltlein.	1. Loth.	12
Scilla. Meer Zwiebel Zeltlein.	—	8
Viperarum Italic. Italiänische Vipern Zeltlein.	—	48
Tunicæ interiores ventriculorum gallinaceor. Hüner Magen Häutlein.	—	8
Turpethum minerale s. Mercurius præcipitatus flavus. Turbith oder gelber Präcipitat.	—	24
* Turpethi Radix. Turbith Wurtzel.	—	8
* Tutiæ. Tutien.	—	4
præparata. Präparirte Tutien.	—	8

V.

		kr.
Vaniglia. Vanillen.	1. St.	20
Ventriculi Gallinacei tunicæ interiores. Hüner Magen Häutlein.	1. Loth.	8
Vinum Cydoniorum. Quitten Wein.	2. Loth.	3
Granatorum. Granaten Wein.	1. Loth.	6
Rubi idæi. Himbeer Wein.	2. Loth.	2
Viperæ Germanicæ integræ. Teutsche Vipern.	1. St.	4
pulverisatæ. Pulverisirte Vipern.	1. Qtl.	12
Italicæ integræ. Italiänische Vipern.	1. St.	24
pulverisatæ. Pulverisirte Italiänische Vipern.	1. Qtl.	24
Viride æris s. ærugo. Grünspan.	1. Loth.	4
pulverisatum. Gestossener Grünspan.	—	6
montanum. vid. Terra virid.		
Viscus corylorum. Haaselstauden Mispel.	—	4
quercinus. Eichen Mispel.	—	2
Vitriolum album. Weisser Vitriol.	—	2
*cœruleum de Cypro. Blauer Vitriol.	—	5
Martis. Eisen Vitriol.	—	12
veneris. Kupffer Vitriol, destillirter Grünspan.	—	16
viride Hungaricum. Ungarischer Vitriol.	—	1
vulgare Goslariense. Gemeiner Vitriol, Kupfer Wasser.	2. Loth.	1
Gilla Theophrasti. Brech Vitriol.	1. Loth.	8
Ros s. phlegma. Sauerlechtes Vitriol Wasser.	—	4
terra dulcis. Abgesüßte Vitriol Erde.	—	3
Vitrum Antimonii. Brech Spießglaß.	—	4
Venetum. Venedisch Glaß.	—	1
Vmbilicus marinus s. faba marina. Meer Bohnen, Nabelstein.	1. St.	2
Vnguentum Ægyptiacum. Reinigende Aegyptiac Salb.	1. Loth.	2
Agrippæ. Agrippen Salb.	—	3
Alabastrinum. Alabaster Salb.	—	2
album camph. Bleyweiß mit Campher.	—	3
simplex. Kühl Bleyweiß oder kühlende Salb.	—	2
de Althea. Eybisch Salb.	—	2
ad ambusta. Brand Salb.	—	3
Anodynum. Schmertzstillende Salb.	—	2
Apostolorum. Grüne Wund oder Apostel Salb.	—	3
de Arthanita. Purgier oder Schweinbrods Salb.	—	6
Aureum. Güldene Wund Salb.	—	2
Basilicum. Basilien Salb.	—	2
Calendulæ florum. Ringelblümleins Salb.	—	2
Carminativum. Wind Salb.	—	4
Clysmaticum. Clystier Salb.	—	2
Comitissæ. Gräfin anhaltende Salb.	—	4

	1. Loth.	kr.
Vnguentum Digestivum comp. Wurzii. Wurtzens Digestiv Salb.	—	3
Digitalis. Flocken oder Fingerhut Salb.	—	2
Enulatum. Alant Salb.	—	2
Fuscum. Braun Salb.	—	3
de Hyosciamo. Bilsenkraut Salb.	—	3
infrigidans Galeni. Galeni Kühl Salb.	—	2
de Linaria. Leinkraut Salb.	—	2
de Liquiritia. Süßholz Salb.	—	3
de Lithargyrio. Silberglätt Salb.	—	2
Majoranæ. Majoran Butter oder Salb.	—	3
Malvæ. Pappel Salb.	—	2
Martiatum. Stärckende Glieder Salb.	—	4
de Minio camphoratum. Camphorirte Mini Salb.	—	3
Mundificans Stahlii. D. Stahlens reinigende Salb.	—	4
Neapolitanum. Salivations Salb.	—	4
Nervinum. Nerven Salb.	—	4
Nicotianæ. Tabacks Salb.	—	3
Nihili. Nichts Salb.	—	3
pectorale. Brust Salb.	—	4
Pediculorum. Bettler oder Lauß Salb.	—	2
Pomatum s. Florum Naphæ. Pomerantzen Blüth, Pomade.	—	6
dia Pompholygos. Augen Salb.	—	3
Populeum. Pappel Salb.	—	2
Purpureum Wurzii. Felix Wurtzens Salb.	—	4
Resumtivum. Schwind Salb.	—	4
Rosatum. Rosen Salb.	—	4
simplex. Rosen Pomade.	—	2
Rubrum ad Labia oris. Mund oder Lippen Pomade.	—	12
potabile sine spermate ceti. Rother Butter ohne Wallrath.	—	3
Santalinum. Santel Salb.	—	3
ad scabiem ord. Rauten Salb.	—	3
Zelleri. D. Zellers Rauten Salb.	—	6
somniferum. Schlaff Salb.	—	6
Spleneticum. Miltz Salb.	—	6
Stomachale. Magen Salb.	—	6
ad Tabem. Salb wider das Schwinden.	—	4
contra vermes. Wurm Salbe.	—	4
viride potabile. Grüner Butter.	—	3
de Vvis. Trauben Pomade.	—	4
Vngula Alcis. Elends Klauen.	—	10
præparata. Präparirte Elends Klauen.	—	24
Vnicornu fossile integrum. Gegraben Einhorn.	—	16
præparatum. Präparirt gegraben Einhorn.	—	24
*marinum s. verum integrum. Meer Einhorn.	—	16
*præparatum. Präparirt MeerEinhorn.	—	24

		kr.
Vvæ passæ. vid. passulæ. Rosinlen.	2. Loth.	1
Vulpis pulmones exsiccati. Gedörrte Fuchs Lungen.	—	8
X.		
* Xylo Aloës s. Agallochum, Lignum Aloës. Paradiß Holtz.	1. Loth.	16 20
Z.		
* Zedoariæ. vid. Radix Zedoariæ. Zittwer.	—	4
* Zibethum. Zibeth.	1. Gran.	6
Zingiber album. Weisser Ingwer.	1. Loth.	2
* conditum. Eingemachter Ingwer.	—	3
Zopissa s. Pix navalis. Schiff Pech.	—	1

NOTA.

Denen Ausländern, welche sich etwann dieses unsers Taxes bedienen möchten, wollen wir hiermit zur Nachricht anfügen: daß die Preise nach hiesiger Zahlung, nemlich nach Gulden und Kreutzern, eingerichtet sind, und ist der Gulden zu 15. Batzen, welche 16. ggr. betragen, oder 60. Kreutzern gerechnet.

TAXA

TAXA LABORUM,

Oder:

Was die Apothecker vor ihre Arbeit und Mühe fordern mögen.

Pro Decocto Lignorum 1. 2. mensurarum. Einen Holtz Tranck zu machen von 1. biß 2. Maas. = = = 12. kr.

Pro Decocto ad dimidias. Vor ein simples Decoctum zur Helffte eingesotten. = = = = 6. kr.

Pro Infusione per noctem. Vor eine Infusion über Nacht. = 2. kr.

Pro Destillatione ex Mariæ balneo pro die. Vor eine Destillation ex Balneo Mariä, ohne Kohlen, täglich. = = 1. fl.

Pro Decoctione Cataplasmatis. Vor ein Cataplasma zu kochen. 3. kr.

Pro Decoctione Clysteris. Vor ein Clystier zu kochen und zu machen. = = = = = 4. kr.

Pro Applicatione Clysteris. Vor Application eines Clystiers. = 30. kr.

Pro Emulsione 5. vel 6. Unciarum. Vor eine Emulsion zu 5. 6. Untzen, biß 1. Pfund. = = = 3. kr.

Pro Confectione Tabularum & Morsulorum libræ dimidiæ vel libræ unius. Vor Verfertigung der Küchlein und Morsellen von ½. biß 1. Pfund. = = = 8. biß 12. kr.

Pro Emplastro cum aluta & sindone. Vor ein Pflaster auf Leder zu streichen samt Leder und Santel. = = 15. kr.

Pro Emplastro cum aluta sine sindone. Vor ein Pflaster auf Leder zu streichen ohne Santel. = = = 8. kr.

Pro sacculo sive Cucupha ex sindone. Vor ein Kräuter Säcklein oder Häublein in Santel. = = = 12. kr.

Pro Nodulo ad Vina Medicata. Vor ein Kräuter Säcklein zum Kräuter Wein aus Leinwand. = = 4. kr.

Pro Divisione pulveris in 4 - 6. Doses. Vor Pulver in 4 = 6. Doses abzutheilen. = = = = 1. kr.

Pro Dividendo pulvere in 12. Doses. Vor Pulver in 12. Doses abzutheilen. = = = = 2. kr.

NB. Speciebus pulverem ingredientibus demum contundendis, duplum statuitur pretium. Wo die Species erst müssen gestossen werden, so wird alles doppelt bezahlt.

Pro Mistione & Malaxatione Emplastri sine Gummi 1 - 2. unciarum. Vor Pflaster zu mischen und zu malaxiren ohne Gummi von 2 = 4. Loth. = = = = 3. kr.

= = = = 2 - 4. unciarum. von 4. biß 8. Loth. = 8. kr.

Pro Mistione & Malaxatione Emplastri cum Gummi sive Mercurio 1 - 3. unciarum. Vor Pflaster zu mischen und zu malaxiren mit Gummi oder Quecksilber von 2 = 6. Loth. = 4. kr.

Pro formatione Pilularum Nro. 60. ex drachma una. Vor Pilulen zu formiren 60. auf ein Quintlein. = = 3. kr.

Pro Pilulis dosi unica. Vor Pilulen zu formiren zu einer Dosi. = = = = = = 1. kr.

Pro Deauratione Pilularum Nro. 3 - 10. Vor Vergüldung der Pilulen von 3 = 10. Stück. = = = 2. kr.
= = = = von 10 = 20. Stück. = 3. kr.
= = = = von 20 = 30. Stück. = 4. kr.
= = = = von 30 = 60. Stück. = 5. kr.
= = = = von 60 = 100. Stück. = 6. kr.

Pro Pilulis argento foliato obducendis. Vor Versilberung der Pilulen, nach vorstehender Proportion den halben Theil.

Pro incisione herbarum, florum, corticum, lignorum & radicum pro Thea 2 - 3. unciarum. Vor Incision der Kräuter und Blumen, Wurzeln und Rinden, nachdem deren viel oder wenig. = = = = 2. biß 4. kr.

Pro vitro Mixturis aut aquis destillatis asservandis destinato 4 - 6. unciarum capaci. Vor Gläser zu Mixturen und destillirten Wassern von 8 = 12. Loth. = = 3. kr.
= = Mensuræ dimidiæ. Von einer halben Maas. = 12. kr.
= = Mensuræ unius. Von einer gantzen Maas. = 18. kr.

Pro vitro pro Essentiis, Elixir & Spiritibus 1 - 2. drachmarum. Vor kleine Gläser zu Essentzien, Elixier, Spiritus rc. von 1. Qtl. biß ½. Loth. = = = 1. kr.
= = = = von 1 = 2. Loth. = 2. kr.

Pro scatula drachmarum 2. capaci. Vor Schachteln zu Pulvern oder andern trockenen Waaren zu ½. 1. 2. 3. Loth. = 1. kr.
= = = = von 4 = 8. Loth. = 2. kr.

Pro pyxidibus stanneis. Vor zinnerne Büchslein zu Balsam von ½. 1. biß 4. Loth. = = = 4. 6. 8. kr.

Pro fictili communi. Vor ein gemein Häffelein zu Lattwergen, von 2. biß 8. Loth. = = = 1. biß 2. kr.

Pro fictili porcellaneo 1 - 2. unc. Vor ein Porcellain Häffelein von 2. 4. biß 8. Loth. = = 3. 5. biß 6. kr.

APPEN-

APPENDIX
DE
MEDICAMENTIS,
IN TAXA
ASTERISCO NOTATIS,
QUORUM
SCILICET PRETIUM SÆPIUS VARIAT,
ET QUOD
JUXTA SCHEDULAS NUNDINALES PRETIORUM AUTHENTICAS, Preiß-*Courants* DICTAS, EX ÆQUO, QUOTIES OPUS FUERIT, ÆSTIMARI DEBET.

Agallochum. s. Lignum Aloës.
Aloë.
Ambra.
Amomum.
Amygdalæ.
Anisum stellatum.
Antophylli.
Anthoræ Radix.
Antimonium.
Aqua Aurantiorum s. Naphæ.
Asa dulcis.
 fœtida.
Aurantiorum mala.
Balsamus Indicus albus.
 niger.
Bezetta.
Bezoar Lapis Occidentalis.
 Orientalis.
Camphora.
Cantharides.
Cardamomum minus.
Caryophylli.
Cassia lignea.
Castoreum verum.
Chocolata.
Cinnamomum.
Cinnabaris nativa.
Citri mala.
Coccionella.
Cocculi de Levante.
Colla piscium.
Cortex Chinæ.
 Winteranus.
Costus Arabicus verus.
Crocus Orientalis.
Cubebæ.
Dactili.
Flores Benzoës.
Folia Sennæ.
Galanga.
Grana paradisi.
Gummi Ammoniacum.
 Animæ.
 Assa dulcis.
 fœtida.
 Carannæ.
 Galbanum.
 Guttæ.
 Hederæ.
 Opopanax.
 Sagapenum.
 Sanguis Draconis.
 Storax calamita.
 Tacamahaca.
Herba Thee.
Indigo.
Jujubæ.
Lacca Florentina.
Lignum Aloës.
Macis.

Magiſterium Jalappæ.
Scammonii.
Manna.
Margaritæ Occidentales.
Orientales.
Maſtiche.
Mechoacanna alba.
Mel.
Mercurius vivus.
Moſchus.
Myrrha.
Nux Indica condita.
Moſchata.
Oculi cancrorum.
Oleum Nuciſtæ expreſſum.
Olibanum. ſ. Thus.
Opium.
Pineæ.
Piper. album.
longum.
nigrum.
Piſtaciæ.
Radix Anthoræ.
Chinæ.
Contrajervæ.
Curcumæ.
Doronici.
Radix Galangæ.
Hermodactili.
Jalapæ.
Ipecacuannhæ.
Mechoacanna alba.
Rhabarbari veri Indici.
Sarſaparillæ.
Saccharum.
Scamonium.
Sanguis Draconis.
Sebeſten.
Semen Cynæ ſ. Cinæ.
Sperma Ceti.
Spica Indica.
Succolata.
Succus Chermes.
Tamarindi.
Terra Catechu.
Lemnia.
Thee.
Turpeth. Radix.
Tutia.
Unicornu verum.
Zodoaria.
Zibethum.
Zinziber Indicum conditum.

F I N I S.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.